

膵臓がんの薬物療法を受ける方へ

治療中に気をつけたい症状と、毎日の過ごし方


膵臓がんの治療では、点滴の抗がん剤を中心に、痛み止めや消化を助けるお薬などを一緒に使います。体力を保ちながら治療を続けるため、気になることは早めにご相談ください。

1 治療のスケジュールの例

膵臓がんでは点滴の抗がん剤を中心に、決まった間隔で治療をくり返します。

ゲムシタビン+nab-パ
クリタキセル

4週間ごとにくり返す



週1回の点滴を3週続け、1週お休み

S-1(手術後)

6週間ごとにくり返す



朝・夕食後に4週間飲んで、2週間お休み

■ 点滴・注射 ■ お休み ■ 飲み薬 数字は治療開始からの日数

点滴の日以外も、痛み止めや消化を助けるお薬、便秘のお薬は毎日続けます。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 37.5℃以上の熱や寒気がある
- 皮膚や白目が黄色い、尿の色が濃い、熱を伴う腹痛
- 水のような下痢が1日4回以上続く
- 咳・息切れが続く
- 食事や水分が1日以上とれない
- 片方の足の腫れや痛み、急な胸の痛み

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 医療用麻薬の痛み止めを使っている方は、便秘を防ぐお薬を続けましょう
- 消化を助けるお薬(膵消化酵素薬)は、食事の直後に飲みましょう
- のどが渇く、尿が多いなど、血糖の変化に気をつけましょう
- 食事は少しずつ回数を分けて、食べられる物を取りましょう
- 痛み止めで眠気が強い時は、ご相談ください
- 市販の薬・サプリメントを使う時は、事前にご相談ください