

ホルモン療法を続ける方へ

長く続けるためのコツと、体を守る工夫

ホルモン療法は、がんの栄養となるホルモンの働きを抑える治療です。5年、10年と続けることで再発を防ぐ効果が得られます。副作用には対処法があるので、つらい時はやめる前にご相談ください。

1 よくある症状と、自分でできる工夫

症状	自分でできる工夫
ほてり・汗	重ね着で調節する、カフェインやお酒を控える、寝室を涼しく保つ
関節のこばり・痛み	朝のストレッチや散歩など適度な運動。痛み止めの使い方は相談を
骨が弱くなる	カルシウム・ビタミンDをとる、日光に当たる、転ばないように足元に注意
気分の落ち込み・眠れない	一人で抱え込まず、医師・看護師・薬剤師に話してください
飲み忘れ	決まった時間に飲む習慣づけ、お薬カレンダーやスマートフォンのアラームを使う

「副作用がつらいからやめたい」と感じたら、自己判断でやめずに、まずご相談ください。薬の変更や対処法を一緒に考えます。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 片方の足の腫れや痛み、急な息切れ・胸の痛み
- 皮膚や白目が黄色い、強いだるさ
- 不正性器出血がある(タモキシフェンを使っている方)
- むくみ・動悸・力が入らない(アビラテロンを使っている方)
- 背中や腰の急な強い痛み、転んで骨を痛めた
- 全身に広がる発疹

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 毎日決まった時間に飲みましょう。アビラテロンは食事の1時間前から食後2時間までの間を避けて飲みます
- 注射の治療を受けている方は、次回の注射日を手帳やカレンダーに書いておきましょう
- 骨密度の検査を定期的に受けましょう。骨の注射を使う方は、歯科を受診する時に必ず伝えてください
- ほてりの治療などで他の病院からお薬が出た時は、薬剤師にお知らせください(効き目に影響する組み合わせがあります)
- 女性ホルモンを含む薬やサプリメントは、事前にご相談ください
- 体重・血圧を時々測り、記録しておきましょう