

免疫チェックポイント阻害薬を使う方へ

免疫の副作用(irAE)を早く見つけるために

このお薬は、体の免疫の力でがんを攻撃します。その免疫が自分の体の臓器に働きすぎると、さまざまな副作用(irAE)が起こることがあります。早く気づいて治療すれば、多くは軽くすむことができます。

1 体のどこに症状が出るか(免疫の副作用カード)

免疫の副作用は、全身のどこにでも起こる可能性があります。次のような症状に気づいたらご連絡ください。

皮膚

かゆみ・発疹

腸

下痢・腹痛・血便

肺

咳・息切れ・発熱

肝臓

皮膚や白目が黄色い・
だるさ

ホルモン

強いだるさ・食欲低下・
むくみ・動悸

血糖

のどが渇く・尿が多い・
体重減少

神経・筋肉

力が入らない・まぶたが
下がる

心臓・腎臓

胸の痛み・動悸・尿が
減る・むくみ

治療が終わった後に出ることもあります。他の病院を受診する時は、この治療を受けたことを伝えましょう。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 下痢が1日4回以上、便に血が混じる、強い腹痛
- 咳・息切れ・発熱が続く
- 強いだるさ、食欲の低下、吐き気が続く
- のどが渇く、尿が多い、急に体重が減った
- 皮膚や白目が黄色い、尿の色が濃い
- 力が入らない、まぶたが下がる、物が二重に見える、動悸

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 体温・体重・排便の回数を毎日記録しましょう
- 他の病院や歯科を受診する時は、この治療を受けている(受けた)ことを伝え、お薬手帳や患者カードを見せましょう
- 副作用の治療でステロイドが出た時は、自己判断で減らしたりやめたりしないでください
- 市販の薬・サプリメントを使う時は、事前に薬剤師にご相談ください
- 症状が軽くても、いつもと違うと感じたら早めにご連絡ください