

飲み薬の抗がん剤を安全に使うために

毎日飲むお薬だからこそ知っておきたいこと

飲み薬の抗がん剤は、ご自宅で毎日続けるお薬です。決められた飲み方を守ることと、副作用に早く気づくことが、治療を長く続けるための大切なポイントです。

1 こんな時はどうする?(飲み薬の困りごと)

こんな時	どうするか
飲み忘れに気づいた	2回分をまとめて飲まないでください。飲むかどうかはお薬ごとに違うため、始める前に薬剤師に確認しておきましょう
飲んだ直後に吐いた	追加で飲まず、次の決められた時間から飲みます(指示が違う場合はそれに従います)
お薬が余った・中止になった	捨てずに、次の来局時に薬局へお持ちください
ご家族がお薬を扱う	直接触れないように、手袋を使うか袋ごと扱いましょう。割ったりカプセルを開けたりしないでください
旅行・入院・他の病院の受診	数日分を多めに持ち、お薬手帳も一緒に持って行きましょう

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 咳・息切れ・発熱が続く(肺の副作用の可能性)
- 皮膚や白目が黄色い、強いだるさがある
- 水のような下痢が1日4回以上続く
- 家で測った血圧がいつもよりかなり高く、頭痛がある
- 手足の痛みや水ぶくれで歩けない・物が持てない
- 胸の痛み・動悸・急なむくみがある

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 決められた時間(食前・食後など、お薬ごとの指示どおり)に毎日飲みましょう
- 飲み忘れても2回分を一度に飲まないでください。忘れた時の対応は事前に確認しておきましょう
- お薬は割ったり砕いたりせず、ご家族が直接触れないように保管しましょう
- グレープフルーツ、セイヨウオトギリソウ(サブリ)、市販の胃薬は、効き目が変わることがあるため事前にご相談ください
- 家庭で血圧を測り、手帳に記録しましょう
- 残っているお薬の数を、次の受診・来局時にお知らせください