

抗がん剤治療と胃腸の症状について

吐き気・下痢・口内炎とうまく付き合うために

抗がん剤の治療では、吐き気や下痢、口の中の痛みなどが起こることがあります。多くはお薬や生活の工夫でやわらげることができます。気になることがあれば、いつでもご相談ください。

1 吐き気止めの飲み方の例(強い吐き気が出やすい治療の場合)

お薬	1日目(治療の日)	2日目	3日目	4日目	5日目～
点滴の吐き気止め	●				
アプレピタント(飲み薬)	●	●	●		
デキサメタゾン(飲み薬)		●	●	●	
オランザピン(飲み薬)	●	●	●	●	
頓服の吐き気止め	吐き気がある時				

お薬の種類と飲む日数は、治療の内容によって違います。吐き気が出てからではなく、指示どおりに予防的に飲むことが大切です。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 食事や水分が1日以上とれない
- 3日以上便が出ず、おなかが張る・吐く
- 水のような下痢が1日4回以上続く、下痢止めでも止まらない
- 口内炎の痛みで食べたり飲み込んだりできない
- 下痢に熱や腹痛を伴う、便に血が混じる
- めまいがする、尿が少ない(脱水のサイン)

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 吐き気止めは、吐き気が出てからではなく、指示どおり予防的に飲みましょう
- 食べられる時に、食べられる物を少しずつ。においの少ない、冷ました食事が食べやすいです
- 水分はこまめに少しずつとりましょう(経口補水液も役立ちます)
- やわらかい歯ブラシで歯をみがき、1日数回うがいをしましょう
- 市販の下痢止め・便秘薬は、自己判断で使わず、まずご相談ください
- 排便の回数と体重をメモしておく、受診時に役立ちます