

抗がん剤治療と発熱・感染について

熱が出たときの正しい対応を知っておきましょう

抗がん剤の治療中は、細菌と戦う「白血球」が一時的に少なくなることがあります。この時期に感染すると重症化しやすいため、熱が出た時の対応を前もって知っておくことが大切です。

1 熱が出た時の行動(夜間・休日も同じです)

① 体温を測る

寒気・だるさを感じたら、まず体温を測ります

② 37.5℃以上なら

解熱剤で様子を見ずに、病院へ電話します

③ 指示に従う

受診する、または渡されている抗菌薬を飲み始めます

④ 薬局にも伝える

次の来局時に、熱が出たことと経過をお知らせください

白血球が最も減るのは、治療後7～14日目ごろです。この時期は特に毎体温を測りましょう。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 37.5℃以上の熱、寒気・ふるえがある
- 鼻血や歯ぐきの出血が止まらない、あざが増える
- のどの痛み、咳、尿をする時の痛みがある
- 息切れ・動悸・ふらつきがある
- 下痢に熱を伴う
- ぐったりして水分がとれない

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 体温を毎日同じ時間に測って記録しましょう
- 手洗い・うがい、外出時のマスクを心がけ、人混みは避けましょう
- 刺身や生卵などの生ものは控え、加熱した食事を心がけましょう
- 痛み止めやかぜ薬は熱を下げてしまうため、飲む前に必ず体温を測りましょう
- 抗菌薬を渡されている場合は、飲み始める条件と連絡の手順を確認しておきましょう
- 夜間・休日の病院の連絡先を、目につく所に貼っておきましょう