

抗がん剤治療と手足のしびれについて

早めに伝えていただきたいこと

一部の抗がん剤では、手足のしびれや痛みが出ることがあります。しびれは早めに伝えていただくことで、お薬の量を調整して悪化を防げることがあります。我慢せずにお知らせください。

1 しびれのセルフチェック表

受診・来局のたびに、できる=○、しにくい=△、できない=× を記入して見せてください。前回と比べることで、変化に早く気づけます。

できるかどうか	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
ボタンをかける						
箸を使う・小さな物をつまむ						
字を書く						
歩く・階段を上り下りする						
冷たい物に触れる(ピリピリしないか)						

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- ボタンがかけにくい、箸が使いにくい、字が書きにくい
- つまづく、転びやすい、歩きにくい
- 急に手足に力が入らなくなった
- 便秘が続き、おなかが張る
- 点滴中・点滴後に息苦しさ・じんましん・顔のむくみ
- 立ちくらみやふらつきが強い

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- しびれは我慢せず、どんな動作で困っているかを具体的に伝えましょう
- 夜に移動する時は明かりをつけ、手すりを使いましょう
- 感覚が鈍くなるため、お湯の温度は温度計やひじで確かめましょう(やけど予防)
- 足に合った靴を選び、足の傷や靴ずれを毎日目で見て確認しましょう
- オキサリプラチンの点滴後数日は、冷たい飲み物を避け、手袋・マフラーを使いましょう
- しびれや痛みのお薬で眠気やふらつきが出ることがあります。車の運転はご相談ください