

抗がん剤治療と皮膚の症状について

手足の赤み・発疹・爪のトラブルを防ぐために

抗がん剤の種類によって、手足の赤みや痛み、ニキビのような発疹、爪のまわりの腫れなどが出ることがあります。治療を始めた時からのスキンケアで、症状を軽くすることができます。

1 保湿の手順(治療を始めた日から)

① タイミング

入浴後5分以内と朝の1日2回以上

② 量の目安

人差し指の先から第1関節までの量で、手のひら2枚分の広さ

③ 塗り方

こすらず、手のひらでやさしく押さえるように広げる

④ 手足を守る

木綿の手袋・靴下で保護し、きつい靴や熱いお湯を避ける

ひび割れた所に尿素入りの保湿剤を塗るとしみることがあります。しみる時は薬剤師にご相談ください。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 熱を伴う発疹が全身に広がる
- 目の充血、唇や口の中のただれ
- 水ぶくれができる、皮膚がむける
- 手足の痛みで歩けない・物が持てない
- 爪のまわりが腫れて膿が出る、痛みが強い
- 発疹やかゆみで眠れない

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 保湿剤は1日2回以上、入浴後すぐにたっぷり塗りましょう(人差し指の先から第1関節までの量で手のひら2枚分)
- 塗り薬は、塗る場所と回数を守って使い、自己判断でやめないでください
- きつい靴、長時間の歩行、熱いお湯は避け、家事の時は手袋を使いましょう
- 直射日光を避け、帽子や日焼け止めを使いましょう
- 洗顔・入浴はぬるま湯で、泡立てた低刺激の石けんでやさしく洗いましょう
- 爪は短く切りすぎず、角を少し残しましょう