

点滴の抗がん剤の治療を受ける方へ

治療のあとの数週間を安心して過ごすために

点滴の抗がん剤は、がん細胞だけでなく、髪や口の中、血液を作る細胞など、増えるのが早い細胞にも影響します。副作用には起こりやすい時期があるので、時期ごとに気をつけることを知っておきましょう。

1 1コースの中での体の変化(3週間ごとの治療の例)

副作用が出やすい時期は、おおよそ決まっています。カレンダーに治療日を書き込み、時期に合わせて準備しましょう。

時期	起こりやすいこと	自分でできること
治療当日～5日目	吐き気・食欲低下、だるさ、便秘	吐き気止めを決められた時間に。水分は少しずつこまめに
7～14日目ごろ	白血球が減り、感染しやすい。口内炎	毎日体温を測る。手洗い・うがい、口の中を清潔に
2～3週目ごろ	髪が抜け始める(お薬による)	帽子やウィッグを早めに準備。頭皮はやさしく洗う
次の治療の前	体の回復を確認(採血)	つらかった症状とメモを、診察や薬局で伝える

時期や症状はお薬の種類によって違います。ご自身の治療については、医師・薬剤師にご確認ください。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 37.5℃以上の熱、寒気・ふるえがある(特に治療後1～2週)
- 口内炎が痛くて食事や水分がとれない
- 吐き気で水分がとれない、尿が少ない
- 点滴をした腕が赤い・腫れている・痛い
- 水のような下痢が続く、1日4回以上増えた
- 息切れ・むくみ・急な体重増加、咳が続く

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 毎日、同じ時間に体温を測り、体調と一緒にメモしましょう
- 手洗い・うがいをこまめにし、人混みではマスクをしましょう
- やわらかい歯ブラシで口の中を清潔に保ちましょう
- 吐き気止めは、吐き気がなくても決められた日・時間に飲みましょう
- 治療後2日間ほどは、トイレの後は2回流し、ふたを閉めて流しましょう
- 市販の痛み止め・かぜ薬・サプリを使う前に、薬剤師にご相談ください