

## 7. Metrické prostory (příklady, konvergence posloupností, spojitá a izometrická zobrazení, úplnost, Banachova věta o pevném bodu)

### Metrický prostor

**Metrickým prostorem**  $\mathcal{X}=(X,\rho)$  budeme nazývat libovolnou množinu  $X$  prvků, které nazýváme body, pokud na množině  $X$  je dána tzv. **vzdálenost**, což je jakákoliv jednoznačná nezáporná reálná funkce  $\rho(x,y)$ , která je definována pro každou dvojici  $x,y \in X$  a která splňuje tyto tři podmínky:

1.  $\rho(x,y)=0$ , když a jen když  $x=y$ ;
2.  $\forall x,y \in X: \rho(x,y)=\rho(y,x)$  (symetrie);
3.  $\forall x,y,z \in X: \rho(x,y)+\rho(y,z) \geq \rho(x,z)$  (trojúhelníková nerovnost).

*Příklady metrických prostorů:*

- **prostor izolovaných bodů:**  $\rho(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{když } x=y \\ 1 & \text{když } x \neq y \end{cases}$
- **množina  $\mathbb{D}^1$ :**  $\rho(x,y) = |x,y|$  je např. číselná osa oboru hodnot jako  $\mathbb{Z}$  či  $\mathbb{R}$ ;
- **množina  $\mathbb{D}^n$  uspořádaných  $n$ -tic:**  $\rho(x,y) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (y_k - x_k)^2}$  (Euklidovská metrika).

### Konvergence posloupností, hromadné body

**Otevřenou koulí**  $S(x_0,r)$  v metrickém prostoru  $\mathcal{X}$  se středem  $x_0$  a poloměrem  $r$  budeme nazývat množinu bodů  $x \in \mathcal{X}$ , která vyhovuje podmínce:

$$\rho(x,x_0) < r$$

**Uzavřenou koulí**  $S(x_0,r)$  v metrickém prostoru  $\mathcal{X}$  budeme nazývat množinu bodů  $x \in \mathcal{X}$ , která vyhovuje podmínce:

$$\rho(x,x_0) \leq r$$

*Otevřenou kouli poloměru  $\varepsilon$  se středem  $x_0$  budeme nazývat  **$\varepsilon$ -okolím bodu**  $x_0$  a značit  $O_\varepsilon(x_0)$ .*

Bod  $x$  nazýváme **bodem uzávěru množiny**  $M$ , jestliže jeho libovolné okolí obsahuje alespoň jeden bod z  $M$ . Množina všech bodů uzávěru množiny  $M$  se označuje  $\bar{M}$  a nazývá **uzávěrem** této množiny.

Protože každý bod, který náleží  $M$ , je bodem uzávěru množiny  $M$  (tento bod totiž leží v každém svém okolí), platí, že  $M \subseteq \bar{M}$ . Množinu  $M$ , pro kterou platí  $M=\bar{M}$ , nazýváme **uzavřenou**.

Bod  $x$  se nazývá **hromadným bodem množiny**  $M$ , jestliže jeho libovolné okolí obsahuje nekonečně mnoho bodů z  $M$ .

Nechť  $x_1, x_2, \dots$  je posloupnost bodů v metrickém prostoru  $\mathcal{X}$ . Říkáme, že tato **posloupnost konverguje k bodu**  $x \in \mathcal{X}$ , jestliže každé  $\varepsilon$ -okolí  $O_\varepsilon(x)$  bodu  $x$  obsahuje všechny body  $x_n$  počínaje od některého indexu  $N(\varepsilon)$ , tj. jestliže ke každému číslu  $\varepsilon > 0$  lze najít takové číslo  $N(\varepsilon)$ , že okolí  $O_\varepsilon(x)$  obsahuje všechny body  $x_n$ , kde  $n \geq N(\varepsilon)$ . Bod  $x$  se nazývá limita posloupnosti  $\{x_n\}$ .

Předchozí definici lze vyslovit také tak, že posloupnost  $\{x_n\}$ , konverguje k bodu  $x$ , jestliže:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x, x_n) = 0$$

## Spojité zobrazení

Nechť  $\mathcal{X} = (X; \rho)$  a  $\mathcal{Y} = (Y; \rho^*)$  jsou dva metrické prostory.

Zobrazení  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  prostoru  $\mathcal{X}$  do prostoru  $\mathcal{Y}$  se nazývá **spojité** v bodě  $x_0 \in X$ , jestliže k libovolnému  $\varepsilon > 0$  lze najít takové  $\delta > 0$ , že:

$$\varrho^*(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

Pro všechny body  $x$  takové, že

$$\varrho(x, x_0) < \delta.$$

Jinými slovy, zobrazení  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je spojitě v bodě  $x_0$ , jestliže k libovolnému okolí  $O_\varepsilon(f(x_0))$  bodu  $f(x_0)$  lze najít takové okolí  $O_\delta(x_0)$  bodu  $x_0$ , že jeho obraz leží uvnitř  $O_\varepsilon(f(x_0))$ .

Zobrazení  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  se nazývá spojitě, jestliže je **spojité** ve všech bodech prostoru  $\mathcal{X}$ .

## Izometrické zobrazení

Říkáme, že vzájemně jednoznačné zobrazení  $y = f(x)$  metrického prostoru  $\mathcal{X} = (X; \rho)$  na metrický prostor  $\mathcal{Y} = (Y; \rho^*)$  je izometrické, jestliže

$$\varrho(x_1, x_2) = \varrho^*(f(x_1), f(x_2)) \quad \forall x_1, x_2 \in X.$$

Samotné metrické prostory  $\mathcal{X}$  a  $\mathcal{Y}$ , mezi kterými je možno stanovit izometrické zobrazení, se nazývají izometrickými mezi sebou.

Izometrie dvou prostorů  $\mathcal{X}$  a  $\mathcal{Y}$  značí, že metrické vztahy mezi jejich elementy jsou jedny a tytéž a rozdíl může být pouze v kvalitě jejich elementů, což je z metrického hlediska nepodstatné. V dalším proto budeme považovat izometrické prostory za totožné.

## Úplné metrické prostory

Číselná osa je nejjednodušším příkladem tak zvaných úplných metrických prostorů, jejichž základní vlastnosti probereme v této kapitole.

Posloupnost  $\{x_n\}$  bodů metrického prostoru  $\mathcal{X}$  budeme nazývat **cauchyovskou** (nebo **fundamentální**), jestliže splňuje Cauchyovo kritérium, tj. jestliže ke každému  $\varepsilon > 0$  existuje takové kladné celé číslo  $N(\varepsilon)$ , že

$$\varrho(x_m, x_n) < \varepsilon \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon).$$

Z trojúhelníkové nerovnosti plyne, že každá konvergentní posloupnost je cauchyovská. Skutečně, jestliže  $\{x_n\}$  konverguje k  $x$  (tj.  $\rho(x_n; x) \rightarrow 0$ ), potom ke každému  $\varepsilon > 0$  lze najít takové

celé kladné  $N(\varepsilon)$ , že  $\rho(x_n; x) < \varepsilon/2$  pro všechna  $n > N(\varepsilon)$ .

Potom

$$\varrho(x_m, x_n) \leq \varrho(x_m, x) + \varrho(x_n, x) < \varepsilon \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon).$$

Naopak denujeme:

Jestliže v metrickém prostoru  $\mathcal{X}$  libovolná cauchyovská posloupnost konverguje (tj. existuje  $x \in \mathcal{X}$  tak, že  $\rho(x_n; x) \rightarrow 0$ ), potom nazýváme tento prostor **úplný**.

Příklad:

☐ Položíme-li pro prvky libovolné množiny

$$\varrho(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{v případě } x = y, \\ 1 & \text{v případě } x \neq y, \end{cases}$$

dostaneme metrický prostor. Lze jej nazvat prostorem izolovaných bodů. V tomto prostoru jsou cauchyovské pouze stacionární posloupnosti, tj. takové, v nichž se od určitého indexu stále opakuje tentýž bod. Každá taková posloupnost ovšem konverguje, tj. tento prostor je úplný.

☐ Úplnost prostoru  $\mathbb{R}^1$ , tj. úplnost množiny všech reálných čísel, je známa z matematické analýzy.

☐ Úplnost euklidovského prostoru  $\mathbb{R}^n$  plyne snadno z úplnosti prostoru  $\mathbb{R}^1$ :

Nechť  $\{x^{(p)}_n\}$  je cauchyovská posloupnost bodů

$$x^{(p)} = (x_1^{(p)}, x_2^{(p)}, \dots, x_n^{(p)}) \in \mathbb{R}^n, \quad p = 1, 2, \dots$$

To znamená, že ke každému číslu  $\varepsilon > 0$  lze najít takové číslo  $N(\varepsilon)$ , že

$$\sum_{k=1}^n (x_k^{(p)} - x_k^{(q)})^2 < \varepsilon^2$$

pro všechna přirozená čísla  $p, q$  větší než  $N(\varepsilon)$ . Odtud dostáváme pro  $k$ -té souřadnice

( $k = 1; 2; \dots; n$ ) tyto nerovnosti:

$$|x_k^{(p)} - x_k^{(q)}| < \varepsilon,$$

platné pro všechna přirozená čísla  $p, q > N(\varepsilon)$ ; je tedy  $\{x^{(p)}_n\}$  cauchyovská posloupnost reálných čísel. Položme

$$x_k = \lim_{p \rightarrow \infty} x_k^{(p)}, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Potom zřejmě je

$$\lim_{p \rightarrow \infty} x^{(p)} = x.$$

Tím je úplnost prostoru  $\mathbb{R}^n$  dokázána.

☐ Úplnost prostoru  $\mathbb{R}^{n_0}$  lze ukázat obdobně.

## Banachova věta o pevném bodu

Řadu problémů souvisejících s existencí a jednoznačností řešení rovnic různého typu lze převést na otázku existence a jednoznačnosti pevného bodu nějakého zobrazení odpovídajícího metrického prostoru do tohoto prostoru. Mezi různými kritérii existence a jednoznačnosti pevného bodu zobrazení tohoto druhu můžeme za jedno z nejjednodušších a zároveň nejdůležitějších kritérií považovat tzv. **Banachův princip pevného bodu** (stručně BPPB); někdy též nazývaný **princip kontraktivních zobrazení**.

Nechť  $\mathcal{X}$  je metrický prostor. Zobrazení  $A$  prostoru  $\mathcal{X}$  do prostoru  $\mathcal{X}$  se nazývá **kontraktivní** (nebo **kontrakce**), existuje-li takové číslo  $\alpha < 1$ , že pro libovolné dva body  $\forall x, y \in \mathcal{X}$  platí nerovnost:

$$\rho(Ax, Ay) \leq \alpha \rho(x, y)$$

Bod  $x$  se nazývá **pevný bod zobrazení**  $A$ , jestliže  $Ax = x$ . Jinak řečeno, pevné body jsou řešení rovnice  $Ax = x$ .

**Banachova věta o pevném bodu (BPPB)** říká, že každé kontraktivní zobrazení definované v úplném metrickém prostoru  $\mathcal{X}$  má právě jeden pevný bod.

BPPB lze použít k důkazu vět o existenci a jednoznačnosti řešení pro rovnice různých typů. Kromě důkazu existence a jednoznačnosti řešení rovnice  $Ax = x$  dává BPPB také praktickou metodu přibližného výpočtu tohoto řešení (nazývanou **metoda postupných aproximací**).