诱导公式的记忆口诀

一、一句话大白话速懂

诱导公式就是把"复杂角"（如180°+α、−α）的三角函数，转化成"简单角"（α）的三角函数的一套规则。

二、生活化场景类比

类比1：镜子里的自己

- **−α（负角）**：像照镜子，左右相反
  - sin(−α) = −sinα（上下颠倒）
  - cos(−α) = cosα（左右对称）

类比2：掉头转向

- **180°±α**：像掉头180°，前后相反
  - sin(180°+α) = −sinα（y坐标变负）
  - cos(180°+α) = −cosα（x坐标变负）

类比3：横平竖直

- **90°±α、270°±α**：像转90°，横竖互换
  - sin变成cos，cos变成sin

三、上帝视角本源解析

1. 本源：为什么要发明诱导公式？

简化计算的需求：

- 没有计算器时，需要查表求三角函数值
- 如果表上只有0°到90°的值，怎么求150°的值？
- 诱导公式把任意角转化成锐角，就能查表了！

2. 本质：诱导公式到底在做什么？

本质是"坐标变换"。

把终边在不同位置的角，通过坐标轴的对称、旋转，转化成第一象限的角。

公式类型	几何意义
$-\alpha$	关于x轴对称
$180^\circ-\alpha$	关于y轴对称
$180^\circ+\alpha$	关于原点对称
$90^\circ-\alpha$	顺时针转90°
$90^\circ+\alpha$	逆时针转90°

3. 边界：什么时候能用？

适用场景	不适用场景
化简任意角的三角函数	不同角之间的运算
求负角、大角的三角函数值	需要精确数值时（还需查表或计算）
证明三角恒等式	涉及和差倍半的复杂变换

4. 体系定位

```
三角函数定义
      ↓
同角三角函数关系
      ↓
诱导公式 ← 你现在在这里
      ↓
三角恒等变换（和差倍半公式）
      ↓
解三角形
```

四、知识点精准拆解

4.1 核心口诀："奇变偶不变，符号看象限"

口诀拆解：

第一句：奇变偶不变

- **"奇偶"**：指 $90°$ 的倍数（即 $\frac{\pi}{2}$ 的倍数）
  - $90° \cdot k$ 中，k是奇数还是偶数
- **"变"**：函数名改变（sin↔cos，tan↔cot）
- **"不变"**：函数名不变

形式	k值	奇偶	函数名
$90° \cdot 1 \pm \alpha = 90° \pm \alpha$	1	奇	变
$90° \cdot 2 \pm \alpha = 180° \pm \alpha$	2	偶	不变
$90° \cdot 3 \pm \alpha = 270° \pm \alpha$	3	奇	变
$90° \cdot 4 \pm \alpha = 360° \pm \alpha$	4	偶	不变

第二句：符号看象限

- 把 α 看作**锐角**（$0° < \alpha < 90°$）
- 判断原角（如$180°+\alpha$）所在的象限
- 根据该象限中原函数的符号，确定结果的正负

4.2 公式分类记忆

类型一：负角公式（k=0，偶）

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$$

$$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan\alpha$$

记忆：cos是偶函数（关于y轴对称），sin和tan是奇函数（关于原点对称）

类型二：180°±α公式（k=2，偶）

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$$

$$\sin(180^\circ + \alpha) = -\sin\alpha$$

$$\cos(180^\circ + \alpha) = -\cos\alpha$$

记忆口诀："180°，sin不变号，cos都变号"

类型三：360°±α公式（k=4，偶）

$$\sin(360^\circ - \alpha) = -\sin\alpha$$

$$\cos(360^\circ - \alpha) = \cos\alpha$$

$$\sin(360^\circ + \alpha) = \sin\alpha$$

$$\cos(360^\circ + \alpha) = \cos\alpha$$

记忆：360°是一圈，转回来和原来一样（周期性）

类型四：90°±α公式（k=1，奇）

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$$

$$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos\alpha$$

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin\alpha$$

记忆：90°时横竖互换，sin变cos，cos变sin

类型五：270°±α公式（k=3，奇）

$$\sin(270^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$$

$$\cos(270^\circ - \alpha) = -\sin\alpha$$

$$\sin(270^\circ + \alpha) = -\cos\alpha$$

$$\cos(270^\circ + \alpha) = \sin\alpha$$

4.3 口诀应用步骤

Step 1：判断 $90^\circ \cdot k \pm \alpha$ 中的k是奇数还是偶数

- k为奇数 → 函数名改变
- k为偶数 → 函数名不变

Step 2：把α看作锐角，判断原角所在象限

Step 3：根据象限确定原函数的符号

Step 4：组合结果

五、全体系逻辑关系



核心功能：

- 把任意角的三角函数转化为锐角的三角函数
- 化简复杂的三角函数表达式

六、零基础入门例题

例题1：口诀应用基础

题目：用口诀化简 $\sin(180° + 30°)$

解析：

Step 1：奇变偶不变

- $180° + 30° = 90° \cdot 2 + 30°$
- k = 2（偶数）→ 函数名不变，还是sin

Step 2：符号看象限

- 把30°看作锐角
- $180° + 30° = 210°$ 在第三象限
- 第三象限sin为负

Step 3：结果

$$\sin(180° + 30°) = -\sin 30° = -\frac{1}{2}$$

例题2：函数名改变的情况

题目：化简 $\cos(90° + 45°)$

解析：

Step 1：奇变偶不变

- $90° + 45° = 90° \cdot 1 + 45°$
- k = 1（奇数）→ 函数名改变，cos变sin

Step 2：符号看象限

- 把45°看作锐角
- $90° + 45° = 135°$ 在第二象限
- 第二象限cos为负

Step 3：结果

$$\cos(90° + 45°) = -\sin 45° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

例题3：负角的处理

题目：化简 $\sin(-60°)$

解析：

方法一：口诀法

- $-60° = 0° - 60° = 90°\cdot 0 - 60°$
- k = 0（偶数）→ 函数名不变
- $-60°$ 在第四象限，sin为负
- 结果：$\sin(-60°) = -\sin 60° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

方法二：奇函数性质

- sin是奇函数：$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$
- 结果：$\sin(-60°) = -\sin 60° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

例题4：综合化简

题目：化简 $\frac{\sin(180°+\alpha)\cdot\cos(360°-\alpha)}{\cos(180°-\alpha)\cdot\sin(-\alpha)}$

解析：

Step 1：分别化简各部分

- $\sin(180° + \alpha) = -\sin\alpha$（180°公式，第三象限sin负）
- $\cos(360° - \alpha) = \cos\alpha$（360°公式，第四象限cos正）
- $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$（180°公式，第二象限cos负）
- $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$（负角公式）

Step 2：代入原式

$$\frac{(-\sin\alpha)\cdot(\cos\alpha)}{(-\cos\alpha)\cdot(-\sin\alpha)} = \frac{-\sin\alpha\cdot\cos\alpha}{\sin\alpha\cdot\cos\alpha} = -1$$

七、文科生高频易错雷区

雷区1："符号看象限"时忘记把α看作锐角

错误：判断 $\sin(180° + 120°)$ 的符号时，认为120°在第二象限，sin为正

正确做法：

- 口诀中的"符号看象限"，是**假设α是锐角**来判断
- $180° + \text{锐角}$ 在第三象限

- 第三象限sin为负
- 结果：$\sin(180^\circ + 120^\circ) = -\sin 120^\circ$

雷区2：混淆k的奇偶

错误：认为 270° 中k=2（因为270÷90=3，但记成偶数）

正确：

- $270^\circ = 90^\circ \times 3$
- k = 3（奇数）→ 函数名改变

记忆技巧：k = 角度 ÷ 90°，只看这个商是奇数还是偶数

雷区3：90°±α的符号判断错误

错误：$\sin(90^\circ + \alpha) = \sin\alpha$（忘记变号和变函数名）

正确：

- k=1（奇数）→ sin变cos
- $90^\circ + 锐角$ 在第二象限，sin为正
- 结果：$\sin(90^\circ + \alpha) = +\cos\alpha$

雷区4：tan的诱导公式记错

错误：$\tan(180^\circ - \alpha) = \tan\alpha$

正确：

- $\tan(180^\circ - \alpha) = \frac{\sin(180^\circ - \alpha)}{\cos(180^\circ - \alpha)} = \frac{\sin\alpha}{-\cos\alpha} = -\tan\alpha$

记忆：tan的符号规律和sin一致（因为tan=sin/cos，cos在第二象限为负）

八、高考考点提示

考查频率：⭐⭐⭐⭐（高频基础）

常见考法：

题型	分值	难度
化简求值	4–5分	⭐⭐
证明恒等式	4–5分	⭐⭐⭐
综合计算	4–5分	⭐⭐⭐

高考真题示例（改编）：

题目（2020全国卷）：$\sin 240° =$ （ ）

A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

答案：D

解析：

- $240° = 180° + 60°$
- k=2（偶数），函数名不变
- $180° + 60°$ 在第三象限，sin为负
- $\sin 240° = -\sin 60° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

备考建议：

1. 熟记"奇变偶不变，符号看象限"口诀
2. 重点掌握180°±α和90°±α的公式
3. 多练习化简题，提高熟练度
4. 注意tan的诱导公式可以通过sin/cos推导

📌 **学习总结**：诱导公式是三角函数的"化简利器"。记住口诀"奇变偶不变，符号看象限"，配合"把α看作锐角"的原则，就能正确化简任意角的三角函数。