0~3 岁儿童生长发育及养育行为指导

0~3 岁儿童生长发育及养育行为指导 1
（一）0-42 天小婴儿 2
1. 动作发展 4
2. 语言发展 4
3. 认知发展 4
4. 情感与社会性 4
5. 养育指导 4
（二）42 天-3 个月婴儿 4
1. 动作发展 6
2. 语言发展 6
3. 认知发展 6
4. 情感与社会性 6
5. 养育指导 6
（三）4-6 个月婴儿 6
1. 动作发展 8
2. 语言发展 8
3. 认知发展 8
4. 情感和社会性 8
5. 养育指导 8
（四）7-9 个月婴儿 8
1. 动作发展 10
2. 语言发展 11
3. 认知发展 11
4. 情感与社会性 11
5. 养育指导 11
（五）10-12 个月婴儿 11
1. 动作发展 12
2. 语言发展 12
3. 认知发展 13
4. 情感与社会性 13
5. 养育指导 13
（六）13-18 个月幼儿 13
1. 动作发展 14
2. 语言发展 14

3. 认知发展 14
4. 情感与社会性 14
5. 养育指导 15
（七）19-24 个月幼儿 15
1. 动作发展 16
2. 语言发展 16
3. 认知发展 16
4. 情感与社会性 16
5. 养育指导 16
（八）25-30 个月幼儿 17
1. 动作发展 18
2. 语言发展 18
3. 认知发展 18
4. 情感与社会性 18
5. 养育指导 18
（九）31-36 个月幼儿 18
1. 动作发展 19
2. 语言发展 19
3. 认知发展 20
4. 情感与社会性 20
5. 养育指导 20

（一）0-42 天小婴儿

0 天-42 天科学育儿		
宝宝情况	体重	足月宝宝正常出生体重在 2500-4000g，出生后 3-4 天内生理性体重下降（下降值小于出生体重的 10%），出生后 7 天恢复出生体重，正常足月儿第一月体重增加可达 1-1.7kg. 男：2.8-4.2kg，女：2.7-4.1kg，每月增长 0.8-1.2kg
	身高	足月宝宝出生身长平均 50cm，正常长速平均每月 4cm 左右。男：47.6-54.8cm，女：46.8-53.8cm，每月增长 4cm
	头围	足月宝宝出生头围在 32-36CM，正常长速平均每月 2CM 左右，男：31.7-36.9cm，女：31.4-36.5cm，每月增长 2cm
	睡眠	新生儿睡眠时间平均每日 13-18 小时，初生宝宝暂时未有昼夜节律，缺乏睡眠规律，除了哺乳和排泄占的大约 6-8 小时外，其余时间均处于睡眠状态，此时宝宝的睡眠容易受到周围环境的干扰，母乳喂养的新生儿每次睡眠时间稍短（2-3 小时），人工喂养新生儿每次睡眠时间稍长（3-4 小时）

	排便	足月儿在出生后 24 小时内排胎便，2-3 天排完胎便，出生 4 日后，大多数婴儿每日排便 3 次或更多，且排便时间通常与哺乳时间同步。到出生后第 5 日，大便应为浅黄色并有颗粒物。
营养及喂养	乳类喂养	母乳含有更适合宝宝生长发育的全部营养素，且母乳含有配方奶无法提供的免疫活性物质，营养价值极高，故建议纯母乳喂养，初生新生儿母乳喂养次数推荐 8-10 次以上。对胎龄<34 周、出生体重<2000 克的早产儿或体重增长缓慢者，根据医生指导，在母乳中添加母乳强化剂。若无法母乳喂养，需要配方奶喂养，新生儿胃容量小，此期宝宝喂养量及时间间隔暂无规律，需要妈妈感知宝宝饥饿及饱腹信号，给予顺应性喂养。
	营养剂添加	1.足月儿生后数日内开始，在医生指导下每天补充维生素 D 400 国际单位，维生素 A1500u/天；2.早产或低出生体重儿一般生后数日内开始，在医生指导下，每天补充维生素 D 800～1000 国际单位；出生后 2～4 周开始，按 2 毫克/（千克·天）补充铁元素，上述补充量包括配方奶及母乳强化剂中的含量。
疫苗接种	0 月龄	乙肝疫苗（第一针），卡介苗；母亲若有乙肝病毒感染，需要在出生时接种乙肝高效免疫球蛋白
	1 月龄	乙肝疫苗（第二针）
常见问题	黄疸	出生后超过 80%正常新生儿可出现皮肤黄染问题，但在出生后 1 周-2 周，宝宝血脑屏障未发育完善，皮肤黄染若明显，或进行性加重，过高的胆红素可能透过血脑屏障造成脑损伤，故此期的黄疸需要谨慎对待，必要时新生儿科就诊。若宝宝黄疸明显加深，或者宝宝伴有排便颜色变浅，亦是及时医院就诊。若排除病理性因素，且宝宝纯母乳喂养，考虑母乳性黄疸，黄疸可能持续到出生 2 个月后，可继续母乳喂养。
体检	体检时间	42 天
	体检目的	1.了解儿童体格生长趋势情况及一般营养状况，进行健康指导； 2.早期发现听力障碍、眼病、先天性及遗传性疾病，并且对可能存在的先天发育异常早发现、早诊断、早干预，比如先天性髋关节发育异常、先天性心脏病、听力障碍、眼底疾病等。
	体检项目	1. 基本情况：病史、日常状况、特殊情况等。 2. 全身体格检查：1）一般检查：身高/长、体重、头围、前囟、呼吸、脉搏；2)物理检查：a.内科检查：心、肺、肝、脾；b.外科检查：皮肤、淋巴结、头、颈、眼睛、耳、鼻、口腔、胸、腹、肛门/外生殖器、脊柱、四肢、髋关节。

		3. 辅助检查：必要时完善心脏、髋关节等超声影像学检查。 4. 专科检查：神经运动发育筛查、发育迟缓筛查、语言发育筛查、眼病及听力筛查。身高体重头围测量、体格检查、早教指导。若发现其他问题，需要进一步检查如眼科、口腔科、耳鼻喉科、彩超等。

1.动作发展

俯卧时会试着抬头，仰卧时会左右摆头，能自由地转动颈部。四肢能笨拙地活动，手的动作多于脚，会蹬腿和踢掉身上东西。摸到东西能攥住，手可张开或攥紧，清醒时两手以握拳为主，触碰手心会握紧拳头。

2.语言发展

会发出细小的喉音，宝宝与妈妈谈话时能注视妈妈面孔。有人大声说话时会出现惊跳。

3.认知发展

仰卧时能注意视线内物体，会注视距眼前约 20-30 厘米远的红球。对声音和光线有多种反应。

4.情感与社会性

喜欢被爱抚、拥抱。部分宝宝能对妈妈微笑。会注意到近距离人的面部表情，喜欢看人脸，尤其是喂养人的笑脸，眼睛能跟踪走动的人。听到人的声音有反应，母亲喂养人的声音对哭吵的婴儿有安抚作用。

5.养育指导

母婴交流非常重要，父母尽可能亲自养育，多与新生儿接触，如说话、微笑、怀抱等。学会辨识新生婴儿哭声，及时安抚情绪并满足其需求，如按需哺乳。新生儿喂奶 1 小时后可进行俯卧练习，每天可进行 1～2 次婴儿被动操。给新生儿抚触，让新生儿看人脸或鲜艳玩具、听悦耳铃声和音乐等，促进其感知觉的发展。

推荐活动:

抚触/被动操;按需哺乳;亲子互动。

（二）42 天-3 个月婴儿

42 天-3 月龄科学育儿		
宝宝情况	体重	男：3.7-5.6kg，女：3.5-5.3kg，每月增长 0.8-1.2kg
	身高	男：49.1-61.2cm，女：48.2-60cm，每月增长 4cm
	头围	男：34.6-39.4cm，女：34-38.6cm，每月增长 2cm
	睡眠	13-18 小时，频率：白天小睡次数：6-8 次，每次小睡的时长：10-15 分钟至 4 小时
	排便	每天 1-3 次
营养及喂养	乳类喂养	继续母乳喂养，无法母乳喂养或者母乳不足时，可选用婴儿配方奶粉补充；每日 500～800ml。
	营养剂添加	1.足月儿每天补充维生素 D 400 国际单位，维生素 DA 1500 国际单位；2.早产或低出生体重儿，在医生

		指导下，每天补充维生素 D 800～1000 国际单位；继续按 2 毫克/（千克·天）补充铁元素，上述补充量包括配方奶及母乳强化剂中的含量。
疫苗接种	2 月龄	脊髓灰质炎疫苗（第 1 针）
	3 月龄	脊髓灰质炎疫苗（第 2 针），百白破疫苗（第 1 针）
常见问题	肠胀气/肠绞痛	在儿童功能性胃肠病罗马 IV 标准中婴儿绞痛的诊断要符合以下 3 点:①一天长时间、反复的、难以安抚的哭闹>3 小时。②一周超过 3 天。③无生长迟缓、发热或疾病的证据。引起婴儿绞痛的原因目前尚未明确，表现为婴儿突然大声哭叫，哭时面部涨红，双手紧握，腹部紧张，双腿向上蜷起，抱哄、喂奶都不能缓解，常常发生在傍晚或夜间，大多从生后 2 周开始，可持续到 4 个月左右。若宝宝出现以上症状，我们可以用试试:①包裹，用小被子将婴儿轻轻包裹起来，让宝宝有一定的安全感，让宝宝慢慢安静下来。②侧位、腹位或飞机抱，这些姿势对孩子的腹部有一定的压迫，可以在一定程度上缓解腹部疼痛。③按揉肚子，在手上涂一层婴儿润肤霜或婴儿油，按顺时针方向轻轻揉婴儿的小肚子，有助于排出肠道内的气体。④此外，有节奏的嘘嘘声或白噪声也可能有一定效果。但是若宝宝长时间（大于半小时）持续不断的剧烈哭闹，无法安抚，需要到医院就诊，排除器质性疾病。
	吐奶	这个月龄宝宝胃部多呈水平位，胃部入口处（贲门）抗反流能力未发育成熟，多有奶后出现吐奶现象，当婴儿出现吐奶时可以采取以下方式预防：①首先不要让孩子吃的太急，母乳喂养可以用一种剪刀式的哺乳方式，减缓奶流速度；人工喂养则需选取奶孔大小合适的奶嘴，可以少量多餐。②喂奶时，婴儿的头、上身始终要与水平位保持 45° 。③吃完奶后给婴儿拍嗝也可以减少吐奶。吐奶时需要将婴儿的身体侧向一边，防止奶汁吸入肺部。注意若宝宝吐奶伴有体重减轻或者体重不增，需要到医院就诊排除器质性问题。
	警示信号	3 个月不会对着人笑。
体检	体检时间	3 月龄
	体检目的	1. 了解儿童体格生长情况及一般营养状况，进行健康指导； 2. 早期识别并及时纠正可疑佝偻病的表现和体征、预防贫血的发生； 3.筛查儿童常见眼病和视力不良。
	体检项目	1. 基本情况：病史、日常状况、特殊情况等。 2. 全身体格检查：1）一般检查：身高/长、体重、头围、前囟、呼吸、脉搏；2）物理检查：a.内科检查：心、肺、肝、脾；b.外科检查：皮肤、淋巴结、头、颈、眼睛、耳、鼻、口腔、胸、腹、肛门/外生

		殖器、脊柱、四肢、髋关节。 3. 辅助检查：骨密度测定。 4. 专科检查：神经运动发育筛查、发育迟缓筛查、语言发育筛查、眼保健及视力检查。

1.动作发展

逐渐学会从仰卧变为侧卧位。俯卧时能将头抬高至 45 度。被竖直抱时，能将头竖直，并张望四周，头可随着看到的物品或听到的声音转动 180 度，扶住腋下保持直立姿势。手能放开，会伸手触摸眼前的东西。上肢能够伸展，两手会在胸前相互接触，手握着手。

2.语言发展

能辨别不同人说话声音的语调，朝声音的方向扭头，咿呀学语。

哭声逐渐减少并开始会用不同的哭声表达自己的需求，听到妈妈声音会发出微笑和笑声。会注意成人的逗引，会发出“咕咕声”和类似 a、o、e 的音。

3.认知发展

能感知色彩。对对比强烈的图样有反应。会将声音和形象联系起来，会试图找出声音的来源。喜欢注视自己的手，能举握物品，见物后能双臂活动。眼睛能立刻注意到面前大玩具，其视线还会随着人的走动而移动。

4.情感与社会性

能忍受短暂的喂奶间断，用目光期待着喂奶。见到经常接触的人会微笑、发声或挥手蹬脚，表现出快乐的神情。对成人的逗引会用动嘴巴、伸舌头、微笑或摆动身体等表示情绪反应。表现出对喂养人的偏爱。

5.养育指导

注重亲子交流，在哺喂、护理过程中多与婴儿带有情感的说话、逗弄，对婴儿发声要用微笑、声音或点头应答，注意目光的交流。通过俯卧、竖抱练习、被动操等，锻炼婴儿头颈部的运动和控制能力。给婴儿听悦耳的音乐，玩带响声的玩具；用鲜艳的玩具吸引婴儿注视和目光跟踪;让他/她有机会触摸不同质地的物品。

推荐活动:

玩玩具;亲子互动;俯卧。

（三）4-6 个月婴儿

4 月龄-6 月龄科学育儿		
宝宝情况	体重	平均每月体重增长 0.5-0.6kg
	身高	平均每月身长增长约 2cm
	头围	平均每月头围增长约 1cm
	睡眠	此期的宝宝睡眠的昼夜节律初步形成，白天清醒时间延长，睡眠多集中在夜晚完成，推荐睡眠时长 12-16 小时，白天会有 3-4 次小睡眠，时长 0.5-2 小时/次，夜晚可有 2-3 次的夜醒。此期需要减少奶睡、抱睡情况发生，让宝宝逐步建立自主入睡能力。

	排便	排便较为规律，1-3 次/日，或者间隔 1-2 日排一次大便，大便多呈黄色糊状便。
营养及喂养	乳类喂养	继续母乳喂养，母乳不足时，可选用婴儿配方奶粉补充。白天定时喂养，每 3-4 小时喂一次，约 800ml/日，逐渐停夜间哺乳（或 4-6 小时以上喂一次），不宜频繁夜奶
	营养剂添加	1.每天补充维生素 D 400 国际单位，维生素 A 1500 国际单位；2.纯母乳喂养的足月儿或以母乳喂养为主的足月儿 4～6 月龄时可根据需要适当补铁剂 1-2mg/kg/日；以预防缺铁性贫血的发生；3.早产或低出生体重儿，继续按 2 毫克/（千克·天）补充铁元素，上述补充量包括配方奶及母乳强化剂中的含量。
疫苗接种	4 月龄	脊灰减毒活疫苗口服（脊髓灰质炎疫苗第三针），百白破疫苗（第二针）
	5 月龄	百白破疫苗（第三针）
	6 月龄	乙肝疫苗（第三针），A 群流脑多糖疫苗（第一针）
常见问题	厌奶期	宝宝吸吮反射消失，宝宝不会一碰到奶头就会吸吮了，前期若宝妈们没有做好顺应性喂养，存在强迫喂养或者过度喂养，且夜间频繁夜奶，3 月龄后宝宝开始逐渐出现厌奶的现象，宝妈们可以做好定时喂养，3-4 小时喂养一次，一次喂养时间控制在 20 分钟内，若宝宝存在停止吸吮，或者拒绝奶头等情况，及时停止喂奶，允许宝宝出现一过性奶量波动减少，不强迫喂养，同时要减少夜间喂奶次数，可以帮助宝妈顺利度过厌奶期。若宝宝长时间抗拒喝奶，伴有哭闹不安、呕吐、腹泻、便秘、体重减轻等情况需要医院就诊。
	警示信号	未建立安全性依恋；缺乏陌生人焦虑。
体检	体检时间	6 月龄
	体检目的	1. 了解宝宝喂养情况、睡眠情况、生长速度，对生长发育、营养状况进行个体化的评价和指导，评估宝宝铁储备，进行辅食添加指导；早教指导；进行眼病筛查和视力检查。了解儿童体格生长情况及一般营养状况，进行健康指导； 2. 早期识别并及时纠正可疑佝偻病的表现和体征； 3. 发现并及时纠正贫血；防治营养性贫血。 4. 筛查儿童动作及社会交往等发育行为情况。
	体检项目	1. 身高体重头围测量、体格检查、神经心理与行为发育筛查、眼科检查、血常规检查、早教指导。基本情况：病史、日常状况、特殊情况等。 2. 全身体格检查：1）一般检查：身高/长、体重、头围、前囟、呼吸、脉搏；2）物理检查：a.内科检查：心、肺、肝、脾；b.外科检查：皮肤、淋巴结、头、颈、眼睛、耳、鼻、口腔、胸、腹、肛门/外生

		殖器、脊柱、四肢、髋关节。 3. 实验室检查：1.血常规，必要时完善血清铁蛋白、尿常规、肝肾功能、血清酶、血糖；2.骨密度测定。 4. 专科检查：神经运动发育筛查、发育迟缓筛查、语言发育筛查。

1.动作发展

慢慢能从仰卧翻身到俯卧，有爬的愿望。能用两只小手支撑倾坐片刻。成人扶腋下能站直，双脚跳跃。会撕纸。喜欢玩手、扒脚。会笨拙的换手接物。能用双手拿起眼前玩具，喜欢把东西放入口中。

2.语言发展

有明显的发音愿望，会和成人进行相互模仿的发音游戏。开始咿呀学语，发辅音 d、n、m、b。无意中会发出“爸”或“妈”的音。能和成人一起“啊啊”、“呜呜”地聊天。会听成人的语言信号。

3.认知发展

能注视距离眼前 75 厘米远的物体。用较长的时间来看物体或图形。会寻找手中丢失的东西。喜欢颜色鲜艳的玩具或图卡。听到歌谣和摇篮曲会手舞足蹈。能根据不同的声音找不同的家人。听到熟悉物品的名称会用眼注视。听到自己的名字会转头看。

4.情感和社会性

会用哭声、面部表情和姿势与人沟通。开始怕羞。辨认生人、熟人，对生人会注视或躲避等，对熟人反应愉悦。对亲切的语言表示愉快，对严厉的语言表现出不安或哭泣等反应。会对着镜中的影像微笑、发音或伸手拍。在独处或别人拿走他小玩具时会表示反对。对熟悉的人或物有观察意识。对主要带养人有明显的依恋。

5.养育指导

父母尽可能陪伴和养育婴儿，主动识别并及时有效的应答婴儿的生理与心理需求，逐渐建立安全的亲子依恋关系。培养规律的进食、睡眠等生活习惯，多与婴儿玩看镜子、藏猫猫、寻找声音来源等亲子游戏。营造丰富的语言环境，多与婴儿说话、模仿婴儿发声以鼓励婴儿发音，达到“交流应答”的目的。鼓励婴儿自由翻身、适当练习扶坐；让婴儿多伸手抓握不同质地的玩具和物品，促进手眼协调能力发展。

推荐活动:

照镜子;练习扶坐;模仿发声。

（四）7-9 个月婴儿

7 月龄-9 月龄科学育儿		
宝宝情况	体重	平均每月体重增长 0.27-0.37kg
	身高	平均每月身长增长约 2cm
	头围	平均每月头围增长约 1cm
	睡眠	推荐睡眠时长 12-16 小时，睡眠昼夜节律较稳定，白

		天小睡眠 2-3 次，小睡时长 0.5-2 小时，夜间最长一次睡眠可达 5-6 小时，夜醒 1-2 次，小于 20 分钟/次。此期需要减少奶睡、抱睡情况发生，让宝宝建立自主入睡能力。
	排便	排便较为规律，1-3 次/日，或者间隔 1-2 日排一次大便，大便多呈黄色糊状便或者柔软成形便。
营养及喂养	乳类喂养	继续母乳喂养，母乳不足时，可选用婴儿配方奶粉补充。定时喂养，每餐食物时间间隔仍为 3-4 小时一次，奶 3-4 次/日，辅食 1-2 次/日，全天奶量 700-900mL 左右
	辅食添加	1. 足月儿 6 个月起应添加辅食，早产儿在校正胎龄 4～6 月时应添加辅食。 2. 辅食质地从泥状过渡到碎末状，种类多样，注意排敏，新的辅食引入需要持续 3-5 天观察是否过敏，添加 1-2 次泥糊状食物，逐渐推进稠粥/碎末状辅食。 3. 每餐 2～3 勺逐渐增加到 1/2 碗（250ml 的碗）。 4. 添加辅食种类每日不少于 4 种，并且至少应包括一种动物性食物、一种蔬菜和一种谷薯类食物。吃的量以宝宝反应为主，训练宝宝的吞咽和咀嚼能力，不宜强迫喂养，不宜着急加量，不宜影响到总奶量。
	营养剂添加	1. 每天补充维生素 D 400 国际单位，维生素 A 1500 国际单位； 2. 早产或低出生体重儿，继续按 2 毫克/（千克·天）补充铁元素，上述补充量包括配方奶及辅食中的含量。
疫苗接种	8 月龄	麻腮风疫苗（第一针），乙脑减毒活疫苗/乙脑灭活疫苗（第一针）
	9 月龄	A 群流脑多糖疫苗（第二针）
常见问题	便秘	婴儿排便次数每周≤2 次，伴有排便费力、排便痛苦感、且大便呈干硬团块状或呈羊大便颗粒状，可考虑存在婴儿期便秘，95% 的婴儿便秘属于功能性问题。 1.大部分宝宝是因为肠道蠕动过慢，或者肛门直肠协调性差，造成排便时间间隔延长，排便费力，可给婴儿做腹部按摩：右手四指并拢，在婴儿的脐部按顺时针方向适当强度推揉、按摩，揉腹部能增加肠蠕动。亦可增加宝宝俯卧爬行等运动，促进肠蠕动。 2.部分宝宝存在食物结构不合理，添加过多高蛋白食物，膳食纤维、水分摄入不足引起，可减少食物中蛋白成分，增加膳食纤维及水分摄入可改善便秘。 3.排便痛苦感，会让宝宝克制排便，让宝宝尽力避免排便，让肠道大便变得更加干硬，引起便秘的恶性循环，故需要定时训练排便，必要时添加乳果糖等药物软化大便，训练定时排便，减少排便痛苦感。若宝宝便秘持续时间长，伴有腹胀、呕吐、哭闹不安等情况

		需要及时医院就诊。
	睡眠倒退期	此期的宝宝大动作发育迅速，部分宝宝学会了爬行；白天的外出活动过久，宝宝过于疲惫；睡前过度兴奋；不恰当的哄睡方式（抱睡、奶睡）等原因会造成宝宝夜醒次数频繁，或者夜醒后难易安抚入睡。 睡眠指导：1.白天适当 1-2 小时户外活动，不激烈，不让宝宝过于疲惫。2.睡眠环境舒适安静。3.婴儿可与父母同屋不同床睡觉。4.规律作息，固定就寝时间，晚上 7：30-8：30 就寝合适，一般不晚于 21：00，但也不提倡过早上床。5.安排固定 3-4 项睡前活动，如洗漱、抚触、调暗灯光，听轻音乐等，活动结束后尽量让宝宝处于安静状态。6.晚上睡前保持 3-4 小时的清醒时间。7.在宝宝快睡着但未睡着时就单独放置小床睡着，不宜抱睡、奶睡、摇睡（白天睡眠亦是如此）。8.宝宝夜醒开始哭闹时候，先尝试轻拍、发出轻柔的哼哼声或摇篮曲，不急着抱起。若宝宝长时间夜醒频繁、哭闹不安，白天亦是精神不佳，需要医院就诊。
	警示信号	听到声音无应答；不会区分生人和熟人；双手间不会传递玩具；不会独坐
体检	体检时间	9 月龄
	体检目的	1. 了解儿童体格生长情况及一般营养状况，进行健康指导； 2. 早期识别并及时纠正可疑佝偻病的表现和体征； 3. 筛查儿童常见眼病和视力不良。
	体检项目	1. 身高体重头围测量、体格检查、神经心理与行为发育筛查、口腔保健、早教指导。基本情况：病史、日常状况、特殊情况等。 2. 全身体格检查：1）一般检查：身高/长、体重、头围、前囟、呼吸、脉搏；2）物理检查：a.内科检查：心、肺、肝、脾；b.外科检查：皮肤、淋巴结、头、颈、眼睛、耳、鼻、口腔、胸、腹、肛门/外生殖器、脊柱、四肢、髋关节。 3. 实验室检查：1）血常规，必要时完善血清铁蛋白（6 月龄未查儿童需完善，6 月龄已查正常儿童无需做此项检查）；2）骨密度测定；3）必要时完善乙肝两对半。 4. 专科检查：神经运动发育筛查、发育迟缓筛查、语言发育筛查。

1.动作发展

能独坐，会自己坐起躺下。扶握双腕能站，站立时腰、髋、膝关节能伸直。开始学会爬。能用小手拨弄桌上的小东西或摇有声响的小物品。会用拇指、食指配合抓起玩具。能换手传递玩具，能用一个玩具敲打另一个玩具。

2.语言发展

能听懂成人对自己的叫唤。开始发“ma-ma”“ba-ba”等音节，能重复发出某些元音和辅音。试着模仿成人声音。发音越来越像正真的语言。开始懂得一些常用词语的意思，会用简单的动作表示。会用自己的语音来表达不同的情绪。

3.认知发展

会关注有吸引力的物体，并反复观察其特点和变化。注意观察大人行动，模仿大人动作。能挑选自己喜欢的玩具。将玩具当着婴儿的面藏起来，婴儿会尝试寻找隐藏的玩具。喜欢熟悉的环境，到陌生的环境婴儿会表现出哭闹、不安或好奇。

4.情感与社会性

对带养人表示出依恋和喜爱，对陌生人会有害怕、拒绝等情绪反应。对成人表示肯定或否定的面部表情有不同的反应。喜欢玩交际游戏，如拍手、躲猫猫。喜欢看镜中自己的影像。会挥手再见、招手欢迎，玩拍手游戏。听到表扬会高兴地重复刚才的动作。

5.养育指导

父母多陪伴和关注婴儿，在保证婴儿安全的情况下扩大活动范围，鼓励与外界环境和人接触。经常叫婴儿名字，说家中物品名称，培养婴儿对语言的理解能力。引导婴儿发“ba ba”、“ma ma”等语音，提高其对发音的兴趣。帮助婴儿练习独坐和匍匐爬行，扶腋下蹦跳；练习伸手够远处玩具、双手传递玩具、撕纸等双手配合和手指抓捏动作，提高手眼协调能力。

推荐活动:

说家中物品名；练习匍匐爬、伸手够；多接触外界环境。

（五）10-12 个月婴儿

10 月龄-12 月龄科学育儿		
宝宝情况	体重	男:7.7-11.5kg,女:7.2-10.8kg,每月增长 0.2-0.3kg
	身高	男：68.3-77.8cm，女：66.8-76.1cm，每月增长 1cm
	头围	男：42.7-47.7cm，女：41.6-46.5cm，每月增长 0.5cm
	睡眠	12-16 小时，频率：白天小睡次数：2 次，每次小睡的时长：1-2 小时
	排便	每天 1-2 次
营养及喂养	乳类喂养	继续母乳喂养，母乳不足时，可选用婴儿配方奶粉补充。每天 2～4 次，共 500～700ml。
	辅食添加	1. 逐渐推进（半）固体食物（切碎的家庭食物/手指食物/条状食物）摄入到 2～3 次。 2. 每餐 1/2 碗（250ml 的碗）。 3. 注意膳食品种多样化，提倡自然食品、均衡膳食，每天应摄入 15～50 鸡蛋（至少一个蛋黄）、25～50 克动物性食物、20～50 克谷物、25～100 克蔬菜、25～100 克水果、0～10 克植物油。
	营养剂添加	1. 每天补充维生素 D 400 国际单位，维生素 A 1500

		国际单位； 2. 早产或低出生体重儿，继续按 2 毫克/（千克·天）补充铁元素，上述补充量包括配方奶及辅食中的含量。
疫苗接种	10-12 月龄	暂无一类疫苗接种，若前期疫苗接种延迟，可顺延至 10-12 月龄进行补种，除国家免疫规划疫苗外，可根据家长需求、流行季节特点等进行补充免疫。
常见问题	辅食喂养困难	辅食喂养困难发生原因：1.未定时喂养，奶和辅食时间间隔太短，宝宝饥饿感不明显。2.长期强迫喂养，让宝宝产生恐惧感。3.夜间未停夜奶，白天食欲下降。4.辅食添加种类太单一，宝宝存在厌新情况。5.辅食太精细，宝宝吞咽咀嚼能力训练不足。6 喂养者过度焦虑。 改善办法：1.拉长喂养时间间隔，可奶后 3-4 小时添加辅食。2.辅食喂养时间小于 20 分钟。3.停止夜奶，特别是母乳喂养亦需要停夜奶。3.若宝宝拒绝某一新的食物，可少量多次添加 10-15 次。4.给宝宝营造轻松舒适的进食环境，特定位置进餐，不依赖玩具电子产品，辅食的进食量多少由宝宝决定，尽量鼓励并表扬宝宝积极的进食状态。若宝宝长期喂养困难，伴体重不增、呕吐、腹胀、便秘等情况，及时医院就诊。
	警示信号	缺乏好奇心；缺乏模仿。
体检	体检时间	12 月龄
	体检目的	1. 了解儿童体格生长情况及一般营养状况，查看预防接种情况，进行健康指导； 2. 早期识别并及时纠正可疑佝偻病的表现和体征； 3.筛查儿童常见眼病和视力不良。
	体检项目	1. 基本情况：病史、日常状况、特殊情况等。 2. 全身体格检查：1）一般检查：身高/长、体重、头围、前囟、呼吸、脉搏；2）物理检查：a.内科检查：心、肺、肝、脾；b.外科检查：皮肤、淋巴结、头、颈、眼睛、耳、鼻、口腔、胸、腹、肛门/外生殖器、脊柱、四肢、髋关节。 3. 实验室检查：骨密度测定。 4. 专科检查：神经运动发育筛查、发育迟缓筛查、语言发育筛查、视力筛查。

1.动作发展

可以腹部不贴地面地用四肢爬行。能自己扶栏杆站立、坐下及蹲下取物。能独自站稳一会儿，扶物会走，能独走几步。会将物体从大罐子中取出、放入。喜欢随地扔东西。会将大圆圈套在木棍上。

2.语言发展

能听懂一些与自己有关的日常生活指令。会用点头摇头等动作表达自己的意愿。能说出几个词，如“爸爸”“妈妈”等。会自创一些词语来指称事物。

3.认知发展

会分辨甜、苦、咸等味道和香、臭等气味。能指认耳朵、眼睛、鼻子和经常接触的物品。喜欢看图画。会注意到比较细小的物品，喜欢摆弄、观察玩具及实物。开始学习使用工具够物，如：玩具掉到沙发底下了，宝宝会拿小棍子够取。

4.情感与社会性

理解成人的肯定或否定态度。会表达愤怒、害怕、焦急等不同情绪。喜爱熟悉的人，会伸手要抱，对陌生人表现出忧虑、退缩、拒绝等行为。喜欢情感交流活动，会注视、伸手去触摸同伴。当言行得到认可时会高兴地重复表现。会用动作等方式向成人索取感兴趣的东西，初步具有保护自己物品的意识。爱尝试、喜欢自己探索。喜欢重复玩交往游戏。

5.养育指导

帮助婴儿识别他人的不同表情；当婴儿出现生气、厌烦、不愉快等负性情绪时，转移其注意力；受到挫折时给予鼓励和支持。丰富婴儿语言环境，经常同婴儿讲话、看图画。让婴儿按指令做出动作和表情，如叫名字有应答，懂得挥手“再见”。帮助婴儿多练习手-膝爬行，学习扶着物品站立和行走；给婴儿提供杯子、积木、球等安全玩具玩耍，发展手眼协调和相对准确的操作能力。与婴儿玩模仿游戏，如拍手“欢迎”、捏有响声的玩具、拍娃娃、拖动毯子取得玩具等。

推荐活动:

模仿“再见”；多与婴儿说话/看图画；手-膝爬。

（六）13-18 个月幼儿

13 月龄-18 月龄科学育儿		
宝宝情况	体重	男：8.3-12.3kg，女：7.7-11.6kg，正常长速：每 3 月增长 0.5kg
	身高	男：71.7-81.6cm，女：70.4-80.1cm，每月增长 1cm
	头围	男：43.7-48.4cm，女：42.7-47.6cm，正常长速：1 岁～2 岁增加 2cm
	睡眠	11-14 小时，频率：白天小睡次数：1-2 次，每次小睡的时长：1-3 小时
	排便	每天 1-2 次
营养及喂养	乳类喂养	继续母乳喂养，母乳不足时，可选用配方奶粉补充。每天 2～3 次，共 400～600ml。
	主食添加	1.条块、球块状的家庭食物，每天摄入到 2～3 次。每餐 3/4 碗（250ml 的碗）。2.每天应摄入 1 个鸡蛋、50 克动物性食物、50～100 克谷物、50～150 克蔬菜、50～150 克水果、5～15 克植物油；3.1 岁以后宜引导而不强迫幼儿进食，鼓励自主进食。每次进餐时间控制在 20 分钟左右，最长不宜超过 30 分钟，并逐渐养成定时进餐和良好的饮食习惯。
	营养剂添加	每天补充维生素 D 600 国际单位，维生素 A 2000 国际单位；

疫苗接种	18 月龄	麻腮风疫苗（第 2 针），百白破疫苗（第 4 针），甲肝减毒活疫苗或甲肝灭活疫苗（2 选 1） （注：甲肝活疫苗仅需接种 1 针，甲肝灭活疫苗需接种第 2 针）
常见问题	分离焦虑	与家人或亲人分开时，哭很长时间；恳求亲人不要离开；分离时只想亲人回到身边
	偏食挑食，吃饭慢	不肯吃硬食物该现象往往由于父母的溺爱和纵容，以及缺乏科学的喂养方式所致。
	警示信号	不能听从简单指令；对周围小朋友不感兴趣。
体检	体检时间	18 月龄
	体检目的	3. 了解儿童体格生长情况及一般营养状况，进行健康指导； 4. 早期识别并及时纠正可疑佝偻病的表现和体征； 5. 发现并及时纠正贫血； 筛查儿童常见眼病和视力不良。
	体检项目	1. 基本情况：病史、日常状况、特殊情况等。 2. 全身体格检查：1）一般检查：身高/长、体重、头围、前囟、呼吸、脉搏；2）物理检查：a.内科检查：心、肺、肝、脾；b.外科检查：皮肤、淋巴结、头、颈、眼睛、耳、鼻、口腔、胸、腹、肛门/外生殖器、脊柱、四肢、髋关节。 3. 实验室检查：1）血常规，必要时完善血清铁蛋白、尿常规、粪常规、肝肾功能、血清酶、血糖、重金属筛查；2）骨密度测定。 4. 专科检查：神经运动发育筛查、发育迟缓筛查、语言发育筛查、口腔检查、眼保健及视力检查。

1.动作发展

开始独立行走，喜欢走路时推、拉、拿着玩具。会跑，但不稳。不用扶物能蹲下、站起。在成人的帮助下会上楼梯。会做简单的手势。会将球滚来滚去，没有方向地随意扔球；会将两三块积木垒高，把小丸捏起放入容器中。会抓住蜡笔涂鸦。会用水杯喝水。

2.语言发展

对语言的理解能力超过语言的表达能力。会用表情、手势代替语言进行交流。能听懂成人说的简单指令，如可依照指令模仿常见动物的叫声。开始知道书的概念，喜欢模仿翻书页。会说自己的名字、熟悉的人名或物品的名字。会使用生活中常见的动词，如“抱”“吃”等。

3.认知发展

会指认某些身体部位。喜欢用嘴、手试探各种东西。开始理解简单的因果关系。会长时间观察感兴趣的事物，能用手势和声音表示不同的反应。能根据感知方面的突出特征对熟悉的物品进行简单的分类。会模仿一些简单的动作或声音，开始自发地玩模仿性游戏，如：用玩具电话玩打电话游戏。

4.情感与社会性

对陌生人表示新奇，会害怕陌生的环境和人。开始理解并遵从成人简单的行

为准则和规范。在很短的时间内表现出丰富的情绪变化。能感觉到常规的改变或环境的变迁。自我意识开始萌芽。能认出镜子里的自己。喜欢单独玩或观看别人游戏活动。开始对别的小孩感兴趣，能共同玩一会儿。

5.养育指导

给予幼儿探索环境、表达愿望和情绪的机会。经常带幼儿玩亲子互动游戏，如相互滚球、爬行比赛等；引导幼儿玩功能性游戏，如模仿给娃娃喂饭、拍睡觉等。多给幼儿讲故事、说儿歌，教幼儿指认书中图画和身体部位，引导幼儿将语言与实物联系起来，鼓励幼儿有意识的用语言表达。给幼儿提供安全的活动场所，通过练习独立行走、扔球、踢球、拉着玩具走等活动，提高控制平衡的能力。鼓励幼儿多做翻书页、盖瓶盖、用笔涂鸦、垒积木等游戏，提高认知及手眼协调能力。

推荐活动:

练习走路；涂鸦；亲子阅读。

（七）19-24 个月幼儿

19 月龄-24 月龄科学育儿		
宝宝情况	体重	男 9.3-13.8kg：，女：8.8-13.2kg，正常长速:每 3 月增长 0.5kg
	身高	男：77.7-88.5cm，女：76.5-87.2cm，每月增长 1cm
	头围	男：44.9-50cm，女：43.9-49cm，正常长速:1 岁～2 岁增加 2cm
	睡眠	11-14 小时，频率：白天小睡次数：1 次，每次小睡的时长：1.5-2.5 小时
	排便	每天 1-2 次
营养及喂养	乳类喂养	继续母乳喂养，母乳不足时，可选用配方奶粉补充。每天 2～3 次，共 400～600ml。
	主食添加	1.条块、球块状的家庭食物，每天摄入 3 次。2.每餐 3/4 碗到 1 整碗（250ml 的碗）。②每天应摄入 1 个鸡蛋、50～75 克动物性食物、50～100 克谷物、100～150 克蔬菜、50～150 克水果、10～15 克植物油。3.幼儿逐步过渡到独立进食，引导而不强迫幼儿进食，鼓励自主进食。每次进餐时间控制在 20 分钟左右，最长不宜超过 30 分钟，并养成定时进餐和良好的饮食习惯。
	营养剂添加	每天补充维生素 D 600 国际单位，维生素 A 2000 国际单位；
疫苗接种	24 月龄	乙脑减毒活疫苗(第 2 针)或乙脑灭活疫苗(第 3 针)，甲肝灭活疫苗（第 2 针） （注：已接种甲肝减毒活疫苗者无需再接种甲肝灭活

		疫苗第 2 针）
常见问题	跌倒外伤等意外伤害	随着年龄的增长，孩子独立行走活动范围逐步扩大，家长应增强安全防范意识，防止幼儿期意外伤害的发生
	警示信号	不能听从简单指令；对周围小朋友不感兴趣。
体检	体检时间	24 月龄
	体检目的	6. 了解儿童体格生长情况及一般营养状况，进行健康指导； 7. 早期识别并及时纠正可疑佝偻病的表现和体征； 3.筛查儿童常见眼病和视力不良。
	体检项目	1. 基本情况：病史、日常状况、特殊情况等。 2. 全身体格检查：1）一般检查：身高/长、体重、头围、前囟、呼吸、脉搏；2）物理检查：a.内科检查：心、肺、肝、脾；b.外科检查：皮肤、淋巴结、头、颈、眼睛、耳、鼻、口腔、胸、腹、肛门/外生殖器、脊柱、四肢、髋关节。 3. 实验室检查：骨密度测定。 4. 专科检查：神经运动发育筛查、发育迟缓筛查、语言发育筛查、口腔检查、眼保健及视听力筛查。

1.动作发展

会自如地向前走、向后走。能连续跑 3-4 米，但不稳。会自己扶栏杆能走几步楼梯。能蹲着玩。能够弯腰捡玩具。能举手过肩扔球。能踢大球。会用五六块积木叠搭起来。会穿串珠。会随意折纸。能够根据音乐的节奏做动作。绘画开始进入圆形涂鸦期。自己能够用汤匙吃东西。

2.语言发展

开始用名字称呼自己,开始会用“我”。会说出常用东西的名称和用途。词汇增加，能说 3-5 个字的简单短句表达一定意思和个人需要。喜欢跟着大人学说话、念童谣，爱重复结尾的句子。喜欢看图书、指认书中物品，说出熟悉的事物。

3.认知发展

喜欢探索周围的世界。开始理解事件发生的前后顺序。能记住一些简单的事，熟悉的生活内容。知道家庭成员以及经常一起玩的伙伴名字。对声音的反应开始越来越强烈，喜欢听声音的重复。能短暂的集中注意看图片、看电视、玩玩具、听故事等。认识红色。能感知、区分方形、三角形和圆形。

4.情感与社会性

对主要带养者表现出较强的依恋。会较长地延续某种情绪状态。会对某些东西或环境感到害怕，需要时间适应新环境。自我意识逐步增强，喜欢自己独立完成某一动作，出现独立行为倾向。开始意识到自己是女孩还是男孩，交往能力增加，会与其他小孩共同参与游戏活动。能按指示完成简单的任务，喜欢模仿成人动作，如擦桌子、拖地、学收拾玩具等。

5.养育指导

家长对待幼儿的养育态度和行为要一致。在保证安全的前提下，给幼儿自主做事情的机会，对幼儿每一次的努力都给予鼓励和赞扬，培养其独立性和自信心。与幼儿玩“给娃娃喂饭、拍睡觉”等装扮性游戏。学习更多词汇，说出身边物品名称、

短语，鼓励用语言表达需求和简单对话；学习区分大小，匹配形状和颜色等。提高幼儿身体动作协调能力，学习扶着栏杆上下楼梯、踢皮球、踮着脚尖走和跑，握笔模仿画线，积木叠高等。培养幼儿生活自理能力，如用匙进食、用杯子喝水，学习脱袜子、脱鞋；固定大小便场所，练习有大小便时向家长示意。

推荐活动:
玩装扮性游戏；练习踮脚尖走；练习自己吃饭。

（八）25-30 个月幼儿

25 月龄-30 月龄科学育儿		
宝宝情况	体重	男：10.4-15.4kg，女：9.8-14.8kg，正常长速：每 3 月增长 0.5kg
	身高	男:82.4-94cm,女:81.2-92.8cm,每月增长 0.5-0.7cm
	头围	男：45.9-51cm，女：44.8-51cm，正常长速：2 岁～3 岁增加 2cm
	睡眠	11-14 小时，频率：白天小睡次数：1 次，每次小睡的时长：1.5-2.5 小时
	排便	每天 1-2 次
营养及喂养	乳类喂养	每日饮奶，350-500 克
	主食添加	1.注意膳食品种多样化，提倡自然食品、均衡膳食，每天应摄入 1 个鸡蛋、50 克动物性食物、75～125 克谷物、100～200 克蔬菜、100～200 克水果、10～20 克植物油。2.幼儿应进食体积适宜、质地稍软、少盐易消化的家常食物，避免给幼儿吃油炸食品，少吃快餐，少喝甜饮料，包括乳酸饮料。3.幼儿应自主进食。每次进餐时间控制在 20 分钟左右，最长不宜超过 30 分钟，并养成定时进餐和良好的饮食习惯。
	营养剂添加	每天补充维生素 D 600 国际单位，维生素 A 2000 国际单位；
疫苗接种	25-30 月龄	除国家免疫规划疫苗外，可根据家长需求、流行季节特点等进行补充免疫。
常见问题	警示信号	缺乏基本情绪表达；缺乏想象性游戏。
体检	体检时间	30 月龄
	体检目的	1. 了解儿童体格生长情况及一般营养状况，进行健康指导； 2.筛查儿童常见眼病和视力不良。
	体检项目	1. 基本情况：病史、日常状况、特殊情况等。 2. 全身体格检查：1）一般检查：身高/长、体重、头围、前囟、呼吸、脉搏；2）物理检查：a.内科检

		查：心、肺、肝、脾；b.外科检查：皮肤、淋巴结、头、颈、眼睛、耳、鼻、口腔、胸、腹、肛门/外生殖器、脊柱、四肢、髋关节。 3. 实验室检查：1）血常规，必要时完善血清铁蛋白、尿常规、粪常规、肝肾功能、25OHD3、血糖、重金属筛查；2）骨密度测定。 4. 专科检查：神经运动发育筛查、发育迟缓筛查、语言发育筛查、口腔检查、眼保健及视力筛查。

1.动作发展

能双脚交替走楼梯。能后退、侧着走和奔跑。能双脚离地跳。会迈过低矮的障碍物。能轻松地立定蹲下。能手脚基本协调地进行攀爬。会骑三轮车和其他大轮的玩具车。能用积木搭桥、火车等简单的物体。会滚球、扔球，举起手臂有方向地投掷。会一页一页五指抓翻书页。会转动把手开门、旋开瓶盖取物。会自己洗手、擦脸。

2.语言发展

咿呀学语声基本消失。会用日常生活中一些常用的形容词，如“热”“冷”。开始用“你”等代名词。会说完整的短句和简单的复合句。会念简单的童谣。能区分书中的图画和文字。愿意独自看简单的图画书。

3.认知发展

对周围事物或现象感兴趣，爱提问题。能感知物体软、硬、冷、热等属性。感知比较差异明显的“大”“小”“多”“少”“上”“下”。能基于形状、大小、颜色等做简单的分类。能跟着数数。能重复一些简单的韵律和歌曲。游戏时能用物体或自己的身体部位代表其他物体。

4.情感与社会性

开始能表达自己的情感。受到挫折会发脾气。开始意识到他人的情感。萌发初步的同情感。有简单的是非观念。喜欢参与同伴的活动，能和同伴一起玩简单的角色游戏，会相互模仿，有模糊的角色装扮意识。

5.养育指导

鼓励自己做力所能及的事，提高克服困难的意识和能力。鼓励幼儿帮助家长做一些简单的家务活动，如收拾玩具、扫地、帮忙拿东西等，促进自信心的发展，激发参与热情。当幼儿企图做危险的活动时，应当及时制止；出现无理哭闹等不适宜的行为时，可采用不予理睬或转移等方法，让幼儿懂得日常行为的对与错，逐步养成良好的行为习惯。教幼儿说出自己的姓名、性别、身体部位以及一些短句和歌谣。学习执行指令，用较准确的语言表达需求；培养幼儿理解“里外”、“上下”、“前后”等空间概念。学习独自上下楼梯、单腿站，提高身体协调及大运动能力；通过搭积木、串珠子、系扣子、画画等游戏，提高精细动作能力。

推荐活动:

收拾玩具;自己上下楼梯;搭积木。

（九）31-36 个月幼儿

宝宝情况	体重	男：11.2-16.7kg，女：10.7-17.2kg，正常长速；每3月增长0.5kg
	身高	男:87-99.4cm,女:85.7-98.1cm,每月增长0.5-0.7cm
	头围	男：46.4-51.6cm，女：45.4-50.6cm，正常长速：2岁～3岁增加2cm
	睡眠	11-14小时，频率：白天小睡次数：1次，每次小睡的时长：1.5-2.5小时
	排便	每天1-2次
营养及喂养	乳类喂养	每日饮奶，350-500克
	主食添加	1.注意膳食品种多样化，提倡自然食品、均衡膳食，每天应摄入1个鸡蛋、50～75克动物性食物、75～125克谷物、150～200克蔬菜、100～200克水果、10～20克植物油。2.幼儿应进食体积适宜、少盐易消化的家常食物，避免给幼儿吃油炸食品，少吃快餐，少喝甜饮料，包括乳酸饮料。3.幼儿应自主进食。每次进餐时间控制在20分钟左右，最长不宜超过30分钟，并养成定时进餐和良好的饮食习惯。
	营养剂添加	每天补充维生素D 600国际单位，维生素A 2000国际单位；
疫苗接种	36月龄	A群C群流脑多糖疫苗
常见问题	警示信号	不能和小朋友玩耍；不能识别照养者的基本情绪。
体检	体检时间	36月龄
	体检目的	2. 了解儿童体格生长情况及一般营养状况，进行健康指导； 2.筛查儿童常见眼病和视力不良。
	体检项目	1. 基本情况：病史、日常状况、特殊情况等。 2. 全身体格检查：1）一般检查：身高/长、体重、头围、前囟、呼吸、脉搏；2）物理检查：a.内科检查：心、肺、肝、脾；b.外科检查：皮肤、淋巴结、头、颈、眼睛、耳、鼻、口腔、胸、腹、肛门/外生殖器、脊柱、四肢、髋关节。 3. 实验室检查：1）血细胞分析、铁代谢、25OHD3、乙肝两对半、肝肾功能，等；2）骨密度测定。 4. 专科检查：神经运动发育筛查、发育迟缓筛查、语言发育筛查、口腔检查、视听力检查。

1.动作发展

能双脚交替灵活走楼梯。能走直线。能跨越一条短的平衡木。双脚离地连续跳跃2—3次。单脚站（约3-5秒）。手脚基本协调地攀登。将球扔出2-3米。随口令做简单的操。会用积木（积塑）搭（或插）成较形象的物体。会穿鞋袜和简单的外衣外裤。

2.语言发展

能回答简单问题，喜欢问“这（那）是什么？”等问句。词汇量增多，能说出有5个字以上的复杂句子。能说出物体及其图片的名称。理解简单故事的主要

情节。会“念”熟悉的图画书给自己或家人听。知道一些礼貌用语，并知道何时使用这些礼貌用语。

3.认知发展

能区别红、黄、蓝、绿等常见颜色。尝试画代表一定意思的涂鸦画，能记忆和唱简单的歌。能口数 1-10。知道数字代表数量。会区分大小、多少、长短、上下、里外，能给物体归类。知道家里主要成员的简单情况。

4.情感与社会性

能较好地调节情绪，发脾气时间减少，有时会隐瞒自己的感情。会用“快乐、生气”等词来谈论自己和他人的情感。对成功表现出积极的情感，对失败表现出消极的情感。会表现出“骄傲、羞愧、嫉妒”等复杂的自我意识。知道自己是男孩还是女孩，能正确使用性别短语，更喜欢玩属于自己性别的玩具，如“女孩喜欢娃娃，男孩喜欢车”参加属于自己性别群体的活动。能和同龄小朋友分享玩具，知道等待、轮流，有时不耐心。会自己整理玩具，能自己上床睡觉。

5.养育指导

提供与小朋友玩耍的机会，鼓励幼儿发展同伴关系，学习轮流、等待、合作、互助与分享，培养爱心、同情心和自我控制能力。通过与小朋友玩“开火车”、“骑竹竿”、“过家家”等想象性和角色扮演游戏，保护和培养幼儿的兴趣和想象力。经常给幼儿讲故事，并鼓励幼儿复述简单故事，教幼儿说歌谣、唱儿歌、讲述图画，不断地丰富词汇，提高语言表达能力。练习双脚交替上楼梯、走脚印、跳远等，提高身体协调能力。通过画水平线、画圆形、扣扣子、穿鞋子等，提高精细动作能力。逐步培养规律的生活习惯，学习自己洗手、进食、穿衣、大小便等生活技能。帮助幼儿学会适应新环境，做好入园准备。

推荐活动:

唱儿歌；自己洗手；参与同伴玩耍。