

Ćwiczenia z ANALIZY NUMERYCZNEJ (L)

Lista nr 5

5 listopada 2015 r.

Zajęcia 18 listopada 2015 r.
Zaliczenie listy **od 5 pkt.**

L5.1. 1 punkt Metodę siecznych definiuje wzór iteracyjny

$$x_{n+1} := x_n - f_n \frac{x_n - x_{n-1}}{f_n - f_{n-1}} \quad (f_n \neq f_{n-1}; n = 1, 2, \dots; x_0, x_1 - \text{dane}),$$

gdzie $f_m := f(x_m)$ ($m = 0, 1, \dots$). Wykaż, że wzór ten można również zapisać w postaci

$$x_{n+1} := \frac{f_n x_{n-1} - f_{n-1} x_n}{f_n - f_{n-1}} \quad (f_n \neq f_{n-1}; n = 1, 2, \dots; x_0, x_1 - \text{dane}),$$

a następnie wyjaśnij, który z wzorów jest przydatniejszy w praktyce numerycznej.

L5.2. 2 punkt Załóżmy, że metoda iteracyjna

$$x_{k+1} = F(x_k) \quad (k = 0, 1, \dots)$$

jest zbieżna do pierwiastka α równania $f(x) = 0$. Wykazać, że jeśli

$$F(\alpha) = \alpha, \quad F'(\alpha) = F''(\alpha) = \dots = F^{(p-1)}(\alpha) = 0, \quad F^{(p)}(\alpha) \neq 0,$$

to rząd metody jest równy p , tzn.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^p} = C \neq 0.$$

Jakim wzorem wyraża się stała C ?

L5.3. 1 punkt Uproszczoną metodę Newtona $x_{n+1} := x_n - f(x_n)/f'(x_0)$ ($n = 0, 1, \dots$) stosujemy do wyznaczenia pojedynczego zera funkcji f . Jaki jest rząd zbieżności tej metody?

L5.4. 1 punkt Niech α będzie podwójnym zerem funkcji f , zatem niech $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0 \neq f''(\alpha)$. Wykaż, że metoda Newtona jest wówczas zbieżna liniowo.

L5.5. 1 punkt Zaproponuj numeryczną metodę wyznaczania wykładnika zbieżności jednokrokowej metody iteracyjnej rozwiązywania równania nieliniowego $f(x) = 0$.

L5.6. **Włącz komputer!** 1 punkt Ustal eksperymentalnie jaki jest rząd następującej metody Olvera:

$$x_{n+1} := x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - \frac{1}{2} \frac{f''(x_n)}{f'(x_n)} \left[\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \right]^2 \quad (n = 0, 1, \dots)$$

rozwiązywania równania nieliniowego $f(x) = 0$.

L5.7.

Włącz komputer!	1 punkt
------------------------	----------------

 Wiadomo, że liczba G jest granicą dwóch ciągów: $\{r_n\}$ i $\{a_n\}$. To znaczy,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = G, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = G.$$

Do tej pory wartość G znana była z dokładnością 10 cyfr dziesiętnych. Na tej podstawie obliczono:

$$|r_0 - G| \approx 0.763907023,$$

$$|r_1 - G| \approx 0.543852762,$$

$$|r_2 - G| \approx 0.196247370,$$

$$|r_3 - G| \approx 0.009220859$$

oraz

$$|a_0 - G| \approx 0.605426053,$$

$$|a_1 - G| \approx 0.055322784,$$

$$|a_2 - G| \approx 0.004819076,$$

$$|a_3 - G| \approx 0.000399783.$$

Obecnie, konieczne okazało się wyznaczenie stałej G z dokładnością 100 cyfr. Na obliczenie jednego wyrazu ciągu $\{r_n\}$ lub $\{a_n\}$ z taką precyzją potrzeba około tygodnia. Rosjanie próbują przybliżyć stałą G używając ciągu $\{r_n\}$, a Amerykanie – ciągu $\{a_n\}$. Kto szybciej wyznaczy stałą G z żadaną dokładnością i ile będzie to trwało?

(–) *Paweł Woźny*