

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Lista zadań nr 7. 10 i 13 kwietnia 2017

1. Zmienna losowa X ma rozkład Bernoulliego $B(n, p)$. Udowodnić, że

$$E = \left[\frac{1}{X+1} \right] = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}.$$

2. Dana jest n -wymiarowa zmienna losowa $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$. Zmienną $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)^T$ określamy następująco:

$$Y_1 = \bar{\mathbf{X}}, \quad Y_k = X_k - \bar{\mathbf{X}} \quad \text{dla } k = 2, \dots, n.$$

Znaleźć postać (współczynniki) Jacobianu

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial x_2}{\partial y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \frac{\partial x_n}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{vmatrix}.$$

3. Dane są zmienne losowe X_1, \dots, X_n . Udowodnić, że:

$$\sum_{k=1}^n (X_k - \mu)^2 = \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{\mathbf{X}})^2 + n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)^2. \quad (1)$$

[Zadania 4–5] Zakładamy, że niezależne zmienne losowe X_k podlegają rozkładowi $N(\mu, \sigma^2)$.

4. Znaleźć (wraz z uzasadnieniem) rozkład zmiennej $M = \frac{n}{\sigma^2} \cdot (\bar{\mathbf{X}} - \mu)^2$
5. Załóżmy, że zmienne $\bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ oraz $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{\mathbf{X}})^2$ są niezależne. Korzystając z równania (1) udowodnić, że $\frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \equiv \text{Gamma}\left(\frac{1}{2}, \frac{n-1}{2}\right)$
6. Pociągi do miejscowości A odjeżdżają co 10 minut, rozpoczynając od 7.00. Pociągi do miejscowości B odjeżdżają co 15 minut, rozpoczynając od 7.05. Pasażer P_1 przychodzi na stację w chwili o rozkładzie jednostajnym pomiędzy 7.00 a 8.00; pasażer P_2 przychodzi na stację w czasie o rozkładzie jednostajnym pomiędzy 7.10 a 8.10. Jakie jest ppb, że pasażer P_1 dojedzie do A? Jakie jest ppb, że pasażer P_2 dojedzie do A? Jeżeli w chwili przyścia pasażera na stacji znajdują się 2 pociągi — wybiera on losowo jeden z nich z ppb = $1/2$. Rozwiązanie (raczej) rysunkowe.

7. Zmienna losowa X ma dyskretny rozkład jednostajny

$$P(X = i) = \frac{1}{100}, \quad i \in \{1, 2, \dots, 99, 100\}.$$

Zmienne losowe Y oraz Z określone są następująco

$$Y = \begin{cases} 1, & 2|X \vee 3|X, \\ 0, & \text{wpw}, \end{cases} \quad Z = \begin{cases} 1, & 3|X, \\ 0, & \text{wpw}. \end{cases}$$

Znaleźć wartość współczynnika korelacji ρ zmiennych Y i Z . (Odp.: $\rho = 33/67$)

[Do zadań 8–9] Boki prostokąta są niezależnymi zmiennymi losowymi X_1 i X_2 o rozkładzie $U[1, 2]$. $Y_1 = 2X_1 + 2X_2$ jest obwodem tego prostokąta, $Y_2 = X_1X_2$ oznacza pole tego prostokąta.

8. Znaleźć wartości oczekiwane i wariancje zmiennych Y_1, Y_2 . (Odp.: 6, $2/3$ dla Y_1 , $9/4$, $55/144$ dla Y_2).
9. Obliczyć wartość współczynnika korelacji ρ zmiennych Y_1, Y_2 . (Odp.: $3\sqrt{330}/55$).
10. Ze zbioru n -elementowego wybieramy losowo niepusty podzbiór (każdy z podzbiorów jest jednakowo prawdopodobny). Wartością zmiennej losowej X jest liczba elementów wylosowanego podzbioru. Wykazać, że $E(X) = \frac{n}{2 - (.5)^{n-1}}$.

Witold Karczewski