

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Lista zadań nr 1. 27 lutego i 2 marca 2017

Zadania

1. Niech Σ będzie σ -ciałem zbiorów.

(a) Sprawdzić, że $\Omega \in \Sigma$.

(b) Załóżmy, że $A_k \in \Sigma$, dla $k = 1, 2, 3, \dots$. Wykazać, że $\bigcap_{k \in \mathbb{N}} A_k \in \Sigma$.

2. Niech $\Omega = \{a, b, c\}$.

(a) Opisać σ -ciała zbiorów tej przestrzeni zdarzeń.

(b) Podać przykład funkcji X, Y takich, że X jest zmienną losową, a Y nie jest zmienną losową.

3. Niech $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ oraz $S = \{1, 3\}$. Wyznaczyć najmniejsze σ -ciało zbiorów zawierające S .

4. Dystrybuanta F zmiennej losowej X określona jest następująco:

$$F(x) \begin{array}{ccccc} (-\infty; -2] & (-2; 3] & (3; 5] & (5; \infty) \\ 0 & 0.2 & 0.7 & 1 \end{array}$$

Znaleźć gęstość $f(x)$ i wartość oczekiwaną EX tej zmiennej.

5. Zmienna X ma rozkład Bernoulliego z parametrami n, p ($X \sim B(n, p)$). Sprawdzić, że:

$$\sum_{k=0}^n p_k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = 1, \quad E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = np.$$

6. Zmienna X ma rozkład Poissona z parametrem λ . Sprawdzić, że

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = 1, \quad E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda.$$

7. Niech X będzie zmienną losową typu dyskretnego. Udowodnić, że $E(aX + b) = a E(X) + b$.

8. Wykazać, że $\Gamma(n) = (n-1)!$, $n \in \mathbb{N}$.

9. Sprawdzić, że

$$(a) \quad B(p, q+1) = B(p, q) \frac{q}{p+q},$$

$$(b) \quad B(p, q) = B(p, q+1) + B(p+1, q).$$

10. (2p.) Udowodnić, że $\Gamma(p) \Gamma(q) = \Gamma(p+q) B(p, q)$, gdzie $p, q \in \mathbb{R}_+$.

DEF. 1. Niepusty zbiór Ω nazywamy **przestrzenią zdarzeń**.

DEF. 2. Rodzinę podzbiorów $\Sigma \subset 2^\Omega$ nazywamy **σ -ciałem zbiorów** wtedy i tylko wtedy gdy

1. $\bar{\Sigma} > 0$.

2. $A \in \Sigma \Rightarrow A^C \in \Sigma$.

3. $A_1, A_2, \dots \in \Sigma \Rightarrow \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k \in \Sigma$.

DEF. 3. Funkcję $P : \Sigma \rightarrow [0, 1]$ nazywamy **prawdopodobieństwem** wtedy i tylko wtedy gdy

1. $P(\Omega) = 1$.

2. $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j \Rightarrow P\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k\right) = \sum_{k \in \mathbb{N}} P(A_k)$.

DEF. 4. Układ (Ω, Σ, P) nazywamy **przestrzenią probabilistyczną**.

DEF. 5. Niech (Ω, Σ, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Funkcję $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ nazywamy **zmienną losową** wtedy i tylko wtedy gdy

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad X^{-1}((-\infty, a]) \in \Sigma.$$

DEF. 6. **Funkcją beta** nazywamy wartość całki

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt, \quad p > 0, \quad q > 0.$$

DEF. 7. **Funkcją gamma Eulera** nazywamy wartość całki

$$\Gamma(p) = \int_0^\infty t^{p-1} e^{-t} dt, \quad p > 0.$$

Witold Karczewski