

Ćwiczenia z ANALIZY NUMERYCZNEJ (L)

Lista nr 2

15 października 2015 r.

Zajęcia 21 października 2015 r.
Zaliczenie listy **od 5 pkt.**

L2.1. 1 punkt Pokaż, że każda niezerowa liczba rzeczywista x ma jednoznaczne przedstawienie w postaci $x = sm2^c$, gdzie $s = \operatorname{sgn} x$, $c \in \mathbb{Z}$, $m \in [\frac{1}{2}, 1)$.

L2.2. 1 punkt Podaj wszystkie liczby zmiennopozycyjne, które można przedstawić w postaci

$$(1) \quad x = \pm(0.1e_{-2}e_{-3})_2 \cdot 2^{\pm c}, \quad e_{-2}, e_{-3}, c \in \{0, 1\},$$

gdzie $(\dots)_2$ oznacza zapis dwójkowy. Jaki jest najmniejszy przedział $[A, B]$, zawierający te liczby? Jak liczby (1) rozkładają się w $[A, B]$? Co z tego wynika?

L2.3. 1 punkt Zaokrągleniem niezerowej liczby rzeczywistej $x = sm2^c$, gdzie $s = \operatorname{sgn} x$, c jest liczbą całkowitą, a $m \in [\frac{1}{2}, 1)$, jest liczba zmiennopozycyjna $\operatorname{rd}(x) = sm_t2^c$, gdzie $m_t \in [\frac{1}{2}, 1)$ oraz $|m - m_t| \leq \frac{1}{2}2^{-t}$. Wykaż, że

$$\frac{|\operatorname{rd}(x) - x|}{|x|} \leq 2^{-t}.$$

L2.4. 1 punkt Zapoznaj się ze standardem IEEE 754¹ reprezentacji liczb zmiennopozycyjnych. Omówi go krótko i podaj główne różnice w stosunku do modelu teoretycznego reprezentacji liczb maszynowych przedstawionego na wykładzie.

L2.5. 1 punkt Załóżmy, że x, y są liczbami maszynowymi. Podaj przykład pokazujący, że przy obliczaniu wartości $d := \sqrt{x^2 + y^2}$ algorytmem postaci

```
u:=x*x;  
u:=u+y*y;  
d:=sqrt(u)
```

może wystąpić zjawisko nadmiaru, mimo tego, że szukana wielkość d należy do zbioru X_{fl} . Następnie zaproponuj algorytm wyznaczania d pozwalający unikać zjawiska nadmiaru, jeśli $\sqrt{2} \max(|x|, |y|) \in X_{\text{fl}}$. Na koniec podaj skuteczną metodę wyznaczania długości euklidesowej wektora $v \in \mathbb{R}^n$.

¹Patrz np. http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754-2008

L2.6. 1 punkt Wytlumacz dokładnie kiedy występuje i na czym polega zjawisko utraty cyfr znaczących wyniku.

L2.7. 1 punkt Można wykazać, że dla dowolnego $x_0 > -1$ ciąg

$$(2) \quad x_{n+1} = 2^{n+2} \left(\sqrt{1 + 2^{-(n+1)} x_n} - 1 \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

jest zbieżny do $\ln(x_0 + 1)$. Czy podczas obliczania kolejnych wyrazów tego ciągu przy pomocy komputera może wystąpić zjawisko utraty cyfr znaczących? Jeśli tak, to zaproponuj inny sposób wyznaczania wyrazów ciągu (2) pozwalający uniknąć wspomnianego zjawiska.

L2.8. 2 punkty Dla jakich wartości x obliczanie wartości wyrażeń

a) $x^3 + \sqrt{x^6 + 2015}$, **b)** $\sin(2x) - 2x + 4x^3/3$, **c)** $\log_3 x - 5$, **d)** $1 - e^{x^2}$

może wiązać się z utratą cyfr znaczących wyniku? Zaproponuj sposób obliczenia wyniku dokładniejszego.

(-) *Paweł Woźny*