1	10/ ="/-PILITY, >>	[F:÷1]
1	1%ディプリバン注ーキット(500mg50mL)	【注】
2 3	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3 4	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 5-FU注1000mg(20mL)	【内】 【注】
4 5	5-FU注250mg(20mL)	
6	ACD一A液 (注射:500mL)	【注】
7	ローソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
8	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
10	EPLカプセル250mg	【内】
11 12	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
13	LHーRH注0.1mg「ニプロ」(1mL) ーメントール * (健栄)(末)	【注】
14		【内】
15	MSコンチン錠10mg MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	[内]
16		[9\]
17 18	PA・ヨード点眼・洗眼液 (20mL)	【外】 【如】
19	SG配合顆粒(1g/包)	【内】
	SPトローチ0.25mg「明治」 アーガメイト20%ゼリー25g	【外】 【中】
20 21	アーガメイト20%ピリー25g アーテン錠(2mg)	【内】
22	アーテン錠(Zilig) アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【内】 【外】
23	アートピレン脳骨髄子例用洗浄准流液(300mにキット) アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
23 24	アイファガン点眼液1%(5mL)	【外】
2 4 25	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
26	アイノミド配合総属住馬吸収 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
27	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
28	アクアチムクリーム1%(10g)	【外】
29	アクアチム軟膏1%(10g)	【外】
30	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】
31	アクトネル錠75mg	【内】
32	アクプラ静注用10mg	【注】
33	アクプラ静注用50mg	<u> </u>
34	アクラシノン注射用20mg	【注】
35	アコアラン静注用600	【注】
36	アコファイド錠100mg	【内】
37	アザルフィジンEN錠500mg	【内】
38	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
39	アシクロビル錠200mg「サワイ」	【内】
40	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
41	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	【内】
42	アズノールうがい液4%10mL	【外】
43	アズノール軟膏0.033%	【外】
44	アスパラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
45	アスパラカリウム錠300mg	【内】
46	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
47	アスベリン錠10	【内】
48	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)	【内】
49	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
50	アセリオ静注液1000mgバッグ	【注】
51	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
52	アゾセミド錠60mg「JG」	【内】
53	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
54	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
55	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
56	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
57 50	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
58 50	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】
59	アデホスーLコーワ注 20mg	【注】

(内) アテボスコーワ類粒109k (内)			
アドルドバスタチンの設計のmg 「トーワ」	60	アデホスコーワ顆粒10%	【内】
アトルパスタチンの錠10mg 「トーフ」	61		【内】
24	62	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】
(注)	63		【内】
(注)	64	アドレナリン注O. 1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
アナストロゾール錠 Img 「NK」	65	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	
アナバイン注75mg / ml 100ml	66		
アナバイン注7.5mg/mL 10mL			[注]
アニュイティ100 μ g エリブタ30吸入用			[注]
アネレト日点海計注液 500mg			
7キレム静注用50mg			
77-ロエリプタ 30吸入用 7パステン点滴静注用100mg/4mL (注) 77ストラル高清静注用100mg/16mL (注) 77ストラル高清静注用400mg/16mL (注) 77ストラル吉下錠100μg (内) 77レピタントカプセル125mg「NK」 (内) 78 アプレピタントカプセル80mg「NK」 (内) 78 アプレピタントカプセル80mg「NK」 (内) 79 アマージ錠2.5mg (内) 80 アマンタジ2塩酸塩金50mg「日医工」 (内) 81 アミガロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 (ス) 82 アミオグロン塩酸塩塩差崩旋50mg「TE」 (ス) 83 アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 (注) 84 アミサン注100mg (注) 85 アミヴントB輸液 200mL (注) 86 アミティーザカプセル12μg (内) 87 アミディーザカプセル24μg (内) 88 アミノルバンEN配合散(フルーツ味) (内) 97 アミノルバンEN配合散(フルーツ味) (内) 97 アンルバン点滴静注(200mL袋) (注) 97 アムバンEN配合散(フルーツ味) (内) 97 アムバンEN配合散(フルーのは袋) (注) 97 アムバンEN配合散(フルーのは袋) (注) 97 アムバンEN配合散(フルーのは袋) (注) 97 アムバンEN配合散(アルーのは袋) (注) 97 アムバンEN配合散(アルーのはくめ) (注) 97 アムアンドンを放きが上りたり (内) 98 アミルバンとの酸25 5mg「トーワ」 (内) 97 アムウンドンクレジを5mg「トーワ」 (内) 97 アムウンドンクロジを5mg「トーワ」 (内) 97 アンカンドンクロジを5mg「トーワ」 (内) 97 アンカンアンル250mg「NP」 (内) 97 アンカントラ皮下注5 5mg (注) 97 アリンストラ皮下注5 5mg (注) 97 アルクストラ皮下注5 5mg (注) 97 アルクストラ皮下注5 5mg (注) 97 アルクストラ皮下注5 5mg (注) 97 アルクストランジを10mg「サワイ」 (内) 97 アルクストラ皮下注5 5mg (注) 97 アルクストラ皮下注5 5mg (注) 97 アルクストラ皮下注5 5mg (注) 97 アルクストラ皮下注5 5mg (注) 97 アルクストラとで50mg (注) 97 アルクストラとで50mg (方) 97 アルクストランジを10mg (方) 97 アルクラン砂を20mg (方) 97 アルクラン砂を20mg (方) 97 アルクラン砂を20mg (方) 97 アルクラン砂を3mg (注) 97 アルクアントラク関節手術用灌流液(3L) (外) 97 アルファルンドールカプセル1.0μg「ワンー」 (内) 97 アルファルンドールカプセル1.0μg「ワンー」 (内) 97 アルブラン-ム錠の4mg「トーワ」 (内) 97 アルブストラン-50 静注 12.5g/250mL (注) 97 アルブストラン-50 静注 12.5g/250mL (注) 97 アルブススタジル注10 μg/05 μg/05 μg/01 (点)			【注】
アバスチン点滴幹注用100mg / 4mL			
7/スチン島海静注用400mg / 16mL (注) 77 アブルラル西下鉄100μg (内) 77 アブルジン塩酸塩カブセル20mg「NP」 (内) 77 アブルジットカブセル125mg「NK」 (内) 78 アブルジットカブセル80mg「NK」 (内) 79 アマ・ジ錠2. 5mg (内) 80 アマッシ塩酸塩錠 50mg「日医工」 (内) 81 アギオグロン塩酸塩酸 50mg「日医工」 (内) 82 アミカダロン塩酸塩素剤 £150mg「TE」 (注) 83 アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 (注) 84 アミサル注100mg (注) 85 アミディーサカブセル12μg (内) 86 アミディーサカブセル12μg (内) 87 アミノルバシEN配合散(コーヒー味) (内) 88 アミノルバシEN配合散(コーヒー味) (内) 90 アミノルバシEN配合散(コーヒー味) (内) 90 アミノルバシEN配合散(コーヒー味) (内) 91 アミノルバシEN配合散(コーヒー味) (内) 92 アメリルバシEN配合散(コーヒー味) (内) 93 アミノルバシEN配合散(コーヒー味) (内) 94 アミノルバシEN配合散(コーヒー味) (内) 95 アシリバンEN配合散(コーヒー味) (内) 96 アミノルバシEN面合散(コーヒー味) (内) 97 アンルバシEN配合散(コーヒー味) (内) 98 アミノルバシEN面合散(コーヒー味) (内) 99 アラルバンEN配合散(コーヒー味) (内) 90 アミノルバシEN配合散(コーヒー味) (内) 91 アンルバシEN配合散(コーヒー味) (内) 92 アンルバの高静注(500mL袋) (注) 93 アラレバの高静注(500mL袋) (注) 94 アンルバンEN配合散性 近日の間(日医工) (内) 95 アムロジピンの口錠5mg「トーワ」 (内) 96 アメジニウムメチル硫酸性 錠10mg 「日医工」 (内) 97 アモキシリンカブセル名を0mg「NP」 (内) 98 アラセナーA点海静注用300mg (注) 99 アラセナーA点海静注用300mg (注) 90 アリクストラ皮下注2. 5mg (ウ) 91 アルブランル発のmg「サワイ」 (内) 91 アルブルクシを2mg (内) 92 アルブロハン注射が10mg「サワイ」 (内) 93 アルグシ目が2mg (注) 94 アルブラン物注のmg「サワイ」 (内) 97 アルラン静注用50mg (注) 97 アルファルシドールカブセル0.25 μg「トーワ」 (内) 97 アルファルルシドールカブセル0.25 μg「トーワ」 (内) 97 アルブラルンドールカブセル0.25 μg「トーワ」 (内) 97 アルブランリン・ドールカブセル0.25 μg「トーワ」 (内) 97 アルブランラム錠0.4mg「トーワ」 (内) 97 アルブランリン・ドールカブセル0.25 μg「トーワ」 (内) 97 アルブラン・トルカブセル0.25 μg「トーワ」 (内) 97 アルブラント・ルカブセル0.25 μg「トーワ」 (内) 97 アルブラント・ルカブセル0.25 μg「トーワ」 (内) 97 アルブラント・カカブセル0.25 μg「トーワ」 (内) 97 アルブラント・カブセル10 μg「ワノー」 (内) 97 アルブラント・カブ・セル0.25 μg「トーワ」 (内) 97 アルブラント・カブ・セル0.25 μg「アソー」 (内) 97 アルブラン・ロル・ロルロ・ロルロ・ロルロ・ロルロ・ロルロ・ロルロ・ロルロ・ロルロ・ロルロ		フバフチンと海鉄注用100mg / 4ml	L7F4 F:+1
アブルン・アン・		アバスチン点海野/エ用 100mg/ 4mL フバスチン点海熱注用400mg/ /16mg/	
アプレビタントカプセル25mg「NK」			
アブレビタントガブセル125mg NK		プノストノル百 下延 TOU # g	
アブレゲタントガプセル80mg「NK」			
アマンダジ2.5mg			
アマンタシン塩酸塩速剤錠50mg「TE」			
アミオダロン塩酸塩連解錠50mg「TE」			
7ミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」			
アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」			
25		アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
1			
R6			
87 アミティーザカプセル24 μg			
7ミノレバンEN配合散(コーヒー味)	86		【内】
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	87		【内】
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	88	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	【内】
91 アミノレバン点滴静注(500mL袋) 【注】 92 アム「口配合錠「サンド」 【内】 94 アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」 【内】 95 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 【内】 96 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 【内】 97 アモキシシリンカプセル250mg「NP」 【内】 98 アラセナーA点滴静注用300mg 【注】 99 アラセナーA点滴静注用300mg 【注】 100 アリクストラ皮下注2. 5mg 【注】 101 アリストラ皮下注5mg 【注】 102 アリビブラゾール錠6mg「サワイ」 【内】 103 アリムタ注射用100mg 【注】 104 アリムタ注射用500mg 【注】 105 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL 【注】 106 アルケラン錠2mg 【内】 107 アルケラン錠2mg 【内】 108 アルスコマナック関節手術用灌流液(3L) 【注】 109 アルト原末(パウダー:1g) 【外】 100 アルト原末(パウダー:500mg) 【外】 110 アルト原末(パウダー:10mg) 【外】 111 アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 【内】 112 アルファカルシドールカプセル1. 0 μg「フリン・「 【内】 113 アルファカルシドールカプセル2.5 μg「トーワ」<	89	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	【内】
91 アミノレバン点滴静注(500mL袋) 【注】 92 アム「口配合錠「サンド」 【内】 94 アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」 【内】 95 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 【内】 96 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 【内】 97 アモキシシリンカプセル250mg「NP」 【内】 98 アラセナーA点滴静注用300mg 【注】 99 アラセナーA点滴静注用300mg 【注】 100 アリクストラ皮下注2. 5mg 【注】 101 アリストラ皮下注5mg 【注】 102 アリビブラゾール錠6mg「サワイ」 【内】 103 アリムタ注射用100mg 【注】 104 アリムタ注射用500mg 【注】 105 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL 【注】 106 アルケラン錠2mg 【内】 107 アルケラン錠2mg 【内】 108 アルスコマナック関節手術用灌流液(3L) 【注】 109 アルト原末(パウダー:1g) 【外】 100 アルト原末(パウダー:500mg) 【外】 110 アルト原末(パウダー:10mg) 【外】 111 アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 【内】 112 アルファカルシドールカプセル1. 0 μg「フリン・「 【内】 113 アルファカルシドールカプセル2.5 μg「トーワ」<	90	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	【注】
92 アムパロ配合錠「サンド」 【内】 93 アムビゾーム点滴静注用50mg 〔注】 94 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 【内】 95 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 【内】 96 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 【内】 97 アモキシシリンカプセル250mg「NP」 【内】 98 アラセナーA点滴静注用300mg 【注】 99 アラセナーA軟膏3%(5g) 【外】 100 アリストラ皮下注2.5mg 【注】 101 アリムフトラ皮下注5mg 【注】 102 アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 【内】 103 アリムタ注射用100mg 【注】 104 アリムタ注射用500mg 【注】 105 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL 【注】 106 アルケラン錠2mg 【内】 107 アルケラン錠2mg 【内】 108 アルスコマチック関節手術用灌流液(3L) 【外】 109 アルツラスボ関節注25mg(2.5mL) 【注】 110 アルト原末(パウダー:500mg) 【外】 111 アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 【内】 112 アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 【内】 113 アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 【内】 114 アルファカルシドールカプセル0.25	91	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	【注】
93	92		
94 アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」 [内] 95 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 [内] 96 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 [内] 97 アモキシシリンカプセル250mg「NP」 [内] 98 アラセナーA点滴静注用300mg [注] 99 アラセナーA軟膏3%(5g) [外] 100 アリクストラ皮下注2. 5mg [注] 101 アリクストラ皮下注5mg [注] 102 アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 [内] 103 アリムタ注射用100mg [注] 104 アリムタ注射用500mg [注] 105 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL [注] 106 アルケラン錠2mg [内] 7ルケラン錠2mg [内] 107 アルケラン静注用50mg [内] 108 アルケラン静注用50mg [内] 108 アルクコースポリカリラリカリラリカリアリカリア・コラリカリアリア・コラリア・コースポリカリシドールカプセル0.25μg「トーワ」 [内] 110 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 [内] 111 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 [内] 115 アルブラルカルシドールカプセル0.25μg(0.5 μg (0.5 μg/0.5 μg		アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
95 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 [内] 96 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 [内] 97 アモキシシリンカプセル250mg「NP」 [内] 98 アラセナーA点滴静注用300mg [注] 99 アラセナーA軟膏3%(5g) [外] 100 アリクストラ皮下注2.5mg [注] 101 アリカストラ皮下注5.5mg [注] 102 アリピブラゾール錠6mg「サワイ」 [内] 103 アリムタ注射用100mg [注] 104 アリムタ注射用500mg [注] 105 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL [注] 106 アルケラン錠2mg [内] 107 アルケラン錠2mg [内] 108 アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) [外] 109 アルツデスズ間節注25mg(2.5mL) [注] 100 アルト原末(パウダー:1g) [外] 111 アルト原末(パウダー:1g) [外] 112 アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーワ」 [内] 113 アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フリー」 [内] 115 アルファロール散1 μ g/g(0.5 μ g/0.5g/包) [内] 116 アルプランラム錠0.4mg「トーワ」 [内] 117 アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「TW」 [注]			
96 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 [内] 97 アモキシシリンカプセル250mg「NP」 [内] 98 アラセナーA点滴静注用300mg [注] 99 アラセナーA軟膏3%(5g) 【外] 100 アリクストラ皮下注2.5mg 【注] 101 アリクストラ皮下注5mg 【注] 102 アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 【内] 103 アリムタ注射用100mg 【注] 104 アリムタ注射用500mg 【注] 105 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL 【注] 106 アルケラン錠2mg 【内] 107 アルケラン錠2mg 【内] 108 アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) 【外] 109 アルツディスポ関節注25mg(2.5mL) 【注] 100 アルツディスポ関節注25mg(2.5mL) 【注] 110 アルト原末(パウダー:1g) 【外] 111 アルト原末(パウダー:1g) 【外] 112 アルファカルシドールカプセル1.0 μg「フソー」 【内] 113 アルファカルシドールカプセル1.0 μg「フソー」 【内] 115 アルファロール散1μg/g(0.5 μg/0.5g/包) 【内] 116 アルプランラム錠0.4mg「トーワ」 【注] 117 アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」			
97アモキシシリンカプセル250mg「NP」【内】98アラセナーA点滴静注用300mg【注】99アラセナーA軟膏3%(5g)【外】100アリクストラ皮下注2.5mg【注】101アリクストラ皮下注5mg【注】102アリピブラゾール錠6mg「サワイ」【内】103アリムタ注射用100mg【注】104アリムタ注射用500mg【注】105アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL【注】106アルケラン錠2mg【内】107アルケラン錠2mg【内】108アルスコマチック関節手術用灌流液(3L)【外】109アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)【注】110アルト原末(パウダー:1g)【外】111アルト原末(パウダー:500mg)【外】112アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」【内】113アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」【内】114アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包)【内】115アルブラリラム錠0.4mg「トーワ」【内】116アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」【内】117アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」【注】			
98 アラセナーA点滴静注用300mg 【注】 99 アラセナーA軟膏3%(5g) 【外】 100 アリクストラ皮下注2.5mg 【注】 101 アリクストラ皮下注5mg 【注】 102 アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 【内】 103 アリムタ注射用100mg 【注】 104 アリムタ注射用500mg 【注】 105 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL 【注】 106 アルケラン錠2mg 【内】 107 アルケラン競2mg 【内】 108 アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) 【外】 109 アルツディスポ関節注25mg(2.5mL) 【注】 110 アルト原末(パウダー:1g) 【外】 111 アルト原末(パウダー:500mg) 【外】 111 アルアアカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 【内】 113 アルファカルシドールカプセル1.0 μg「フソー」 【内】 114 アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包) 【内】 115 アルプランラム錠0.4mg「トーワ」 【注】 116 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 【内】 117 アルプロスタジル注10 μgシリンジ「TW」 【注】			
99 アラセナーA軟膏3%(5g) 【外】 100 アリクストラ皮下注2.5mg 【注】 101 アリクストラ皮下注5mg 【注】 102 アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 【内】 103 アリムタ注射用100mg 【注】 104 アリムタ注射用500mg 【注】 105 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL 【注】 106 アルケラン錠2mg 【内】 107 アルケラン錠2mg 【内】 107 アルケラン静注用50mg 【注】 108 アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) 【外】 109 アルツディスポ関節注25mg(2.5mL) 【注】 110 アルト原末(パウダー:1g) 【外】 111 アルト原末(パウダー:500mg) 【外】 112 アルファカルシドールカプセル1.0μg「アソー」 【内】 113 アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」 【内】 114 アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包) 【内】 115 アルブミナー5% 静注12.5g/250mL 【注】 116 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 【内】 117 アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」 【注】		アラヤナーA占海静注用300mg	
7リクストラ皮下注2.5mg [注] 101		アラヤナー Δ 軟 亭 3% (5σ)	
7リケストラ皮下注5mg 【注】 102		アリクストラ皮下注25mg	
102 アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 【内】 103 アリムタ注射用100mg 【注】 104 アリムタ注射用500mg 【注】 105 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL 【注】 106 アルケラン錠2mg 【内】 107 アルケラン静注用50mg 【注】 108 アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) 【外】 109 アルツディスポ関節注25mg(2.5mL) 【注】 110 アルト原末 (パウダー: 1g) 【外】 111 アルト原末 (パウダー: 500mg) 【外】 112 アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 【内】 113 アルファカルシドールカプセル1.0 μg「フソー」 【内】 114 アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包) 【内】 115 アルブミナー5% 静注12.5g/250mL 【注】 116 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 【内】 117 アルプロスタジル注10 μgシリンジ「TW」 【注】			【注】
7リムタ注射用100mg			
104 アリムタ注射用500mg 【注】 105 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL 【注】 106 アルケラン錠2mg 【内】 107 アルケラン静注用50mg 【注】 108 アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) 【外】 109 アルツディスポ関節注25mg(2.5mL) 【注】 110 アルト原末(パウダー:1g) 【外】 111 アルト原末(パウダー:500mg) 【外】 112 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 【内】 113 アルファカルシドールカプセル1. Oμg「フソー」 【内】 114 アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包) 【内】 115 アルブミナー5% 静注12.5g/250mL 【注】 116 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 【内】 117 アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」 【注】		フリノクシン が蜒のing・ケット]	「注】
105アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL【注】106アルケラン錠2mg【内】107アルケラン静注用50mg【注】108アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)【外】109アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)【注】110アルト原末(パウダー:1g)【外】111アルト原末(パウダー:500mg)【外】112アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」【内】113アルファカルシドールカプセル1. Oμg「フソー」【内】114アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包)【内】115アルブミナー5% 静注12.5g/250mL【注】116アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」【内】117アルプロスタジル注10 μgシリンジ「TW」【注】			
106アルケラン錠2mg【内】107アルケラン静注用50mg【注】108アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)【外】109アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)【注】110アルト原末(パウダー:1g)【外】111アルト原末(パウダー:500mg)【外】112アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」【内】113アルファカルシドールカプセル1. Oμg「フソー」【内】114アルファロール散1μg/g(0.5 μg/0.5g/包)【内】115アルブミナー5% 静注12.5g/250mL【注】116アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」【内】117アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」【注】			「注」
107アルケラン静注用50mg【注】108アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)【外】109アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)【注】110アルト原末 (パウダー: 1g)【外】111アルト原末 (パウダー: 500mg)【外】112アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」【内】113アルファカルシドールカプセル1. Oμg「フソー」【内】114アルファロール散1μg/g(0.5 μg/0.5g/包)【内】115アルブミナー5% 静注12.5g/250mL【注】116アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」【内】117アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」【注】			「大力」
108 アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) 【外】 109 アルツディスポ関節注25mg(2.5mL) 【注】 110 アルト原末(パウダー: 1g) 【外】 111 アルト原末(パウダー: 500mg) 【外】 112 アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 【内】 113 アルファカルシドールカプセル1. Oμg「フソー」 【内】 114 アルファロール散1μg/g(0.5 μg/0.5g/包) 【内】 115 アルブミナー5% 静注12.5g/250mL 【注】 116 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 【内】 117 アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」 【注】			[[]] [] [] [] [] [] [] [] []
109アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)【注】110アルト原末(パウダー:1g)【外】111アルト原末(パウダー:500mg)【外】112アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」【内】113アルファカルシドールカプセル1. Oμg「フソー」【内】114アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包)【内】115アルブミナー5% 静注12.5g/250mL【注】116アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」【内】117アルプロスタジル注10 μgシリンジ「TW」【注】		アルソフノ耐注用30mg	[注]
110アルト原末(パウダー:1g)【外】111アルト原末(パウダー:500mg)【外】112アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」【内】113アルファカルシドールカプセル1. Ομg「フソー」【内】114アルファロール散1μg/g(0.5 μg/0.5g/包)【内】115アルブミナー5% 静注12.5g/250mL【注】116アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」【内】117アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」【注】		アルスロマナツク関即于何用灌流液(3L)	[9]
7ルト原末(パウダー: 500mg)【外】112アルファカルシドールカプ・セル0.25 μg「トーワ」【内】113アルファカルシドールカプセル1. Ομg「フソー」【内】114アルファロール散1μg/g(0.5 μg/0.5g/包)【内】115アルブミナー5% 静注12.5g/250mL【注】116アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」【内】117アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」【注】		アルソナイ人不関即汪25mg(2.5mL)	[注]
112アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」【内】113アルファカルシドールカプセル1. Ο μg「フソー」【内】114アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包)【内】115アルブミナー5% 静注12.5g/250mL【注】116アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」【内】117アルプロスタジル注10 μgシリンジ「TW」【注】		アルト原木(ハワター: 1g)	【 夕 卜】
113 アルファカルシドールカプセル1. Ο μ g l フソー」 【内】 114 アルファロール散 1 μ g/g(0.5 μ g/0.5g/包) 【内】 115 アルブミナー5% 静注12.5g/250mL 【注】 116 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 【内】 117 アルプロスタジル注10 μ g シリンジ「TW」 【注】		アルト原末(ハワター: 500mg)	
113 アルファカルシドールカプセル1. Ο μ g l フソー」 【内】 114 アルファロール散 1 μ g/g(0.5 μ g/0.5g/包) 【内】 115 アルブミナー5% 静注12.5g/250mL 【注】 116 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 【内】 117 アルプロスタジル注10 μ g シリンジ「TW」 【注】		アルファカルシドールカフ セルO.25 μg 「トーワ」	
115アルブミナー5% 静注12.5g/250mL【注】116アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」【内】117アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」【注】		アルファカルシドールカブセル1. Ομglフソー」	【内】
115アルブミナー5% 静注12.5g/250mL【注】116アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」【内】117アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」【注】		アルファロール散1 μ g/g(0.5 μ g/0.5g/包)	【内】
117 アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」 【注】		アルブミナー5% 静注12.5g/250mL	
117 アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」 【注】		アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
118 アルプロスタジル注5 µ gシリンジ「TW」 【注】		アルプロスタジル注10 μgシリンジ「TW」	【注】
	118	アルプロスタジル注5 μ gシリンジ「TW」	【注】

110		[F+1]
119	アルロイドG内用液5%	【内】
120 121	アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレビアチン散10% (100mg/g)	【外】 【内】
122	アレビアチン錠100mg アレビアチン錠100mg	【内】
123	アレロックOD錠5	【内】
124	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
125	アロキシ静注0.75mg(5mL)	【注】
126	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
127	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
128	アンサー皮下注20 μg	【注】
129	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
130	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
131	アンペック坐剤10mg	【外】
132	イーケプラ点滴静注500mg	【注】
133	イオウ・カンフルローション	【外】
134	イオパーク300注シリンジ100mL	【注】
135	イオパーク350注 100mL	【注】
136 137	イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL	【注】
138	イオパーク350注 50mL イオパーク350注シリンジ70mL	【注】
139	イオパーク330注クタクク / OML イオパミロン注300 100mL	【注】
140	イオパミロン注300 100mL	【注】
141	イオパミロン注300 50mL	【注】
142	イオパミロン注300シリンジ100mL	【注】
143	イオパミロン注370 100mL	【注】
144	イオパミロン注370 20mL	【注】
145	イオパミロン注370 50mL	【注】
146	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
147	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
148	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	【注】
149	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	【注】
150	イグザレルトOD錠10mg	【内】
151	イグザレルトOD錠15mg	【内】
152	イクスタンジ錠80mg	【内】
153 154	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg	【内】 【内】
155	イスコナン錠 Tooling イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	【外】
156	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
157	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
158	イソビスト注240 10mL	【注】
159	イソビスト注300 10mL	【注】
160	イダマイシン静注用5mg	【注】
161	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	【内】
162	イトリゾールカプセル50mg	【内】
163	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
164	イナビル吸入粉末剤20mg	【内】
165	イニシンク配合錠	【注】
166	イノバン注100mg(5mL)	【外】
167	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
168	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
169	イベニティ皮下注105mgシリンジ	【注】
170 171	イマジニール300注 20mL イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【注】
171	1ミグラン	【外】 【内】
172	インノブラダー膀注用40mg	【注】
173	イムラン錠50mg	【内】
175	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホスピーラ」	【注】
176	1777777 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	【内】
177	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
		B

178	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
179	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
180	インテバンクリーム1%(50g)	【外】
181	インデラル錠10mg	【内】
182	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
183	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
184	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
185	イントラリポス輸液20% 100mL	【注】
186	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
187	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
188	ヴィーン3G輸液 500mL	【注】
189	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
190	ウテメリン錠5mg	【内】
191	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
192	ウブレチド錠5mg	【内】
193	ウルソデオキシコール酸錠100mg	内
194	ウルティブロ吸入用カプセル	【外】
195	ウルパールローション10%(20g)	【外】
196	ウログラフイン注60%(20mL)	【注】
	ウログラクイク注80%(20mL) ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	
197		【外】
198	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
199	エイゾプト懸濁性点眼液1%	【外】
200	エイベリス点眼0.002%	【外】
201	エキザルベ	【外】
202	エクザール注射用10mg	【注】
203	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
204	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
205	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
206	エクセグラン錠100mg	【内】
207	エクフィナ錠50mg	【内】
208	エクメット配合錠HD	【内】
209	エクラープラスター20 μ g/cm2	【外】
210	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	【外】
211	エサンブトール錠250mg	【内】
212	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	【内】
213	エストラ—ナテープ0.72mg	【外】
214	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
215	エストリール錠1mg * (持田)	【内】
216	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
217	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
218	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
219	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	【内】
220	エタノール「マルイシ」	【外】
221	エダラボン点滴静注液 30mg「日医工」	【注】
222	エチゾラム錠0. 5mg「トーワ」	【内】
223	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
224	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
225	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
226	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
227	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】
228	エネーボ配合経腸用液	【内】
229	エネマスター注腸散(400g)	【外】
230	Tパルレスタット錠 50mg「ファイザー」	【内】
231	エピデュオゲル(15g)	【外】
232	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】
233	エフィエントOD錠20mg	【内】
234	エフィエント錠 3.75mg	【内】
235	エフィエント錠2.5mg	[内]
236	エフピーOD錠2.5	【内】
	L · - 272	N - 14

エプランチルカプセル15mg	
	_
エリキュース錠 5 mg	
241	
1	
エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	
244 エルシトニン注20Sディスポ(1mL)	
245 エルシトニン注40単位	
エルデカルシトールカプセル0.75 μg「トーワ」	
247	
248	
エルネオパNF2号輸液 1000mL	
250 エルオオパNF2号輸液 1500mL [注 251 エルプラット点滴静注液100mg 【注 252 エルプラット点滴静注液50mg 【注 253 エレジェクト注シリンジ (2mL) 【注 254 エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm) 【外 255 エレファワイパーEI W (消毒綿4cm×4cm) 【外 256 エレタール配合内用剤(80g/包) 【内 257 エンシュア・H(375kcal/250mL) 【内 258 エンタカポン錠100mg「アメル」 【内 259 エンテカビル錠0、5mg「トーワ」 【内 260 エンドキサン錠 50mg 【内 261 エンレスト錠100mg 【内 262 エンレスト錠200mg 【内 263 オイパロミン300注シリンジ100mL 【注 264 オイパロミン370注シリンジ65mL 【注 265 オイパロミン370注シリンジ80mL 【注 266 オイパロミン注300 100mL 【注 267 オイパロミン注300 50mL 【注 268 オイパロミン注300 50mL 【注 269 オイパロミン注370 100mL 【注 270 オイパロミン注370 100mL 【注 271 オイパロミン注370 20mL 【注 <td></td>	
1	
1252 エルプラット点滴静注液50mg 【注 253 エレジェクト注シリンジ(2mL) 【注 254 エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm) 【外 255 エレファロイパーEI W (消毒綿4cm×4cm) 【外 256 エレンタール配合内用剤(80g/包) 【内 257 エンシュア・H(375kcal/250mL) 【内 258 エンタカポン錠100mg「アメル」 【内 259 エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 【内 260 エンドキサン錠 50mg 【内 261 エンレスト錠100mg 【内 262 エンレスト錠200mg 【内 263 オイパロミン370注シリンジ100mL 【注 264 オイパロミン370注シリンジ65mL 【注 265 オイパロミン370注シリンジ80mL 【注 267 オイパロミン370注シリンジ80mL 【注 268 オイパロミン370注シリンジ80mL 【注 269 オイパロミン注300 20mL 【注 269 オイパロミン注370 20mL 【注 270 オイパロミン注370 20mL 【注 271 2	
1	
254エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm)【外255エレファワイパーEI W (消毒綿4cm×4cm)【外256エレンタール配合内用剤(80g/包)【内257エンシュア・H(375kcal/250mL)【内258エンタカポン錠100mg「アメル」【内259エンテカビル錠0.5mg「トーワ」【内260エンドキサン錠 50mg【内261エンレスト錠100mg【内262エンレスト錠200mg【内263オイパロミン300注シリンジ100mL【注264オイパロミン370注シリンジ65mL【注265オイパロミン370注シリンジ80mL【注267オイパロミン注300 100mL【注268オイパロミン注300 20mL【注269オイパロミン注370 100mL【注270オイパロミン注370 20mL【注271オイパロミン注370 20mL【注	
255 エレファワイパーEI W (消毒綿4cm×4cm) 「外 256 エレンタール配合内用剤(80g/包) 「内 257 エンシュア・H (375kcal/250mL) 「内 258 エンタカポン錠100mg「アメル」 「内 259 エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 「内 260 エンドキサン錠 50mg 「内 261 エンレスト錠100mg 「内 262 エンレスト錠200mg 「内 263 オイパロミン300注シリンジ100mL 「注 264 オイパロミン370注シリンジ65mL 「注 265 オイパロミン注370注シリンジ80mL 「注 266 オイパロミン注300 100mL 「注 268 オイパロミン注300 20mL 「注 269 オイパロミン注370 100mL 「注 270 オイパロミン注370 20mL 「注 271 オイパロミン注370 20mL 「注	
256エレンタール配合内用剤(80g/包)[内257エンシュア・H(375kcal/250mL)[内258エンタカポン錠100mg「アメル」[内259エンテカビル錠0.5mg「トーワ」[内260エンドキサン錠 50mg[内261エンレスト錠100mg[内262エンレスト錠200mg[内263オイパロミン300注シリンジ100mL[注264オイパロミン370注シリンジ65mL[注265オイパロミン370注シリンジ80mL[注266オイパロミン注300 100mL[注267オイパロミン注300 20mL[注269オイパロミン注370 100mL[注270オイパロミン注370 20mL[注271オイパロミン注370 20mL[注	
257エンタカポン錠100mg「アメル」【内258エンタカポン錠100mg「アメル」【内259エンテカビル錠0.5mg「トーワ」【内260エンドキサン錠 50mg【内261エンレスト錠100mg【内262エンレスト錠200mg【内263オイパロミン300注シリンジ100mL【注264オイパロミン370注シリンジ65mL【注265オイパロミン370注シリンジ80mL【注266オイパロミン注300 100mL【注267オイパロミン注300 20mL【注269オイパロミン注370 100mL【注270オイパロミン注370 100mL【注271オイパロミン注370 20mL【注	
258エンタカポン錠100mg「アメル」【内259エンテカビル錠0.5mg「トーワ」【内260エンドキサン錠 50mg【内261エンレスト錠100mg【内262エンレスト錠200mg【内263オイパロミン300注シリンジ100mL【注264オイパロミン370注シリンジ65mL【注265オイパロミン370注シリンジ80mL【注266オイパロミン注300 100mL【注268オイパロミン注300 20mL【注269オイパロミン注370 100mL【注270オイパロミン注370 20mL【注271オイパロミン注370 20mL【注	
259エンテカビル錠0.5mg「トーワ」【内260エンドキサン錠 50mg【内261エンレスト錠100mg【内262エンレスト錠200mg【内263オイパロミン300注シリンジ100mL【注264オイパロミン370注シリンジ65mL【注265オイパロミン370注シリンジ80mL【注266オイパロミン注300 100mL【注267オイパロミン注300 20mL【注269オイパロミン注300 50mL【注270オイパロミン注370 100mL【注271オイパロミン注370 20mL【注	
260エンドキサン錠 50mg「内261エンレスト錠100mg「内262エンレスト錠200mg「内263オイパロミン300注シリンジ100mL「注264オイパロミン370注シリンジ65mL「注265オイパロミン370注シリンジ80mL「注266オイパロミン注300 100mL「注267オイパロミン注300 20mL「注268オイパロミン注300 50mL「注270オイパロミン注370 100mL「注271オイパロミン注370 20mL「注	
Z61エンレスト錠100mg「内262エンレスト錠200mg【内263オイパロミン300注シリンジ100mL【注264オイパロミン370注シリンジ65mL【注265オイパロミン370注シリンジ80mL【注266オイパロミン注300 100mL【注267オイパロミン注300 20mL【注268オイパロミン注300 50mL【注270オイパロミン注370 100mL【注271オイパロミン注370 20mL【注	
262エンレスト錠200mg「内263オイパロミン300注シリンジ100mL【注264オイパロミン370注シリンジ65mL【注265オイパロミン370注シリンジ80mL【注266オイパロミン注300 100mL【注267オイパロミン注300 20mL【注269オイパロミン注300 50mL【注270オイパロミン注370 100mL【注271オイパロミン注370 20mL【注	
263オイパロミン300注シリンジ100mL[注264オイパロミン370注シリンジ65mL[注265オイパロミン370注シリンジ85mL[注266オイパロミン370注シリンジ80mL[注267オイパロミン注300 100mL[注268オイパロミン注300 20mL[注269オイパロミン注300 50mL[注270オイパロミン注370 100mL[注271オイパロミン注370 20mL[注	
264オイパロミン370注シリンジ100mL【注265オイパロミン370注シリンジ65mL【注266オイパロミン370注シリンジ80mL【注267オイパロミン注300 100mL【注268オイパロミン注300 20mL【注269オイパロミン注300 50mL【注270オイパロミン注370 100mL【注271オイパロミン注370 20mL【注	
265オイパロミン370注シリンジ65mL【注266オイパロミン370注シリンジ80mL【注267オイパロミン注300 100mL【注268オイパロミン注300 20mL【注269オイパロミン注300 50mL【注270オイパロミン注370 100mL【注271オイパロミン注370 20mL【注	
266オイパロミン370注シリンジ80mL【注267オイパロミン注300 100mL【注268オイパロミン注300 20mL【注269オイパロミン注300 50mL【注270オイパロミン注370 100mL【注271オイパロミン注370 20mL【注	
268オイパロミン注300 20mL【注269オイパロミン注300 50mL【注270オイパロミン注370 100mL【注271オイパロミン注370 20mL【注	
268オイパロミン注300 20mL【注269オイパロミン注300 50mL【注270オイパロミン注370 100mL【注271オイパロミン注370 20mL【注	
269オイパロミン注300 50mL【注270オイパロミン注370 100mL【注271オイパロミン注370 20mL【注]
271 オイパロミン注370 20mL 【注	
	:]
272 オイパロミン注370 50mL 「注	
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
273 オイラックスHクリーム(5g) 【外	\cdot
274 オイラックスクリーム10%(10g・500g) 【外	.]
275 オイラックスクリーム10%(500g) 【外	.]
276 オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入 【外	
277 オーグメンチン配合錠250RS(375mg) 【内	
278 大塚生食注(1L広口開栓) 【外	
279 オキサロールローション25 µ g/g(10g) 【外	
280 オキサロール軟膏25 μ g/g(10g) 【外	
281 オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 【内	
282 オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 【内	
283 オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 【内	
284 オキシドール(液:500mL/瓶) 【外	
285 オキナゾール膣錠600mg 【外	
286 オキノーム散2. 5mg 【内	
287 オキノーム散5mg 【内	
288 オキファスト注10mg 【注	
289 オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μg「サンド」 【注	
290 オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 【注	
291 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 【内	
292 オゼンピック皮下注2mg 【注	
293 オノアクト点滴静注用 50mg 【注	1
294 オピソート注射用0.1g(100mg1管) 【注	
295 オフサグリーン静注用 25mg 【注	.]

296	オプソ内服液10mg(5mL)	【内】
297	オプソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
298	オプチレイ350注シリンジ100mL	【注】
299	オプチレイ350注シリンジ135mL	【注】
300	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
301	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
302	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
303	オムニパーク300注シリンジ 100mL	【注】
304	オムニパーク300注シリンジ 150mL	【注】
305	オムニパーク350注シリンジ 70mL	【注】
306	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	【内】
307	オメプラゾール注射用 20mg 「日医工」	【注】
308	オラネジン液1. 5%消毒用アプリケータ25mL	【外】
309	オラネジン消毒液1.5%	【外】
310	オリブ油 * (丸石)	【外】
311	オルケディア錠1mg	【内】
312	オルケディア錠2mg	【内】
313	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
314	オルテクサーロ腔用軟膏0. 1%	【外】
315	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
316	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
317	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	【外】
318	オングリザ錠2.5mg	【内】
319	オンコビン注射用1mg	【注】
320	オンジェンティス錠25mg	【内】
321	オンデキサ静注用200mg	【注】
322	カイトリル錠2mg	【内】
323	カイトリル注1mg	【注】
324	ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)	【注】
325	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
326	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】
327	カチーフN錠5mg	【内】
328	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
329	カデックス軟膏0.9%	【外】
330	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」	【注】
331	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	【注】
332	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	【注】
333	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
334	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
335	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
336	カナグル錠100mg	【内】
337	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
338	カナリア配合錠	【内】
339	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
340	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
341	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	【内】
342	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
343	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」	【内】
344	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」	【内】
345	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】
346	カリメート散(5g/包)	【内】
347	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
348	カルセド注射用20mg	【注】
349	カルセド注射用50mg	【注】
350	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
351	カルデナリンOD錠1mg	【内】
352	カルデナリンOD錠2mg	【内】
353	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
354	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】

355	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
356	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
357	カルベジロール錠 10mg「DSEP」	【内】
358	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	【内】
359	カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】
360	カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】
361	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】
362	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
363	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	【内】
364	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
365	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
366	カロナール細粒50%	【内】
367	カロナール錠200	【内】
368	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	【内】
369	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
370	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
371	キシロカインゼリー2% 30mL	【外】
372	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
373	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
374	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
375	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
376	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
377	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
378	キャブピリン配合錠	【内】
379	キュビシン静注用350mg	【注】
380	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】
381	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
382	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
383	グーフィス錠5mg	【内】
384	クエチアピン錠 25mg「トーワ」	【内】
385	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
386	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
387	グラケーカプセル15mg	【内】
388	グラクティブ錠50mg	【内】
389	クラシェ猪苓湯エキス細粒[EK-40] 2.0g	【内】
390	クラシエ補中益気湯エキス細粒[EK-41] 2.5g	【内】
391	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒[EK-68] 2.0g	【内】
392	グラナテック点眼液 0.4% (5mL)	【外】
393	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	【注】
394	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
395	クラフォラン注射用1g	【注】
396	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
397	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	【内】
398	グランダキシン錠50	【内】
399	クリアクター静注用80万	【注】
400	グリクラジド錠40mg「サワイ」	【内】
401	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
402	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL	【注】
403	グリチロン配合錠	【内】
404	グリベック錠100mg	【内】
405	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
406	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
407	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
408	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
409	グルトパ注1200万単位	【注】
410	グルベス配合OD錠	【内】
411	クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL)	【外】
412	クレメジン速崩錠500mg	【内】
413	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】

クロピドグレル錠25mg「SANIK」	【内
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	【内
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	【外
クロマイ膣錠100mg	【外
フロマイーP軟膏(25g)	【外
フロマー 1 4 5 6 (20g) クロミッド錠50mg	内
プローン	【外
プロルペインフングルコン酸塩エダノール消毒液 1 %0 宋豆」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	【内
ウィキッレードドフィブロップ 76%(3.27g/ 己) ケイセントラ静注用1000	
	【注
ケイセントラ静注用500	【注
ケイツーN静注10mg(2mL)	【注
ケーサプライ錠600mg	【内
ゲーベンクリーム1%(50g)	【外
ケタスカプセル10mg	【内
ケタラール静注用200mg(20mL)	【注
ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外
ケトコナゾールローション2%「JG」	【外
ケトプロフェンテープ40mg 「日医工」	【外
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	注
ケムファビラ 旅間 肝	【外
ケンエーG浣腸液50% 60mL	【外
テンエース ル 	【外
プンエーアプラグ	【注
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(10g)	【 外
コアテック注5mg(5mL)	【注
コアヒビター注射用10mg	【注
コアヒビター注射用50mg	【注
ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外
ゴージョーMHS(液:215mL)	【外
コートリル錠10mg	【内
コスパノン錠80mg	【内
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内
コメリアンコーワ錠50	【内
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内
コレクチム軟膏0.5%(5g)	【外
コロネル細粒83.3%	【内
コントミン筋注25mg(5mL)	【注
コントミン糖衣錠12.5mg	【内
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm × 22.9cm)	【 夕
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外
デーン こん フラン ハンル・ベビステント (新華 5.16m × 2.36m) サイザルシロップ 0.05%	【大
サイトテック錠200	【内
サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外
サイナンフィック 点 職人(Total 2) サイモグロブリン 点 滴 静 注 用 25mg	【注
ウイモグロブウン 点 周 静 注 用 25mg サクシゾン 静注 用 1000mg	【注
ソフノノノげた田 1000ilig H力シバン注 計 田 100	
サクシゾン注射用100mg	注
サクシゾン注射用300mg	【注
サテニジン液10(500mL)	【 夕
サニサーラW(250mL)	【外
サラジェン錠5mg	【内
サラゾピリン錠500mg	【片
サリパラ液	【外
ザルコニン液0.05(500mL)	【外

		[=
473	ザルコニン液10 (10% 500mL)	【外】
474	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
475	サンディミュン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
476	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
477	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】 【外】
478	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
479	ジアグノグリーン注 25mg	【注】
480	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
481	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
482	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	【外】 【注】
483 484	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
484 485	ジェイゾロフトOD錠 25mg ジェニナック錠200mg	【内】
486	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	【内】
487	ジェノケストロロ級「IIIg」 モノダ」 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
488	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
489	ジクアスLX点眼液3%(5mL)	【外】
490	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	【内】
491	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	【内】
492	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	【内】
493	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」50g	【外】
494	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
495	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
496	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
497	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
498	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
499	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
500	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
501	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
502	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	【内】
503	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	【注】
504	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	【注】
505	シプロキサン錠200mg	【内】
506	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	【注】
507	シベクトロ錠200mg	【内】
508	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
509	シベレスタットNa点滴静注用 100mg「F」	【注】
510	シベンゾリンコハク酸 <u>塩錠50mg「トーワ」</u>	【内】
511	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
512	ジャディアンス錠 10mg	【内】
513	ジャドニュ顆粒分包360mg	【内】
514	ジャドニュ顆粒分包90mg	【内】
515	酒石酸「ケンエー」	【外】
516	静注用マグネゾール20mL	【注】
517	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
518	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
519	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
520	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	【内】
521 522	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
522 523	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
523 524		【内】
524 525	シンビット静注用50mg スインプロイク錠0.2mg	【注】 【内】
525 526	スインプロイン疑U. 2mg スープレン吸入麻酔液	【外】
520 527	スープレン吸入M許及 スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
528	スコピラル・脱科 用版 13m2 スタデルムクリーム5%(10g)	【外】
529	スタレボ配合錠L100	【内】
530	スチブロン軟膏0.05%(5g)	【外】
531	ステリクロンR液0.1(500mL)	【外】
	Enter which the anti-partition of the control of th	N / 1 A

EOO	コニリカロンの法の 5 / 500… 1 〉	[F 14]
532	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】 【如】
533	ステリクロンW液0.02(500mL)	【外】 【如】
534	ステリクロンW液0.05(500mL)	【外】 【如】
535	ステリスコープ3W/V%液	【外】
536	ストロカイン錠5mg	【内】
537	ストロメクトール錠3mg	【内】
538	スピオルトレスピマット 60吸入用	【外】
539	スピリーバ2.5 μgレスピマット60吸入	【外】
540	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
541	スポンゼル(5cm×2.5cm)	【外】
542	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	【内】
543	スミスリンローション 5% (30g)	【外】
544	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
545	スミルスチック3% 40g	【外】
546	スミルローション3%	【外】
547	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
548	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】
549	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
550	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)	【注】
551	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】
552	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	【注】
553	セキソビット錠100mg	【内】
554	セパミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
555	ゼビアックス油性クリーム2% (10g)	【外】
556	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	【注】
557	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
558	セファドール錠25mg	【内】
559	セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
560	セファランチン末1%(10mg/g)	【内】
561	ゼフィックス錠100	【内】
562	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	【注】
563	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	【注】
564	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	【内】
565	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%	【内】
566	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」	【内】
567	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	【内】
568	セフタジジム静注用1g「マイラン」	【注】
569	セファンフム所たの「g・マーフン」	【注】
570	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工 セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
571	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	
572	セカラルフラルス体計板・ニッコー」 セララ錠25mg	【外】 【内】
573	セララ錠50mg	【内】
574	セルシン注射液10mg(2mL)	
	ビルフノ注列 /校 TOMIg (ZML)	【注】
575 576	セルニルトン錠63mg	【内】
576	ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)	【外】 【 外 】
577 570	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	【内】
578	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	【内】
579	セレジストOD錠5mg	【内】
580	セレスタミン配合錠	【内】
581	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
582	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
583	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
584	ソセゴン注 15mg	【注】
585	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	【内】
586	ソナゾイド注射用 16μL	【注】
587	ゾビラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
588	ゾビラックス軟膏5%(5g)	【外】
589	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
590	ゾフルーザ錠20mg	【内】

5 01	\ 「ニニッカフ 1 0m ~ニ"+*	【注】
591 592	ゾラデックス1.8mgデポ ゾラデックス3.6mgデポ	【注】
592 593	ブラデックス3.0mg デポ ブラデックスLA10.8mgデポ	【注】
594	ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
595	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」	【内】
596	ソルアセトF輸液 500mL	【注】
597	フルデム1輸液 200mL	【注】
598	ソルデム1輸液 500mL	【注】
599	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
600	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
601	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
602	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
603	ダーブロック錠2mg	【内】
604	ダーブロック錠4mg	【内】
605	ダーブロック錠6mg	【内】
606	ダイアモックス注射用500mg	【注】
607	ダイアモックス錠250mg	【内】
608	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
609	ダカルバジン注用100	【注】
610	タケキャブ錠 10mg	【内】
611	タケキャブ錠 20mg	【内】
612	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
613	タシグナカプセル150mg	【内】
614	タシグナカプセル200mg	【内】
615	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	【注】
616	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	【内】
617	タプロス点眼液0.0015%(2.5mL)	【外】
618	タプロスミニ点眼液0.0015% (0.3mL)	【内】
619	タムスロシン塩酸塩OD錠O. 1mg「サワイ」	【外】
620	ダラシンTゲル1%(10g)	【内】
621	タリージェOD錠5mg	【外】
622	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	【外】
623	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	【外】
624	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
625	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
626	タンデトロン注射用20 (20 μg)	【注】
627	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
628	ダントリウム静注用20mg	【注】
629	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
630	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】
631	チウラジール錠50mg	【内】
632	チェナム点滴静注用0.5g	【注】
633	チオラ錠100	【内】
634	チガソンカプセル10	【内】
635	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】
636	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
637	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
638	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	【外】
639	チャンピックス錠0.5mg	【内】
640	チャンピックス錠1mg	【内】
641	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
642	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】
643	チラーヂンS錠25μg	【内】
644	チラーヂンS錠50μg	【内】
645	チロナミン錠 5mcg	【内】
646	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[内]
647 648	ツイミーグ錠500mg つくしA・M配合散(1.3g/包)	[内]
649	JCOA・M配合 取(T.3g/ 色) ツートラム錠25mg	【内】 【内】
048	ノ I プロッCCJIIIg	[KN]

650	ツートラム錠50mg	【内】
651	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[No.137] 2.5g	【内】
652	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17] 2.5g	【内】
653	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[No.16] 2.5g	【内】
654	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[No.62]2.5g	【内】
655	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[No.24] 2.5g	【内】
656	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[No.1] 2.5g	【内】
657	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[No.107] 2.5g	【内】
658	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[No.18] 2.5g	【内】
659	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)[No.25] 2.5g	【内】
660	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)[No.31] 2.5g	【内】
661	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[No.12] 2.5g	【内】
662	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[No.10] 2.5g	【内】
663	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)[No.114] 3.0g	【内】
664	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[No.48] 2.5g	【内】
665	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[No.19] 3.0g	【内】
666	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)[No108] 3.0g	【内】
667	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[No.100] 2.5g	【内】
668	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)[No.47] 2.5g	【内】
669	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒(医療用)[No.38] 2.5g	【内】
670	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[No.23] 2.5g	【内】
671	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[No.29] 3.0g	【内】
672	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)[No.7] 2.5g	【内】
673	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[No.14] 2.5g	【内】
674	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)[No.126]2.5g	【内】
675 676	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[No.54]2.5g ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[No.43] 2.5g	【内】 【内】
677	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)[No.53] 2.5g	【内】
678	プムノ味経治血湯エイス積極(医療用)(NO.33) 2.3g ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
679	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】
680	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
681	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
682	ディビゲル1mg(ゲル)	【外】
683	デエビゴ錠5mg	【内】
684	テオドール錠100mg	【内】
685	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【内】
686	テオロング錠200mg	【内】
687	デカドロン錠0.5mg	【内】
688	デキサート注射液3. 3mg	【注】
689	デキサンVG軟膏 0.12% (日医工)	【外】
690	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ	【注】
691	デザレックス錠5mg	【内】
692	デスモプレシン・スプレー2. 5協和(125μg1瓶)	【外】
693	テタノブリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】
694	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】
695	テネリアOD錠20mg	【内】
696	デノシン点滴静注用500mg	【注】
697	テノゼット錠 300mg	【内】
698	テプレノンカプセル50mg「サワイ」	【内】
699	テプレノン細粒10%「サワイ」	【内】
700 701	デベルザ錠20mg	【内】
701	デュアック配合ゲル(10g)	[外]
702 703	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】
703 704	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 デュファストン錠 5mg	【内】 【内】
704 705	テュファストフ錠 5mg テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
705 706	テラムロ配合 延AP・DSEP」 テラルビシン注射用10mg	【注】
706 707	テリルジー100エリプタ	【外】
707	テリルジー200エリプタ30吸入用	【外】
, 00	/ //V / LOOT // /OO3X/\/\	LYPA

709	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
710	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	【外】
711	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
712	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
713	テルモ生食 250mL(注射用)	【注】
714	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
715	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
716	動注用アイエーコール100mg	【注】
717	トーワチーム配合顆粒	【内】
718	ドキシル注 20mg	【注】
719	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
720	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
721	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	【内】
722	トコノエロールニコナノ殴工人ナルカノゼル 200mg「日医工」	【内】
723	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	【注】
724 725	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
726	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】 【内】
727	ドパコール配合錠L100	【内】
728	ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
729	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
730	トビエース錠4mg	【内】
731	トピナ錠50mg	【内】
732	トプシムクリーム(5g)	【外】
733	ドプスOD錠100mg	[内]
734	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
735	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
736	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	【注】
737	ドボベット軟膏 (15g)	【外】
738	トラセミドOD錠4mg「TE」	【内】
739	トラゼンタ錠 5mg	【内】
740	トラディアンス配合錠AP	【内】
741	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】
742	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
743	トラマールOD錠 25mg	【内】
744	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
745	ドラマミン錠50mg	【内】
746	トランコロン錠 7.5mg	【内】
747	トランサミンカプセル 250mg	【内】
748	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
749 750	トリキュラー21(錠 21日分1組) トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	【内】 【内】
750 751	トリプタノール錠10	【内】
751 752	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
753	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	【内】
754	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	【内】
755	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
756	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)	【外】
757	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	【注】
758	トレーランG液75g (液: 225mL)	【内】
759	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
760	トレリーフOD錠 25mg	【内】
761	ドロエチ配合錠「あすか」	【内】
762	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
763	トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	【内】
764	ナウゼリンOD錠10	【内】
765	ナウゼリン坐剤60	【外】
766	ナフトピジルOD錠25mg「EE」	【内】
767	ナベルビン注10(1mL)	【注】

1985	700	L 0"11 L"> >> 40/4 L >	[*\ \]
プロキソン塩酸塩静法02mg「第一三共」(ImL)	768	ナベルビン注40(4mL)	【注】
コルジン性酸性注射核 10mg ヤワイ			
コチネルTTS 10(貼付)			
コチネルTTS 20(貼付)			
コテネルTTS 30(貼付)			
コープレジの機関・動物 (19 mg) 1 mg 1 mg			
コープリン接見機ができるのの 「外」			
コランジル点滴静注用48mg サクリ		ニコペリック腹膜透析液2000mL	
コリン注射液500mg(10mL)	777		
プログラット 1980 198			
1812			
下日一ル注5mgシリング(10mL)			
183			
184			
1		ニトロール点滴静注100mgハック(200mL)	
た日本ン舌下錠0.3mg		ニトログリセリン・手注25mg/50mLンリンン・「E」	
1878 フェジピンCR錠2Omg「トーワ」			
788 ニフェジピンCR錠4Omg「トーワ」		ニフェジピンの日韓20mg「トーロ」	
789 二フェジピンム党 10mg 「トーワ」		ニフェップピンCR錠40mg「トーワ」	
790 ニフェンピンカプセル10mg		ニフェップピンノ 錠 10mg「トーワ」	
191		ニフェジピンカプセル10mg	
792		ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	
193			
195 スープロパッチ9mg	793	ニュープロパッチ4. 5mg	
796 ネオアミユー輸液 200mL (注) 797 ネオシネジンコーワ5%点眼液 (10mL) (外) 798 ネオシネジンコーワ注1mg (注) 799 ネオバルギンEHD (内) 800 ネオピタカイン注 5mL (注) 801 ネオマノン注250mg(10mL) (注) 802 ネオベノール点眼液の.4%(15mL) (外) 803 ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (内) 804 ネクサバール錠200mg (内) 805 ネスブ注射液120μgブラシリンジ (注) 806 ネスブ注射液820μgブラシリンジ (注) 807 ネスブ注射液820μgブラシリンジ (注) 808 ネスブ注射液800μgブラシリンジ (注) 809 ネスブ注射液60μgブラシリンジ (注) 810 ネリゾナンニバーサルクリーム0.1%(5g) 811 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g) 812 ノイトロジン注100μg (注) 813 ノイトロジン注250μg (注) 814 ノロトロピン注射液3.6単位(3mL) (注) 815 ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL) (注) 816 ノウリアスト錠20mg (内) 817 ノバスタンHI注10mg (注) 818 ノバミン筋注5mg(1mL 1管) (注) 820 ノボラビッド注フレックスペン(300単位1キット) (注) 821 ノボラビッド注フレックスペン(300単位1キット) (注) 822 ノボラビッド注フレックスペン(300単位1キット) (注) 823 ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL) (注) 824 ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL) (注)	794		
797 ネオシネジンコーワ注1mg (注) 798 ネオシネジンコーワ注1mg (注) 799 ネオバルギンEHD (内) 800 ネオピタカイン注 5mL (注) 801 ネオフィリン注250mg(10mL) (注) 802 ネオベノール点眼液0.4% (15mL) (外) 803 ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (内) 804 ネクサバール錠200mg (内) 805 ネスブ注射液120μgブラシリンジ (注) 806 ネスブ注射液120μgブラシリンジ (注) 807 ネスブ注射液20μgブラシリンジ (注) 808 ネスブ注射液60μgブラシリンジ (注) 809 ネスブ注射液60μgブラシリンジ (注) 810 ネリゾナンリューション0.1% (10mL) (外) 811 ネリゾナコニバーサルクリーム0.1% (5g) (外) 812 ノイトロジン注250μg (注) 813 ノイトロジン注250μg (注) 814 ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL) (注) 815 ノイロトロピン症4単位 (内) 816 ノウリアスト錠20mg (内) 817 ノバスタンHI注10mg (注) 818 ノバミン筋注5mg(1mL 1管) (注) 820 ノボン注10mg(5mL) (注) 821 ノボラピッド30ミックスズン(300単位1キット) (注) 822 ノボラビッド30ミックスペン(300単位1キット) (注) 823 ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット) (注) 824 ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL) (注)			
798 ネオシネジンコーワ注1mg			
799 ネオバルギンEHD			
800 ネオピタカイン注 5mL [注] 801 ネオフィリン注250mg(10mL) [注] 802 ネオペノール点眼液0.4%(15mL) [外] 803 ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg [内] 804 ネクサバール錠200mg [内] 805 ネスプ注射液120μgプラシリンジ [注] 806 ネスプ注射液120μgプラシリンジ [注] 807 ネスプ注射液20μgプラシリンジ [注] 808 ネスプ注射液60μgプラシリンジ [注] 809 ネスプ注射液60μgプラシリンジ [注] 810 ネリゾナソリューション0.1%(10mL) [外] 811 ネリゾナコニバーサルクリーム0.1%(5g) [外] 812 ノイトロジン注100μg [注] 813 ノイトロジン注250μg [注] 814 ノイロトロピン錠射液3.6単位(3mL) [注] 815 ノイロトロピン錠4単位 [内] 816 ノヴリアスト錠20mg [内] 817 ノバスタンH1注10mg [注] 818 ノバミン筋注5mg(1mL 1管) [注] 819 ノバミン錠5mg [内] 820 ノバントロン注10mg(5mL) [注] 821 ノボラピッド注フレックスペン(300単位1キット) [注] 822 ノボラピッド注フレックスペン(300単位1キット) [注] 823 ノボリン注1mg(1mg1mL) [注] 824 ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL) [注]		ネオジネシンコーリ注1mg	
801 ネオフィリン注250mg(10mL) [注] 802 ネオペノール点眼液0.4%(15mL) 【外】 803 ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg 【内】 804 ネクサバール錠200mg 【内】 805 ネスブ注射液120μgブラシリンジ 【注】 806 ネスブ注射液20μgブラシリンジ 【注】 807 ネスブ注射液20μgブラシリンジ 【注】 808 ネスブ注射液40μgブラシリンジ 【注】 809 ネスブ注射液60μgブラシリンジ 【注】 810 ネソブナ射液60μgブラシリンジ 【注】 811 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g) 【外】 811 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g) 【外】 812 ノイトロジン注100μg 【注】 813 ノイトロジン注250μg 【注】 814 ノイロトロピン錠4単位 【内】 815 ノイロトロピン錠4単位 【内】 816 ノウリアスト錠20mg 【注】 817 ノバスタンH1注10mg 【注】 818 ノバミン筋注5mg(1mL 1管) 【注】 819 ノバミン錠5mg 【内】 820 ノバントロン注10mg(5mL) 【注】 821 ノボラピッド注フレックスペン(300単位1キット) 【注】 822 ノボラピッド注フレックスペン(300単位1キット) 【注】 823 ノボリン序注1mg(1mg1mL) 【注】 824 ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL) 【注】			
802 ネオベノール点眼液0.4%(15mL)			
R03 ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg			
804 ネクサバール錠200mg		ネキシウム緊濁用顆粒分匀20mg	
805		ネインクムぶ角が森種の C20mg	【内】
306 ネスプ注射液180 μgプラシリンジ		ネスプ注射液120μgプラシリンジ	【注】
807 ネスプ注射液20μgプラシリンジ [注] 808 ネスプ注射液40μgプラシリンジ [注] 809 ネスプ注射液60μgプラシリンジ [注] 810 ネリゾナソリューション0.1%(10mL) [外] 811 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g) [外] 812 ノイトロジン注100μg [注] 813 ノイトロジン注250μg [注] 814 ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL) [注] 815 ノイロトロピン錠4単位 [内] 816 ノウリアスト錠20mg [内] 817 ノバスタンHI注10mg [注] 818 ノバミン筋注5mg(1mL 1管) [注] 819 ノバミン錠5mg [内] 820 ノバントロン注10mg(5mL) [注] 821 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット) [注] 822 ノボラピッド注フレックスペン(300単位1キット) [注] 823 ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット) [注] 824 ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL) [注] 825 ハーセプチン注射用150			
13			【注】
Ref	808	ネスプ注射液40 μ gプラシリンジ	【注】
811ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)【外】812ノイトロジン注100μg【注】813ノイトロジン注250μg【注】814ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)【注】815ノイロトロピン錠4単位【内】816ノウリアスト錠20mg【内】817ノバスタンHI注10mg【注】818ノバミン筋注5mg(1mL 1管)【注】819ノバミン錠5mg【内】820ノバントロン注10mg(5mL)【注】821ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)【注】822ノボラピッド注フレックスペン(300単位1キット)【注】823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)【注】824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)【注】825ハーセプチン注射用150【注】	809	ネスプ注射液60μgプラシリンジ	【注】
812ノイトロジン注100 μg[注]813ノイトロジン注250 μg[注]814ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)[注]815ノイロトロピン錠4単位[内]816ノウリアスト錠20mg[内]817ノバスタンHI注10mg[注]818ノバミン筋注5mg(1mL 1管)[注]819ノバミン錠5mg[内]820ノバントロン注10mg(5mL)[注]821ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)[注]822ノボラピッド注フレックスペン[注]823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)[注]824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)[注]825ハーセプチン注射用150[注]			【外】
813ノイトロジン注250 μg(注)814ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)(注)815ノイロトロピン錠4単位(内)816ノウリアスト錠20mg(内)817ノバスタンHI注10mg(注)818ノバミン筋注5mg(1mL 1管)(注)819ノバミン錠5mg(内)820ノバントロン注10mg(5mL)(注)821ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)(注)822ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)(注)823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)(注)824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)(注)825ハーセプチン注射用150(注)		ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)	【外】
814ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)【注】815ノイロトロピン錠4単位【内】816ノウリアスト錠20mg【内】817ノバスタンHI注10mg【注】818ノバミン筋注5mg(1mL 1管)【注】819ノバミン錠5mg【内】820ノバントロン注10mg(5mL)【注】821ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)【注】822ノボラピッド注フレックスペン【注】823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)【注】824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)【注】825ハーセプチン注射用150【注】		ノイトロジン注100 μ g	【注】
815ノイロトロピン錠4単位【内】816ノウリアスト錠20mg【内】817ノバスタンHI注10mg【注】818ノバミン筋注5mg(1mL 1管)【注】819ノバミン錠5mg【内】820ノバントロン注10mg(5mL)【注】821ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)【注】822ノボラピッド注フレックスペン【注】823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)【注】824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)【注】825ハーセプチン注射用150【注】		ノイトロシン注250 µ g	【注】
816ノウリアスト錠20mg【内】817ノバスタンHI注10mg【注】818ノバミン筋注5mg(1mL 1管)【注】819ノバミン錠5mg【内】820ノバントロン注10mg(5mL)【注】821ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)【注】822ノボラピッド注フレックスペン【注】823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)【注】824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)【注】825ハーセプチン注射用150【注】		ノイロトロビン注射液3.6単位(3mL)	[注]
817ノバスタンHI注10mg【注】818ノバミン筋注5mg(1mL 1管)【注】819ノバミン錠5mg【内】820ノバントロン注10mg(5mL)【注】821ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)【注】822ノボラピッド注フレックスペン【注】823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)【注】824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)【注】825ハーセプチン注射用150【注】		ノカリスストは2000	
818ノバミン筋注5mg(1mL 1管)【注】819ノバミン錠5mg【内】820ノバントロン注10mg(5mL)【注】821ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)【注】822ノボラピッド注フレックスペン【注】823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)【注】824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)【注】825ハーセプチン注射用150【注】		ノゾソアスト延20mg	【2)
819ノバミン錠5mg【内】820ノバントロン注10mg(5mL)【注】821ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)【注】822ノボラピッド注フレックスペン【注】823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)【注】824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)【注】825ハーセプチン注射用150【注】		ノハスダンロバエTOMIg バミン辞注5mg(1ml 1等)	【注】
820ノバントロン注10mg(5mL)【注】821ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)【注】822ノボラピッド注フレックスペン【注】823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)【注】824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)【注】825ハーセプチン注射用150【注】			「九工」
821ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)【注】822ノボラピッド注フレックスペン【注】823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)【注】824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)【注】825ハーセプチン注射用150【注】			
822ノボラピッド注フレックスペン【注】823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)【注】824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)【注】825ハーセプチン注射用150【注】			
823ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)【注】824ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)【注】825ハーセプチン注射用150【注】			【注】
824 /ルアドリナリン注1mg(1mg1mL) 【注】 825 ハーセプチン注射用150 【注】			<u>[注]</u>
825 ハーセプチン注射用150 【注】		ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	
826 ハーセプチン注射用60 【注】		ハーセプチン注射用150	【注】
	826	ハーセプチン注射用60	【注】

827	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
828	バイアスピリン錠100mg	【内】
829	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
830	ハイカリックRF輸液 500mL	<u>【注】</u>
831	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
832	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
833	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
834	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
835	ハイゼット錠50mg	【内】
836	ハイドレアカプセル500mg	【内】
837	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【外】
838	パキシルCR錠12.5mg	【内】
839	パキシルCR錠25mg	【内】
840	バクタ配合錠	【内】
841	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
842	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
843	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
844	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	【内】
845	バックス発泡顆粒	【外】
846	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
847	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
848	パム静注500mg(20mL)	【注】
849	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	【内】
850	パラミヂンカプセル300mg	【内】
851	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
852	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
853	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
854	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
855	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】 【中】
856 857	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 パルモディアXR錠0.2mg	【内】 【内】
858	ハルピティアスR製0.2mg ハルロピテープ24mg	【外】
859	ハルロピューク24mg ハルロピテープ8mg	【外】
860	バレイショデンプン「ヨシダ」	【内】
861	バロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
862	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	【内】
863	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
864	バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「明治」	【内】
865	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「明治」	【注】
866	パンテチン錠 100mg「YD」	【内】
867	パンテノール注100mg「KCC」	【注】
868	ハンプ注射用1000	【注】
869	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
870	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
871	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
872	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
873	ピーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】
874	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
875	ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
876	ビーソフテンローション0.3% (50g)	【外】
877	ビーフリード輸液 (500mL)	【注】
878	ピヴラッツ点滴静注液150mg	【注】
879	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
880	ビオスリー配合OD錠	【内】
881	ビオフェルミンR散(1g/包)	【内】
882	ビカーボン輸液 500mL	【注】
883	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】
884	ビクシリンカプセル250mg	【内】
885	ビクシリン注射用1g	【注】

886	ビクトーザ皮下注18mg	【注】
887	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	【内】
888	ビジパーク270 100mL	【注】
889	ビジパーク270 50mL	【注】
890	ビジパーク270注20mL	【注】
891	ピシバニール注射用5KE	【注】
892	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
893	ビスダイン静注用15mg	【注】
894	LスロンH錠200mg	【内】
895	ビソノテープ 2mg	【外】
896	ビソノテープ 4mg	【外】
897	ビソノテープ 8mg	【外】
898	ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「トーワ」	【内】
899	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
900	ビダーザ注射用100mg	【注】
901	ビタジェクト注キット	【注】
902	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
903	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
904	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
905	ビタメジン静注用	【注】
906	ヒダントールF配合錠	【内】
907	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	<u>【注】</u>
908	ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
909	EEスノールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
910	ヒビスコール液A0.5%	【外】
911	ととスコール版入5.5 / 20 とビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
912	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	注】
913	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	注】
913	ピムパット錠50mg	
914	ピムパット 歳30mg	【内】
916	ピムロ顆粒(0.5g/包)	【内】
917	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
918	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
919	ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL	【注】
920	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200	
921	ピラノアOD錠20mg	内
922	ピラマイド原末	内
923	ビリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
924	ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」	【内】
925	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	【内】
926	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」	【内】
927	<u>ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)</u>	【注】
928	ビレーズトリ エアロスフィア120吸入用	【外】
929	ファーストシン静注用1g	【注】
930	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」	【注】
931	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
932	ファルモルビシン注射用10mg	【注】
933	ファンギゾンシロップ 100mg ∕ mL	【内】
934	フィコンパ錠2mg	【内】
935	フィジオ140輸液 500mL	【注】
936	フィニバックス点滴静注用O. 25g	【注】
937	ブイフェンド200mg静注用	【注】
938	フィブラストスプレー500	【外】
939	フィブロガミンP静注用(4mL)	【注】
940	フィルグラスチムBS注 75μgシリンジ「モチダ」	【注】
941	フィルグラスチムBS注300 μgシリンジ「モチダ」	【注】
942	フェインジェクト静注500mg	【注】
943	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
944	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
	<u> </u>	

345			[F.S.W.]
フェノバルピタール教1096/ホエイ」(100mg/g)	945	フェソロデックス筋注250mg	【注】
1			
7. 17キソスタット錠10mg [DSEP]		フェノバルビタール散10%「ホエイ」(100mg/g)	
フェー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファ		フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	
プロ・グラテュメット錠105mg			
フェンタニル注射液の、5mg テルモ」	950	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	
フェンタニル注射液の、5mg テルモ」	951	フェロ・グラデュメット錠105mg	
プェントステーブ0.5mg	952	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	【注】
プェントステーブmg	953	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	【注】
プェントステーブmg	954	フェントステープ0.5mg	【外】
7ェントステーブAmg	955	フェントステープ1mg	【外】
フェントステーブ4mg		フェントステープ2mg	
74シーガ錠 10mg			
フォリアミン錠(5mg)			
74リアミン錠(Smg)		フォシーガ錠 5mg	
79・ジンレイ軟膏2%(10g)		フォリアミン錠(5mg)	
プスコバン注20mg			
プリフェキ配合錠 SANIK」			
7ッシュ綿棒P(綿棒2本人)			
75			
506 プラザキサカプセル10mg			
プラザキサカプセル110mg			
75ザキサカプセル75mg			
(内) フラジール内服錠250mg			
970 フラジール膣錠250mg (内) 971 プラバトル配合錠 (内) 972 フラビタン錠5mg (内) 973 プラリアル下注60mgシリンジ (注) 974 プランルカスト錠225「日医工」 (内) 975 プリテル配合錠 LD (内) 976 プリディオン静注変0.5g 50mL (注) 977 プリティオン静注200mg (注) 978 プリモボラン錠5mg (内) 979 フルオソロン0. 1% 点眼液 (外) 980 フルオレサイト静注500mg (10%65mL) (注) 981 フルオレサイト静注500mg (10%65mL) (注) 982 フルオレサイト静注500mg (10%65mL) (注) 983 フルスタン錠0.3 (内) 984 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 (内) 985 フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用 (方) 986 フルダラ静注用50mg (注) 987 フルチンフンプレカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用 (外) 988 フルテンプンプレカルボン酸 に関係の (内) 991 フルアインエトラゼバム錠 1mg「アメル」 (内) 992 フルマリンキャ計注 用1g(生食100mL付) (注) 993 フルマリンキャ計注 用5mg (注) 994 ブルオ注射用5mg			
プラノバール配合錠			
972 フラビタン錠5mg (内) 973 ブラリア皮下注60mgシリンジ (注) 974 グランルカスト錠225「日医工」 (内) 975 プリウェル配合錠 LD (内) 976 プリズバインド静注液 2.5g 50mL (注) 977 プリディオン静注200mg (注) 978 プリモボラン錠5mg (内) 980 プレイト静注500mg (10%5mL) (注) 981 フルオレサイト静注500mg (10%5mL) (注) 981 フルカリック3号輸液1103mL (注) 982 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 (内) 983 フルスタン錠0.3 (内) 984 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 (内) 985 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 (外) 986 フルダカド100μgエアゾール60吸入用 (外) 987 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 (外) 988 フルデーオーム125エアゾール 120吸入用 (内) 989 フルデーオーム125エアゾール 120吸入用 (内) 990 フルニトラゼバム錠 1mg「アメル」 (内) 991 ブルアニン錠100 (内) 992 フルマリンキ・静注用1g (注) 994 フルマリンキ・計算に関係 (注) 995 ブレオ注射用5mg <td></td> <td></td> <td></td>			
973 プラリア皮下注60mgシリンジ [注] 974 プランルカスト錠225「日医工」 (内) 976 プリブル配合錠 LD (内) 977 プリディオン静注200mg (注] 978 プリディオン静注200mg (注] 979 フルオンサスン錠5mg (内) 980 フルオレサイト静注500mg(10%5mL) (注] 981 フルカリック3号輸液1103mL (注] 982 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 (内) 983 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 (内) 984 フルメイチアミン錠25mg「トーワ」 (内) 985 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 (内) 986 フルダラかカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 (外) 987 フルデカソンランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 (外) 989 フルデーン支援100 (内) 989 フルデーン支援100 (内) 991 フルマイン・主幹前後0.5mg「アメル」 (内) 992 フルマゼニル主射形の (注) 994 フルマリン・静注射15mg (注) 995 ブレオ注射用15mg (注) 996 ブレガバリンのの錠55mg「VTRS」 (内) 998 ブレガバリンの砂錠50mg「VTRS」 (内) 7レディンのり錠50mg「VTRS」 <			
77 プリウェル耐入を錠 225「日医工」			
7リウェル配合錠 LD (内) 976 プリズバインド静注液 2.5g 50mL (注) 977 プリディオン静注200mg (注) 978 プリモボラン錠5mg (内) 979 フルオンロンO. 1%点眼液 (内) 980 フルオレサイト静注500mg(10%5mL) (注) 981 フルカリック3号輸液1103mL (注) 982 フルコナゾールカブセル100mg「サワイ」 (内) 983 フルスタン錠0.3 (内) 984 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 (内) 985 フルタイド100μg IPゾール60吸入用 (外) 986 フルダラ静注用50mg (注) 987 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 (外) 988 フルッロンカプセル200 (内) 989 フルディフォーム125エアゾール 120吸入用 (外) 990 フルニトラゼバム錠 1mg「アメル」 (内) 991 ブルフェン錠100 (内) 992 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 (注) 993 フルマジェト計算注射1g(生食100mL付) (注) 994 フルマジェト計算注射1g(生食100mL付) (注) 995 ブレオ注射用15mg (注) 996 ブレオ注射用5mg (注) 997 フレカイ=ド酢酸塩錠50mg「VTRS」 (内) 998 ブレガバリンのD錠25mg「VTRS」 (内) 999 ブレガバリンのD錠25mg「VTRS」 (内) 1000 ブレドニン位1mg (旭化成) (内) 7レドニン位1mg (旭化成) (内) 7レドニン位2mg (旭化成) (内) 7レドニン位5mg (旭化成) (内)		ブラリア皮下注60mgシリンジ	
976 プリスインド静注液 2.5g 50mL [注] 977 プリティオン静注200mg (注) 978 プリモボラン錠5mg (内) 999 プルオンサイト静注500mg(10%5mL) (注) 980 フルカリック3号輸液1103mL (注) 981 フルカナジールカプセル100mg「サワイ」 (内) 982 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 (内) 983 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 (内) 984 フルメイチアミン錠25mg「トーワ」 (内) 985 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 (外) 986 フルダラ静注用50mg (注) 987 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 (外) 988 フルツロンカプセル200 (内) 989 フルニトラゼバム錠 1mg「アメル」 (内) 991 ブルフナン錠100 (内) 992 フルマゼニル注射液0.5mg「アメル」 (内) 993 フルマリンキャト静注用1g(生食100mL付) (注) 994 ブルマリン静注用15mg (注) 995 ブレオ注射用15mg (注) 996 ブレオ注射用5mg (注) 997 フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 (内) 998 ブレガバリンのD錠7mg「VTRS」 (内) 900 ブレガイニンのD錠5			
977 ブリディオン静注200mg		フリウェル配合錠 LD	
978 プリモボラン錠5mg			
979 フルオメソロンO. 1%点眼液 フルオレサイト静注500mg(10%5mL) フルカリック3号輸液1103mL フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 フルダラ静注用50mg フルダラ静注用50mg フルゲラかンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 フルゲーフがフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 フルヴェカガセル200 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 ブルフェン錠100 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) フルマリン静注用1bmg ブレオ注射用1bmg ブレオ注射用5mg ブレオ注射用5mg ブレオ注射用5mg ブレオ注射用5mg ブレオに下酢酸塩錠50mg「VTRS」 フルガパリンのD錠25mg「VTRS」 フリののでは100 ブレガパリンのD錠25mg「VTRS」 フリのでフレースのD錠50 ブレガディンのD錠50 ブレガディンのD錠50 ブレディンのD錠50 ブレガニンの25mg「VTRS」 「内」 フリののでフレースののでしては フリののでしては フリのに フリのに		ブリディオン静注200mg	
980 フルオレサイト静注500mg(10%5mL) [注] 981 フルカリック3号輸液1103mL (注] 982 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 (内] 983 フルスタン錠0.3 (内] 984 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 (内] 985 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 (外] 986 フルダラ静注用50mg (注) 987 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 (外) 988 フルツロンカプセル200 (内] 989 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 (外) 990 フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 (内) 991 ブルフェン錠100 (内) 992 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 (注) 993 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) (注) 994 フルマリンキット静注用1g (注) 995 ブレオ注射用15mg (注) 996 ブレオ注射用5mg (注) 997 フレカイ=ド酢酸塩錠50mg「VTRS」 (内) 998 プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 (内) 999 ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」 (内) 999 ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」 (内) 1000 ブレディニンOD錠50 (内) 1001 ブレドニゾロン錠1mg(地化成) (内) 1002 ブレドニン錠5mg	978		
981 フルカリック3号輸液1103mL [注] 982 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 [内] 983 フルスタン錠0.3 [内] 984 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 [内] 985 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 [外] 986 フルダラ静注用50mg [注] 987 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 [外] 988 フルツロンカプセル200 [内] 989 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 [外] 990 フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 [内] 991 ブルフェン錠100 [内] 992 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 [注] 993 フルマリンキット静注用1g [注] 994 フルマリンキット静注用1g [注] 995 ブレオ注射用15mg [注] 996 ブレオ注射用15mg [注] 997 フレカイ=ド酢酸塩錠50mg「VTRS」 [内] 998 プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 [内] 999 ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」 [内] 1000 ブレディニンOD錠50 [内] 1001 ブレドニゾロン錠1mg(地化成) [内] 1002 ブレドニン位5mg	979		
982 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 [内] 983 フルスタン錠0.3 [内] 984 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 [内] 985 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 [外] 986 フルグラ静注用50mg [注] 987 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 [外] 988 フルツロンカプセル200 [内] 989 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 [外] 990 フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 [内] 991 ブルフェン錠100 [内] 992 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 [注] 993 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) [注] 994 フルマリン静注用1g [注] 995 ブレオ注射用15mg [注] 996 ブレオ注射用15mg [注] 997 フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 [内] 998 プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 [内] 999 プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 [内] 1000 ブレディニンOD錠50 [内] 1001 プレドニン錠1mg(旭化成) [内] 1002 プレドニン錠5mg	980	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
982 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 [内] 983 フルスタン錠0.3 [内] 984 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 [内] 985 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 [外] 986 フルグラ静注用50mg [注] 987 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 [外] 988 フルツロンカプセル200 [内] 989 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 [外] 990 フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 [内] 991 ブルフェン錠100 [内] 992 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 [注] 993 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) [注] 994 フルマリン静注用1g [注] 995 ブレオ注射用15mg [注] 996 ブレオ注射用15mg [注] 997 フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 [内] 998 プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 [内] 999 プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 [内] 1000 ブレディニンOD錠50 [内] 1001 プレドニン錠1mg(旭化成) [内] 1002 プレドニン錠5mg	981	フルカリック3号輸液1103mL	
7ルスタン錠0.3 [内] 984 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 [内] 985 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 [外] 986 フルダラ静注用50mg [注] 987 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 [外] 988 フルツロンカプセル200 [内] 989 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 [外] 990 フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 [内] 991 ブルフェン錠100 [内] 992 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 [注] 993 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) [注] 994 フルマリンキット静注用1g [注] 995 ブレオ注射用15mg [注] 996 ブレオ注射用5mg [注] 997 フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 [内] 998 プレガバリンのD錠25mg「VTRS」 [内] 999 プレガバリンのD錠25mg「VTRS」 [内] 1000 ブレディニンOD錠50 [内] 1001 プレドニン錠5mg (担化成) [内] 1002 プレドニン錠5mg	982	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	
984フルスルチアミン錠25mg「トーワ」【内】985フルタイド100μgエアゾール60吸入用【外】986フルダラ静注用50mg【注】987フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用【外】988フルツロンカプセル200【内】989フルティフォーム125エアゾール 120吸入用【外】990フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」【内】991ブルフェン錠100【内】992フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】993フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】994フルマリン静注用1g【注】995ブレオ注射用15mg【注】996ブレオ注射用5mg【注】997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンのD錠25mg「VTRS」【内】999プレガバリンのD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】	983	フルスタン錠0.3	
985 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 986 フルダラ静注用50mg			
986フルダラ静注用50mg(注)987フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μg「武田テバ」56噴霧用【外】988フルツロンカプセル200【内】989フルティフォーム125エアゾール 120吸入用【外】990フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」【内】991ブルフェン錠100【内】992フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】993フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】994フルマリン静注用1g【注】995ブレオ注射用15mg【注】996ブレオ注射用5mg【注】997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】999ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			
987フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用【外】988フルツロンカプセル200【内】989フルティフォーム125エアゾール 120吸入用【外】990フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」【内】991ブルフェン錠100【内】992フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】993フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】994フルマリン静注用1g【注】995ブレオ注射用15mg【注】996ブレオ注射用5mg【注】997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニン位ン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			
988フルツロンカプセル200【内】989フルティフォーム125エアゾール 120吸入用【外】990フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」【内】991ブルフェン錠100【内】992フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】993フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】994フルマリン静注用1g【注】995ブレオ注射用15mg【注】996ブレオ注射用5mg【注】997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】999プレガバリンOD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			
989フルティフォーム125エアゾール 120吸入用【外】990フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」【内】991ブルフェン錠100【内】992フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】993フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】994フルマリン静注用1g【注】995ブレオ注射用15mg【注】996ブレオ注射用5mg【注】997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			
990フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」【内】991ブルフェン錠100【内】992フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】993フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】994フルマリン静注用1g【注】995ブレオ注射用15mg【注】996ブレオ注射用5mg【注】997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】999プレガバリンOD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			
991ブルフェン錠100【内】992フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】993フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】994フルマリン静注用1g【注】995ブレオ注射用15mg【注】996ブレオ注射用5mg【注】997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】999プレガバリンOD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			[内]
992フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】993フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】994フルマリン静注用1g【注】995ブレオ注射用15mg【注】996ブレオ注射用5mg【注】997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】999プレガバリンOD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			
993フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】994フルマリン静注用1g【注】995ブレオ注射用15mg【注】996ブレオ注射用5mg【注】997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】999プレガバリンOD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			
994フルマリン静注用1g【注】995ブレオ注射用15mg【注】996ブレオ注射用5mg【注】997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】999プレガバリンOD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			
995ブレオ注射用15mg【注】996ブレオ注射用5mg【注】997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】999プレガバリンOD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			
996ブレオ注射用5mg【注】997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】999プレガバリンOD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			
997フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】999プレガバリンOD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】		ノレク/エ初 用 TOMg ゴレオ注 針 田 E	
998プレガバリンOD錠25mg「VTRS」【内】999プレガバリンOD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠5O【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】		フレカノニが形形が存在の。。「VTDO」	
999プレガバリンOD錠75mg「VTRS」【内】1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】		ノレハ1 ― F 間 F 阪 垣 延 つ U mg 「 V T K う 」	
1000ブレディニンOD錠50【内】1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			
1001プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1002プレドニン錠5mg【内】			
1001フレドニソロン錠1mg(旭化灰)【内】1002プレドニン錠5mg【内】1003プレマリン錠0.625mg【内】		フレナイニンOD錠50	
1002 フレドニン錠5mg 【内】 1003 プレマリン錠0.625mg 【内】		フレドニソロン錠1mg(旭化灰)	
1003 [フレマリン錠0.625mg 【内】]		フレトニン錠5mg	
	1003	フレマリン錠0.625mg	【内】

1004	プロイメンド点滴静注用150mg	【注】
1005	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
1006	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
1007	プログラフカプセル0.5mg	【内】
1008	プログラフカプセル1mg	【内】
1009	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
1010	プログラフ顆粒0. 2mg	【内】
1011	プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】
1012	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1013	プロジフ静注液400(5mL)	【注】
1014	プロスコープ300注100mL	【注】
1015	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
1016	プロスタンディン点滴静注用500μg	【注】
1017	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
1018	プロセキソール錠0.5mg	【内】
1019	フロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
1020	フロセミド錠20mg「NP」	【内】
1021	フロセミド錠40mg「NP」 プロケーリー 対 0.25 (0.020/15-1)	【内】 【注】
1022 1023	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	
1023	プロタノールS錠15mg プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【内】 【注】
1024	プロチミン硫酸塩腫圧 TOOMg「モナタ」(TOME) プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1025	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
1020	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1027	プロナーゼMS(10g)	【内】
1028	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】
1030	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1031	プロポフォール静注1%20mL「日医工」	【注】
1032	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1033	ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1034	ブロムフェナクNa点眼液O. 1%「ニットー」	【外】
1035	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ-」	【外】
1036	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1037	ブロメライン軟膏 * (ジェイドルフ)(20g)	【外】
1038	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1039	フロリード膣坐剤100mg	【外】
1040	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1041	ベオーバ錠50mg	【内】
1042	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1043	ペガシス皮下注180 μ g(1mL)	【注】
1044	ペガシス皮下注90 µ g(1mL)	【注】
1045	ヘキザックAL1%綿棒12	【外】
1046	ヘキザック水溶液1%消毒布 20×30	【外】
1047	ベギンクリーム10% (20g)	【外】
1048	ペグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用	【注】
1049	ペグイントロン皮下注用50 μ g/0.5mL用	【注】
1050	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1051	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1052	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1053	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1054	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】 【如】
1055	ベセルナクリーム5%	【外】
1056	ベタニス錠25mg	【内】
1057	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1058	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	[内]
1059 1060	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	[外]
1060	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g) ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1061	ペチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【外】 【注】
1002	「・ソ ノノ・皿 収・皿 /エ プ」 /区 ∪∪ !! 8 ' ノ ノ ノ 」	【/工】

ペネ・リン吸入液の 5%(5mg/mL)	1063	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1066			
1066			
ハイリン和と近上で 152 1068			
1068 ハパリンカルウカム皮下注ち千単位/02mLシリンジ「モチヴ」		ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	
1069	1068	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	
1070	1069		
1071 ハパリ類似物質外用スプレーO、3%「日医工」	1070	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	
1072	1071	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	
1073	1072	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	
イスプリン川静注 1000単位	1073	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)	【外】
1076	1074	ヘブスブリンIH静注1000単位	【注】
1077	1075	ヘプタバックスー II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	1076	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	
1079	1077		
1080 ペラ/ミル塩酸塩静注5mg[タイヨーJ(2mL) [注] (内) (D) (D)	1078	ヘモポリゾン軟膏 (2g)	
1081		ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	
1082			
1084			
1084			
1085			
1086			
1087 ペリプラストP コンピセット 組織接着用 5mL 2キット1組			
1088		ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	
1089		ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	
1090 ペルジピン上Aカプセル40mg		ペルサンチン-Lカプセル 150mg	
1091 ペルジピン注射液2mg2mL (注) 1092 ベルソムラ錠 15mg (内) イルソムラ錠 20mg (内) イルベソロン下点眼・点鼻液(5mL) (外) イルベソロン下点眼・点鼻液(5mL) (力) イルベッサー注射用50(パイアル製品) (注) インズブロマロン錠50mg「トーワ」 (内) インダウ注腸1g(100mL) (内) インタウ注腸1g(100mL) (内) インタウ類粒94%(1000mg/包) (内) インタサ顆粒94%(1000mg/包) (内) ボアラ軟膏0.12%(5g) (外) ボーステル内用液10(液:10mg250mL) (内) ボーステル内開液10(液:10mg250mL) (内) ボーステル内開液10(液:10mg250mL) (内) ボース・カン解用錠1mg (内) ボストイン静注750mg(10mL) (内) ボストイン静注750mg(10mL) (注) ホストイン静注750mg(10mL) (注) ボスミン錠500mg (内) ボスミン錠500mg (内) ボスミン錠500mg (内) ボスリボン配合顆粒 (内) ボトックス注用50単位 (内) ボトックス注用50単位 (内) ボトックス注用50単位 (内) ボトックス注用50単位 (内) ボドンコードガーブルア%「明治」(30mL) (外) ボビドンヨードガーブルア%「明治」(30mL) (外) ボビドンヨードガーブルア%「明治」(30mL) (外) ボビドンヨードガーブルア%「明治」(30mL) (外) ボビドンヨードガーブルア%「明治」(50mL) (外) ボビドンヨードガーブルア%「明治」(50mL) (外) ボーブビジュードガーブルア、「明治」(50mL) (外) ボーブビジュードガーブルア、「明治」(50mL) (外) ボーブビジュードカーブ液7、5%「明治」 (内) ボーブビジュードカーブ液7、5%「明治」 (内) ボーブ・カードカーブ液7、5%「明治」 (内) ボーブ・カードカーブルア、5mg「サウイ」 (内) ボーブ・カードカーブルア、5mg「サウイ」 (内) ボーブージング クロの 錠 75mg「サウイ」 (内) ボーブージングロの 錠 75mg「サウイ」 (内) ボーブージングロの 錠 75mg「サウイ」 (内) ボーブージングロの 錠 75mg「サウイ」 (内) ボーブージン注 5mg (力) (力			
1092		ペルジピンLAカブセル40mg	
1093			
1094 ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL) (外) 1095 ヘルベッサー注射用50(バイアル製品) (注) 1096 ベンズブロマロン錠5Omg「トーワ」 (内) 1097 ベンタサ注腸1g(100mL) (外) 1098 ベンタサ顆粒94% (2000mg/包) (内) 1099 ベンタサ顆粒94% (2000mg/包) (内) 1100 ボアラ軟膏0.12% (5g) (外) 1101 ボースデル内用液10 (液:10mg250mL) (内) 1102 ホーリンV膣用錠1mg (外) 1103 ボグリボースOD錠0. 3mg「トーワ」 (内) 1104 ホストイン静注750mg(10mL) (注) 1105 ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 (注) 1106 ホスミン錠500mg (内) 1107 ボスミン外用液0.1% (100mL) (外) 1108 ボスミン注1mg(1mL) (注) 1109 ホスリボン配合顆粒 (内) 1110 ボトックス注用50単位 (注) 1111 ボナロンをロゼリー35mg (内) 1112 ボナロン点滴静注バッグ900 μg (注) 1113 ポピドンヨードガーブル7%「明治」(30mL) (外) 1115 ポピドンヨードカーブル7%「明治」(30mL) (外) 1116 ポラゴン第カードスクラブ液7. 5%「明治」 (外) 1117 ボラザG軟膏 (外) 1118 ボラザG軟膏 (外) 1119 ボララミン注 5mg (円) 1110 ボララミン注 5mg (戸) 1111 ボララミン注 5mg (戸) 1112 ボララミン注 5mg (戸) 1112 ボララミン錠2mg (内)			
1095 ヘルベッサー注射用50(パイアル製品) [注] 1096 ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 [内] 1097 ベンタサ注腸1g(100mL) [外] 1098 ベンタサ顆粒94% (1000mg/包) [内] 1099 ベンタサ顆粒94% (2000mg/包) [内] 1100 ボアラ軟膏0.12% (5g) [外] 1101 ボースデル内用液10 (液:10mg250mL) [内] 1102 ホーリンV膣用錠1mg [外] 1103 ボグリボースOD錠0. 3mg「トーワ」 [内] 1104 ホストイン静注750mg(10mL) [注] 1105 ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 [注] 1106 ホスミシン錠500mg [内] 1107 ボスミンが見500mg [内] 1108 ボスミン注1mg(1mL) [注] 1109 ホスリボン配合顆粒 [内] 1110 ボトックス注用50単位 [注] 1111 ボーロン経口グリー35mg [内] 1112 ボナロン点滴静注パッグ900μg [内] 1113 ボビドンヨードガーブルア%「明治」(30mL) [外] 1114 ボビドンヨードガーブルア%「明治」(30mL) [外] 115 ポビドンヨードガーブルア%「明治」(30mL) [外] 116 ボラザら軟膏 [外] 117 ボラザG軟膏 [外] 118 ボラブレジンクOD錠 75mg「サワイ」 [内] 119 ボララミン注 5mg [注] 1110 ボララミン注 5mg [注] 1120 ボララミン錠2mg [内]		ヘルソムフ錠 20mg	
1096 ペンズブロマロン錠50mg「トーワ」			
1097 ペンタサ実施1g(100mL)			
パンタサ顆粒94%(1000mg/包)		ヘン人ノロマロン錠50mg「トーリ」	
1099		ヘンタサ注肠 Ig(IUUML)	
ボアラ軟膏0.12% (5g)			
1101 ボースデル内用液10 (液:10mg250mL)			
1102 ホーリンV膣用錠1mg		ハアフ	
1103 ボグリボースOD錠O. 3mg「トーワ」		ホースナル内用液10 (液:TUMg23UML)	
1104 ホストイン静注750mg(10mL) 【注】		ボーソフV腔用薬IMg	
1105			「注)
1106 ホスミシン錠500mg			【/土】
1107 ボスミン外用液0.1%(100mL)		ホスパマイプフNaff/土州Zg「NP」 ホフミシン、空500mg	「力」
1108			[[[]]
1109		小人ミングト円/枚U.1%(100ML/ ボフミンジナ1 mm (1ml)	【7F】 【注】
1110ボトックス注用50単位【注】1111ボナロン経口ゼリー35mg【内】1112ボナロン点滴静注バッグ900μg【注】1113ポビドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)【外】1114ポビドンヨード外用液10%「VTRS」(250mL)【外】1115ポビドンヨードゲル10%「VTRS」(90g)【外】1116ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」【外】1117ボラザG軟膏【外】1118ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」【内】1119ポララミン注 5mg【注】1120ポララミン錠2mg【内】		ハスミノ注 IMg(IML/ ホフリボン和 今 照 粒	「力」
1111ボナロン経口ゼリー35mg【内】1112ボナロン点滴静注バッグ900μg【注】1113ポビドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)【外】1114ポビドンヨード外用液10%「VTRS」(250mL)【外】1115ポビドンヨードゲル10%「VTRS」(90g)【外】1116ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」【外】1117ボラザG軟膏【外】1118ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」【内】1119ポララミン注 5mg【注】1120ポララミン錠2mg【内】		ボトックス 注 田50 単位	「注)
1112ボナロン点滴静注バッグ900μg【注】1113ポビドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)【外】1114ポビドンヨード外用液10%「VTRS」(250mL)【外】1115ポビドンヨードゲル10%「VTRS」(90g)【外】1116ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」【外】1117ボラザG軟膏【外】1118ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」【内】1119ポララミン注 5mg【注】1120ポララミン錠2mg【内】		ボナロンタロゼルー2555~	「大工」
1113ポビドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)【外】1114ポビドンヨード外用液10%「VTRS」(250mL)【外】1115ポビドンヨードゲル10%「VTRS」(90g)【外】1116ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」【外】1117ボラザG軟膏【外】1118ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」【内】1119ポララミン注 5mg【注】1120ポララミン錠2mg【内】		ボナロンた 海熱汁 バッグのの u ~	「注】
1114ポビドンヨード外用液10%「VTRS」(250mL)【外】1115ポビドンヨードゲル10%「VTRS」(90g)【外】1116ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」【外】1117ボラザG軟膏【外】1118ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」【内】1119ポララミン注 5mg【注】1120ポララミン錠2mg【内】		ポアドンコードガーグルフ%「明治」(20~1)	\ \ \ \ _ \ \ \ \ \ \ \ \
1115ポビドンヨードゲル10%「VTRS」(90g)【外】1116ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」【外】1117ボラザG軟膏【外】1118ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」【内】1119ポララミン注 5mg【注】1120ポララミン錠2mg【内】		ポピドンコード外田海100/「V/TDC I/250mL)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
1117ボラザG軟膏【外】1118ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」【内】1119ポララミン注 5mg【注】1120ポララミン錠2mg【内】		ポピドンコードゲル10%「V/TDS」(200mL)	
1117ボラザG軟膏【外】1118ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」【内】1119ポララミン注 5mg【注】1120ポララミン錠2mg【内】		パレー・フコー "ハル・ロッの・V・Rの」 (90g/ ポピドンコードフカラブ添フ 50%「明治・	
1118ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」【内】1119ポララミン注 5mg【注】1120ポララミン錠2mg【内】		バトンコードカンフス(及)・0701 97/03 ポラザG軟膏	<u> 【フト』</u> 「かして
1119 ポララミン注 5mg 【注】 1120 ポララミン錠2mg 【内】		小ファマチへ 目 ポラプレジンノクロの錠 75mg「サロイ	
- 1120 - ボララミン錠2mg		パファレフフラロッド Tollig ・ソフコー ポーラミン注 5mg	
1121 ポリコナゾール錠50mg「トーロ」 「中T		パンノヘン/エ 5011g ポララミン統2mg	
114.	1121	ボリコナゾール錠50mg「トーワ」	【内】

1122	ポリドカスクレロール1%注2mL	【注】
1123	ホリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1124	ボルベン輸液6%	【注】
1125	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1126	ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1127	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	【注】
1128	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
1129 1130	マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg	【注】
1131	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」	【注】
1132	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	【注】
1133	マキュエイド硝子体内注用40mg	【注】
1134	マグコロールP(50g)	【内】
1135	マクサルトRPD錠10mg	【内】
1136	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【注】
1137	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	【注】
1138	マグミット錠330mg	【内】
1139	マグミット錠500mg	【内】
1140	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)	【外】
1141	マドパー配合錠	【内】
1142	マブリン散1%(10mg/g)	【内】
1143	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【内】
1144	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	【注】
1145 1146	マンジャロ皮下注5mgアテオスマンニットールS注射液「YD」300mL	【注】
1147	マフェットール3/23 (3 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	【外】
1147	ミカファンギNa点滴静注用50mg	【注】
1149	ミグリステン錠20	【内】
1150	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1151	ミケルナ配合点眼液	【外】
1152	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1153	ミッドペリックL135腹膜透析液1500mL	【注】
1154	ミッドペリックL135腹膜透析液2000mL	【注】
1155	ミッドペリックL135腹膜透析液1000mL	【注】
1156	ミッドペリックL250腹膜透析液1500mL	【注】
1157	ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL	【注】
1158	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1159	ミニプレス錠0.5mg	【内】
1160	ミネブロOD錠2.5mg	【内】
1161 1162	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【注】
1163	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内】
1164	ミヤBM細粒	【内】
1165	ミヤBM錠	【内】
1166	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1167	ミラペックスLA錠 0.375mg	【内】
1168	ミラペックスLA錠 1.5mg	【内】
1169	ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)	【注】
1170	ミルセラ注シリンジ200 µg(0.3mL)	【注】
1171	ミルセラ注シリンジ50 µg(0.3mL)	【注】
1172	ミルセラ注シリンジ250 μg	【注】
1173	ミルセラ注シリンジ25μg	【注】
1174	ミルタザピン錠15mg「明治」	【内】
1175	ミルトン 1L	【内】
1176	ミルリノン注22.5mg/、ック「タカタ」(150mL)	【内】
1177	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】 【如】
1178 1179	ムコスタ点眼液UD2% 無水エタノール * 丸石 (液:500mL)	【外】
1180	無水エタノールキメルコ (後:500mL) 無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【外】 【注】
1100		【/工】

1181	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1182	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
1183	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」	【内】
1184	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1185	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1186	メジコン錠15mg	【内】
1187	メスチノン錠60mg	【内】
1188	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1189	メタライト250カプセル	【内】
1190	メチコバール錠500 μ g	【内】
1191	メチコバール注射液500 μ g(1mL)	【注】
1192	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」	【内】
1193	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1194	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】
1195	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1196	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
1197	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1198	メトリジンD錠2mg	[内]
1199 1200	メノエイドコンビパッチ メプチンエアー10μg吸入100回	【外】 【外】
1200	メプチンエアー10 μ g吸入100回 メプチン錠50 μ g	【外】 【内】
1201	メファン延30μg メマンチンOD錠 20mg「DSEP」	【内】
1202	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」	【内】
1203	メルカゾール錠5mg	【内】
1205	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」	【注】
1206	モイゼルト軟膏「1%	【外】
1207	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	【外】
1208	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1209	モビコール配合内用剤HD	【内】
1210	モビプレップ配合内用剤	【内】
1211	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用	【外】
1212	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1213	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1214	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1215	薬用炭.OY(原末)	【内】
1216	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1217	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】
1218	ユービット錠100mg	【内】
1219	ユナシン錠375mg	【内】
1220	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1221	ョウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1222	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】
1223	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1224	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	【内】
1225	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1226	ラステットSカプセル25mg	【内】
1227	ラスビック錠75mg	【内】
1228	ラスビック点滴静注キット150mg	【注】
1229	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】 【如】
1230 1231	ラニチジン錠150mg「トーワ」 ラニラピッド錠0.05mg	【内】 【内】
1231	ラニラにット錠0.05mg ラベプラゾールNa錠 5mg「明治」	【内】 【内】
1232	ラベブラゾールNa錠 5mg「明治」 ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	【内】
1233	ラベノラケールNa錠Tolligi 明治」 ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1234	フトナール注列用0.3g(300mg) ラミクタール錠100mg	
1236	ラミクタール錠25mg	【内】
1237	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	【内】
1237	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	【内】
1239	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
		Kr J2

ランタスXR注ソロスター	【注
リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	[
リオナ錠 250mg	【 戊
リオレサール錠5mg	【 戊
リクシアナOD錠15mg	【 卢
リクシアナOD錠30mg	
リクシアナOD錠60mg	【 卢
リコモジュリン点滴静注用12800	
リザベンカプセル100mg	
リシノプリル錠10mg「トーワ」	Ţ.
リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	<u> </u>
リスミー錠2mg	[
リスモダンP静注50mg(5mL)	
リゾビスト注(44.6mg1.6mL)	
リツキサン点滴静注100mg	
リツキサン点滴静注500mg	
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	
リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」(5mL)	
<u> 9 Fが1 フ塩酸塩注射液 0.5% 「VTRS」(3ML)</u> リドカイン塩酸塩注射液 1% 「VTRS」(10mL)	
リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(TOML) リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(5mL)	
リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL) リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL)	
リドカイン塩酸塩注射液 2%・VTRS」(TOML) リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	
リトカイン静注用2%シリンシ「テルモ」(5mL) リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	
リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【 夕
リパクレオンカプセル150mg	[7
リパクレオン顆粒300mg分包	[7
リバゼブ配合錠HD	[p
リピオドール480注10mL	
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	[7
リフラップシート5%(1シート=25cm2×6枚)	[9
リフラップ軟膏5%(30g)	[g
リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	[7
リボトリール錠0.5mg	[7
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	[7
硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)	
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	
リュープリンSR注射用キット11.25mg	
リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	
リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	
リルゾール錠50mg「ニプロ」	[7
リンゼス錠0.25mg	[7
リンデロン-VGローション(10mL)	【 夕
リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	[7
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【 夕
リンデロン坐剤0.5mg	【 夕
リンデロン坐剤1.0mg	<u></u>
リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	ĪŽ
リン酸Na補正液0. 5mmol/mL	
ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	Ţ)
ルテスデポー注(1mL)	
ルパフィン錠10mg	
ルボックス錠25	[P
ルムジェブ注ミリオペン	
ルリコンクリーム1%10g	[<i>y</i>
レキソタン錠5	【 卢
レキップCR錠2mg	【 卢
レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL	The state of the s

1299	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1300	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1301	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1302	レクサプロ錠10mg	【内】
1303	レザルタス配合錠HD	【内】
1304	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
1305	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
1306	レトロゾール錠2. 5mg「サンド」	【内】
1307	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	【内】
1308 1309	レバミピド錠100mg「サワイ」 レビトラ錠5mg	【内】 【内】
1310	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	【内】
1311	レベチラセタムDS50%「トーワ」	【内】
1312	レペタン坐剤0.4mg	【外】
1313	レペタン注0.2mg(1mL)	【注】
1314	レベトールカプセル200mg	【内】
1315	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」	【内】
1316	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1317	レボビスト注射用 2.5g	【注】
1318	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1319	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	【外】
1320	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
1321	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1322 1323	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】 【注】
1323	レンステンタニル解注用といる。第一二共	【外】
1325	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1326	レルミナ錠40mg	【内】
1327	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1328	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】
1329	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1330	ロイナーゼ注用5000	【注】
1331	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1332	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
1333	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5. 0mL「F」	【注】
1334	ロケルマ懸濁用散分包5g	【内】
1335 1336	ロコアテープ (7枚/袋) ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】 【外】
1337	ロコイドウラーム0.1%(5g) ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1338	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1339	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1340	ロスーゼット配合錠HD	【内】
1341	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1342	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1343	ロピオン静注50mg	【注】
1344	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1345	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内】
1346	ロルカム錠4mg	【内】
1347	ロレアス配合錠「SANIK」	【内】
1348 1349	ワーファリン錠1mg ワーファリン錠5mg	【内】
1349	ワーファウン錠5mg ワイスタール静注用1g	【内】 【注】
1351	ワイスタール耐圧用で ワイスタール配合点滴静注用1gバック	【注】
1352	フィスタール配日 点間野 注流 1gハック ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1353	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1354	アフェドリン「ナガヰ」注射液40mg(1mL)	【注】
1355	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1356	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 μ g(溶解液付)	【注】
1357	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25 µg(溶解液付)	【注】

1358	液状フェノール*(健栄)	【外】
1359	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1360	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1361	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	【注】
1362	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
1363	希ヨードチンキ「ニッコー」	【外】
1364	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1365	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	【注】
1366	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	【注】
1367 1368	献血ノンスロン1500注射用 消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【注】
1369	消毒用エダノール・ウンエー」(減谷ホトル 500mL) 硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】 【外】
1370	研酸イソソルビドテーク 40mg「EMEO] 硝酸イソソルビド徐放力プセル20mg「St」	【内】
1371	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1372	新レシカルボン坐剤	【外】
1373	親水クリーム「ニッコー」	【外】
1374	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1375	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1376	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】
1377	生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中ロタイプ)	【注】
1378	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
1379	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1380	生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)	【注】
1381	生理食塩液PL「フソー」2L(注射用)	【注】
1382	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1383	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
1384 1385	大塚蒸留水(注射:500mL) 大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1386	大塚良塩注10%20mL(34mEq)	【注】 【注】
1387	大塚生食注 100mL	【注】
1388	大塚生食注 300mL	【注】
1389	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1390	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1391	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1392	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1393	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1394	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1395	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1396	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1397	単シロップ*(丸石)	【内】
1398	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	【内】
1399	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	【内】
1400	注射用イホマイド1g	【注】
1401 1402	注射用エンドキサン100mg	【注】
1402	注射用エンドキサン500mg 注射用サイメリン50mg	【注】
1403	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1405	注射用ソル・メルコート125	【注】
1406	注射用ソル・メルコート40	【注】
1407	注射用ソル・メルコート500	【注】
1408	注射用フィルデシン1mg	【注】
1409	注射用フィルデシン3mg	【注】
1410	注射用フサン50	【注】
1411	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	【注】
1412	注射用メソトレキセート50mg	【注】
1413	注射用メソトレキセート5mg	【注】
1414	調剤用パンビタン末	【内】
1415	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL	【注】
1416	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	【注】

4 4 4 7	(ボハマーナコーン) (注 500)	F >> T
1417	低分子デキストランL注 500mL	【注】
1418	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 乳酸カルシウム「VTRS」原末 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	【注】
1419	乳酸カルシウム「VTRS」原末	【内】
1420	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	【内】
1421	白色ワセリン*(健栄) 複方ヨード・グリセリン(液)	【外】
1422	複方ヨード・グリセリン(液)	【外】
1423	減菌精製水 * (大成薬品) (【外】
1424	一硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	【内】
1425		注〕
1425	別はストレフトマーフン注列:/m·g·らかね」	L/ T]
		+
		+
		-
		+
		-
		+
		+
	+	+
		-
		igspace
		+
	+	+

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

<u> </u>	
	L

	1

i
· I
·
·
i

Ī
i
·
i
П

i
· I
·
·
i

Ī
i

·
i
П

i
· I
·
·
i

Ī
i
·
·
i
П

i
· I
·
·
i

Ī
i
·
·
i
П

i
· I
·
·
·
i

Ī
i

·
i
П

1
· I
·
·
i

Ī
i
·
i
П

1
· I
·
·
·
i

Ī
i
·
·
i
П

1
· I
·
·
i

Ī
i
·
i
П

ı	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

ı	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

ı	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

ı	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

ı	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

ı	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

ı	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

ı	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

1
1
1