

脳動脈瘤コイル塞栓術を受けられる患者さんへ（入院診療計画書）

	入院～治療前日	治療当日		治療後1日目	治療後2日目	治療後6日目
		治療前	治療後			
治療 処置		あなたの治療は 午前・午後の()番の 予定です。				<div>退院です。</div> <div>退院の手続きは 10～11時に 終了します。</div> <div>次回外来日を ご確認の上、 お帰りください。</div> 
注射 内服	毎日飲んでいるお薬を確認し、前日に看護師が一旦お預かりします。	手術前より点滴を開始します。治療直前に安定剤の筋肉注射をします。	持続点滴中です。	持続点滴中です。 朝から内服を再開します。 (血糖のおくすりは昼から再開します)	点滴が終了したら針を抜きます。	
検査	レントゲン・心電図・血液検査など、治療に必要な検査を行います。		看護師が意識状態や出血・麻痺の有無などを確認するため何度も訪室いたします。	術後の検査があります。 (内容についてはその都度説明します)		
安静	歩行できます。	筋肉注射の後は ベッド上安静です。	治療後はベット上安静です。足を曲げることができません。4時間後圧迫解除になれば、ベット上で動くことができます。	病棟内歩行できます。 		
食事	治療前日22時より絶飲食です。	絶飲食です		昼から食事ができます。		
清潔	男性(月・水・金)/女性(火・木・土)が入浴日です。検査前日に足の付け根の毛を剃り、入浴していただきます。	入浴できません。検査着と病院用使い捨てパンツに着替えます。		入浴できません。検査着を着替えます。	入浴できます。	
排泄			治療の日はおしっこの管が入っています。	おしっこの管を抜きます。		
説明	・担当医より治療について詳しい説明が あります。	メガネ・入れ歯・指輪・コンタクトレンズ・ネックレスなどははずしてください。マニキュア・化粧はしないでください。貴重品はセーフティボックスに入れてください。	当日は集中治療室(ICU)に入室予定ですが状態によって変更になる場合もあります。	問題なければ病棟に戻ります。		
			医師より結果説明があります。			

* 病名や経過などは入院時に考えられるものであり、状況により予定が変更になる場合があります。