0	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	
	1%ディブリバン注ーキット(500mg50mL)	【注】		アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	
	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	[外]		アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	
	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】		アミサリン注100mg	
	5-FU注1000mg(20mL)	【注】		アミゼットB輸液 200mL	
	5-FU注250mg(5mL) ACD-A液 (注射:500mL)	【注】		アミティーザカブセル24μg アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	
	Dーソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】		アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	
	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】		アミノレバン点滴静注(200mL袋)	
	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】		アミノレバン点滴静注(500mL袋)	
	EPLカプセル250mg	【内】		アムバロ配合錠「サンド」	
	GSプラスターC「ユートク」(7cm×10cm:10枚)	[外]		アムビゾーム点滴静注用50mg	
	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】		アムロジピンOD錠2. 5mg「ト-ワ」	
	HMGテイゾー75(注射用)	【注】		アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	
4	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】	99	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	
5	LHーRH注0.1mg「タナベ」(1mL)	【注】	100	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	
6	⊢メントール * (健栄)(末)	【内】	101	アラセナーA点滴静注用300mg	
7	MSコンチン錠10mg	【内】	102	アラセナーA軟膏3%(5g)	
8	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】	103	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	
	PA・3-ド点眼・洗眼液(20mL)	【外】		アリクストラ皮下注2.5mg	
	SG配合顆粒(1g/包)	【内】	105	アリクストラ皮下注5mg	
	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】		アリクストラ皮下注7.5mg	
	アーガメイト20%ゼリー25g	【内】		アリムタ注射用100mg	
	アーテン錠(2mg)	【内】		アリムタ注射用500mg	
	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	[外]		アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	
	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	[外]		アルケラン錠2mg	
	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	【外】		アルケラン静注用50mg	
	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】		アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	
	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】		アルト原末(パウダー:1g)	
	アカルボース錠100mg「サワイ」	[内]		アルト原末(パウダー: 500mg)	
	アクアチムクリーム1%(10g) アクトシン・砂・奈・204(20g)	【外】		アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」	
	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】		アルファカルシドール錠1.0μg	
	アウトネル錠75mg アウプラ静注用10mg	【内】		アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包) アルブミナー5% 静注12.5g/250mL	
	アウプラ静注用50mg アウプラ静注用50mg	【注】		アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	
	アクランノ注射用20mg	【注】		アルプロスタジル注10 μgシリンジ「F」	
	アコアラン静注用600	【注】		アルプロスタジル注 5 μgシリンジ「F」	
	アコファイド錠100mg	【内】		アルロイドG内用液5%	
	アザルフィジンEN錠500mg	[内]		アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL)	
	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】		アレビアチン散10%(100mg/g)	
	アシクロビル錠200mg「テバ」	[内]		アレビアチン錠100mg	
	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	[内]		アレロックOD錠5	
	アジルパ錠20mg	[内]		アレンドロン酸錠35mg「日医工」	
	アズノールうがい液4%10mL	【外】		アロキシ静注0.75mg(5mL)	
	アズノール軟膏0.033%	[外]		アロプリノール錠100mg「サワイ」	
	アスパラ-CA錠200(1.3mEq)	[内]		アロンアルファA「三共」(0.5g)	
	アスパラカリウム錠300mg	【内】		アンサー皮下注20 μg	
	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】		アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	
	アスペリン錠10	【内】	133	アンテベートローション0.05%(10g)	
	アセチルシステイン内用液17.6%「ショーワ」(20mL瓶)	【内】	134	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「ト-ワ」	
	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】	135	アンペック坐剤10mg	
	アセトキープ3G注 (500mL)	【注】	136	イーケプラ錠500mg	
	アセリオ静注液1000mg/「ッグ	【注】	137	イーケプラドライシロップ50%	
	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】	138	イーケプラ点滴静注500mg	
	アゾセミド錠60mg	【内】	139	イオウ・カンフルローション	
	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】	140	イオパーク300注シリンジ100mL	
	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】	141	イオパーク350注 100mL	
	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】	142	イオパーク350注 20mL	
	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】	143	イオパーク350注 50mL	
	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】		イオパーク350注シリンジ70mL	
	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】		イオパミロン注300 100mL	
	アデホスーLコーワ注 20mg	【注】		イオパミロン注300 20mL	
	アデホスコーワ顆粒10%	【内】		イオパミロン注300 50mL	
	アトーゼット配合錠HD	[内]		イオパミロン注300シリンジ100mL	
	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	[外]		イオパミロン注370 100mL	
	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	[内]		イオパミロン注370 20mL	
	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】		イオパミロン注370 50mL	
	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】		イオパミロン注370シリンジ100mL	
	アナストロゾール錠1mg「NK」 アナペイン注2mg / ml 100ml	【内】		イオパミロン注370シリンジ65mL イオパミロン注370シリンジ80ml	
	アナペイン注2mg/mL 100mL アナペイン注7.5mg/mL 10mL	【注】		イオパミロン注370シリンジ80mL イオメロン350注シリンジ100mL	
	アニュイティ100 µgエリプタ30吸入用	【外】		14オロン350注シリンジ135mL	
	アニュイティ 100 位 g g 1 9 2 9 3 0 吸入用 アネキセート注射液0.5mg(5mL)	【注】		イグザレルトOD錠10mg	
	アネメトロ点滴静注液 500mg	【注】		イグザレルトOD錠15mg	
	アネレム静注用50mg	【注】		1 フラレル T-O D	
	アノーロエリプタ 30吸入用	[外]		イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	
	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	【注】		イスコチン錠100mg	
	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	【注】		イソコロナールRカプセル20mg	
	アフィニトール錠5mg	【内】		イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	
	アブストラル舌下錠100μg	[内]		イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	
	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	[内]		イソソルビド内用液70%「CEO」	
	アプレピタントカプセル125mg「NK」	[内]		イソビスト注240 10mL	
	アプレピタントカプセル80mg「NK」	[内]		イソビスト注300 10mL	
	アマージ錠2. 5 mg	[内]		イダマイシン静注用5mg	
	アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「日医工」	[内]		イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	
				イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】		エルネオパNF2号輸液 1000mL	【注】
	イナビル吸入粉末剤20mg	【内】		エルネオパNF2号輸液 1500mL	【注】
	イニシンク配合錠	【注】		エルプラット点滴静注液100mg	【注】
	イノバン注100mg(5mL) イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【外】 【内】		エルブラット点滴静注液50mg エレジェクト注シリンジ (2mL)	【注】
	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	[内]	261	エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm)	[外]
	イマジニール300注 20mL	【注】		エレファワイパーEI W (消毒綿4cm×4cm)	[外]
178	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】	263	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
179	イミダブリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】	264	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
	イムノブラダー膀注用40mg	【注】		エンタカポン錠100mg「アメル」	【内】
	イムラン錠50mg	[内]		エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	[内]
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「ホスピーラ」 イリボーOD錠 5μg	【注】		エンドキサン錠 50mg エンレスト錠100mg	【内】 【内】
	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	[内]		オイパロミン300注シリンジ100mL	[注]
	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】		オイパロミン370注シリンジ100mL	[注]
	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】	271	オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
187	インデラル錠10mg	【内】	272	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】		オイパロミン注300 100mL	【注】
	インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g)	[外]		オイパロミン注300 20mL	【注】
	インドメタシン坐剤25「NP」	[外]		オイパロミン注300 50mL	【注】
	インドメタシン坐剤50「NP」 イントラリポス輸液20% 100mL	【外】		オイパロミン注370 100mL オイパロミン注370 20mL	【注】
	インフルエンザHAワクチン「ピケンHA」 1mL	【注】		オイパロミン注370 50mL	【注】
	ヴィーンD輸液 500mL	【注】		オイラックスHクリーム(5g)	[外]
	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	[内]		オイラックスクリーム10%(10g・500g)	[外]
196	ウテメリン錠5mg	【内】	281	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】		オーキシス9 μgタービュヘイラー60吸入	[外]
	ウブレチド錠5mg	[内]		オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	[内]
	ウルソデオキシコール酸錠100mg	[内]		大塚生食注(1上広口開栓)	[外]
	ウルティブロ吸入用カプセル	【外】 【外】		オキサロールローション25 μ g/g(10g)	[外]
	ウレパールローション10%(20g) ウログラフイン注60%(20mL)	【注】		オキサロール軟膏25 μ g/g(10g)	【外】 【内】
	ウロナーゼ静注用6万単位	【注】		オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	[内]
	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	[外]		オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	[内]
205	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】	290	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
206	エイゾプト懸濁性点眼液1%	[外]	291	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」	【内】
	エイベリス点眼0.002%	[外]		オキナゾール膣錠600mg	[外]
	エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」(1.5g/包)	[内]		オキノーム散2. 5mg	【内】
	エキザルベ エクザール注射用10mg	【外】		オキノーム散5mg オキファスト注10mg	【内】
	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】		オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	【注】
	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】		オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
213	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】	298	オゼンピック皮下注0.25mgSD	【注】
214	エクセグラン散20%	【内】	299	オゼンピック皮下注0.5mgSD	【注】
	エクセグラン錠100mg	【内】		オゼンピック皮下注1.0mgSD	[注]
	エクメット配合錠HD	[内]		オノアクト点滴静注用 50mg	【注】
	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 エサンブトール錠250mg	【外】 【内】		オビソート注射用0.1g(100mg1管) オフサグリーン静注用 25mg	【注】
	エストラーナテープ0.72mg	【外】		オプソ内服液10mg(5mL)	【内】
	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】		オプソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
221	エストリール錠1mg * (持田)	【内】	306	オプチレイ350注シリンジ100mL	【注】
222	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】	307	オプチレイ350注シリンジ135mL	【注】
	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】		オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	[内]		オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
	エタノール「マルイシ」 エガラボン点 海熱汁液 パッグ 2000-「日医エリ	[外]		オムニスキャン静注32%シリンジ15mL オムニパーク300注シリンジ 100mL	【注】
	エダラボン点滴静注液バッグ 30mg「日医工」 エチゾラム錠O. 5mg「トーワ」	【注】 【内】		オムニハーク300注シリンシ 100mL オムニパーク350注シリンジ 70mL	【注】
	エディロールカプセル0.75 μ g	[内]		オメプラゾール注射用 20mg「日医工」	【注】
	エトドラク錠 200mg「SW」	[内]		オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL	[外]
230	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】	315	オラネジン消毒液1.5%	【外】
	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	[内]		オリブ油 * (丸石)	【外】
	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	[内]		オルケディア錠1mg	[内]
	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】		オルケディア錠2mg	[内]
	エネーボ配合経腸用液 エネファクー 注腸粉(400g)	【内】		オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	[注]
	エネマスター注腸散(400g) エパルレスタット錠 50mg「ファイザー」	【外】 【内】		オルテクサーロ腔用軟膏0.1% オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【外】 【内】
	エバリファイ錠6mg	[内]		オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	[内]
	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】		オングリザ錠2.5mg	[内]
	エフィエントOD錠20mg	[内]		オンコビン注射用1mg	[注]
240	エフィエント錠 3.75mg	[内]	325	カイトリル錠2mg	【内】
	エフィエント錠2.5mg	[内]		カイトリル注1mg	【注】
	エフピー〇D錠2.5	[内]		ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)	[注]
	エプランチルカプセル15mg エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】 【内】		ガスター注射液20mg(2mL) ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【注】
	エベリソン温酸塩凝50mg(トー・ソ) エホチール注10mg(1mL)	[注]		カストログフノイン絵口・注腸用(液剤:TOUML) カチーフN錠5mg	[内]
	エリキュース錠 5mg	[内]		カデーブへ続きmg カデチア配合錠HD「あすか」	[内]
	エリキュース錠2.5mg	[内]		カデックス軟膏0.9%	[外]
248	エリスロシン錠200mg	【内】	333	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
249	エリル点滴静注液30mg(2mL)	【注】		ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
	エルカトニン注40単位(1mL)「NP」	【注】		ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
	エルカルチンFF錠 250mg	[内]		カナグル錠100mg	【内】
	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	[注]		カナマイシンカプセル250mg「明治」	[内]
	エルシトニン注20Sディスポ(1mL) エルネオパNF1号輸液 1000mL	【注】		ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
					[内]
	エルネオ/ NF1号輸液 1500mL エルネオ/ NF1号輸液 1500mL	【注】		カペキサートメンル酸塩注射用500mg「ザリイ」 カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
	カベルゴリン錠0. 25mg「サワイ」	【内】	•	ケイセントラ静注用500	【注】
	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】		ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
	カリジノゲナーゼ錠 50単位「ト-ワ」	【内】		ケーサプライ錠600mg	【内】
	カリメート散(5g/包) カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【内】 【外】		ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg	【外】 【内】
	カルセド注射用20mg	【注】		ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
	カルセド注射用50mg	【注】		ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】		ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
349	カルデナリンOD錠1mg	【内】	434	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
350	カルデナリンOD錠2mg	【内】	435	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
	カルパゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】		ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】		ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	【内】 【内】		ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】		ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 ケンエーG浣腸液50% 120mL	【注】 【外】
	カルベジロール錠 10mg「サワイ」	[内]		ケンエーG浣腸液50% 60mL	【外】
	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	[内]		ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
358	カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】		献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
359	カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】	444	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
360	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】	445	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「イワキ」 (10g)	【外】
361	カルボシステイン錠500mg「ト-ワ」	【内】	446	コアテック注5mg(5mL)	【注】
	カルボシステインドライシロップ50%「テバ」	[内]	447	コアヒビター注射用10mg	【注】
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】		コアヒビター注射用50mg	【注】
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL) カロナール細粒50%	【注】		コアベータ静注用12.5mg ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【注】
	カロナール細粒50% カロナール錠200	【内】 【内】		コーショーMHS TFXオートティスペンサー用カートリッシ タッチフリー式(液:1200mL) ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】 【外】
	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	[内]		コーショーMHS (液: 215mL) コートリル錠10mg	【外】
	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	[注]		コスパン錠80mg	【内】
	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】		コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
	キシロカインゼリー2% 30mL	[外]		コメリアンコーワ錠50	【内】
371	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】	456	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	[外]	457	コレクチム軟膏0.5%(5g)	【外】
	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】		コロネル細粒83.3%	【内】
	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】		コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】		コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL) キャブピリン配合錠	【注】		コンプラビン配合錠 サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューニット15.2cm×22.9cm)	【内】 【外】
	キュビシン静注用350mg	【注】		サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm × 22.9cm)	【外】
	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】		ザイザルシロップ 0.05%	【内】
	キロサイド注20mg(1mL)	【注】		サイトテック錠200	【内】
	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】		サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
382	キンダリー透析剤3E	【注】	467	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
383	キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶	【注】	468	サクシゾン静注用1000mg	【注】
	キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶	【注】		サクシゾン注射用100mg	【注】
	グーフィス錠5mg	[内]		サクシゾン注射用300mg	【注】
	クエチアピン錠 25mg「トーワ」	【内】		ザクラス配合錠HD	【内】
	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】 【内】		サテニジン液10(500mL) サニサーラW(250mL)	【外】 【外】
	グラクティブ錠50mg	[内]		サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mLキット	【注】
	クラシェ猪苓湯エキス細粒[EK-40] 2.0g	[内]		サムスカOD錠7.5mg	【内】
	クラシエ補中益気湯エキス細粒[EK-41] 2.5g	【内】		サラジェン錠5mg	【内】
392	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒[EK-68] 2.0g	【内】	477	サラゾピリン錠500mg	【内】
393	グラナテック点眼液 0.4% (5mL)	【外】	478	サルパラ液	【外】
	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	【注】		ザルコニン液0.05 (500mL)	【外】
	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】		ザルコニン液10 (10% 500mL)	【外】
	クラフォラン注射用1g	【注】		ザルティア錠 5mg	【内】
	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】		サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」 グランダキシン錠50	【内】 【内】		ザロンチンシロップ(50mg/mL) サンコバ点眼液0.02%(5mL)	【内】 【外】
	グラン注射液M300(0.7mL)	【注】		サンディミュン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
	クリアクター静注用80万	【注】		サンドールP点眼液(5mL)	【外】
	グリクラジド錠40mg「サワイ」	【内】		サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
403	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】	488	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
	グルセレブ点滴静注 (200mL)	【注】		ジアグノグリーン注 25mg	【注】
	グリチロン配合錠	[内]		ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
	グリベック錠100mg	【内】		ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	[内]		ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】		ジェイゾロフトOD錠 25mg ジェニナック錠200mg	【内】 【内】
	グリンダマイソングン酸エステル注射液600mg「リック1」 グルカゴンGノボ注射用1mg	[注]		ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】		ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
	グルトパ注1200万単位	【注】		ジクアス点眼液3%(5mL)	【外】
413	グルベス配合OD錠	【内】		シグマビタン配合カプセルB25	【内】
414	グレースビット錠50mg	【内】	499	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」50g	【外】
	クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL)	[<i>5</i> h]		ジクロフェナクNa徐放力プセル37.5mg「トーワ」	【内】
	クレメジン速崩錠500mg	[内]		ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】		ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
	クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠75mg「SANIK」	【内】 【内】		ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】 【外】
	クロマイ膣錠100mg	[外]		シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
	クロミッド錠50mg	【内】		シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	[外]		ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」	[内]		ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
	プロルマンノノBF酸工人アル蜒25iligi ロ 医工」	F 17			
423	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	[内]	509	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	【注】

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	
	ジピリダモール錠25mg「日医工」	[内]		ソタコール錠40mg	【内】
	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「日医工」	[内]		ソナゾイド注射用 16 μ L	【注】
	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	【内】		ゾビラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
	シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」 シベクトロ錠200mg	【注】	599 600	ゾビラックス軟膏5%(5g) ソフラチュール貼付剤10cm	【外】 【外】
	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】	601	ゾフルーザ錠20mg	[内]
	シベレスタットNa点滴静注用 100mg「F」	【注】		ゾラデックス1.8mgデポ	【注】
518	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	[内]	603	ゾラデックス3.6mgデポ	【注】
519	シムビコートタービュヘイラー60吸入	【外】	604	ゾラデックスLA10.8mgデポ	【注】
520	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】	605	ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
	ジャディアンス錠 10mg	【内】		ソルアセトF輸液 500mL	【注】
	ジャドニュ顆粒分包360mg	[内]		ツルデム1輸液 200mL	【注】
	ジャドニュ顆粒分包90mg シュアポスト錠0.5mg	【内】		ソルデム1輸液 500mL ソルデム3A輸液 200mL	【注】
	酒石酸「ケンエー」	[5]		ソルデム3A輸液 500mL	【注】
	静注用マグネゾール20mL	[注]		ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	[内]
	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	[内]		ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
528	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】	613	ダーブロック錠2mg	【内】
529	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】	614	ダーブロック錠4mg	【内】
530	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	[内]	615	ダーブロック錠6mg	【内】
	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】		ダイアモックス注射用500mg	【注】
	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】		ダイアモックス錠250mg	【内】
	シンピット静注用50mg	【注】		ダウノマイシン静注用20mg	【注】
	スインプロイク錠0.2mg スープレン吸入麻酔液	【内】 【外】		ダカルバジン注用100 タケキャブ錠 10mg	【注】 【内】
	スコピゾル眼科用液 15mL	[外]		タケキャブ錠 10mg	[内]
	スタデルムクリーム5%(10g)	[5h]		タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	[外]
	スタレボ配合錠L100	[内]		タシグナカプセル150mg	[内]
	スチブロン軟膏0.05%(5g)	[5]		タシヴナカプセル200mg	[内]
540	ステリクロンR液0.1 (500mL)	【外】	625	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	【注】
	ステリクロンR液0.5(500mL)	[外]		タフマックE配合カプセル	【内】
	ステリクロンW液0.02 (500mL)	【外】		タプロス点眼液0.0015%(2.5mL)	【外】
	ステリクロンW液0.05 (500mL)	[外]		タプロスミニ点眼液0.0015% (0.3mL)	【外】
	ステリスコープ3W/V%液	[外]		タミフルカプセル75	【内】
	ステリハイド20W/V%液 500mL(消毒剤原料) ストロカイン錠5mg	【外】 【内】		タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1 mg「サワイ」 ダラシンTゲル1%(10g)	【内】 【外】
	ストロメクトール錠3mg	[内]		タリピッド眼軟膏0.3%(3.5g)	[9h]
	スピール膏M(貼付薬)	[<i>f</i> h]		タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	[外]
	スピオルトレスピマット 60吸入用	[外]		ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
550	スピリーバ2.5 µgレスピマット60吸入	【外】	635	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
551	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	【内】	636	タンデトロン注射用20 (20 μ g)	【注】
	スペニールディスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】		タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
	スポンゼル(5cm × 2.5cm)	【外】		ダントリウム静注用20mg	【注】
	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	[内]		タンニン酸アルブミン(末)	【内】
	スミスリンローション 5% (30g) スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【外】		チアプリト錠25mg「サワイ」 チウラジール錠50mg	【内】 【内】
	スミルスチック3% 40g	【外】		チェクール点滴用O. 5g	[注]
	スミルローション3%	[外]		チオラ錠100	[内]
	スルバシリン静注用 1.5g	【注】		チガソンカプセル10	【内】
560	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	[内]	645	チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	【内】
561	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】	646	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)	【注】		チニタゾール錠500mg「F」	【内】
	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】		チモプトールXE点眼液0.5%(2.5mL)	【外】
	生理食塩液パッグ「フソー」1500mL	【注】		チャンピックス錠0.5mg	【内】
	セキソビット錠100mg セポラット - P細粒204(10mg-0.5m/句)	【内】		チャンピックス錠1mg 注射用水PL「フソー」(20mL)	【内】
	セパミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包) ゼピアックスローション 2% (10g)	[5h]		注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	[注]		チラーヂンS錠25 μ g	[内]
	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】		チラーヂンS錠50 μ g	[内]
	セファメジンα 点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】	655	チロナミン錠 5mcg	【内】
571	セファランチン末1%(10mg/g)	[内]		沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[内]
	ゼフィックス錠100	【内】		つくUA・M配合散(1.3g/包)	【内】
	セフォチアム静注用1gパッグ「日医工」	【注】		ツムラ 乙字湯ェキス顆粒(医療用) [No.3] 2.5g	【内】
	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	【注】		ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17] 2.5g	【内】
	セフカペンピポキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	[内]		ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)[No.34]3.0g	[内]
	セフジトレンピボキシル小児用細粒10% セフジトレンピボキシル錠 100mg 「サワイ」	【内】		ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[No.16] 2.5g ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[No.62]2.5g	【内】 【内】
	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	[内]		ツムラが風通至和エイス積極(医療用)[NO.02]2.3g	【外】
	セフタジジム静注用1g「マイラン」	【注】		ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)[No.61] 2.5g	[内]
	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工	【注】		ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)[No15] 2.5g	[内]
581	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】	666	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)[No.106] 2.5g	【内】
	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[54]		ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[No.24] 2.5g	【内】
	セララ錠25mg	[内]		ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[No.1] 2.5g	[内]
	セララ錠50mg	【内】		ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[No.107] 2.5g	【内】
	セルシン注射液10mg(2mL)	【注】		ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[No.18] 2.5g	【内】
	セルニルトン錠63mg ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)	[外]		ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)[No.25] 2.5g ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)[No50] 2.5g	【内】 【内】
	セルノルム(始付: 100mm×125mm) セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	【外】		ツムフ刑介連翹湯エキス顆粒(医療用)[No.31] 2.5g	[内]
	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	[内]		ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[No.12] 2.5g	【内】
	セレジストOD錠5mg	[内]		ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[No.10] 2.5g	[内]
	セレスタミン配合錠	[内]		ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)[No.114] 3.0g	【内】
592	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】	677	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[No.48] 2.5g	【内】
	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	[内]		ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[No.19] 3.0g	[内]
594	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】		ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)[No108] 3.0g	【内】
	ソセゴン注 15mg	【注】		ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[No.100] 2.5g	【内】

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)[No.47] 2.5g	[内]		トリキュラー21(錠 21日分1組)	[内]
	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒(医療用)[No.38] 2.5g	【内】 【内】		トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 トリプタノール錠10	【内】 【内】
	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[No.23]2.5g ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[No.29]3.0g	[内]		トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	[内]
	ツムラハ味地黄丸エキス顆粒(医療用)[No.7] 2.5g	[内]		ドルミカム注射液10mg2mL	[注]
686	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)[No.37] 2.5g	【内】	771	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)	[外]
	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[No.14] 2.5g	[内]		トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	【注】
	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[No.54]2.5g ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[No.43]2.5g	【内】		トレーランG液75g(液:225mL) トレシーバ注フレックスタッチ	【内】 【注】
	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	[外]		ドレニゾンテープ4 μ g / cm2	【外】
	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	[外]		トレリーフOD錠 25mg	【内】
	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】		ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)	[外]		トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	[内]
	ディナゲスト錠1mg ディビゲル1mg(ゲル)	【内】 【外】		ナウゼリンOD錠10 ナウゼリン坐剤60	【内】 【外】
	ディフェリンゲル0.1%(15g)	[外]		ナフトピジルOD錠25mg「EE」	[内]
	ディレグラ配合錠	【内】	782	ナベルビン注10(1mL)	[注]
	デエビコ錠5mg	【内】		ナベルビン注40(4mL)	[注]
	テオドール錠100mg テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」	【内】		ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL) ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
	テオロング錠200mg	[内]		ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
702	デカドロン錠0.5mg	【内】	787	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
	デキサート注射液3.3mg	【注】		ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】
	デキサンVG軟膏 0.12% (日医工)	【外】		ニコランジル錠5mg「サワイ」	[内]
	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ	【内】		ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
	デザレックス錠5mg	[内]		ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	[内]
	デスモプレシン・スプレー2. 5協和(125μg1瓶)	[外]		ニトプロ持続静注液6mg2mL	【注】
	テタノブリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】		ニドラン注射用50mg	[注]
	デトキソール静注液2g(20mL) テネリアOD錠20mg	【注】		ニトロール注5mgシリンジ(10mL) ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)	【注】
	デノシン点滴静注用500mg	【注】		ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	【注】
713	テノゼット錠 300mg	【内】	798	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	【注】
	デパケンシロップ5%(50mg/mL)	[内]		ニトロペン舌下錠0.3mg	【内】
	テプレノンカプセル50mg 「サワイ」 テプレノン細粒10%「サワイ」	【内】 【内】		ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
	ブランフ 加加 10 90 1 9 7 1] デベルザ錠20 mg	[内]		ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」	【内】
	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	[外]		ニフェジピンカプセル10mg	[内]
719	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	【内】	804	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	[内]
	デュファストン錠 5mg	【内】		ニュープロパッチ13.5mg	[外]
	テラムロ配合錠AP「DSEP」 テラルビシン注射用10mg	【内】		プロパッチ4. 5mg プロパッチ9mg	【外】 【外】
	テリルジー100エリプタ	[外]		ネイリンカプセル100mg	[内]
724	テリルジー200エリプタ30吸入用	【外】	809	ネオアミユー輸液 200mL	【注】
	テルチア配合錠AP「DSEP」	[内]		ネオーラル10mgカプセル	[内]
	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」 テルビナフィン錠125mg「サワイ」	【外】 【内】		ネオーラル25mgカプセル ネオーラル50mgカプセル	【内】
	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[内]		ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	【外】
729	デルモベートスカルプローション0.05%(10g)	【外】	814	ネオシネジンコーワ注1mg	【注】
	デルモベート軟膏0.05%(5g)	【外】		ネオピタカイン注 5mL	【注】
	テルモ生食 250mL(注射用)	【注】		ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
	テレミンソフト坐薬10mg トアラセット配合錠「トーワ」	[内]		ネオベノール点眼液0.4%(15mL) ネキシウムカプセル20mg	【外】 【内】
	動注用アイエーコール100mg	[注]		ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	[内]
735	トーワチーム配合顆粒	【内】	820	ネクサバール錠200mg	【内】
	ドキシル注 20mg	[注]		ネスプ注射液120μgプラシリンジ	[注]
	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】		ネスプ注射液180 μgプラシリンジ ネスプ注射液20 μgプラシリンジ	【注】
	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	[内]		ネスノ注射液40μgプラシリンジ	[注]
	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	[内]		ネスプ注射液60 μgプラシリンジ	【注】
	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	[注]		ネリゾナソリューション0.1%(10mL)	【外】
	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 ドネペジル性酸性 OD錠3mg「明治」	【注】		ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g) ネリプロクト坐剤	【外】
	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】 【内】		ネリフロクト坐剤 ノイトロジン注100μg	【外】 【注】
	ドパコール配合錠L100	[内]		ノイトロジン注250μg	[注]
746	ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】	831	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】
	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】		ノイロトロピン錠4単位	[内]
	トピナ錠50mg トプシムクリーム(5g)	【内】 【外】		ノーベルバール静注用250mg ノバスタンHI注10mg	【注】
	トプンムグリーム(og) ドプスOD錠100mg	[内]		/バミン筋注5mg(1mL 1管)	[注]
	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	[注]		/パミン錠5mg	[内]
	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】		ノパントロン注10mg(5mL)	【注】
	ドブポン注0.3%シリンジ	[注]		ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	[注]
	ドボベット軟膏 (15g) トラセミドOD錠4mg「TE」	【外】 【内】		ノボラピッド注フレックスタッチ ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
	トラゼンタ錠 5mg	[内]		ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	[注]
757	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	【内】	842	ハーセプチン注射用150	【注】
	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】		ハーセプチン注射用60	[注]
	トラネキサム酸カプセル 250mg 「トーワ」 トラパタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【内】 【外】		ハーフジゴキシンKY錠0.125 パーロデル錠2.5mg	【内】
	トラマールOD錠 25mg	[内]		バーロアル錠2.5mg バイアスピリン錠100mg	[内]
	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	[外]		ハイカムチン注射用1.1mg	[注]
	ドラマミン錠50mg	[内]		ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
	トランコロン錠 7.5mg	【内】		ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
	トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」	【内】	850	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】		ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
	//イシー顆粒25%(250mg/g/包)	[内]		ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
	ハイゼット錠50mg	[内]		<u> </u>	【注】
	ハイドレアカプセル500mg	【内】 【外】	939	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL) パキシルCR錠12.5mg	[内]	940	ピラノア錠20mg ピラマイド原末	【内】 【内】
	パキシルCR錠25mg	【内】		ビリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
	パクタ配合錠	[内]		ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」	【内】
859	パクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】	944	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「トーワ」	【内】
860	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】	945	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」	【内】
861	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】	946	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
	パタノール点眼液0.1%	【外】		ピレーズトリエアロスフィア56吸入用	【外】
	パックス発泡顆粒	[外]		ファーストシン静注用1g	【注】
	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】	949	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
	バファリン配合錠A330	[内]		ファルモルビシン注射用10mg	【内】
	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶 パム静注500mg(20mL)	【注】		ファンガード点滴用50mg ファンギゾンシロップ 100mg/mL	【注】
	バムネターS200(水性懸濁液)(150mL)	[内]		フィコンパ錠2mg	【内】
	パラシクロビル錠500mg「アスペン」	[内]		フィジオ140輪液 500mL	【注】
	パラミヂンカプセル300mg	[内]		フィニバックス点滴静注用0.25g	【注】
871	パリエット錠 5mg	【内】	956	ブイフェンド200mg静注用	【注】
872	パリエット錠10mg	【内】	957	ブイフェンド錠50mg	【内】
873	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	[内]	958	フィブラストスプレー500	【外】
	パルサルタン錠 40mg 「サンド」	[内]		フィブロガミンP静注用(4mL)	【注】
	パルサルタン錠 80mg「サンド」	[内]		フィルグラスチムBS注 75 µgシリンジ「モチゲ」	【注】
	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg 「トーワ」	[内]		フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「ト-ワ」	[内]		フェジン静注40mg(2mL)	【注】
	パレイショデンプン(末)	[内]		フェソロデックス筋注250mg	【注】
	バロス消泡内用液2%(300mL)	【内】		フェノール・亜鉛華リニメント	【外】
	ハロペリドール錠1 mg「アメル」 ハロペリドール注5 mg「ヨシトミ」(1 mL)	【内】 【注】		フェノバルビタール散10%「マルイシ」(100mg/g) フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】 【内】
	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイサー」	[内]		フェブリクショー・Medoling・氏面 ケハコ	【内】
	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「ファイザー」	[注]		フェブリン錠20mg	【内】
	パンテチン錠 100mg「YD」	[内]		フェロ・グラデュメット錠105mg	[内]
	パンテニール注100mg「JG」(1mL)	[注]		フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」	【注】
886	ハンプ注射用1000	【注】	971	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	【注】
887	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】	972	フェントステープ0.5mg	【外】
888	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】	973	フェントステープ1mg	【外】
889	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】	974	フェントステープ2mg	【外】
890	ピーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】	975	フェントステープ4mg	【外】
	ピーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】		フォシーガ錠 10mg	【内】
	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】		フォシーガ錠 5mg	【内】
	ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】		フォリアミン錠(5mg)	【内】
	ピーソフテンローション0.3% (50g)	[外]	979	フシジンレオ軟膏2%(10g) ブシラミン錠100mg「トーワ」	【外】
	ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輸液 (500mL)	【内】 【注】	980	ブラフェン錠「UUIIIg! ドーツ」 ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	【内】 【内】
	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	[内]	982	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	【注】
	ピオスリー配合OD錠	[内]		プッシュ綿棒P(綿棒2本入)	[外]
899	ビオフェルミンR散(1g/包)	[内]		ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)	【注】
900	ビカーボン輸液 500mL	【注】	985	プラザキサカプセル110mg	【内】
901	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】	986	プラザキサカプセル75mg	【内】
902	ピクシリンカプセル250mg	【内】	987	フラジール内服錠250mg	【内】
	ピクシリン注射用1g	【注】		フラジール膣錠250mg	【外】
	ピクトーザ皮下注18mg	【注】		プラノバール配合錠	【内】
	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	[内]		フラビタン錠5mg	【内】
	ビジパーク270 100mL	【注】		プラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
	ビジパーク270 50mL	【注】		プランルカスト錠225「日医工」	【内】
	ビジパーク270注20mL ピシパニール注射用5KE	【注】		ブリウェル配合錠 LD プリズバインド静注液 2.5g 50mL	【内】
	ピスコート0.5眼粘弾剤	[外]		プリディオン静注200mg	【注】
	ビスダイン静注用15mg	[注]		プリモジアン・デボー筋注(1mL)	【注】
	ヒスロンH錠200mg	[内]		プリモボラン錠5mg	【内】
	ピソノテープ 2mg	[外]		フルオメソロン0. 1%点眼液	【外】
	ピソノテープ 4mg	[外]		フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
915	ピソノテープ 8mg	[外]	1000	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
916	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【内】	1001	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	[内]		フルスタン錠0.3	【内】
	ビダーザ注射用100mg	【注】		フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
	ピタジェクト注キット	【注】		フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(20mL)	【注】
	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	[内]		フルタイド100 μgエアゾール60吸入用	【外】
	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	[内]		フルダラ静注用50mg	【注】
	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL) ビタメジン静注用	【注】		フルツロンカブセル200 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【内】 【外】
	Cダメング静注用 ヒダントールF配合錠	【注】		フルニース・フルース・フルース・フルース・フルニース・フルニース・フルニース・フルニース・フルニース・フルニース・フルニース・フルニース・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン	【内】
	LFCRH静注用100μg「タナベ」	[注]		ブルフェン錠100	【内】
	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】		フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)	【注】
	ピピアント錠20mg	【内】		フルマリン静注用1g	【注】
	ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	[外]		ブレオ注射用15mg	【注】
	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	[外]		ブレオ注射用5mg	【注】
930	ヒビスコール液A0.5%	【外】	1015	フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」	【内】
931	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】	1016	ブレディニンOD錠50	【内】
	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】		プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	【内】
	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】		プレドニン錠5mg	【内】
934	ビムパット錠50mg	【内】		プレマリン錠0.625mg	【内】
	ピムロ顆粒(0.5g/包)	【内】	1000	プロイメンド点滴静注用150mg	【注】

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	
	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】		ベリプラストP コンピセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】		ペルサンチン-Lカプセル 150mg	【内】
	プログラフカプセル0.5mg	【内】		ペルジピンLAカプセル40mg	【内】
	プログラフカプセル1mg	【内】		ペルジピン注射液2mg2mL	【注】
	プログラフ注射液5mg(1mL) プログラフ顆粒0.2mg	【注】		ベルソムラ錠 15mg ベルソムラ錠 20mg	【内】
	プログラス級和U. 2mg プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】		ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】		ヘルペッサー注射用50(パイアル製品)	【注】
	プロジフ静注液400(5mL)	【注】		ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」	[内]
1030	フロジン外用液5%(30mL)	【外】		ペンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1031	プロスコープ300注100mL	【注】	1116	ペンタサ顆粒94% (1000mg/包)	【内】
1032	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】	1117	ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)	【内】
1033	プロスタンディン点滴静注用500 µg	【注】	1118	ポアラ軟膏0.12% (5g)	[外]
1034	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】		ポースデル内用液10 (液:10mg250mL)	【内】
	プロセキソール錠0.5mg	【内】		ホーリンV膣用錠1mg	[外]
	フロセミド注20mg「武田テハ・」	【注】		ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
	フロセミド錠20mg「NP」	【内】		ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
	フロセミド錠40mg「NP」 プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【内】		ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 ホスミシン錠500mg	【注】
	プロタノールS錠15mg	【内】		ポスミング 用液0.1%(100mL)	[外]
	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】		ポスミン注1mg(1mL)	【注】
	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	[内]		ホスリボン配合顆粒	【内】
	プロテアミン12注射液 200mL	【注】		ホスレノールOD錠250mg	【内】
	プロトピック軟膏0.1%(5g)	[外]		ボトックス注用50単位	【注】
	プロナーゼMS(0.5g)	[内]		ボナロン経口ゼリー35mg	[内]
	プロナーゼMS(10g)	【内】		ポナロン点滴静注バッグ900μg	【注】
1047	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg 「オーハラ」	【内】	1132	ポピドンヨードガーグル7%「マイラン」(30mL)	[外]
	プロハンス静注シリンジ 13mL	【注】		ポビドンヨード外用液10%「マイラン」(250mL)	[外]
	プロハンス静注シリンジ 17mL	【注】		ポピドンヨードゲル10%「マイラン」(90g)	【外】
	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	[内]		ポピドンヨードゲル10%「明治」(4g)	[外]
	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	【注】		ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	[外]
	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	【注】		ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」	【内】
	ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】 【外】		ポララミン注 5mg	【注】
	プロムフェナクNa点眼液O. 1%「日新」 プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	[外]		ポララミン錠2mg ポリドカスクレロール1%注2mL	[内]
	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】		ホリナート錠25g「タイホウ」	【内】
	プロメライン軟膏 * (ジェイドルフ)(20g)	[外]		ボルベン輸液6%	【注】
	フロリードゲル経口用2%(5g)	[内]		ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	[外]
	フロリード膣坐剤100mg	[外]		ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
	フロリネフ錠(0.1 mg)	【内】		ー ボンビバ静注1mgシリンジ	【注】
1061	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】	1146	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	【注】
1062	ペガシス皮下注180 µ g(1mL)	【注】	1147	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
1063	ペガシス皮下注90 µ g(1mL)	【注】	1148	マーロックス懸濁用配合顆粒	[内]
1064	ペガモックス点眼液0.5%(5mL)	【外】	1149	マイトマイシン注用10mg	【注】
	ヘキザックAL1%綿棒12	【外】		マイトマイシン注用2mg	【注】
	ペギンクリーム10% (20g)	[外]		マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」	【注】
	ペヴイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用	【注】		マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	【注】
	ペヴイントロン皮下注用50 μg/0.5mL用 ペサコリン散5%(50mg/g)	【注】		マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g)	【注】
	ベサノイドカプセル10mg	[内]		マクサルトRPD錠10mg	【内】
	ペザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	[内]		マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【注】
	ベシケアOD錠2.5mg	[内]		マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	【注】
1073	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】	1158	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	【注】
1074	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】	1159	マグミット錠330mg	【内】
1075	ヘスパンダー輸液 (注射:500mL)	【注】	1160	マグミット錠500mg	【内】
1076	ベセルナクリーム5%	【外】	1161	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)	[外]
	ペタニス錠25mg	【内】		マドパー配合錠	【内】
	ペタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「ト-ワ」	【内】		マブリン散1%(10mg/g)	【内】
	ペタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】		マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	[内]
	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】		マンニットールS注射液「YD」300mL	【注】
	ペチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」 ペニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【注】		ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミグリステン錠20	【外】 【内】
	ペニシビン温酸温疑 4mg 1 OME」 ペネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	[外]		ミグリ人テン疑20 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	[内]
	へパリンNa透析用500単位/mLシリンジ「NP」10mL(ロック用)	[注]		ミケルナ配合点眼液	[外]
	へパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	[注]		ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
	へ/『リンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】		ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	[外]
	ヘパリンNa注5千単位/5mL 「モチダ」	【注】		ミニプレス錠0.5mg	[内]
1088	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】	1173	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1089	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】	1174	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	[内]
	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】		ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内】
	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	[外]		ミヤBM細粒	【内】
	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	[外]		ミヤBM錠	[内]
	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)	【外】		ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
	ベピオゲル 2.5% (15g) ヘブスプリンIH静注1000単位	【外】		ミラペックスLA錠 1.5mg ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)	【内】 【注】
	ヘフスノウノIFIF注:1000単位 ヘプタバックスー II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】		ミルセラ注シリンジ200 µg(0.3mL)	[注]
	ペプリコール錠50mg	【内】		ミルセラ注シリンジ50 μg(0.3mL)	【注】
	ペポタスチンペシル酸塩OD錠10mg「タナペ」	[内]		ミルセラ注シリンジ250 μg	【注】
	ヘモポリゾン軟膏 (2g)	[外]		ミルセラ注シリンジ25 μg	【注】
1100	ペラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】		ミルトン 1L	【内】
1101	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】	1186	ミルリノン注22.5mgバック「タカタ」(150mL)	【内】
1102	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】	1187	ミンクリア内用散布液0.8%	[外]
	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】		ムコスタ点眼液UD2%	[外]
1104	ベリプラストP コンピセット 組織接着用 1mL 2キット1組	[外]		無水エタノール * 丸石 (液: 500mL)	【外】
	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】		無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
	メイロン静注8.4% 20mL	【注】		リフラップ軟膏5%(30g)	[外]
	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】		リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	[内]		リボトリール錠0.5mg	【内】
	メキタジン錠3mg「トーワ」 メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】		リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)	【内】
	メスチノン錠60mg	[内]		リュープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】		リュープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1198	メタライト250カプセル	【内】	1283	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	【注】
1199	メチコパール錠500 μg	【内】	1284	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	【注】
	メチコパール注射液500 μ g(1mL)	【注】		リリカOD錠25mg	【内】
	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」	【内】		リルのD錠75mg	【内】
	メトクロブラミド錠5mg「タカタ」 メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】		リルデック錠50	【内】
	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	[内]		リンデロン-VGローション(10mL) リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【外】
	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】		リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1206	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】	1291	リンデロン坐剤0.5mg	[外]
1207	メトリジンD錠2mg	【内】	1292	リンデロン坐剤1.0mg	[外]
	メナテトレノンカプセル15mg「TYK」	【内】		リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
	メノエイドコンビパッチ	[外]		リン酸Na補正液0. 5mmol/mL	[注]
	メプチンエアー10 µg吸入100回	[外]		ルセフ/錠5mg	【内】
	メプチン錠50μg メマンチンOD錠 20mg「DSEP」	【内】		ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL ルテスデポー注(1mL)	【注】
	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」	[内]		ルネスタ錠1mg	【内】
	メルカゾール錠5mg	[内]		ルパフィン錠10mg	【内】
	メロペネム点滴静注用 0.5g 「トーワ」	[注]		ルボックス錠25	[内]
	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	[内]		ルムジェブ注ミリオペン	【注】
	モビコール配合内用剤	[内]		ルリコンクリーム1%10g	[外]
	モビブレップ配合内用剤	[内]		レキソタン錠5	[内]
	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用	[外]		レキップCR錠2mg	[内]
	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】		レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL) モンテルカスト錠10mg「KM」	【注】 【内】		レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1300mL	【注】
	ヤーズ配合錠	[内]		レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
	薬用炭.OY(原末)	[内]		レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1225	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】	1310	レクサプロ錠10mg	[内]
1226	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】	1311	レザルタス配合錠HD	[内]
	ユービット錠100mg	【内】		レスタス錠2mg	【内】
	コナシン錠375mg	【内】		レスタミンコーワクリーム 1%	[外]
	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	[内]		レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
	ヨウ素「コザカイ・M」(末) ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】		レトロゾール錠2.5mg「サンド」 レナジェル錠250mg	【内】
	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	[注]		レバミピド錠100mg「サワイ」	[内]
	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	[内]		レビトラ錠5mg	【内】
	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	[内]		レペタン坐剤0.4mg	【外】
1235	ラステットSカプセル25mg	【内】	1320	レペタン注0.2mg(1mL)	【注】
1236	ラスピック錠75mg	【内】	1321	レベトールカプセル200mg	[内]
	ラスピック点滴静注キット150mg	【注】		レポセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	[外]		レポピスト注射用 2.5g	【注】
	ラニチジン錠150mg「トーワ」 ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	【内】		レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」 レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」	【内】 【外】
	ラニラピッド錠0.05mg	[内]		レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】		レポポリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
	ラミクタール錠100mg	【内】		レポホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
1244	ラミクタール錠25mg	【内】	1329	レミッチOD錠2. 5 μg	【内】
	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	[内]		レミニールOD錠4mg	[内]
	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	[内]		レミニールOD錠8mg	[内]
	ランタススR注ソロスター	【注】		レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
	リーパクト配合顆粒(4.15g/包) Lix+は 250mg	【内】		レメロン錠15mg L=+いけ田200mg(※軽落付 10ml)	【内】
	リオナ錠 250mg リオレサール錠5mg	【内】		レラキシン注用200mg(溶解液付 10mL) レルベア100エリプタ30吸入用	【注】
	リクシアナOD錠15mg	[内]		レルベア200エリプタ30吸入用	【外】
	リクシアナOD錠30mg	[内]		レルミナ錠40mg	[内]
	リクシアナOD錠60mg	[内]		ロイケリン散10%(100mg/g)	[内]
1254	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】	1339	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】
	リシノプリル錠10mg「ファイザー」	[内]		ロイスタチン注8mg(8mL)	[注]
	リスペリドンOD錠 1mg「トーワ」	[内]		ロイナーゼ注用5000	【注】
	リスミー錠2mg	[内]		ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	[内]
	リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】		ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
	リゾビスト注 (44.6mg1.6mL) リツキサン点滴静注100mg	【注】 【注】		ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 ロコアテープ (7枚/袋)	【注】
	リツキサン点滴静注100mg	【注】		ロコイドクリーム0.1%(5g)	[外]
	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	[注]		ロコイド教育0.1%(5g)	【外】
	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】		ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	[内]
	リドカインテープ18mg「YP」	[外]		ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「ファイザー」(5mL)	【注】		ロスーゼット配合錠HD	[内]
	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザ-」(10mL)	[注]		ロスパスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	[内]
	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザ-」(5mL)	[注]		ロスパスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
	リドカイン塩酸塩注射液 2%「ファイザー」(10mL) リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】		ロゼレム錠8mg ロトリガ粒状カプセル2g	【内】 【内】
	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】		ロピオン静注50mg	[注]
	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】		ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
	リパクレオンカプセル150mg	[内]		ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	[内]
	リピオドール480注10mL	[注]		ロルカム錠4mg	[内]
	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	[内]		ワーファリン錠1mg	【内】
	リフラップシート5%(1シート=25cm2×6枚)			ワーファリン錠5mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
		【注】
	ワイスタール配合点滴静注用1gパック ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
	ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg(1mL)	【注】
1366	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1367	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 µg(溶解液付)	【注】
1368	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25 µg(溶解液付)	【注】
	液状フェノール*(健栄)	【外】
	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	[内]
	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」 乾燥まむし抗毒素「KMB」(6000単位)	【注】
	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
	希ヨードチンキ「ニッコー」	【外】
1375	強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1376	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	【注】
1377	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	【注】
	献血ノンスロン1500注射用	【注】
	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」 硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
	新レシカルボン坐剤	【外】 【外】
	親水クリーム「ニッコー」	[外]
	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	[外]
	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1386	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】
	生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中口タイプ)	【注】
	生食注シリンジ「オーツカ」20mL (ルアーロックタイプ)	【注】
	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
	生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用) 生理食塩液PL「フソー」 2L(注射用)	【注】
	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1395	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1396	大塚生食注 100mL	【注】
	大塚生食注 500mL	【注】
	大塚生食注2ボート100mL	【注】
	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
	大塚糖液20% 20mL(注射用) 大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1404	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1405	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1406	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
	単シロップ*(丸石)	【内】
	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	[内]
	注射用イホマイド1g 注射用エンドキサン100mg	【注】
	注射用エンドキサン500mg	【注】
	注射用サイメリン50mg	【注】
	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1414	注射用ソル・メルコート125	【注】
	注射用ソル・メルコート40	【注】
	注射用ソル・メルコート500	【注】
	注射用フィルデシンクmg	【注】
	注射用フィルデシン3mg	【注】
	注射用プサン50 注射用ペニシリンGカリウム100万単位	【注】
	注射用マキシピーム1g	【注】
	注射用メソトレキセート50mg	【注】
	注射用メソトレキセート5mg	【注】
1424	調剤用パンビタン末	【内】
	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL	【注】
	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	【注】
	低分子デキストランL注 500mL	【注】
	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	【注】
	乳酸カルシウム「ファイザー」原末 乳糖水和物原末「フルイシュ(粉状)	【内】 【内】
	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 白色ワセリン*(健栄)	[外]
	複方ヨード・グリセリン(液)	[外]
	滅菌精製水*(大成薬品)	[外]
		1 - 1 -

1434 硫酸アトロピン「ホエイ」(末)

1435 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」

医薬品名	剤型
タール静注用1g	[注]
タール配合点滴静注用1gパック チグミン注0.5mg(1mL)	【注】
ョットプラスヘキシジン0.2	[外]
ドリン「ナガヰ」注射液40mg(1mL)	【注】
筆軟膏「ニッコー」 参断用精製ツベルクリン(PPD)1 μg(溶解液付)	【外】
参断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25μg(溶解液付)	【注】
フェノール*(健栄)	【外】
トトリウム「オーツカ」(末)	[内]
くトクロブラミド注射液10mg「タカタ」 tむし抗毒素「KMB」(6000単位)	【注】
科用リンデロンA軟膏(5g)	[外]
ドチンキ「ニッコー」	[外]
ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
ブェノグロブリンIH10%静注10g/100mL ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	【注】
/ンスロン1500注射用	【注】
用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
「ソソルビドテープ 40mg「EMEC」 根「ホエイ」(末)	【外】 【外】
カルボン坐剤	【外】
	[外]
戻液マイティア点眼液(5mL)	[外]
生プレドニン10mg(注射用) 生プレドニン20mg(注射用)	【注】
主ノレトニノ20mg(注対) H1) 主シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中口タイプ)	【注】
主シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
容解液キットH 50mL(注射用)	[注]
食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)食塩液PL「フソー」 2L(注射用)	【注】
塩力ル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
蒸留水(注射:100mL)	【注】
素留水(注射:500mL)	[注]
食塩注10%20mL(34mEq) 生食注 100mL	【注】
主食注 500mL	【注】
生食注2ポート100mL	【注】
re reference	【注】
据校20% 20mL(注射用)	【注】
唐液5% 20mL(注射用)	【注】
塘液5% 250mL(注射用)	【注】
唐液5% 500mL(注射用)	【注】
唐液70% 350mL(注射用)	【注】
ップ* (丸石)	【内】
Jチウム錠200「ヨシトミ」 Rノナラスに	【内】
用イホマイド1g 用エンドキサン100mg	【注】
用エンドキサン500mg	【注】
刊サイメリン50mg	【注】
用ソル・メルコート1000	[注]
用ソル・メルコート125 用ソル・メルコート40	【注】
用ソル・メルコート500	【注】
用フィルデシン1mg	【注】
用フィルデシン3mg 用フサン50	【注】
#ノッフ50 用ペニシリンGカリウム100万単位	【注】
 用マキシピーム1g	[注]
用メソトレキセート50mg	[注]
月メソトレキセート5mg 月パンピタン末	【注】
Hハンにタンス ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL	【注】
波傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	[注]
子デキストランL注 500mL	[注]
静注用ホスカビル注24mg/mL カルシウム「ファイザー」原末	【注】
リルン・ノス・ノアイサー」原木 K和物原末「マルイシ」(粒状)	[内]
アセリン* (健栄)	[外]
ヨード・グリセリン(液)	[外]
猜制 水 ★ (★ 成 蔥 具)	r at 1

NO

【内】

【注】

医薬品名

剤型