NO	医薬品名	剤型
1	1%ディプリバン注ーキット(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[内]
4	5-FU注1000mg(20mL)	【注】
5	5-FU注250mg(5mL)	【注】
6	ACD-A液 (注射:500mL)	【注】
7	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
8	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
10	EPLカプセル250mg	【内】
11	GSプラスターC「ユートク」(7cm×10cm:10枚)	[外]
12	HCGモチダ筋注用5,000単位	[注]
13	HMGテイゾー75(注射用)	[注]
14	KCL注10mEgキット「テルモ」10mL1キット	[注]
15	LH-RH注0.1mg「タナペ」(1mL)	[注]
16	トメントール*(健栄)(末)	[内]
17	MSコンチン錠10mg	[内]
18	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	[外]
19	PA・ヨード点眼・洗眼液 (20mL)	[外]
20	SC配合顆粒 (1g/包)	[内]
21	SPトローチ0.25mg「明治」	[外]
22	アーガメイト20%ゼリー25g	[内]
23	アーテン錠(2mg)	【内】
24	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
25	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
26	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	【外】
27	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
28	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
29	アクアチムクリーム1%(10g)	【外】
30	アクトシン軟膏3%(30g)	[外]
31	アクトネル錠75mg	【内】
32	アクプラ静注用10mg	【注】
33	アクプラ静注用50mg	【注】
34	アクラシノン注射用20mg	【注】
35	アコアラン静注用600	【注】
36	アコファイド錠100mg	【内】
37	アザルフィジンEN錠500mg	【内】
38		【注】
39	アシクロビル錠200mg「テバ」	[内]
40	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	[内]
41	アジルバ錠20mg	[内]
42	アズノールうがい液4%10mL	[9h]
43	アズノール軟膏0.033%	
		[外]
44	アスパラーCA錠200 (1.3mEq)	【内】
45	アスパラカリウム錠300mg	[内]
46	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
47	アスペリン錠10	[内]
48	アセチルシステイン内用液17.6%「ショーワ」(20mL瓶)	[内]
49	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	[外]
50	アセトキープ3G注 (500mL)	【注】
51	アセリオ静注液1000mgバッグ	【注】
52	アゼルニジビン錠16mg「トーワ」	【内】
53	アゾセミド錠60mg	[内]
54	アゾルガ配合懸濁性点眼液	[外]
55	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
56	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
57	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
58	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
59	アテノロール錠25mg「トーワ」	[内]
60	アデホスーLコーワ注 20mg	【注】
61	アトーゼット配合錠HD	[内]
62	アドロッド部に日 製にし アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	[9h]
63	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	[内]
64	アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
65	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】
66	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】

NO 67		1
67	医薬品名	剤型
	アナペイン注2mg/mL 100mL	【注】
68	アナペイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
69	アニュイティ100 μgエリプタ30吸入用	【外】
70	アネキセート注射液0.5mg(5mL)	【注】
71	アネトカインゼリー2%(30mL)	【外】
72	アネメトロ点滴静注液 500mg	【注】
73	アネレム静注用50mg	【注】
74	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
75	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	【注】
76 77	アバスチン点滴静注用400mg/16mL アフィニトール錠5mg	【注】
78	アブストラル舌下錠100 µg	【内】
79	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
80	アプレピタントカプセル125mg「NK」	【内】
81	アプレピタントカプセル80mg「NK」	【内】
83	アマージ錠2. 5mg	【内】
84	アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「日医工」	【内】
85	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
86	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
87	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
88	アミサリン注100mg	【注】
89	アミゼットB輸液 200mL	【注】
90	アミティーザカブセル24μg	【内】
91	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	【内】
92	アミノレパンEN配合散(フルーツ味)	【内】
93	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	【注】
94	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	【注】
95	アムパロ配合錠「サンド」	【内】
96	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
97	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【内】
98	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
99	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
100	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
	アラセナーA点滴静注用300mg	【注】
	アラセナーA軟膏3%(5g)	【外】
	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	[外]
	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
	アリクストラ皮下注5mg アリクストラ皮下注7.5mg	【注】
	アリムタ注射用100mg	1/11
		[注]
	アリムタ注射用500mg	【注】
108	アリムタ注射用500mg アルガトロパン注射液10mg「サワイ」 20mL	【注】
108	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	【注】
108 109 110		【注】
108 109 110 111	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg	[注] [注]
108 109 110 111 112	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン静注用50mg	[注] [注] [注]
108 109 110 111 112 113	アルガトロパン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン静注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【注】 【注】 【注】 【注】 【注】
108 109 110 111 112 113 114	アルガトロパン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末 (パウダー: 1g)	【注】 【注】 【注】 【注】 【外】
108 109 110 111 112 113 114 115	アルガトロパン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末 (パウダー: 1g) アルト原末 (パウダー: 500mg)	[注] [注] [注] [注] [外] [外]
108 109 110 111 112 113 114 115 116	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末 (パウダー: 1g) アルト原末 (パウダー: 500mg) アルファカルシドールカブセル0.25 μg「トーワ」	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [外]
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末 (パウダー: 1g) アルト原末 (パウダー: 500mg) アルファカルシドールカプセル0.25 μg 「トーワ」 アルファカルシドール錠1. 0 μg	[注] [注] [注] [外] [外] [外] [内]
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末 (パウダー: 1g) アルト原末 (パウダー: 500mg) アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 アルファカルシドール錠1. 0 μg アルファカール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包)	[注] [注] [注] [外] [外] [外] [内] [内]
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末 (パウダー: 1g) アルト原末 (パウダー: 500mg) アルファカルシドールカブセル0.25 μg「トーワ」 アルファカルシドールカブセル0.25 μg「トーワ」 アルファカルシドール散1.0 μg アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包) アルブミナー5% 静注12.5g/250mL アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注10 μg/リンジ「F」	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [内] [内] [注]
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末(パウダー:1g) アルト原末(パウダー:500mg) アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 アルファカルシドール競1.0 μg アルファロール散1μg/g(0.5 μg/0.5g/包) アルブランラム錠0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注10μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5μgシリンジ「F」	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [内] [注] [注]
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末 (パウダー:1g) アルト原末 (パウダー:500mg) アルファカルシドールカプセル0.25 μg 「トーワ」 アルファカルシドール錠1.0 μg アルファカルシドール粒1μg/g(0.5 μg/0.5g/包) アルブランラム錠0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注10 μgシリンジ「F」 アルプロスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルプロスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルプロスタジル注5 μgシリンジ「F」	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [内] [[注] [内] [[注] [内]
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末(パウダー:1g) アルト原末(パウダー:500mg) アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 アルファカルシドールがセル0.25μg「トーワ」 アルファカルシドール数1μg/g(0.5μg/0.5g/包) アルブフロール数1μg/g(0.5μg/0.5g/包) アルブランラム錠0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注10μgシリンジ「F」 アルプロスタジル注5μgシリンジ「F」 アルプロスタジル注5μgシリンジ「F」 アルロイドG内用液5% アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL)	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [内] [[注] [内] [[注] [内] [[注] [[八] [[八] [[八] [[八] [[八] [[八] [[八
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末(パウダー:1g) アルト原末(パウダー:500mg) アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 アルファカルシドール錠1. 0 μg アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包) アルブミナー5% 静注12.5g/250mL アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注10 μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルロイドG内用液5% アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレビアチン散10%(100mg/g)	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内]
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末(パウダー:1g) アルト原末(パウダー:500mg) アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 アルファカルシドール線1.0 μg アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包) アルブランラム錠0.4mg「トーワ」 アルブラソラム錠0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注10 μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルロイドG内用液5% アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレビアチン散10%(100mg/g) アレビアチン数100mg	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注] [内]
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末(パウダー:1g) アルト原末(パウダー:500mg) アルファカルシドールカ*セル0.25 μg「トーワ」 アルファカルシドールカ*セル0.25 μg「トーワ」 アルファカルシドール散1.0 μg アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包) アルブラソラム錠0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注10 μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルブイスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルブインスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルブインスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルブインスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルブインスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルブインスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルブインスタジル注5 μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5 μgシリンジ「F」	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注] [内] [内] [内]
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末(パウダー:1g) アルト原末(パウダー:500mg) アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 アルファカルシドール錠1.0 μg アルファカルシドール粒1μg/g(0.5 μg/0.5g/包) アルブランラム錠0.4mg「トーワ」 アルブランラム錠0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注10μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5μgシリンジ「F」 アルブトな内用液5% アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレビアチン散100mg アレンドロン酸錠35mg「日医工」 アロキシ静注0.75mg(5mL)	[注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注] [内] [共] [内] [共] [内] [共]
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン静注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末(パウダー:1g) アルト原末(パウダー:500mg) アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 アルファカルシドール粒1.0 μg アルファカルシドール粒1μg/g(0.5 μg/0.5g/包) アルブラソラム錠0.4mg「トーワ」 アルブラソラム錠0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注10μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5μgシリンジ「F」 アルプロスタジル注5μgシリンジ「F」 アルプロスタジル注5μgシリンジ「F」 アルプロスタジル注5μgシリンジ「F」 アルプトG内用液5% アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレビアチン散100mg アレンドロン酸錠35mg「日医工」 アロキシ静注0.75mg(5mL) アロブリノール錠100mg「サワイ」	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内]
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン静注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末(パウダー:1g) アルト原末(パウダー:500mg) アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 アルファカルシドールがセル0.25μg「トーワ」 アルファカルシドール数1μg/g(0.5μg/0.5g/包) アルブフロール数1μg/g(0.5μg/0.5g/包) アルブランラム錠0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注10μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5μgシリンジ「F」 アルロイトG内用液5% アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレビアチン錠100mg アレンドロン酸錠35mg「日医工」 アロキシ静注0.75mg(5mL) アロブリノール錠100mg「サワイ」 アロンアルファストニ共」(0.5g)	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内]
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末(パウダー:1g) アルト原末(パウダー:500mg) アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 アルファカルシドールがセル0.25μg「トーワ」 アルファカルシドール錠1.0μg アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包) アルブランラム錠0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注10μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5μgンリンジ「F」 アルプロスタジル注5μgンリンジ「F」 アルロイドG内用液5% アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレビアチン散10%(100mg/g) アレビアチン散100mg アレントロン酸錠35mg「日医工」 アロキン幹注0.75mg(5mL) アロブリノール錠100mg「サワイ」 アロンアルファム「三共」(0.5g) アンサー皮下注20μg	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末(パウダー:1g) アルト原末(パウダー:500mg) アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」 アルファカルシドール放1.0 μg アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包) アルブラナーションランランランランランランランランランランランランランランランランランランラ	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [注] [注] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL アルケラン錠2mg アルケラン幹注用50mg アルスロマチック関節手術用灌流液(3L) アルト原末(パウダー:1g) アルト原末(パウダー:500mg) アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 アルファカルシドールがセル0.25μg「トーワ」 アルファカルシドール錠1.0μg アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包) アルブランラム錠0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注10μgシリンジ「F」 アルブロスタジル注5μgンリンジ「F」 アルプロスタジル注5μgンリンジ「F」 アルロイドG内用液5% アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレビアチン散10%(100mg/g) アレビアチン散100mg アレントロン酸錠35mg「日医工」 アロキン幹注0.75mg(5mL) アロブリノール錠100mg「サワイ」 アロンアルファム「三共」(0.5g) アンサー皮下注20μg	[注] [注] [注] [注] [外] [外] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内

NO	医薬品名	剤型
134	アンペック坐剤10mg	[外]
135	イーケプラ錠500mg	【内】
136	イーケプラドライシロップ50%	【内】
137	イーケプラ点滴静注500mg	【注】
139	イオウ・カンフルローション	[外]
138	イオパーク300注シリンジ100mL	【注】
140	イオパーク350注 100mL	【注】
141	イオパーク350注 20mL	[注]
142	イオパーク350注 50mL	[注]
143	イオパーク350注シリンジ70mL	[注]
		<u> </u>
144	イオ/ミロン注300 100mL	[注]
145	イオパミロン注300 20mL	[注]
146	イオパミロン注300 50mL	【注】
147	イオパミロン注300シリンジ100mL	【注】
148	イオパミロン注370 100mL	【注】
149	イオパミロン注370 20mL	【注】
150	イオパミロン注370 50mL	【注】
151	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
152	イオパミロン注370シリンジ65mL	【注】
153	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
154	イオメロン350注シリンジ100mL	【注】
155	イオメロン350注シリンジ135mL	【注】
156	イグザレルトOD錠10mg	[内]
157	イグザレルトOD錠15mg	【内】
158	- イクスタンジ錠80mg	【内】
159	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
160	イスコチン錠100mg	【内】
161	イソコロナールRカプセル20mg	[内]
162	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	[外]
163		
	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	[注]
164	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
165	イソビスト注240 10mL	【注】
166	イソビスト注300 10mL	【注】
167	イダマイシン静注用5mg	【注】
168	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	【内】
169	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	【内】
170	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
171	イナビル吸入粉末剤20mg	【内】
172	イニシンク配合錠	【注】
173	イパン注100mg(5mL)	[外]
174	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
175	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	[内]
176	イマジニール300注 20mL	【注】
177	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	[外]
178	イミダブリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
179	イムノブラダー膀注用40mg	【注】
	イムラン錠50mg	[内]
180		
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「ホスト゜ーラ」	[[注]
181	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「ホスピーラ」	+
181 182	イリボーOD錠 5μg	[内]
181 182 183	イリボーOD錠 5μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」	[内] [内]
181 182 183 184	イリボーOD錠 5 µ g イルペサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【内】 【内】 【注】
181 182 183 184 185	イリボーOD錠 5μg イルペサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	[内] [内] [注]
181 182 183 184 185	イリボーOD錠 5μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン グラルギンBS注ミリオベン「リリー」 インデラル注射液2mg(2mL)	[内] [内] [注] [注]
181 182 183 184 185 186	イリボーOD錠 5μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インテラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1ッ「FI医工」(50g)	[内] [内] [注] [注] [注]
181 182 183 184 185 186	イリボーOD錠 5μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン ヴラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インデラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g) インドメタシン坐剤25「NP」	[内] [内] [注] [注] [注] [外]
181 182 183 184 185 186 187	イリボーOD錠 5μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インテラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1ッ「FI医工」(50g)	[内] [内] [注] [注] [注] [外]
181 182 183 184 185 186 187 188	イリボーOD錠 5μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン ヴラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インデラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g) インドメタシン坐剤25「NP」	[内] [内] [注] [注] [注] [外]
181 182 183 184 185 186 187 188 189	イリボーOD錠 5μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インデラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g) インドメタシン坐剤25「NP」	[内] [内] [注] [注] [外] [外]
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190	イリボーOD錠 5 μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インデラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g) インドメタシン坐剤25「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 イントラリポス輪液20% 100mL	[內] [內] [注] [注] [注] [外] [外] [[於] [[於] [[於] [[於] [[於] [[於]
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190	イリボーOD錠 5 μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン グラルギンBS注ミリオベン「リリー」 インデラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1 %「日医工」(50g) インドメタシン坐剤25「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 インドメタンと対析Aワクテン「ピケンHA」 1mL	[内] [内] [注] [注] [外] [外] [外] [注]
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194	イリボーOD錠 5 μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インデラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g) インドメタシン坐剤25「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 イントラリポス輸液20% 100mL インフルエンザHAワカチン「ピケンHA」 1mL ヴィーンD輸液 500mL	[注] [内] [注] [注] [注] [外] [外] [注] [注] [注]
181 182 183 184 185 186 187 188 190 191 192 193	イリボーOD錠 5 μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン ヴラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インデラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g) インドメタシン坐剤25「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 イントラリポス輸液20% 100mL インフルエンザHAワクチン「ピケンHA」 1mL ヴィーンD輸液 500mL ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	[内] [内] [注] [注] [注] [注] [外] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注]
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194	イリボーOD錠 5 μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インデラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g) インドメタシン坐剤25「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 イントラリボス輸液20% 100mL インフルエンザHAワクチン「ピケンHA」 1 mL ヴィーンD輸液 500mL ウチダのシテイM(生薬:1回8g) ウテメリン錠5mg	[内] [内] [注] [注] [注] [注] [外] [外] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内]
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193	イリボーOD錠 5 μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インデラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g) インドメタシン坐剤25「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 イントラリボス輸液20% 100mL インフルエンザHAワクテン「ピケンHA」 1 mL ヴィーンD輸液 500mL ウチダのシテイM(生薬:1回8g) ウテメリン錠5mg ウテメリン注50mg(5mL)	[内] [内] [注] [注] [注] [注] [外] [外] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注]
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196	イリボーOD錠 5 μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インデラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g) インドメタシン坐剤25「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 イントラリポス輸液20% 100mL インフルエンザHAワクチン「ピケンHA」 1mL ヴィーンD輸液 500mL ウチダのシテイM(生薬:1回8g) ウテメリン錠5mg ウテメリン注50mg(5mL) ウブレチド錠5mg ウルソデオキシコール酸錠100mg	[内] [内] [注] [注] [注] [外] [外] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [内]
181 182 183 184 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195 196	イリボーOD錠 5 μg イルベサルタン錠100mg「DSPB」 インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL) インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インデラル注射液2mg(2mL) インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g) インドメタシン坐剤25「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 インドメタシン坐剤50「NP」 イントラリボス輸液20% 100mL インフルエンザHAワクチン「ピケンHA」 1 mL ヴィーンD輸液 500mL ウチダのシティM(生薬:1回8g) ウテメリン錠5mg ウテメリン注50mg(5mL) ウブレチド錠5mg	[内] [内] [注] [注] [注] [外] [外] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [内]

NO	医苯D //	* 11.20
NO	医薬品名	利型 [注]
200	ウログラフイン注60%(20mL)	【注】
201	ウロナーゼ静注用6万単位 ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【注】
202	プロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
203	エイベリス点眼0.002%	【外】
205	エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」(1.5g/包)	【内】
206	エキザルベ	【外】
207	エクザール注射用10mg	【注】
208	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
209	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
210	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
211	エクセグラン散20%	【内】
212	エクセグラン錠100mg	【内】
213	エウメット配合錠HD	【内】
214	エクリラ400 μgジェヌエア60吸入用	【外】
215	エサンブトール錠250mg	【内】
216	エストラーナテープ0.72mg	【外】
217	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
218	エストリール錠1mg * (持田)	【内】
219	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
220	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
221	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
222	エタノール「マルイシ」	【外】
223	エダラボン点滴静注液バッグ 30mg「日医工」	【注】
224	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
225	エディロールカプセル0.75 μ g	【内】
226	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
227	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
228	エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
229	エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
230	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】
231	エネーボ配合経腸用液	【内】
232	エネマスター注腸散(400g)	【外】
233	エパルレスタット錠 50mg「ファイザー」	【内】
234	エビリファイ錠6mg	【内】
235	Iピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】
236	エフィエントOD錠20mg	【内】
237	エフィエント錠 3.75mg	【内】
238	Iフィエント錠2.5mg	【内】
239	I フピーOD錠2.5	【内】
240	エブランチルカプセル15mg	【内】
241	Iペリソン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
242	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	【注】
243	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	【注】
244	エボチール注10mg(1mL)	【注】
245	エリキュース錠 5mg エリキュース幹の 5mg	【内】
246	エリキュース錠2.5mg エリスロシン錠200mg	【内】
247	エリル点滴静注液30mg(2mL)	【注】
249	エルカトニン注40単位(1mL)「NP」	【注】
250	エルカルチンFF錠 250mg	【内】
251	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
252	エルシトニン注20Sディスポ(1mL)	【注】
253	エルネオパNF1号輸液 1000mL	【注】
254	エルネオパNF1号輸液 1500mL	【注】
255	エルネオパNF2号輸液 1000mL	【注】
256	エルネオパNF2号輸液 1500mL	【注】
257	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
258	- エルプラット点滴静注液50mg	【注】
259	エレジェクト注シリンジ (2mL)	【注】
260	エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm)	【外】
261	エレファワイパーEI W (消毒綿4cm×4cm)	【外】
262	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
263	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
264	エンタカポン錠100mg「アメル」	【内】
265	エンテカビル錠O. 5mg「トーワ」	【内】

NO	医薬品名	剤型
266	エンドキサン錠 50mg	【内】
267	エンレスト錠100mg	【内】
268	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注】
269	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
270	オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
271	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
272	オイパロミン注300 100mL	【注】
273	オイパロミン注300 20mL	【注】
274	オイパロミン注300 50mL	【注】
275	オイパロミン注370 100mL	【注】
276	オイパロミン注370 20mL	【注】
277	オイパロミン注370 50mL	【注】
278	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
279	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外】
280	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
281	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	【外】
282	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
283	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
284	オキサロールローション25 μ g/g(10g)	[外]
285	オキサロール軟膏25 μ g/g(10g)	[外]
286	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
287	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
288	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
289	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
290	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」	【内】
291	オキナゾール膣錠600mg	【外】
292	オキノーム散2.5mg	【内】
293	オキノーム散5mg	[内]
294	オキファスト注10mg	[注]
295	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	[注]
296	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 オゼンピック皮下注0.25mgSD	【注】
297		[注]
298	オゼンビック皮下注0.5mgSD オゼンビック皮下注1.0mgSD	【注】
	オノアクト点滴静注用 50mg	【注】
301	オピソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
302	オフサグリーン静注用 25mg	【注】
303	オプソ内服液10mg(5mL)	【内】
304	オプソ内服液5mg(2.5mL)	[内]
305	オプチレイ350注シリンジ100mL	【注】
306	オプチレイ350注シリンジ135mL	【注】
307	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
308	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
309	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
310	オムニパーク300注シリンジ 100mL	[注]
311	オムニパーク350注シリンジ 70mL	【注】
312	オメプラゾール注射用 20mg 「日医工」	【注】
313	オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL	[外]
314	オラネジン消毒液1.5%	[外]
315	オリブ油 * (丸石)	[外]
316	オルケディア錠1mg	【内】
317	オルケディア錠2mg	【内】
318	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
319	オルテクサーロ腔用軟膏O. 1%	[外]
320	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
321	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
322	オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「明治」	【内】
323	オングリザ錠2.5mg	【内】
324	オンコピン注射用1mg	【注】
325	カイトリル錠2mg	[内]
326	ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)	【注】
327	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	[内]
328	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T -
328 329	カチーフN錠5mg	【内】
	カチーフN錠5mg カデチア配合錠HD「あすか」	【内】

NO		
	医薬品名	剤型
	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
	カナグル錠100mg	【内】
	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	【内】
	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	【内】
	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】
	カリメート散(5g/包) カリ石ケン* (日興)(軟膏)	【外】
	カルセド注射用20mg	【注】
	カルセド注射用50mg	【注】
	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
	カルデナリンのD錠1mg	【内】
	カルデナリンのD錠2mg	【内】
	カルパゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
	カルパゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
	カルパマゼピン細粒50%「フジナガ」	【内】
	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
	カルベジロール錠 10mg「サワイ」	【内】
	カルベシロール錠2.5mg「サワイ」	【内】
	カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】
	カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】
	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】
	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
	カルボシステインドライシロップ50%「テバ」	【内】
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 (15mL)	【注】
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
	カロナール細粒50%	【内】
	カロナール錠200	【内】
366	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	【内】
367	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
368	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
369	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
370	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
371	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
372	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	
373		【外】
	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【外】
374	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL) キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	
		【注】
375	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
375 376	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL) キャブピリン配合錠	【注】 【注】 【内】
375 376 377	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL) キャブピリン配合錠 キュピシン静注用350mg	【注】 【注】 【内】 【注】
375 376 377 378	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュビシン静注用350mg 強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	[注] [注] [内] [注]
375 376 377 378 379	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL)	[注] [注] [内] [注] [注]
375 376 377 378 379 380	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) 含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュビシン静注用350mg 強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g)	[注] [注] [内] [注] [注] [注]
375 376 377 378 379 380 381	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g)	[注] [注] [内] [注] [注] [注]
375 376 377 378 379 380 381 382	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤3E	[注] [注] [内] [注] [注] [注] [外] [注]
375 376 377 378 379 380 381 382 383	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤3E キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶	[注] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注]
375 376 377 378 379 380 381 382 383	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤3E キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶 ゲーフィス錠5mg	[注] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注]
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) 含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤3E キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶 キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶 プーフィス錠5mg クエチアピン錠 25mg「トーワ」 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 クエン酸第一鉄トリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	(注) (注) (内) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 521	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) 含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤3E キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶 キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶 ヴーフィス錠5mg ウエチアピン錠 25mg「トーワ」 ウエン酸第一鉄Na錠5Omg「サフィ」 ウエン酸第一鉄大りがし入顆粒8.3%「ツルハラ」 グラウティブ錠50mg	(注) (注) (内) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (内) (内) (内)
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 521	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) 含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶 キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶 グーフィス錠5mg クエチアピン錠 25mg「トーワ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サウイ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サウイ」 クエン酸第一鉄トリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 グラクティブ錠50mg クラシェ猪苓湯エキス細粒[EK-40] 2.0g	[注] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [内]
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 521 387	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) 含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤3E キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶 サンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶 ヴーフィス錠5mg クエチアピン錠 25mg「トーワ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サウイ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サウイ」 クエン酸第一鉄トリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 グラウティブ錠50mg クラシエ猪苓湯エキス細粒(EK-40)2.0g	[注] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内]
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 521 387	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) 含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶 キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶 グーフィス錠5mg クエチアピン錠 25mg「トーワ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サウイ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サウイ」 クエン酸第一鉄トリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 グラクティブ錠50mg クラシェ猪苓湯エキス細粒[EK-40] 2.0g	[注] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [内]
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 521 387 388 389 390	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) 含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤3E キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶 キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶 グーフィス錠5mg クエチアピン錠 25mg「トーワ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サワイ」 クエン砂第一鉄トリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 グラウテイブ錠50mg クラシエ精辛湯エキス細粒(EK-40) 2.0g クラシエ精辛湯エキス細粒(EK-41) 2.5g クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68) 2.0g グラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68) 2.0g	(注)
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 521 387 388 389 390	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) 含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キングリー透析剤3E キングリー透析剤AF2号 6L 1瓶 ゲーフィス錠5mg クエチアピン錠 25mg「トーワ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サ7イ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サ7イ」 クエン酸第一鉄トリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 ゲラウティブ錠50mg クラシエ猪苓湯エキス細粒(EK-40) 2.0g クラシエ猪苓湯エキス細粒(EK-41) 2.5g	(注)
375 376 377 378 380 381 382 383 384 385 521 387 388 389 390	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) 含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤3E キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶 キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶 グーフィス錠5mg クエチアピン錠 25mg「トーワ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サワイ」 クエン砂第一鉄トリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 グラウテイブ錠50mg クラシエ精辛湯エキス細粒(EK-40) 2.0g クラシエ精辛湯エキス細粒(EK-41) 2.5g クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68) 2.0g グラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68) 2.0g	(注)
375 376 377 378 380 381 382 383 384 385 521 387 388 389 390 391	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) 含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤3E キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶 キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶 グーフィス錠5mg クエチアピン錠 25mg「トーワ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サワイ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サワイ」 クエン酸第一鉄大トリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 グラウティブ錠50mg クラシエ補中益気湯エキス細粒(EK-40) 2.0g クラシエ補中益気湯エキス細粒(EK-41) 2.5g クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68) 2.0g グラナデック点眼液 0.4% (5mL) グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	(注)
375 376 377 378 380 381 382 383 384 385 386 521 387 388 389 390 391 392	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) 含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶 キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶 ガーフィス錠5mg フエチアピン錠 25mg「トーワ」 クエン酸第一鉄Na錠5Omg「サワイ」 クエン酸第一鉄トリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 グラウティブ錠50mg クラシエ褚辛湯エキス細粒[EK-40] 2.0g クラシエ精薬湯エキス細粒[EK-41] 2.5g フラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68] 2.0g グラナデック点眼液 0.4% (5mL) グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」 フラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	(注)
375 376 377 378 380 381 382 383 384 385 386 521 387 388 399 390 391 392 393	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) 含有(20mL) キャプピリン配合錠 キュピシン静注用350mg 強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL キロサイド注20mg(1mL) キンダベート軟膏0.05%(5g) キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶 キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶 グーフス錠5mg フェチアピン錠 25mg「トーワ」 フェン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 クェン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 クェン酸第一鉄トリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 グラクティブ錠50mg クラシェインでは、多なので、カーシー・カーシー・カーシー・カーシー・カーシー・カーシー・カーシー・カーシー	[注] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内

NO	医薬品名	剤型
397	グラン注射液M300(0.7mL)	【注】
398	クリアクター静注用80万	【注】
399	グリクラジド錠40mg「サワイ」	【内】
400	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
401	グリセレブ 点滴静注 (200mL)	【注】
402	グリチロン配合錠	【内】
403	グリベック錠100mg	【内】
404	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
405	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	【注】
406	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
407	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
408	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
409	グルトパ注1200万単位	【注】
410	グルベス配合OD錠	【内】
411	グレースピット錠50mg	【内】
412	クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL)	[外]
413	クレメジン速崩錠500mg	【内】
414	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
415		【内】
416	クロピドグレル錠75mg「SANIK」 クロマイ膣錠100mg	[内]
417		[外]
418	クロミッド錠50mg	[内]
419	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」	【外】 【内】
421	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	[内]
422	ケイセントラ静注用1000	【注】
423	ケイセントラ静注用500	【注】
424	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
425	ケーサプライ錠600mg	【内】
426	ゲーベンクリーム1%(50g)	[外]
427	ケタスカプセル10mg	[内]
428	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
429	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	[外]
430	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
431	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
432	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
433	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
434	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
435	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
436	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
437	ケンエーG浣腸液50% 120mL	【外】
438	ケンエーG浣腸液50% 60mL	【外】
439	ケンエーアクリノール液0.1 (滅菌) (液:500mL)	【外】
440	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
441	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
442	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「イワキ」(10g)	【外】
443	コアテック注5mg(5mL)	【注】
444	コアヒビター注射用10mg	【注】
445	コアヒビター注射用50mg	【注】
446	コアベータ静注用12.5mg	【注】
447	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
448	ゴージョーMHS (液: 215mL)	【外】
449	コートリル錠10mg	【内】
450	コスパン錠80mg	[内]
451	コソプトミニ配合点眼液 (0.4mL)	【外】
452	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
453	コメリアンコーワ錠50	【内】
454	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
455	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
456	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
457	コンプラビン配合錠	【内】
458	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm×22.9cm)	【外】
459	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外】
460	ザイザルシロップ 0.05%	【内】
	サイトテック錠200	【内】
461	グリリブクWE200	1

NO	医薬品名	剤型
463	佐来品名 サイモグロプリン点滴静注用25mg	[注]
464	サクシゾン静注用1000mg	【注】
465	サクシゾン注射用100mg	【注】
466	- サクシゾン注射用300mg	【注】
467	ザクラス配合錠HD	【内】
468	サテニジン液10(500mL)	【外】
469	サニサーラW(250mL)	【外】
470	サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mLキット	【注】
471	サムスカOD錠7.5mg	【内】
472	サラジェン錠5mg	【内】
473	サラゾピリン錠500mg	【内】
474	サリパラ液	【外】
475	ザルコニン液0.05 (500mL)	【外】
476	ザルコニン液10 (10% 500mL)	【外】
477	ザルティア錠 5mg	【内】
478	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
479	ザロンチンシロップ(50mg/mL)	【内】
480	サンコバ点眼液0.02%(5mL)	【外】
481	サンディミュン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
482	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
483	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
484	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
485	ジアグノグリーン注 25mg	【注】
486	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
487	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
488	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
489	ジェイゾロフトOD錠 25mg	【内】
490	ジェニナック錠200mg	【内】
491	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
492	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
493	ジクアス点眼液3%(5mL)	【外】
494	シグマート注48mg	【注】
495	シグマピタン配合カブセルB25	【内】
496	ジクロフェナカNaゲル1%「SN」50g	【外】
497 498	ジクロフェナクNa徐放力プセル37.5mg「トーワ」 シシロフェナカNa徐放力プセル37.5mg「トーワ」	【内】
499	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	[外]
500	ジクロフェナクナトリウム至前「Z.Smg「JG」	【外】
501	ジクロフェナッナトリウム生剤 50mg「JG」	【外】
502	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
503	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
504	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
505	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
506	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	【注】
507	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	【注】
508	ジピリダモール錠25mg「日医工」	【内】
509	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「日医工」	【内】
510	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	【内】
511	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」	【注】
512	シベクトロ錠200mg	【内】
513	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
514	シベレスタットNa点滴静注用 100mg 「F」	【注】
515	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
516	シムビコートタービュヘイラー60吸入	【外】
517	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
518	ジャディアンス錠 10mg	【内】
519	ジャドニュ顆粒分包360mg	【内】
520	ジャドニュ顆粒分包90mg	【内】
522	シュアポスト錠0.5mg	【内】
523	酒石酸「ヤマゼン」	【外】
524	静注用マグネゾール20mL	【注】
525	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
526	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
527	シルニジピン錠 10mg 「サワイ」	【内】
528	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
529	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】

	医薬品名	剤型
530	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	[内]
531	シンビット静注用50mg	【注】
532	スインプロイク錠0. 2mg	【内】
533	スープレン吸入麻酔液	【外】
534	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
535	スタデルムクリーム5%(10g)	【外】
536	スタレボ配合錠L100	【内】
537	スチブロン軟膏0.05%(5g)	【外】
538	ステリクロンR液0.1 (500mL)	【外】
539	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】
540	ステリクロンW液0.02 (500mL)	【外】
541	ステリクロンW液0.05 (500mL)	【外】
542	ステリスコープ3W/V%液	【外】
543	ステリハイド20W/V%液 500mL(消毒剤原料)	【外】
544	ストロカイン錠5mg	【内】
545	ストロメクトール錠3mg	【内】
546	スピール膏M(貼付薬)	【外】
547	スピオルトレスピマット 60吸入用	【外】
548	スピリーバ2.5 µgレスピマット60吸入	[外]
549	スピロノラクトン錠25㎜「トーワ」	[内]
550	スペニールディスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
551	スポンゼル(5cm×2.5cm)	【外】
552	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	【内】
553	スミスリンローション 5% (30g)	【外】
554 555	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
	スミルスチック3% 40g	【外】
556 557	スミルローション3% スルパシリン静注用 1.5g	【外】
558	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【注】
559	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
560	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)	【注】
561	生理食塩液パッグ「フソー」 3mL(注射用) 生理食塩液パッグ「フソー」1000mL	【注】
562	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	【注】
563	セキソビット錠100mg	[内]
565	セパミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	11.72
		【内】
566		【内】 【外】
566 567	ゼピアックスローション 2% (10g)	[外]
567	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	【外】 【注】
567 568	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	[外] [注] [注]
567	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	[外] [注] [注]
567 568 569	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付)	[外] [注] [注] [注]
567 568 569 570	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/「ッグ「オーツカ」 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g)	[外] [注] [注]
567 568 569 570 571	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/ハッグ「オーツカ」 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100	[外] [注] [注] [注] [内]
567 568 569 570 571	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチァム静注用1gバッグ「日医工」	[外] [注] [注] [注] [内] [内]
567 568 569 570 571 572 573	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」 セフォチアム韓達静注用1g「日医工」	[外] [注] [注] [内] [内] [注]
567 568 569 570 571 572 573	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」	[外] [注] [注] [内] [内] [注] [注]
567 568 569 570 571 572 573 574	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/いグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジン α点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカインピポキシル塩酸塩錠100mg 「トーワ」 セフジトレンピポキシルルの用細粒10%	[外] [注] [注] [内] [内] [注] [注]
567 568 569 570 571 572 573 574 575	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/iッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/iッグ「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 セフジトレンピボキシルル児用細粒10% セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」	[外] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [注] [内] [内] [内] [内]
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/iッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/iッグ「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカペンピポキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 セフジトレンピポキシルが戻り用細粒10% セフジトレンピポキシルが戻り100mg「サワイ」 セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	[外] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内]
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジン α点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/バッグ「日医工」 セフォチアム韓建静注用1g「日医工」 セフカベンビボキシル塩酸塩幹注用1g「日医工」 セフガベンビボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 セフジトレンビボキシル小児用細粒10% セフジトレンビボキシル錠 100mg「サワイ」 セフジニルカブセル100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」	[外] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内]
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/バッグ「日医工」 セフォチアム韓達静注用1g「日医工」 セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg 「トーワ」 セフジトレンピボキシル小児用細粒10% セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 セフジールカプセル100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工	[外] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [付]
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/バッグ「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg 「トーワ」 セフジトレンピボキシル小児用細粒10% セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 セフジールカプセル100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工 セフメタゾールNa静注用1g「NP」	[外] (注) (注) (注) (内) (内) (注) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (共) (共) (共) (共) (共) (共)
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメシンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム増酸塩静注用1g「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg 「トーワ」 セフジトレンピボキシルル児用細粒10% セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 セフジールカプセル100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医エ セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[外] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg 「トーワ」 セフジトレンピポキシルル児用細粒10% セフジトレンピポキシルが戻100mg「サワイ」 セフジールカプセル100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトゾウム静注用1g「日医工」日医エ セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セララ錠25mg	[外] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/iッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム館を塩静注用1g「日医工」 セフオテアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカベンビボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 セフジトレンビボキシル・児用細粒10% セフジトレンビボキシル・原用細粒10% セフジトレンビボキシル・原用細粒10% セフジールカブセル100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医エ セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セララ錠25mg セララ錠25mg	[外] (注) (注) (内) (内) (注) (注) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) ((注) (注) ((注) (
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 580 581 582 583 584 585	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/Nゥグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/Nゥグ「日医工」 セフォチアム静注用1g/Nゥグ「日医工」 セフォチアム韓陸塩静注用1g「日医工」 セフカベンビボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 セフジトレンビボキシルル児用細粒10% セフジトレンビボキシル錠 100mg「サワイ」 セフジトレンビボキシル錠 100mg「サワイ」 セフジニルカブセル100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医エ セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セララ錠25mg セララ錠50mg セルシン注射液10mg(2mL)	[外] (注) (注) (内) (内) (注) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/ッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/、ッグ「日医工」 セフォチアム韓陸塩静注用1g「日医工」 セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 セフジトレンピボキシルルの用細粒10% セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」 セフジールンプセル100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医エ セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セララ錠25mg セララ錠50mg セルシン注射液10mg(2mL) セルニルトン錠63mg	[外] (注) (注) (注) (内) (内) (注) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (注) (注) (注) (内)
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 580 581 582 583 584 585	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/ッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/ッグ「日医工」 セフォチアム韓酸塩静注用1g「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 セフジトレンピボキシルル見用細粒10% セフジトレンピボキシル・定用細粒10% セフジトレンピボキシル・定 100mg「サワイ」 セフジールカプセル100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工 セフメタリールNa静注用1g「NP」 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セララ錠25mg セララ錠50mg セルシン注射液10mg(2mL) セルールトン錠63mg ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)	[外] (注) (注) (内) (内) (注) (注) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (注) (注) (注) (方) (内) (内) (内) (方) (方) (方) (方) (方) (方) (方) (方)
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 580 581 582 583 584 585 586 587	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/ッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/ッグ「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフォイアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカベンビボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 セフジトレンビボキシルル児用細粒10% セフジトレンビボキシル・2g(100mg「サワイ」 セフジールカプセル100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医エ セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セララ錠25mg セララ錠50mg セルシン注射液10mg(2mL) セルニルトン錠63mg ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	[外] (注) (注) (内) (内) (注) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (注) ((注) (
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 580 581 582 583 584 585 586 587	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/バッヴ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカベンピポキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 セフジトレンピポキシルル児用細粒10% セフジトレンピポキシル・児用細粒10% セフジトレンピポキシルが戻100mg「サワイ」 セフジニルカプセル100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「ロ医工」日医エ セフメタゾールNa静注用1g「ロ医工」日医エ セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セララ錠25mg セララ錠50mg セルシン注射液10mg(2mL) セルニルトン錠63mg ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	[外] (注) (注) (注) (内) (内) (注) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (注) ((内) ((注) ((内) ((内
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 580 581 582 583 584 585 586 587	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/ッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカペンピポキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 セフジトレンピポキシルル児用細粒10% セフジトレンピポキシルル説 100mg「サワイ」 セフジールンプレンプルン・シールので、アイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医エ セフメタゾールNa静注用1g「ロ医工」 日医エ セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セララ錠25mg セララ錠50mg セルシン注射液10mg(2mL) セルニルトン錠63mg ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	[外] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [注] [外] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/vヴ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/vヴ「日医工」 セフォチアム韓陸塩静注用1g「日医工」 セフォアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「トーワ」 セフジトレンピボキシルルの関 「トーワ」 セフジトレンピボキシル線 100mg「サワイ」 セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」 セフジトレンピボキシルは 100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医エ セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セララ錠25mg セララ錠50mg セルシン注射液10mg(2mL) セルニルトン錠63mg ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	[外] (注) (注) (内) (内) (注) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (注) (注) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 588 589 589 590 591	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/ッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/ッグ「日医工」 セフォチアム韓陸塩静注用1g「日医工」 セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 セフジトレンピボキシルルの見用細粒10% セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 セフジールンプ・ルン・リン・リン・リン・リン・リン・リン・リン・リン・リン・リン・リン・リン・リン	[外] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	ゼピアックスローション 2% (10g) セファグリンNa点滴静注用1g/ッグ「オーツカ」 セファグリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/ッグ「日医工」 セフォチアム韓酸塩静注用1g「日医工」 セフォチアム韓酸塩静注用1g「日医工」 セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 セフジトレンピボキシルルル見用細粒10% セフジトレンピボキシル線100mg「サワイ」 セフジールンプレンプレーンのmg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工 セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セララ錠25mg セララ錠50mg セルシン注射液10mg(2mL) セルニルトン錠63mg ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレンストOD錠5mg セレスターナ配合錠 セレスターナ配合錠	[M] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	ゼピアックスローション 2% (10g) セファゾリンNa点滴静注用1g/ッグ「オーツカ」 セファゾリントリウム注射用1g「日医工」 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) セファランチン末1%(10mg/g) ゼフィックス錠100 セフォチアム静注用1g/ッグ「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 セフカベンビボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 セフジトレンビボキシルル児用細粒10% セフジトレンビボキシルが錠100mg「サワイ」 セフジールンプセル100mg「ファイザー」 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医エ セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セララ錠25mg セララ錠50mg セルニルトン錠63mg ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレスターナ配合錠 セレニカト顆粒40%(400mg/g) セレネース内服液0.2%(2mg/mL) センノシド錠12mg「サワイ」	[外] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内

593 プリップ 表現 高い			+177
599 フファチューAideMilloom	NO 507	医薬品名	利型
598 フルーザ酸20mg 「円」 「円」 「円」 「円」 「円」 「円」 「円」 「円」 フラップス 「円」			
1959 プラテクス1.3mm27所 1931 1932 1932 プラテクス1.3mm27所 1931 1932 プラテクス1.4mm2 1931 1932 プラテクス1.4mm2 1931 1932 プラテクス1.4mm2 1931 1932 1932 ブラテクス1.4mm2 1931 1932 1932 1932 1932 1932 1933 1			
19			
1957 プラテクス上A10名mg F A7 12 12 13 13 13 13 13 13			
1939 アステンス・ 1939 193			
19.0			
1960			
10.00			【注】
1960 リルデル3科液 500ml 日本	606		【注】
10	607	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
101	608	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
15	609	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
18	610	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL 「サンド」	【注】
613	611	ダーブロック錠2mg	[内]
614	612	ダーブロック錠4mg	【内】
615	613	ダイアニールーN PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1000mL	【注】
616 分イアニルーN PD-4 25 腹膜透析液 UVフラッシュツインパッグ 1500mL [注] 分イアニルーN PD-4 25 腹膜透析液 UVフラッシュツインパッグ 2000mL [注] 分イアニルーN PD-4 25 腹膜透析液 UVフラッシュツインパッグ 2000mL [注] 分イアニウス達を利用300mg [注] 分イアニウス達を列の (元] (注] 分ルパジン注用100 [注] 分ルパジン注用100 [注] 分ルパジン注用100 [注] 分本が変 20mg [内] (元] (614	ダイアニールーN PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
617	615	ダイアニールーN PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
1818 347平ウフは全対用500mg	616		【注】
19			【注】
(注) タウ/マイシ/神注用20mg		<u> </u>	【注】
621 対カルバジ注用100 [注] 622 タケキャブ錠 10mg [内] 623 タケキャブ錠 20mg [内] 624 タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm) [内] 625 タジゲカプセル150mg [内] 626 タジゲカプセル150mg [内] 626 タジゲカプセル150mg [内] 627 9グゲの高金幹注用4.5「明治 [注] 628 9ブマット配合カプセル [内] 629 9ブロス点眼液0.0015% (0.3mL) [内] 630 9ブロス主点眼液0.0015% (0.3mL) [内] 631 9ミアルガプセル75 [内] 633 タミアルガプセル75 [内] 634 9リビッド眼軟膏0.3% (3.5 g) [内] 634 9リビッド眼軟膏0.3% (3.5 g) [内] 635 9リビッド眼軟膏0.3% (3.5 g) [内] 636 9リディリン人(来) [内] 637 皮酸水素ナトリンム(来) [内] 638 タリディリン人(来) [内] 639 9シドトロジ注射用20 (20 μ g) [注] 639 9シドトロジ注射用20 (20 μ g) [注] 640 9ントリウント酸酸 (0.0 g) [中] [内] 640 9ントリウント酸酸 (0.0 g) [中] [内] 641 9ンニン酸アルブミン(来) [内] 642 デフラリール錠のの側 [内] 643 デウラジール錠のの側 [内] 644 チェウル上流列用0.5g [中] [内] 645 チャンが文は動物値 (100mg 「トーワ」 [内] 646 チャンが交は (100mg 「トーワ」 [内] 647 チウビジン塩酸塩酸 (100mg 「トーワ」 [内] 648 チェジットル変もの側が下り [内] 649 チェジットル変もの側が下り [内] 649 チェジ・大脈 (100mg 「トーワ」 [内] 640 チェジ・大脈 (100mg 「トーワ」 [内] 641 チェン・ル錠もの側が下り [内] 642 チェン・ル錠ものの側が下り [内] 643 チェン・ル錠ものの側が下り [内] 644 チェン・ル錠ものの側が下り [内] 645 チェン・ル錠ものの側が下り [内] 646 チェン・シが錠りの側が下り [内] 647 チェン・シが変りの側が下り [内] 648 チェン・ジが変りの側が下り [内] 649 チェン・ジが変りの側が下り [内] 649 チェン・ジが変りの側が下り [内] 649 チェン・ジが変りの側が下り [内] 649 チェン・シが変りの側が下り [内] 649 チェン・シが変りの側が下り [内] 649 月ェン・シが変りの側が下り 640 640 月ェン・シが変りの側が下り 640 640 月ェン・シが変りの側が下り 640 640 月ェン・シが変りの側が下り 640			【内】
622 9ケキャブ錠 10mg			
193 9			
624 タコシール組織接着用シート(9,5×4,8cm)			
(内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (巾) (巾			
(内) (日) (日			
(空) タゾビベ配合静注用45「明治」 (国) 9 プロス点眼液0.0015% (0.3mL) (30) 9 プロス点眼液0.0015% (0.3mL) (31) 5ミフルカプセル75 (32) 9 グロスニ点眼液0.0015% (0.3mL) (33) 9 プロスニ点眼液0.0015% (0.3mL) (34) 9 ジフルカプセル75 (35) 9 ジンブゲル1%(10g) (36) 9 ジシンブゲル1%(10g) (37) 9 ジシンブゲル1%(10g) (38) 9 ジピッド耳科用液0.3% (3.5g) (48) 636 9 ジピッド耳科用液0.3% (5.5g) (48) 637 9 ジピッド耳科用液0.3% (5.5g) (48) 638 9 ジピッド耳科用液0.3% (5.5g) (49) 639 9 ジドスピロングエン酸錠10mg「トーワ」 (40) 3 クリテント型を発10mg「トーワ」 (41) 640 ダンドンム酸500mg (1.5g) (42) 7 プラジール錠50mg (43) 7 プラジール錠50mg (44) 7 ブラジール錠50mg (45) 7 プロビジン塩酸塩酸 100mg「トーワ」 (46) 7 デンアンが成50mg (47) 7 プロビジン塩酸塩酸 100mg「トーワ」 (48) 7 プロビジン塩酸塩酸 100mg「トーワ」 (49) 7 デンドルが2.0mg (40) 7 デンドルが2.0mg (41) 7 プロビジン塩酸塩酸 100mg「トーワ」 (42) 7 プロビジン塩酸塩酸 100mg「トーワ」 (43) 7 プロビジン塩酸塩酸 100mg「トーワ」 (44) 7 プロビジン塩酸塩酸 100mg「トーワ」 (45) 7 デーデントル変50mg (46) 7 デンドルが2.0mg (47) 7 プロビジン塩酸1mg (1.5g) (48) 7 デンドルジの3mg (49) 7 デンドルジの3mg (49) 7 デンドルジの3mg (49) 7 デーアンS破25 μg (49) 7 デーアンS破5 mg (49) 7 プロデンS破5 mg (49) 7 プロデンS mg (49) 7 プロデンS mg (49) 7 プロデンS mg (49) 7 プロデンS mg (49) 7 プ			
628 タフマツE配合カブセル [外] 629 タブロス点眼液0.0015%(2.5mL) (外] 630 タブロスミニ点眼液0.0015%(2.5mL) (外] 631 タミフルカプセル75 (内) 632 タムスロシン塩酸塩のD錠O. 1 mg「サワイ」 (内) 633 グラシンアグル196(10g) (外) 634 タリビッド眼軟膏の.3%(3.5g) (外) 635 タリビッド耳科用液0.3%(5mL) (外) 636 グリビッド耳科用液0.3%(5mL) (外) 637 グルテパンNa静注5000単位/20mLシリンジニプロ」 (注) 638 クジトスピロンウエン酸錠10mg「トーワ」 (内) 639 タンドスピロンウエン酸錠10mg「トーワ」 (内) 639 タンドスピロンウエン酸錠10mg「トーワ」 (内) 640 グントリンム静注用20 (20 μ g) (力) 641 タンニン酸アルブミン(末) (内) 642 デアプリド錠25mg「サワイ」 (内) 643 デウラジール錠50mg (内) 644 デエクール点滴用の. 5g (注) 645 デオラ錠100 (内) 646 デガンカプセル10 (内) 647 デクロビジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 (内) 648 デザニジン錠1mg(サワイ」 (内) 649 デニジン検1mg(サワイ」 (内) 640 デモブトールXE点眼液0.5%(2.5mL) (外) 651 デモブトールXE点眼液0.5%(2.5mL) (外) 652 デャンピッフス錠0.5mg (内) 653 注射用水PL「アソー」(20 mL) (注) 654 注射用水PL「アソー」(20 mL) (注) 655 デラーデンS錠50 μg (内) 656 デラーデンS錠50 μg (内) 657 プロナミン錠5mog (内) 658 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 (内) 659 プロナミン錠5mog (内) 650 プロナミン錠5mog (内) 651 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 (内) 652 プロナミン錠5mog (内) 653 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 (内) 654 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 (内) 655 プラープンS錠500mg「三和」 (内) 656 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 (内) 657 プロナミン錠5mog (内) 658 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 (内) 659 プロナミン錠5mog (内) 650 ツムラ 乙字温エキス顆粒(医療用) (No.3) 2.5g (内)			
629 タプロスを眼液の0015%(2.5mL) (計) (お) (お) (お) (お) (お) (お) (お) (お) (お) (お			
630 タブロスミニ点眼液0.0015%(0.3mL) [お] 631 タミフルカブセル75 [内] 632 タムスロシン塩酸塩のD錠O.1 mg「サワイ」 [内] 633 ダラシンTゲル196(10g) [外] 634 タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g) [外] 635 タリビッド耳科用液0.3%(3.5g) [外] 636 ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニブロ」 [注] 637 炭酸水素ナトリウム(末) [内] 638 タンテトロン注射用20(20μg) [注] 639 タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」 [内] 640 ダントリウム静注用20mg [注] 641 タンニン酸アルブミン(末) [内] 642 デアプリド錠25mg「サワイ」 [内] 643 デウラジール磁差のmg 644 デロール点滴用の.5g [注] 645 デオラ錠100 [内] 646 デがソンカブセル10 [内] 647 デウロビジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 [内] 648 デザニジン塩酸1mg「サワイ」 [内] 649 デナジン塩酸塩錠25mg「リフイ」 [内] 640 デナンルル流線100mg「トーワ」 [内] 641 デナビルルを30mg「ドーワ」 [内] 642 デナジン塩酸1mg「サワイ」 [内] 643 デオラな20mg「「内] 644 データリール変500mg「「 [内] 645 デモタリール変500mg「「 [内] 646 デオンルルを30mg「下リフ」 [内] 647 デカリール変500mg「「 [内] 648 デナジン塩酸1mg「サワイ」 [内] 649 デモタリール変500mg「「 [内] 650 デモブトールなら値10mg「トーワ」 [内] 651 デンピックス錠1.5mg [内] 652 デャンピックス錠1.5mg [内] 653 注射用水PL「フソー」(500mL) [注] 654 注射用水PL「フソー」(500mL) [注] 655 デーアンS錠25μg [内] 657 デロナミン錠5mcg [内] 658 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 [内] 659 つくしA・M配合散(1.3g/包) [内] 650 ソムラ 工学連エキ取動化(医療用) [No.3] 2.5g [内] 660 ツムラ マ学連エキス颗粒(医療用) [No.3] 2.5g [内] 661 ツムラ エキス颗粒(医療用) [No.3] 2.5g [内] 661 ツムラ エキス颗粒(医療用) [No.3] 2.5g [内]			
632			【外】
633 ダラシンTゲル1%(10g) (外) 634 タリピッド眼軟膏0.3%(3.5g) (外) 635 タリピッド耳科用液0.3%(5mL) (外) 636 ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 (注) 637 炭酸水素ナトリウム(末) (内) 638 タンテトロン注射用20 (20 μg) (注) 639 タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」 (内) 640 ダントリウム静注用20mg (注) 641 タン二酸アルブミン(末) (内) 642 チアプリト錠25mg「サワイ」 (内) 643 チウラジール錠50mg (内) 644 チエクール点滴用0.5g (力) 645 チオン錠10mg「トーワ」 (内) 646 チガソンカブセル10 (内) 647 チワロビジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 (内) 648 ザビュジン錠1mg「サワイ」 (内) 649 チニタゾール反6mgがら96(2.5mL) (内) 650 チモブトールXE点眼液0.5%(2.5mL) (内) 651 注射用水PL「アソー」(20 mL) (上) 655 チラーデンS錠50 μg (内) 657 チロトンジ錠50 mg (内) 658 沈降皮酸カルシウム錠500mg「三和」 (内) 659 つくしょ・MBに含数1.3g/包) (内) 650 ソムラエギ散エキ乳粒(医療用) (No.3) 2.5g (内) 651 ソムラエギ散エキ乳粒(医療用) (No.3) 2.5g (内)	631	タミフルカプセル75	【内】
633 ダラシンTゲル1%(10g) (外) 634 タリピッド眼軟膏0.3%(3.5g) (外) 635 タリピッド耳科用液0.3%(5mL) (外) 636 ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 (注) 637 炭酸水素ナトリウム(末) (内) 638 タンテトロン注射用20 (20 μg) (注) 639 タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」 (内) 640 ダントリウム静注用20mg (注) 641 タン二酸アルブミン(末) (内) 642 チアプリト錠25mg「サワイ」 (内) 643 チウラジール錠50mg (内) 644 チエクール点滴用0.5g (力) 645 チオン錠10mg「トーワ」 (内) 646 チガソンカブセル10 (内) 647 チワロビジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 (内) 648 ザビュジン錠1mg「サワイ」 (内) 649 チニタゾール反6mgがら96(2.5mL) (内) 650 チモブトールXE点眼液0.5%(2.5mL) (内) 651 注射用水PL「アソー」(20 mL) (上) 655 チラーデンS錠50 μg (内) 657 チロトンジ錠50 mg (内) 658 沈降皮酸カルシウム錠500mg「三和」 (内) 659 つくしょ・MBに含数1.3g/包) (内) 650 ソムラエギ散エキ乳粒(医療用) (No.3) 2.5g (内) 651 ソムラエギ散エキ乳粒(医療用) (No.3) 2.5g (内)	632	タムスロシン塩酸塩OD錠O. 1mg「サワイ」	【内】
(35) タリピッド耳科用液0.3%(5mL) (分) (分) グルテルウンハa幹注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 (注) が酸水素ナトリウム(未) (内) (分) タンドトロン注射用20(20μg) (注) タンドトロン注射用20(20μg) (注) (内) (ク) タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」 (内) (内) グントリウム幹注用20mg (注) (タン二酸アルブミン(未) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内) (内	633	ダラシンTゲル1%(10g)	【外】
(注)	634	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	[外]
(内)	635	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	【外】
(注)	636	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
639 タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	637	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
640 ダントリウム静注用20mg [注]	638	タンデトロン注射用20 (20 μg)	【注】
(A1 タンニン酸アルブミン(末)	639	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
642 チアヴト錠25mg「サワイ」 【内】 643 チウラジール錠50mg 【内】 644 チエウール点滴用O.5g 【注】 645 チオラ錠100 【内】 646 チガソンカブセル10 【内】 647 チウロビジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 【内】 648 チザニジン錠1mg「サワイ」 【内】 649 チニタゾール錠500mg「F」 【内】 650 チモブトールXE点眼液0.5%(2.5mL) 【外】 651 チャンピックス錠0.5mg 【内】 652 チャンピックス錠1.5mg 【内】 653 注射用水PL「フソー」(20mL) 【注】 654 注射用水PL「フソー」(500mL) 【注】 655 チラーデンS錠25μg 【内】 666 チラーデンS錠50μg 【内】 657 チロナミン錠5mcg 【内】 658 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 【内】 659 つくしA・M配合散(1.3g/包) 【内】 660 ツムラ 乙字湯エキス顆粒(医療用) [No.3] 2.5g 【内】 661 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) [No.17] 2.5g 【内】	640		【注】
(内) 644 チェクール絵50mg			【内】
(注) 644 チェケール点滴用O. 5g (注) 645 チオラ錠100 (内) 646 チガソンカプセル10 (内) 647 チウロビジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 (内) 648 チザニジン錠1mg「サワイ」 (内) 649 チニタゾール錠500mg「F」 (内) 650 チモプトールXE点眼液0.5%(2.5mL) (内) 651 チャンピックス錠0.5mg (内) 652 チャンピックス錠1mg (内) 653 注射用水PL「フソー」(20mL) (注) 654 注射用水PL「フソー」(500mL) (注) 655 チラーデンS錠25μg (内) 656 チラーデンS錠25μg (内) 657 ゲロナミン錠5mcg (内) 658 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 (内) 659 つくしA・M配合散(1.3g/包) (内) 660 ツムラ 乙字湯ェキス顆粒(医療用) [No.3] 2.5g (内) 661 ツムラ 五字湯ェキス顆粒(医療用) [No.17] 2.5g (内)			【内】
(A)			【内】
(A) チガソンカプセル10 (内)			【注】
647			
[内] 648			
(A) チニタゾール錠500mg「F」			
(50) チモプトールXE点眼液0.5%(2.5mL) (外) 651 チャンピックス錠0.5mg (内) 652 チャンピックス錠1mg (内) 653 注射用水PL「フソー」(20mL) (注) 654 注射用水PL「フソー」(500mL) (注) 655 チラーデンS錠25μg (内) 656 チラーデンS錠50μg (内) 657 チロナミン錠5mcg (内) 658 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 (内) 659 つくしA・M配合散(1.3g/包) (内) 660 ツムラ 乙字湯エキス顆粒(医療用) [No.3] 2.5g (内) 661 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) [No.17] 2.5g (内)			
(内) 651 チャンピックス錠0.5mg			
 652 チャンピックス錠1mg 653 注射用水PL「フソー」(20mL) 654 注射用水PL「フソー」(500mL) 655 チラーチンS錠25μg 656 チラーデンS錠50μg 657 チロナミン錠5mcg 658 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 659 つくしA・M配合散(1.3g/包) 660 ツムラ Z字湯エキス顆粒(医療用) [No.3] 2.5g 661 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) [No.17] 2.5g [内] 			【内】
1			【内】
 (注) 注射用水PL「フソー」(500mL) (注)			【注】
 655 チラーデンS錠25μg 656 チラーデンS錠50μg 657 チロナミン錠5mcg 658 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 659 つくしA・M配合散(1.3g/包) 660 ツムラ 乙字湯エキス顆粒(医療用) [No.3] 2.5g 661 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) [No.17] 2.5g [内] 			【注】
657 チロナミン錠 5mcg 【内】 658 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 【内】 659 つくしA・M配合散(1.3g/包) 【内】 660 ツムラ 乙字湯ェキス顆粒(医療用) [No.3] 2.5g 【内】 661 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) [No.17] 2.5g 【内】	655		【内】
658 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 【内】 659 つくしA・M配合散(1.3g/包) 【内】 660 ツムラ 乙字湯ェキス顆粒(医療用) [No.3] 2.5g 【内】 661 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) [No.17] 2.5g 【内】	656	チラーヂンS錠50μg	【内】
659 つくしA・M配合散(1.3g/包) 【内】 660 ツムラ Z字湯エキス顆粒(医療用) [No.3] 2.5g 【内】 661 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) [No.17] 2.5g 【内】	657	チロナミン錠 5mcg	【内】
660 ツムラ 乙字湯エキス顆粒(医療用) [No.3] 2.5g 【内】 661 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) [No.17] 2.5g 【内】	658	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
661 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17] 2.5g 【内】	659	つくUA・M配合散(1.3g/包)	【内】
	660	ツムラ 乙字湯エキス顆粒(医療用) [No.3] 2.5g	【内】
662 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)[No.34]3.0g 【内】	661	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17] 2.5g	【内】
	662	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)[No.34]3.0g	【内】

NO	医薬品名	剤型
663	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[No.16] 2.5g	【内】
664	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[No.62]2.5g	【内】
665	ツムラ紫雲膏	[外]
666	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)[No.61] 2.5g	【内】
667	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)[No15] 2.5g	【内】
668	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)[No.106] 2.5g	【内】
669	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[No.24] 2.5g	【内】
670	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[No.1] 2.5g	【内】
671	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[No.107] 2.5g	【内】
672	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[No.18] 2.5g	【内】
673	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)[No.25] 2.5g	【内】
674	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)[No50] 2.5g	[内]
675	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)[No.31] 2.5g	【内】
676	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[No.12]2.5g	【内】
677	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[No.10] 2.5g	【内】
678	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)[No.114] 3.0g	【内】
679	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[No.48] 2.5g	【内】
680	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[No.19] 3.0g	【内】
681	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)[No108] 3.0g	【内】
682	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[No.100] 2.5g	【内】
683	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)[No.47] 2.5g	【内】
684	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒(医療用)[No.38] 2.5g	【内】
685	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[No.23] 2.5g	【内】
686	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[No.29] 3.0g	【内】
687	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)[No.7] 2.5g	【内】
688	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)[No.37]2.5g	[内]
689	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[No.14] 2.5g	[内]
690	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[No.54]2.5g	[内]
691	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[No.43] 2.5g	[内]
692	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
693	リンロブテロールテープ 2mg「久光」	[9h]
694	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
695	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)	[9h]
696	ディナゲスト錠1mg	[内]
	ディビゲル1mg(ゲル)	[外]
698	ディフェリンゲル0.1%(15g)	[外]
699	ディレグラ配合錠	[内]
	デエビゴ錠5mg	[内]
701	テオドール錠100mg	[内]
702	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」	[内]
703	テオロング錠200mg	[内]
703	デカドロン錠0.5mg	[内]
704	デキサート注射液3.3mg	[注]
706		
706	デキサンVG軟膏 0.12% (日医工) デキフトロメトルファン臭化 水素酸塩錠1.5 mg 「NP」	[外] [内]
	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	【内】
708 709	デクスメデトミジン静注液200 μg/50mLシリンジ	【注】
	デザレックス錠5mg	【内】
	デスモプレシン・スプレー2. 5協和(125μg1瓶)	[外]
711	テタノブリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】
	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】
	テネリア錠20mg	[内]
	デノシン点滴静注用500mg	【注】
715	テノゼット錠 300mg	【内】
716	デパケンシロップ5%(50mg/mL)	【内】
82	テプレノンカプセル50mg「サワイ」	[内]
717	テプレノン細粒10%「サワイ」	【内】
718	デベルザ錠20mg	【内】
719	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】
720	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	【内】
721	デュファストン錠 5mg	【内】
722	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
723	テラルビシン注射用10mg	【注】
724	テリルジー100ェリプタ	【外】
725	テリルジー200エリプタ30吸入用	【外】
726	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」	

NO 医薬品名 728	割型
729	[内] [外] [外] [外] [注] [内] [注] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [内] [注]
730 デルモベート 大スカルブローション0.05%(10g) 731 デルモベート 軟膏0.05%(5g) 732 デルモ生食 250mL(注射用) 733 デレミンソフト坐薬10mg 734 トアラセット配合錠「トーワ」 735 動注用アイエーコール100mg 736 トーワチーム配合顆粒 737 ドキシル注 20mg 738 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 739 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 740 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」 741 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」 742 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」 743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 744 ドネペジル塩酸塩のD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩のD錠5mg「明治」 746 ドパコール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注 25mg(0.25%10mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注 25mg(0.25%10mL1管)	[外] [外] [外] [注] [例] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [共]
731 デルモベート軟膏0.05%(5g) 732 デルモ生食 250mL(注射用) 733 デレミンソフト坐薬10mg 734 トアラセット配合錠「トーワ」 735 動注用アイエーコール100mg 736 トーワチーム配合顆粒 737 ドキシル注 20mg 738 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 739 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 740 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」 741 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」 742 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」 743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 744 ドネペジル塩酸塩のD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩のD錠5mg「明治」 746 ドパコール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	[州] [注] [州] [州] [州] [州] [河] [注] [河] [注] [注] [河] [河] [河] [河] [河]
732	[注] [外] [内] [注] [注] [注] [注] [内] [内]
733 テレミンソフト坐薬10mg 734 トアラセット配合錠「トーワ」 735 動注用アイエーコール100mg 736 トーワチーム配合顆粒 737 ドキシル注 20mg 738 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 739 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 740 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」 741 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医エ」 742 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」 743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 744 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 746 ドパコール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.259610mL1管) 748 ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	[外] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内]
734 トアラセット配合錠「トーワ」 735 動注用アイエーコール100mg 736 トーワチーム配合顆粒 737 ドキシル注 20mg 738 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 739 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 740 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」 741 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」 742 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」 743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 744 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 746 ドパロール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.259610mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	[內] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [内]
735 動注用アイエーコール100mg 736 トーワチーム配合顆粒 737 ドキシル注 20mg 738 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 739 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 740 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」 741 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」 742 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤウルト」 743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤウルト」 744 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 746 ドパコール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.259610mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	(注) (內) (注) (注) (注) (內) (內)
736 トーワチーム配合顆粒 737 ドキシル注 20mg 738 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 739 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 740 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」 741 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」 742 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」 743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 744 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 746 ドパロール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.259610mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	[内] [注] [注] [注] [内] [内] [内]
737 ドキシル注 20mg 738 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 739 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 740 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」 741 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」 742 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」 743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 744 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 746 ド/ロール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	[注] [注] [注] [内] [内]
738 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 739 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 740 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」 741 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」 742 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤウルト」 743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 744 ドネベジル塩酸塩のD錠3mg「明治」 745 ドネベジル塩酸塩のD錠5mg「明治」 746 ドパコール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	[注] [注] [内] [内]
739 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 740 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」 741 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」 742 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」 743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 744 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 746 ドパロール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】 【内】 【内】 【注】
740 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」 741 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」 742 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」 743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 744 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 746 ドパコール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	[内] [内] [注]
741 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」 742 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」 743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 744 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 746 ドパコール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	[内] [注]
 742 ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」 743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 744 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 746 ドパロール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」 	【注】
743 ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」 744 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 746 ドパコール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	
744 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 745 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 746 ドパロール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】
745 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 746 ドパコール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	
746 ドパコール配合錠L100 747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【内】
747 ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管) 748 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【内】
748 ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【内】
	【注】
749 トピナ錠50mg	【注】
<u> </u>	【内】
750 トプシムクリーム(5g)	【外】
751 ドプスOD錠100mg	【内】
752 ドプタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
753 ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】
754 ドブポン注0.3%シリンジ	【注】
755 ドボベット軟膏 (15g)	【外】
756 トラセミドOD錠4mg「TE」	【内】
757 トラゼンタ錠 5mg	[内]
758 トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	[内]
759 トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】
760 トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」	【内】
761 トラパタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
762 トラマールOD錠 25mg	【内】
763 トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
764 ドラマミン錠50mg	【内】
765 トランコロン錠 7.5mg	【内】
766 トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
767 トリキュラー21(錠 21日分1組)	【内】
768 トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	[内]
769 トリノシン顆粒10%(100mg/g/包)	[内]
770 トリプタノール錠10	【内】
771 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
772 ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
773 ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)	【外】
774 トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス	【注】
775 トレーランG液75g (液:225mL)	【内】
776 トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
777 ドレニゾンテープ4 μ g / cm2	【外】
778 トレリーフOD錠 25mg	【内】
779 ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
780 トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	【内】
781 ナウゼリンOD錠10	【内】
782 ナウゼリン坐剤60	【外】
783 ナフトビジルOD錠25mg「EE」	【内】
784 ナベルビン注10(1mL)	【注】
785 ナベルピン注40(4mL)	【注】
786 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
787 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
788 二コチネルTTS 10(貼付)	【外】
789 ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
790 ニコチネルTTS 30(貼付)	[外]
791 ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
	【注】
792 ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	

NO	医薬品名	剤型
794	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	[内]
795	ニトプロ持続静注液6mg2mL	【注】
796	ニドラン注射用50mg	【注】
797	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
798	ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)	【注】
799	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	【注】
800	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	【注】
801	ニトロペン舌下錠0.3mg	【内】
802	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
803	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
804	ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」	【内】
805	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
806	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	【内】
807	ニュープロパッチ13.5mg	[外]
808	ニュープロパッチ4. 5mg	[外]
809	ニュープロパッチ9mg	[外]
810	ネイリンカプセル100mg	【内】
811	ネオアミユー輸液 200mL	【注】
812	ネオーラル10mgカプセル	【内】
813	ネオーラル25mgカプセル	【内】
814	ネオーラル50mgカプセル	【内】
815	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	[外]
816	ネオシネジンコーワ注1mg	【注】
817	ネオビタカイン注 5mL	【注】
818	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
819	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)	[外]
820	ネキシウムカプセル20mg	【内】
821	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】
822	ネクサバール錠200mg	【内】
823	ネスプ注射液120µgプラシリンジ	【注】
824	ネスプ注射液180 µgプラシリンジ	【注】
825	ネスプ注射液20 μgプラシリンジ	【注】
826	ネスプ注射液40 µ gプラシリンジ	【注】
827	ネスプ注射液60 µgプラシリンジ	【注】
828	ネリゾナソリューション0.1%(10mL)	[外]
829	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)	【外】
830	ネリプロクト坐剤	[外]
831	ノイトロジン注100 μg	【注】
832	ノイトロジン注250 μg	【注】
833	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】
834	ノイロトロピン錠4単位	【内】
835	ノーベルバール静注用250mg	【注】
836	ノバスタンHI注10mg	【注】
837	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)	【注】
838	ノバミン錠5mg	【内】
839	ノパントロン注10mg(5mL)	【注】
840	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
841	ノボラピッド注フレックスタッチ	【注】
842	ノポリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
843	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
844	ハーセプチン注射用150	【注】
845	ハーセプチン注射用60	【注】
846	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
847	パーロデル錠2.5mg	【内】
848	バイアスピリン錠100mg	【内】
849	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
850	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
851	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
852	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
853	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
854	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
855	ハイゼット錠50mg	【内】
856	ハイドレアカプセル500mg	[内]
857	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	[外]
858	パキシルCR錠12.5mg	【内】
000		

NO	医薬品名	剤型
860	パウタ配合錠	【内】
861	パウトロパン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
862	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
863	パウリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
864	パタノール点眼液0.1%	【外】
865	パックス発泡顆粒	【外】
866	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
867 868	バファリン配合錠A330 ハブトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【内】
869	パム静注500mg(20mL)	【注】
870	バムスターS200(水性懸濁液)(150mL)	【内】
871	パラシクロビル錠500mg「アスペン」	[内]
872	パラミヂンカプセル300mg	【内】
873	パリエット錠 5mg	【内】
874	パリエット錠10mg	【内】
875	パリプライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
876	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
877	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
878	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
879	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】
880 881	バレイショデンブン(末)	【内】
881	バロス消泡内用液2%(300mL) ハロペリドール錠1mg「アメル」	【内】
883	/ロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
884	パンコマイシン塩酸塩散0.5g「7ァイザ-」	[内]
885	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「ファイザー」	【注】
886	パンテチン錠 100mg「YD」	[内]
887	パンテニール注100mg「JGJ(1mL)	【注】
888	ハンブ注射用1000	【注】
889	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
890	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
891	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
892	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
002	ピーエフッパ・1 早齢法 1000!	F:+1
893	ピーエヌツイン-1号輸液 1000mL ピーエヌツイン-2号輸液 1100ml	【注】
894	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
894		
894 895	ビーエヌツイン-2号輸液 1100mL ビーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
894 895 896	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローションO.3% (50g)	[注] [注] [外]
894 895 896 897	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg	[注] [注] [外]
894 895 896 897 898	ピーエヌツイン-2号輪液 1100mL ピーエヌツイン-3号輪液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輪液 (500mL)	【注】 【注】 【外】 【内】
894 895 896 897 898	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【注】 【注】 【外】 【内】 【注】
894 895 896 897 898 899 900 901	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローションO.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包)	[注] [注] [外] [内] [注] [内] [内] [内] [内]
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローションO.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」	[注] [注] [外] [内] [注] [内] [内] [内] [内]
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローションO.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーブリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」	[注] [注] [外] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内]
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローションO.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーブリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピクシリンカプセル250mg	[注] [注] [外] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内]
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローションO. 3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーブリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピクシリンカプセル250mg ピクシリンオナル1g	[注] [注] [外] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注]
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローションO. 3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーブリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピウシリンカプセル250mg ピクシリン注射用1g ピクトーザ皮下注18mg	[注] [注] [外] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローションO. 3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーブリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピクシリンカプセル250mg ピクシリンオナル1g	[注] [注] [外] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注]
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピウシリンカプセル250mg ピクシリン注射用1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	[注] [注] [外] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピウシリンカプセル250mg ピウシリンオオセル250mg ピウシリン注射用1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL	[注] [注] [外] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注]
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンのD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合のD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピクシリンカプセル250mg ピクシリン注射用1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL	[注] [注] [外] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [内] [注] [内] [注] [注] [注]
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローションO. 3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーブリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピクシリンカブセル250mg ピクシリンカブセル250mg ピクシリン注射用1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液O. 75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 50mL	[注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注]
894 895 896 897 898 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローションO. 3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーブリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピクシリンカブセル250mg ピクシリンカブセル250mg ピクシリン注射用1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液O. 75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270注20mL ピジパニール注射用5KE	[注] [注] [外] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注]
894 895 896 897 898 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンのD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合のD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドのD錠80mg「NK」 ピクシリンカプセル250mg ピクシリンオサロル250mg ピクシリン注射用1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 20mL ピジパーク270注20mL ピンパニール注射用5KE ピスコート0.5眼粘弾剤 ピスダイン静注用15mg ピスコンH錠200mg	[注] [注] [[注] [[h] [[h] [[h] [[h] [[h] [[
894 895 896 897 898 900 901 902 903 904 905 906 907 908 910 911 912 913 914 915	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠8Omg「NK」 ピクシリンカプセル250mg ピクシリンカプセル250mg ピクシリン注射用1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 120mL ピンパニール注射用5KE ピスコート0.5眼粘弾剤 ピスタイン静注用15mg とスコント総定200mg ピソノテーブ 2mg	[注] [注] [外] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [外] [注] [外]
894 895 896 897 898 900 901 902 903 904 905 906 907 910 911 912 913 914 915 916	ピーエヌツイン-2号輪液 1100mL ピーエヌツイン-3号輪液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輪液 (500mL) ピオグリタソンの配能15mg「トーワ」 ピオスリー配合のD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輪液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピクシリンカプセル250mg ピクシリン注射用1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270注20mL ピジパーク270注20mL ピシパニール注射用5KE ピスコート0.5眼粘弾剤 ピスダイン静注用15mg とスコントは200mg ピソノテーブ 2mg ピソノテーブ 4mg	[注] [注] [[注] [[h] [[h] [[h] [[h] [[h] [[
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916	ピーエヌツイン-2号輪液 1100mL ピーエヌツイン-3号輪液 1200mL ピーソフテンローションO. 3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーブリード輪液 (500mL) ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輪液 500mL ピカルタミドOD錠8Omg「NK」 ピクシリンオ射用1g ピクシリン注射用1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液O. 75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 50mL ピンパニール注射用5KE ピスコート0.5眼粘弾剤 ピスタイン静注用15mg ヒスコントラーブ 2mg ピソノテーブ 4mg ピソノテーブ 4mg	[注] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [济] [注] [内] [注] [内] [注] [内] [注]
894 895 896 897 898 900 901 902 903 904 905 906 907 910 911 912 913 914 915 916 917 918	ピーエヌツイン-3号輪液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輪液 (500mL) ピオグリタソンの2歳15mg「トーワ」 ピオスリー配合のD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輪液 500mL ピカルラミドのD錠80mg「NK」 ピクシリンカプセル250mg ピクシリン注射用1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 50mL ピジパール注射用5KE ピスコート0.5眼粘弾剤 ピススレン辞注 用15mg ピコスリカーオーの3・眼を弾剤 ピスタイン静注用15mg ピコスリカーオーの3・眼粘弾剤 ピステーブ 2mg ピソノテーブ 4mg ピソノテーブ 8mg ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	[注] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
894 895 896 897 898 900 901 902 903 904 905 906 907 910 911 912 913 914 915 916 917 918	ピーエヌツイン-2号輸液 1200mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーブルド輸液(500mL) ピオグルタゾンのD錠15mg「トーワ」 ピオスルー配合のD錠 ピオフエルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルシミドのD錠80mg「NK」 ピウシリンガナセル250mg ピクシリンオオ用1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL ピジパーク270 50mL ピジパークフールションを選挙を ピスコートの5眼粘弾剤 ピスダイン静注用15mg ヒスコンH錠200mg ピソノテーブ 2mg ピソノテーブ 4mg ピソノテーブ 4mg ピソプロロールフスル酸塩錠0.625mg「トーワ」 ピグプロロールフスル酸塩錠2.5mg「トーワ」	[注] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [共] [共] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
894 895 896 897 900 901 902 903 904 905 906 907 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンのD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピクシリンカプセル250mg ピクシリンオサ相1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 注20mL ピシバニール注射用5KE ピスコート0.5眼粘弾剤 ピスダイン静注用15mg ヒスコートの5・眼粘弾剤 ピソノテーブ 2mg ピソノテーブ 4mg ピソノテーブ 8mg ピソプロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 ピグーサスアル酸41mg 100mg ピタブロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 ピダーザ注射用100mg ピタジェクト注キット	[注] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [注] [注] [内] [注] [注] [内] [共] [注] [共] [共] [共] [共] [共] [共] [共] [共] [共] [共
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919	ピーエヌツイン-2号輸液 1200mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーブルド輸液(500mL) ピオグルタゾンのD錠15mg「トーワ」 ピオスルー配合のD錠 ピオフエルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルシミドのD錠80mg「NK」 ピウシリンガナセル250mg ピクシリンオオ用1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL ピジパーク270 50mL ピジパークフールションを選挙を ピスコートの5眼粘弾剤 ピスダイン静注用15mg ヒスコンH錠200mg ピソノテーブ 2mg ピソノテーブ 4mg ピソノテーブ 4mg ピソプロロールフスル酸塩錠0.625mg「トーワ」 ピグプロロールフスル酸塩錠2.5mg「トーワ」	[注] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [共] [共] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
894 895 896 897 900 901 902 903 904 905 906 907 911 912 913 914 915 916 917 918 919	ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル顆粒分包250mg ピーフリード輸液 (500mL) ピオグリタゾンのD錠15mg「トーワ」 ピオスリー配合OD錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピクシリンカプセル250mg ピクシリンカプセル250mg ピクシリンオサ和1g ピクトーザ皮下注18mg ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 120mL ピシバニール注射用5KE ピスコート0.5眼粘弾剤 ピスダイン静注用15mg ヒスコントが建立のmg ピソノテーブ 2mg ピソノテーブ 4mg ピソノテーブ 4mg ピソノテーブ 8mg ピソプロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 ピグプロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 ピグプロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 ピグーザ注射用100mg ピタジェクト注キット ピタパスタチンカルシウムOD錠2mg「日医エ」	[注] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [付] [注] [付] [付] [付] [付] [付] [付] [付] [付] [付] [付
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923	ピーエヌツイン-2号輸液 1200mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ピーソフテンローション0.3% (50g) ピートル颗粒分包250mg ピーフルード輸液 (500mL) ピオグルタゾンの錠15mg「トーワ」 ピオスルー配合の錠 ピオフェルミンR散(1g/包) ピカーボン輸液 500mL ピカルタミドOD錠80mg「NK」 ピクシリンカプセル250mg ピクシリンオナルと50mg ピクシリンオナルシウムの用液0.75%「CHOS」 ピジパーク270 100mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 50mL ピジパーク270 技20mL ピシバニール注射用5KE ピスコート0.5眼粘弾剤 ピスダイン静注用15mg ピスレン井錠200mg ピソノテーブ 2mg ピソノテーブ 4mg ピソノテーブ 4mg ピソノテーブ 8mg ピソプロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 ピダーヴ注射用100mg ピタ・ヴ注射用100mg ピタ・ジュクト注キット ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医エ」 ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医エ」	[注] [注] [外] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [注] [内] [注] [注] [注] [注] [外] [外] [外] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内

NO	医薬品名	剤型
926 I	ヒダントールF配合錠	【内】
927	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	【注】
928	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】
929	ビビアント錠20mg	【内】
930	ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
931	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
932	ヒビスコール液A0.5%	【外】
933	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
934	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
935 I	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
936	ビムパット錠50mg	【内】
937	ピムロ顆粒(0.5g/包)	【内】
938	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
939	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
940	ヒューマログ注ミリオペン(300単位1キット)	【注】
941	ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位1キット)	【注】
942	ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位1キット)	【注】
943	ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL	【注】
944	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
945	ビラ/ア錠20mg	【内】
946	ピラマイト原末	【内】
947	ビリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
948 l	ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」	【内】
949	ピルシカイニド塩酸塩カブセル 25mg「トーワ」	【内】
950 l	ピルシカイニド塩酸塩カブセル 50mg「トーワ」	【内】
951 l	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
952	ビレーズトリエアロスフィア56吸入用	【外】
953	ファーストシン静注用1g	【注】
954	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
955	ファルモルビシン注射用10mg	【内】
956	ファンガード点滴用50mg	【注】
957	ファンギゾンシロップ 100mg∕mL	【外】
958	フィコンパ錠2mg	【内】
959	フィジオ140輸液 500mL	【注】
960	フィニバックス点滴静注用0. 25g	【注】
961	ブイフェンド200mg静注用	【注】
962	ブイフェンド錠50mg	【内】
963	フィブラストスプレー500	【外】
964	フィブロガミンP静注用(4mL)	【注】
965	フィルグラスチムBS注 75μgシリンジ「モチダ」	【注】
966	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
967	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
968	フェソロデックス筋注250mg	【注】
969	フェノール・亜鉛華リニメント	【外】
970	フェノバルビタール散10%「マルイシ」(100mg/g)	【内】
971	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】
972	フェブリク錠10mg	【内】
973	フェブリク錠20mg	【内】
974	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
975	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	【注】
976	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	【注】
977	フェントステープ0.5mg	【外】
978	フェントステープ1mg	【外】
980	フェントステープ2mg	【外】
979	フェントステーブ4mg	【外】
981	フォシーガ錠 10mg	【内】
982	フォシーガ錠 5mg	【内】
983	フォリアミン錠(5mg)	【内】
984	フシジンレオ軟膏2%(10g)	【外】
985	ブシラミン錠100mg「トーワ」	【内】
986	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	【内】
987	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	【注】
988	プッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
989	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)	【注】
990	プラザキサカプセル110mg	【内】
	プラザキサカプセル75mg	-

NO	医薬品名	剤型
992	フラジール内服錠250mg	【内】
993	フラジール膣錠250mg	[外]
994	プラバール配合錠	【内】
995		【内】
996	プラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
997	プランルカスト錠225「日医工」	【内】
998	フリウェル配合錠 LD	【内】
999	プリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
1000	ブリディオン静注200mg	【注】
1001	プリモジアン・デポー筋注(1mL)	【注】
1002	プリモボラン錠5mg	【内】
1003	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%(5mL)	【外】
1004	フルオメソロン0. 1%点眼液	【外】
1005	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
1006	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
1007	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
1008	フルスタン錠0.3	【内】
1010	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(20mL)	【注】
1011	フルタイド100 μgエアゾール60吸入用	【外】
1012	フルダラ 静注用50mg	【注】
1013	フルツロンカプセル200	【内】
1014	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	[外]
1015	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
1016	ブルフェン錠100	【内】
1017	フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)	【注】
1018	フルマリン静注用1g	【注】
1019	ブレオ注射用15mg	【注】
1020	プレオ注射用5mg	【注】
1021	フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」	【内】
1022	ブレディニンOD錠50	【内】
1023	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	【内】
1024	プレドニン錠5mg	【内】
1025	プレマリン錠0.625mg	【内】
	プロイメンド点滴静注用150mg	【注】
	フローレス眼検査用試験紙0.7mg プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【外】
1028	プロクトセディル軟膏(2g)	【外】
	プログラフカプセル0.5mg	【内】
	プログラフカプセル1mg	[内]
		【注】
1033	プログラフ顆粒O. 2mg	【内】
1034	プロゲテポー筋注125mg(1mL)	【注】
1035	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1036	プロジフ静注液400(5mL)	【注】
1037	プロジン外用液5%(30mL)	[外]
1038	プロスコープ300注100mL	【注】
	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
	プロスタンディン点滴静注用500μg	【注】
	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
	プロセキソール錠0.5mg	【内】
	プロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
	フロセミド錠20mg「NP」 フロセミド錠40mg「NP」	【内】
	プロタノールに注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
	プロタノールS錠15mg	【内】
	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
	ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1050	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
1051	プロトピック軟膏0.1%(5g)	[外]
1052	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1053	プロナーゼMS(10g)	【内】
1054	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg 「オーハラ」	【内】
1055	プロハンス静注シリンジ 13mL	【注】
1056	プロハンス静注シリンジ 17mL	【注】
1057	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】

NO	医薬品名	剤型
058	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	【内】
564	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	【注】
1059	プロポフォール静注 1 %50mL「マルイシ」	【注】
1060	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1061	プロムフェナクNa点眼液O. 1 %「日新」	【外】
1062	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ-」	【外】
1063	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1064	プロメライン軟膏 * (ジェイドルフ)(20g)	【外】
1065	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1066	フロリード膣坐剤100mg	[外]
1067	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1068	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1069	ペガシス皮下注180 μ g(1mL)	【注】
1070	ペガシス皮下注90 µg(1mL) ペガモックス点眼液0.5%(5mL)	【注】
1071	ヘキザック人に吸液0.3%(SmL) ヘキザックAL1%綿棒12	【外】
1072	ペギンクリーム10% (20g)	【外】
1073	ペグイントロン皮下注用100 µg/0.5mL用	【注】
1074	ペグイントロン皮 下注用100 μg/0.5mL用 ペグイントロン皮下注用50 μg/0.5mL用	【注】
1075	ペサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1077	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1078	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1079	ベシケアOD錠2.5mg	【内】
1080	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	[外]
1081	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	[外]
1082	へスパンダー輸液 (注射:500mL)	【注】
1083	ベセルナクリーム5%	[外]
1084	ベタニス錠25mg	【内】
1085	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1086	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1087	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1088	ペチジン塩酸塩注射液 50mg 「タケダ」	【注】
1089	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1090	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1091	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ「NP」10mL(ロック用)	【注】
1092	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	【注】
1093	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】
1094	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	【注】
1095	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1096	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1097	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1098	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1099	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1100	ヘパン類似物質油性ケリーム 0.3%「日医工」(25g)	【外】
1101	ベピオゲル 2.5% (15g)	【外】
1102	ヘブスプリンH静注1000単位	【注】
1103	ヘプタバックスー II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1104	ベプリコール錠50mg	【内】
1105	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1106	ヘモポリゾン軟膏 (2g)	【外】
1107	ベラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
1108	ベラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1109	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1110	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
111	ベリプラストP コンピセット 組織接着用 1mL 2キット1組	[外]
112	ベリプラストP コンピセット 組織接着用 3mL 2キット1組	[外]
113	ベリプラストP コンピセット 組織接着用 5mL 2キット1組	[外]
114	ベルサンチン-Lカブセル 150mg	【内】
115	ペルジピンLAカブセル40mg	【内】
1116	ベルジピン注射液2mg2mL	【注】
1117	ベルソムラ錠 15mg	【内】
1118	ベルソムラ錠 20mg	【内】
1119	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	[外]
1120	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1121	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1122	ペンタサ注腸1g(100mL)	【外】

	医薬品名	剤型
NO 1123	広栄m-4 ベンタサ顆粒94% (1000mg/包)	【内】
1124	ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)	[内]
1125	ペンタゾシン注15mg「KN」(1mL)	【注】
1126	ボアラ軟膏0.12% (5g)	【外】
1127	ボースデル内用液10 (液:10mg250mL)	【内】
1128	ホーリンV膣用錠1mg	【外】
1129	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
1130	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
1131	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】
1132	ホスミシン錠500mg	【内】
1133	ボスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1134	ボスミン注1mg(1mL)	【注】
	ホスリボン配合顆粒	【内】
	ホスレノールOD錠250mg	[内]
	ボトックス注用50単位 ボナロン経ロゼリー35mg	【注】
1139	ボナロン点滴静注バッグ900 μg	【注】
	ポピドンヨードガーグル7%「マイラン」(30mL)	【外】
	ポピドンヨード外用液10%「マイラン」(250mL)	[外]
	ポピドンヨードゲル10%「マイラン」(90g)	【外】
	ポピドンヨードゲル10%「明治」(4g)	[外]
1144	ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	[外]
1145	ポラブレジンクOD錠 75mg「サワイ」	【内】
1146	ポララミン注 5mg	【注】
1147	ポララミン錠2mg	【内】
1148	ポリカルボフィルCa細粒83,3%「日医工」	【内】
1149	ポリドカスクレロール1 %注2mL	【注】
	ホリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1151	ボルベン輸液6%	【注】
1152	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1153	ボンアルファハイ軟膏20 μ g/ g(10g) ボンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【外】
1155	ボンビバ静注1mgシリンジ	【注】
	1000 111 111 111 111 111 111 111 111 11	1,44
1156	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	【注】
1156 1157	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
1157		
1157	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
1157 1158	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒	【注】
1157 1158 1159	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg	【注】 【内】 【注】
1157 1158 1159 1160	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg	[注] [内] [注]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg	[注] [内] [注] [注] [注] [注]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g)	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [内]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [内]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [注]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166	マーカイン注音麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL マグネスコーブ静注38%シリンジ13mL	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [内]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg マグネスコープ静注38%シリンジ11mL マグネスコープ静注38%シリンジ13mL マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168	マーカイン注脅麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg マグネスコープ静注38%シリンジ11mL マグネスコープ静注38%シリンジ20mL マズネスコープ静注38%シリンジ20mL マスキントエタノール液(0.5w/v%)(500mL)	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [注] [付]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170	マーカイン注脅麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL マグネスコーブ静注38%シリンジ13mL マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドバー配合錠	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [付] [注]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170	マーカイン注脅麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL マグネスコーブ静注38%シリンジ13mL マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠 マプリン散1%(10mg/g)	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [注] [内] [[注] [[[]] [[[]] [[]]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170	マーカイン注音麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マヴコロールP(50g) マウサルトRPD錠10mg マヴネスコーブ静注38%シリンジ11mL マヴネスコーブ静注38%シリンジ13mL マヴネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠 マブリン散1%(10mg/g) マブロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [注] [[注] [
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1169 1170 1171 1172 1173	マーカイン注脅麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL マグネスコーブ静注38%シリンジ3mL マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠 マブリン散1%(10mg/g) マプロテリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットールS注射液「YD」300mL ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミグリステン錠20	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176	マーカイン注脅麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マヴコロールP(50g) マウサルトRPD錠10mg マヴネスコープ静注38%シリンジ11mL マヴネスコープ静注38%シリンジ13mL マヴネスコープ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドバー配合錠 マプリン散1%(10mg/g) マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットールS注射液「YDJ300mL ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミグリステン錠20	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内]
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176	マーカイン注脅麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マグサルトRPD錠10mg マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL マグネスコーブ静注38%シリンジ13mL マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠 マブリン散1%(10mg/g) マブロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットールS注射液「YD」300mL ミオコールスブレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミグリステン錠20 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 ミケルト配合点眼液	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [[注] [内] [[[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177	マーカイン注脅麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL マグネスコーブ静注38%シリンジ13mL マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠 マブリン散1%(10mg/g) マブロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットールS注射液「YD」300mL ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミグリステン錠20 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 ミケルナ配合点眼液 ミチヴリニドOa・OD錠10mg「三和」	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178	マーカイン注音麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マヴコロールP(50g) マウサルトRPD錠10mg マヴネスコーブ静注38%シリンジ11mL マヴネスコーブ静注38%シリンジ13mL マヴネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠 マブリン散1%(10mg/g) マブロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットールS注射液「YDJ300mL ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミゲリステン錠20 ミゲリトールOD錠50mg「サワイ」 ミケルナ配合 点眼液 ミチヴリニドCa・OD錠10mg「三和」 ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178	マーカイン注音麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL マグネスコーブ静注38%シリンジ13mL マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠 マブリン散1%(10mg/g) マブロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットール注射液「YD」300mL ミオコールスブレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミグリステン錠20 ミグリトールのD錠50mg「サワイ」 ミケルナ配合 息波 ミチヴリニドCa・OD錠10mg「三和」 ミドリンM点眼液0.4%(5mL) ミニブレス錠0.5mg	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180	マーカイン注脅麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL マグネスコーブ静注38%シリンジ3mL マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドバー配合錠 マブリン散1%(10mg/g) マブロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットールS注射液「YD」300mL ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミグリステン錠20 ミグリトールのD錠50mg「サワイ」 ミケルナ配合 点眼液 ミチヴリニドCa・OD錠10mg「三和」 ミドリンM点眼液0.4%(5mL) ミニブレス錠0.5mg ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181	マーカイン注音麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL マグネスコーブ静注38%シリンジ13mL マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠 マブリン散1%(10mg/g) マブロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットール注射液「YD」300mL ミオコールスブレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミグリステン錠20 ミグリトールのD錠50mg「サワイ」 ミケルナ配合 息波 ミチヴリニドCa・OD錠10mg「三和」 ミドリンM点眼液0.4%(5mL) ミニブレス錠0.5mg	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [注] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181	マーカイン注音麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキコエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マクサルトRPD錠10mg マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL マグネスコーブ静注38%シリンジ13mL マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドバー配合錠 マブリン散1%(10mg/g) マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットールS注射液「YD」300mL ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミグリステン錠20 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 ミケルナ配合点眼液 ミチヴリニドQ・OD錠10mg「三和」 ミドリンM点眼液0.4%(5mL) ミニブレス錠0.5mg ミノサイクリン塩酸塩塩前00mg「トーワ」	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [内] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183	マーカイン注音解用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用10mg マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マヴコロールP(50g) マウサルトRPD錠10mg マヴネスコーブ静注38%シリンジ11mL マヴネスコーブ静注38%シリンジ13mL マヴネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠 マブリン散1%(10mg/g) マプロテリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットールを注射液「YD」300mL ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミヴリステン錠20 ミヴリトールのD錠50mg「サワイ」 ミケルナ配合点眼液 ミチヴリニドCa・OD錠10mg「三和」 ミドリンM点眼液0.4%(5mL) ミニブレス錠0.5mg ミノサイクリン塩酸塩塩に10mg「日医エ」 ミノサイクリン塩酸塩塩に10mg「日医エ」 ミノサイクリン塩酸塩塩に10mg「日医エ」 ミノサイクリン塩酸塩塩に10mg「日医エ」 ミノサイクリン塩酸塩塩に10mg「日医エ」 ミノサイクリン塩酸塩塩に10mg「日医エ」	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [内] [注] [内] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185	マーカイン注音麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g) マウサルトRPD錠10mg マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL マグネスコーブ静注38%シリンジ13mL マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠 マプリン散1%(10mg/g) マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットールS注射液「YDJ300mL ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミグリステン錠20 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 ミケルナ配合点眼液 ミチヴリニドCa・OD錠10mg「三和」 ミドリンM点眼液0.4%(5mL) ミニブレス錠0.5mg ミノサイクリン塩酸塩塩20mg「日医エ」 ミノサイクリソ塩酸塩塩50mg「日医エ」 ミノサイクリソ塩酸塩塩50mg「日医エ」 ミノサイクリソ塩酸塩塩50mg「日医エ」 ミノサイクリソ塩酸塩塩50mg「日医エ」 ミノサイクリソ塩酸塩塩50mg「日医エ」 ミノサイクリソ塩酸塩塩50mg「日医エ」 ミノサイクリソ塩酸塩塩50mg「日医エ」 ミノサイクリソ塩酸塩塩50mg「日医エ」 ミンドロン酸錠50mg「日医エ」 ミンドロン酸錠50mg「日医エ」 ミンドロン酸錠50mg「日医エ」 ミンドDM細粒	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [注] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185	マーカイン注音麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マヴコロールP(50g) マウサルトRPD錠10mg マヴネスコーブ静注38%シリンジ11mL マヴネスコーブ静注38%シリンジ20mL マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠 マプリン散1%(10mg/g) マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットールS注射液「YDJ300mL ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミグリステン錠20 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 ミケルナ配合点眼液 ミチヴリニドCa・OD錠10mg「三和」 ミドリンM点眼液0.4%(5mL) ミニブレス錠0.5mg ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 ミノドロン酸錠50mg「日医エ」 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「日医エ」 ミンサイクリン塩酸塩錠100mg「日医エ」 ミンサイクリン塩酸塩錠100mg「日医エ」 ミンサイクリン塩酸塩錠100mg「日医エ」 ミンサイのリン塩酸塩錠100mg「日医エ」 ミンサのM線	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186	マーカイン注音麻用0.5%等比重 4mL マーロックス懸濁用配合顆粒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシン注用2mg マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」 マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」 マキュエイド硝子体内注用40mg マヴコロールP(50g) マウサルトRPD錠10mg マヴネスコープ静注38%シリンジ11mL マヴネスコープ静注38%シリンジ13mL マヴネスコープ静注38%シリンジ20mL マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠 マブリン散1%(10mg/g) マプロテリン塩酸塩錠10mg「アメル」 マンニットールS注射液「YDJ300mL ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) ミグリステン錠20 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 ミケルナ配合点眼液 ミチヴリニドCa・OD錠10mg「三和」 ミドリンM点眼液0.4%(5mL) ミニブレス錠0.5mg ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 ミノドロン酸錠50mg「日医エ」 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 ミノドロン酸錠50mg「日医エ」 ミントロン酸錠50mg「日医エ」 ミントロン酸定50mg「日医エ」 ミントロンはためにカーロン	[注] [内] [注] [注] [注] [注] [内] [内] [注] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内] [内

NO	医薬品名	剤型
1189	ミルセラ注シリンジ200 µg(0.3mL)	【注】
1190	ミルセラ注シリンジ50 μg(0.3mL)	【注】
1191	ミルセラ注シリンジ250 μg	[注]
1192	ミルトン 1L	[内]
1193	ミルリノン注22.5mgバック「タカタ」(150mL)	【内】
1194	ミンクリア内用散布液0.8%	[外]
1195	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1196	無水エタノール * 丸石 (液:500mL)	【外】
1197	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】
1198	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1199	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
1200	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	[内]
1201	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1202	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1203	メスチノン錠60mg	【内】
1204	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1205	メタライト250カプセル	[内]
1206	メチコバール錠500 μ g	【内】
1207	メチコバール注射液500 μ g(1mL)	[注]
	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」	[内]
	メトクロプラミト錠5mg「タカタ」	[内]
	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	[内]
	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	[内]
	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	[内]
	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	[内]
	メトリジンD錠2mg	[内]
	メナテトレノンカプセル15mg「TYK」	[内]
	メノエイドコンビバッチ	[外]
	メプチンエアー10μg吸入100回	[外]
	メブチン錠50μg メマンチンOD錠 20mg「DSEP」	[内]
	メマンチンOD錠 ZUMB USEP」 メマンチンOD錠 5mg「DSEP」	[内]
	メルカゾール錠5mg	[内]
	メロペネム点滴静注用 0.5g「トーワ」	[注]
	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
	モビコール配合内用剤	[内]
	モビプレップ配合内用剤	[内]
	モメタゾン点鼻液50 μg「杏林」112噴霧用	[外]
1227	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	[注]
1228	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	[注]
	モンテルカスト錠10mg「KM」	[内]
	ヤーズ配合錠	[内]
1231	薬用炭.OY(原末)	[内]
1232	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	[内]
1233	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】
1234	ユーパッチテープ 18mg	[外]
1235	ユービット錠100mg	[内]
1236	ユナシン錠375mg	[内]
1237	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	[内]
1238	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	[内]
1239	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】
1240	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1241	ラケツロース・シロップ60%「コーワ」	【内】
1242	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1243	ラステットSカプセル25mg	【内】
1244	ラスビック錠75mg	[内]
245	ラスピック点滴静注キット150mg	【注】
1246	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	[外]
	ラニチゾン錠150mg「トーワ」	[内]
	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	【注】
1247) =) >) / = iii / iii	
1247	ラニラピッド錠0.05mg	[内]
1247 1248 1249		[内] [注]
1247 1248 1249 1250	ラニラピット錠0.05mg	
1247 1248 1249 1250	ラニラピッド錠0.05mg ラボナール注射用0.3g(300mg)	[注]
1247 1248 1249 1250 1251 1252	ラニラビッド錠0.05mg ラボナール注射用0.3g(300mg) ラミクタール錠100mg	[注] [内]

NO	医薬品名	剤型
	ランタスXR注ソロスター	【注】
	リーパクト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1257	リオナ錠 250mg	【内】
1258	リオレサール錠5mg	【内】
1259	リクシアナOD錠30mg	【内】
1260	リクシアナOD錠60mg	【内】
1261	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1262	リシノブリル錠10mg「ファイザー」	【内】
1263	リスペリドンOD錠 1mg「トーワ」	【内】
1264	リスモダンP 静注50mg(5mL)	【注】
1265	リゾビスト注(44.6mg1.6mL)	【注】
	リツキサン点滴静注100mg	【注】
	リツキサン点滴静注500mg	【注】
	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
	リツキシマプBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
	リドカイン塩酸塩注射液 0.5% 「ファイザー」(5mL)	【注】
	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」(10mL)	【注】
	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」(5mL) リドカイン塩酸塩注射液 2%「ファイザー」(10mL)	【注】
	リトカイン塩酸塩注射液 2%・リアイケー」(TUML) リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】
	リパクレオンカプセル150mg	【内】
	ルプオドール480注10mL	【注】
	リファンピシンカブセル150mg「サンド」	【内】
1280	リフラップシート5%(1シート=25cm2×6枚)	【外】
1281	リフラップ軟膏5%(30g)	[外]
1282	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1283	リボトリール錠0.5mg	【内】
1284	リマプロストアルファデクス錠5 μg「サワイ」	【内】
1285	硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)	【注】
1286	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
1287	リュープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1288	リュープリン注射用キット1.88mg	【注】
	リュープリン注射用キット3.75mg	【注】
	リJカOD錠25mg	【内】
	リルカOD錠75mg	【内】
	リルテック錠50	【内】
	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL) リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
	リンテロン坐剤1.0mg	[外]
	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】
	ルセフイ錠5 mg	【内】
	ー ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1302	ルテスデポー注(1mL)	【注】
1303	ルネスタ錠1 mg	【内】
1304	ルパフィン錠10mg	【内】
1305	ルボックス錠25	【内】
1306	ルリコンクリーム1%10g	[外]
1307	レキソタン錠5	【内】
1308	レキップCR錠2mg	【内】
	レクサプロ錠10mg	【内】
	レザルタス配合錠HD	【内】
	レスタス錠2mg	【内】
	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
	1 上で 川 始の50	【内】
1315	レナジェル錠250mg	
1315 1316	レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】
1315 1316 1317	レバミビド錠100mg「サワイ」 レビトラ錠5mg	【内】
1315 1316 1317 1318	レバミビド錠100mg「サワイ」 レビトラ錠5mg レベタン坐剤0.4mg	[内] [内] [外]
1315 1316 1317 1318 1319	レバミビド錠100mg「サワイ」 レビトラ錠5mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
1321	レポセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1322	レポビスト注射用 2.5g	【注
1323	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	[内]
1324	レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」	【外】
1325	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注
1326	レポホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注
1327	レポホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注
1328	レミッチOD錠2. 5 μg	【内
1329	レミニールOD錠4mg	【内】
1330	レミニールOD錠8mg	【内】
1331		【注
1332		【内
1333	-	【注
1334		【外】
1335		【外】
	レルミナ錠40mg	【内】
	ロイケリン散10%(100mg/g)	[内
	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注
	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注
	ロイナーゼ注用5000	【注
	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内
	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ファイザー」	【外
1343	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	【注
1344	ロコアテープ (7枚/袋)	【外
1345	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外
1346	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外
1347	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内
1348	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内
1349	ロスーゼット配合錠HD	【内
1350	ロスパスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内
1351	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内
1352	ロゼレム錠8mg	【内
1353	ロトリガ粒状カプセル2g	【内
1354	ロピオン静注50mg	【注
1355	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内
1356	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内
		【内
1358	ワーファリン錠1mg	【内
1359		【内
1360		【注
1361	ワイスタール配合点滴静注用1gバック	【注
1362		【注
1363	ワンショットプラスヘキシジン0.2	
		【外
1364	ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg(1mL)	【注
	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外
1366		【注
1367		【注
	液状フェノール*(健栄)	【外
	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内
	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注
1371	塩酸リルマザホン錠 2mg「MEEK」	【内
1372	乾燥まむし抗毒素「KMB」(6000単位)	【注
1373	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外
1374	希ヨードチンキ「ニッコー」	【外
1375	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注
1376	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	【注
1377	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	【注
1378	献血ノンスロン1500注射用	【注
1379	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	【内
1380	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	【内
1381	**	【外
	硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」	【外
	新版	【外
		【外
1384	1991 5 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	1 1 7 1
1384	親水クリーム「ニッコー」	【外

1387 水溶性 ルドニン10mg 注射用)			
1388	NO	医薬品名	剤型
1389 全食注シリングオーツカJ10mL(ルアースリグ・中ロタイク) 1注 1390 名食注シリングオーツカJ20mL(ルアーロクタイク) 1注 1391 生食溶解液キットH 50mL(注射用) 1注 1393 生理食塩液レ「ファー」 20mL(注射用) 1注 1393 生理食塩液レ「ファー」 20mL(注射用) 1注 1393 生理食塩液レ「ファー」 20mL(注射用) 1注 1395 大塚塩の水に(72mEc) 1注 1395 大塚塩液化注射:500mL) 1注 1396 大塚黒衛水注射:500mL) 1注 1397 大塚黒宿水注射:500mL) 1注 1398 大塚黒宿水注射:500mL 1注 1398 大塚生食注 500mL 1注 1398 大塚生食注 500mL 1注 1400 大塚生食注 500mL 1注 1400 大塚生食注 500mL 1注 1400 大塚生食注 500mL 1注 1400 大塚建液20% 20mL(注射用) 1注 1401 大塚糖液30% 20mL(注射用) 1注 1402 大塚糖液30% 20mL(注射用) 1注 1405 大塚糖液30% 20mL(注射用) 1注 1406 大塚糖液30% 20mL(注射用) 1注 1407 大塚糖液30% 20mL(注射用) 1注 1407 大塚糖液30% 20mL(注射用) 1注 1407 大塚糖液30% 20mL(注射用) 1注 1411	1387	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1390 全食溶解液+9h+ Son-L(注射用)			【注】
1391 生食溶解液キットH 50mL(注射用)			【注】
1392 全理食塩液PL「アソー」 ZOML (注射用)	1390	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
1393 土理食塩液PL「アソー」 2 L(注射用)	1391	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1394 大塚塩加ル注2%20mL(72mEa)	1392	生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)	【注】
1395 大塚高田水(注射:100mL)	1393	生理食塩液PL「フソー」2L(注射用)	【注】
1396 大塚高留水注射:500mL [注 1397 大塚食塩注10%20mL(34mEq) [注 1398 大塚全鬼注 10%20mL(34mEq) [注 1399 大塚生食注 500mL [注 1399 大塚生食注 500mL [注 1400 大塚生食注 500mL [注 1400 大塚生食注 500mL [注 1400 大塚生食注 500mL(注射用) [注 1402 大塚離液20% 20mL(注射用) [注 1403 大塚離液59% 100mL(注射用) [注 1403 大塚離液59% 20mL(注射用) [注 1404 大塚離液59% 20mL(注射用) [注 1405 大塚離液59% 20mL(注射用) [注 1406 大塚離液59% 20mL(注射用) [注 1407 大塚離液59% 500mL(注射用) [注 1408 大塚離液59% 20mL(注射用) [注 1409 大塚離液59% 20mL(注射用) [注 1409 大塚離液59% 20mL(注射用) [注 1409 株理液20% 350mL(注射用) [注 1410 株理棉子が今が 250mL(注射用) [注 1411 注射用ナバマイド [注 1411 注射用ナバキウナバ 100m [注 1411 注射用ナバ・メルコート125 [注 1411 注射用ナバ・メルコート125 [注 1411 注射用ナバ・メルコート125 [注 1411 注射用ナバ・メルコート40 [注 1411 注射用ナバ・デン・30mg [注 1412 注射用フバ・デン・30mg [注 1413 注射用フバ・デン・30mg [注 1414 注射用フバ・デン・30mg [注 1414 注射用フバ・デン・30mg [注 1415 注射用フバ・デン・30mg [注 1415 注射用フバ・デン・30mg [注 1418 注射用フバ・デン・30mg [注 1418 注射用フバ・デン・30mg [注 1418 注射用で、30mg [注 1418 注射用で、30mg 1418	1394	大塚塩カル注2%20mL (7.2mEq)	【注】
1397 大塚食塩注10%20mL(34mEq)	1395	大塚蒸留水(注射: 100mL)	【注】
1388 大塚生食注 100mL	1396	大塚蒸留水(注射: 500mL)	【注】
1399 大塚生食注 500mL [注 1400 大塚生食注 2ポート100mL [注 1410 大塚生食注 2ポート100mL [注 1410 大塚糖液10% 500mL(注射用) [注 1410 大塚糖液5% 100mL(注射用) [注 1410 大塚糖液5% 100mL(注射用) [注 1410 大塚糖液5% 100mL(注射用) [注 1410 大塚糖液5% 100mL(注射用) [注 1410 大塚糖液5% 500mL(注射用) [注 1411 注射用/式イド] [注 1412 注射用/工ド中ンLOOMS [注 1412 注射用エンド中ンLOOMS [注 1413 注射用エンド中ン500mg [注 1414 注射用エンド中ン500mg [注 1415 注射用フル・メルコート1000 [注 1418 注射用フル・メルコート1000 [注 1418 注射用フル・メルコート1000 [注 1419 注射用フル・メルコート1000 [注 1419 注射用フル・メルコート1000 [注 1419 注射用フル・メルコート1000 [注 1419 注射用フル・メルコート500 [注 1419 注射用フル・メルコート500 [注 1412 注射用フル・ジン3mg [注 1412 注射用フル・ジン3mg [注 1412 注射用フル・ジン3mg [注 1412 注射用フル・ジン3mg [注 1412 注射用フル・ビン10mg [注 1412 注射用フル・ジン3mg [注 1412 注射用フル・レ・セート50mg [注 1412 注射用フ・ンフmg [注 1412 注射用フ・ンフmg [注 1413 注解用マ・シビーム1g [注 1414 注解用フ・シン3mg [注 1414 注解用ス・シールを1mg [注 1415 注解用ス・シールを1mg [注 1418 注解解析表・フールを1mg [注 1418 注解析表示を1mg [注 1418 注	1397	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1400 大塚生意注2ボート100mL [注 1401 大塚穂液10% 500mL(注射用) [注 1402 大塚穂液20% 20mL(注射用) [注 1403 大塚穂液50% 100mL(注射用) [注 1404 大塚穂液50% 20mL(注射用) [注 1405 大塚穂液50% 20mL(注射用) [注 1405 大塚穂液50% 20mL(注射用) [注 1405 大塚穂液50% 20mL(注射用) [注 1408 大塚穂液50% 200mL(注射用) [注 1419 単立リプチ (丸石) [注 1410 規助ピアム錠200「ヨシトミ」 [内 1410 規助ピアム錠200「ヨシトミ」 [内 1410 提射用イホマイド1g [注 1412 注射用エンドキサン100mg [注 1413 注射用エンドキサン500mg [注 1414 注射用サイメリン500mg [注 1416 注射用リル・メルコート1000 [注 1416 注射用リル・メルコート1000 [注 1418 注射用リル・メルコート1000 [注 1418 注射用リル・メルコート40 [注 1418 注射用フルドラン1mg [注 1417 注射用リル・メルコート500 [注 1412 注射用フルドラン1mg [注 1417 注射用フルドラン3mg [注 1418 注射用フルドラン3mg [注 1419 注射用フルドラン3mg [注 1417 注 注射用フルドラン50 [注 1417 注 注射用フルドラン7mg [注 1418 注射用フルドラン7mg [注 1419 注 注射用フルドラン7mg [注 1419 注 注射用フルドフン7mg [注 1419 注 注射用フルドフン7mg [注 1419 注 注射用フルドシン3mg [注 1419 注 注射用フルドラン1mg [注 1419 注 注射用フルドカン1mg [注 1419 注 注射用フルドカン1mg [注 1419 注 1419	1398	大塚生食注 100mL	【注】
1400 大塚穂渡10% 500mL(注射用)	1399	大塚生食注 500mL	【注】
1402 大塚穂渡20% 20mL(注射用)	1400	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1403 大塚穂渡596 100mL(注射用)	1401	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1404 大塚糖液5% 20mL(注射用) [注 1405 大塚糖液5% 250mL(注射用) [注 1406 大塚糖液5% 250mL(注射用) [注 1407 大塚糖液5% 200mL(注射用) [注 1408 大塚糖液50% 200mL(注射用) [注 1408 世シロップ*(丸石) [内	1402	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1405 大塚糖液5% 250mL(注射用) [注 1406 大塚糖液5% 500mL(注射用) [注 1407 大塚糖液50% 200mL(注射用) [注 1408 大塚糖液50% 200mL(注射用) [注 1408 単シロップ*(丸石) [内 1410 旋酸リテウム錠200「ヨシトミ」 [内 1411 注射用イホマイド1g [注 1412 注射用エンドキサン100mg [注 1413 注射用エンドキサン500mg [注 1413 注射用エンドキサン500mg [注 1414 注射用リル・メルコート1000 [注 1416 注射用リル・メルコート125 [注 1417 注射用リル・メルコート125 [注 1417 注射用リル・メルコート500 [注 1418 注射用フル・ジルコート500 [注 1418 注射用フル・ジルコート500 [注 1419 注射用フル・ジン3mg [注 1421 注射用フル・ジン3mg [注 1421 注射用フル・ジン3mg [注 1421 注射用フル・ジン3mg [注 1421 注射用フル・ジン3mg [注 1422 注射用マカンジン10g [注 1421 注射用マカンジン0gカリウム100万単位 [注 1423 注射用マキシピーム1g [注 1424 注射用マキシピーム1g [注 1424 注射用フトレトセート50mg [注 1425 注射用マキシピーム1g [注 1426 調剤用ハンピラシ末 [内 1427 沈降シラテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL [注 1428 沈降破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL [注 1428 沈降破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL [注 1429 低分子デキストラン上注 500mL [注 1429 低分子デキストラン上注 500mL [注 1429 1439 [注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 [内 1430 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL [注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 [内 1432 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 [内 1433 直色ワセリン*(健栄) [外 1434 複方ョード・グリセリン(液) [外 1435 減菌精製水*(大成薬品) [外 1435 減菌精製水*(大成薬品) [外 1436 硫酸アトロビン「ホエイ」(末) [内 1436 硫酸アトロビン「ホエイ」(末) [内 1436 硫酸アトロビン「ホエイ」(末) [内 1436 硫酸アトロビン「ホエイ」(末) [内 1436 硫酸アトロビン「ホエイ」(末) [力 1436 元本 1437 [力	1403	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1406 大塚穂液5% 500mL(注射用)	1404	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1407 大塚糖液50% 200mL(注射用)	1405	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1408 大塚軸液70% 350mL(注射用)	1406	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1409 単シロップ*(丸石)	1407	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1410 放験リチウム錠200「ヨシトミ」	1408	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1411 注射用イエマイド1g	1409	単シロップ* (丸石)	【内】
1412 注射用エンドキサン500mg	1410	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	【内】
1413 注射用エンドキサン500mg	1411	注射用イホマイド1g	【注】
1414 注射用サイメリン50mg [注 注射用ソル・メルコート1000 [注 注射用ソル・メルコート1000 [注 注射用ソル・メルコート125 [注 注射用ソル・メルコート40 [注 注射用ソル・メルコート500 [注 注射用フルデシン1mg [注 注射用フィルデシン3mg [注 注射用フィルデシン3mg [注 注射用フィルデシン3mg [注 注射用フオン50 [注 注射用フオン50 [注 注射用アオン50 [注 注射用アオン50 [注 注射用アオン50 [注 注射用アオン50 [注 注射用アオンピーム1g [注 注射用アキンピーム1g [注 注射用メソトレキセート50mg [注 注射用メソトレキセート50mg [注 注射用メソトレキセート5mg [注 注射用メソトレキセート5mg [注 注射用メソトレキセート5mg [注 注	1412	注射用エンドキサン100mg	【注】
注射用ソル・メルコート1000 [注 注射用ソル・メルコート125 [注 注射用ソル・メルコート125 [注 注射用ソル・メルコート40 [注 注射用ソル・メルコート500 [注 注射用フルデシン1mg [注 注射用フイルデシン3mg [注 注射用フサン50 [注 注射用フサン50 [注 注射用プサン50 [注 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 [注 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 [注 注射用メントレキセート50mg [注 注射用メントレキセート50mg [注 注射用メントレキセート5mg [注 [注 [注 [注 [注 [注 [注 [1413	注射用エンドキサン500mg	【注】
1416 注射用ソル・メルコート125 [注 1417 注射用ソル・メルコート40 [注 1418 注射用ソル・メルコート500 [注 1419 注射用フルデシン1mg [注 1420 注射用フイルデシン3mg [注 1421 注射用フサン50 [注 1421 注射用フサン50 [注 1422 注射用マキンピーム1g [注 1423 注射用マキンピーム1g [注 1424 注射用メソトレキセート50mg [注 1425 注射用メソトレキセート5mg [注 1426 調剤用パンピタン末 [内 1427 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL [注 沈降破傷風トキソイド"生研」(0.5mL) [注 1429 低分子デキストランL注 500mL [注 1429 低分子デキストランL注 500mL [注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 [内 1432 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 [内 1434 複方ヨード・ヴリセリン*(健栄) [外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) [外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) [内 1437 1438 [内 1438 元本の「アルビン「ホエイ」(末) [内 1439 元本の「アルビン「ホエイ」(末) [内 1430 元本の「アルビン「ルン」(注) [内 1430 元本の「アルビン」(注) [内 1430 元本の「アルビン」(注) [内 1430 元本の「アルビン」「ホエイ」(注) [力 1430 元本の「アルビン」「オースの「アルビン」」「オースの「アルビン」」「オースの	1414	注射用サイメリン50mg	【注】
注射用ソル・メルコート500 [注 1418 注射用ソル・メルコート500 [注 1419 注射用フルデシン1mg [注 1420 注射用フルデシン3mg [注 1421 注射用フサン50 [注 1422 注射用マキシピーム1g [注 1423 注射用マキシピーム1g [注 1424 注射用メソトレキセート50mg [注 1425 注射用メソトレキセート5mg [注 1426 調剤用パンピタン末 [内 1427 沈降ップテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL [注 1428 沈降破傷風トキソイド"生研」(0.5mL) [注 1429 低分子デキストラン上注 500mL [注 1429 低分子デキストラン上注 500mL [注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 [内 1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) [内 1434 複方ヨード・ヴリセリン (健栄) [外 1435 滅菌精製水 * (大成薬品) [外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) [内 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) [内 1437 [内 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) [内 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) [内 1437 [内 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) [内 1437 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) [内 1437 1437 [内 1438 元のよりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによ	1415	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1418 注射用ソル・メルコート500 【注 1419 注射用フィルデシン1mg 【注 1420 注射用フィルデシン3mg 【注 注射用フサン50 【注 注射用フサン50 【注 注射用マキシピーム1g 【注 注射用マキシピーム1g 【注 注射用マキシピーム1g 【注 注射用メソトレキセート50mg 【注 注射用メソトレキセート50mg 【注 1424 注射用メソトレキセート5mg 【注 1426 調剤用パンピタン末 【内 1427 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL 【注 沈降破傷風トキソイド"生研」(0.5mL) 【注 1428 沈降破傷風トキソイド"生研」(0.5mL) 【注 1429 低分子デキストラン上注 500mL 【注 1430 点滴静注用ホスカピル注24mg/mL 【注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 【内 1434 複方ヨード・ヴリセリン*(健栄) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内 1436 征 1436	1416	注射用ソル・メルコート125	【注】
注射用フィルデシン1mg 「注 注射用フィルデシン3mg 「注 注射用フィルデシン3mg 「注 注射用フィルデシン3mg 「注 注射用フサン50 「注 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 「注 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 「注 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 〔注 注射用メソトレキセート50mg 〔注 注射用メソトレキセート5mg 〔注 注射用メソトレキセート5mg 〔注 注射用メソトレキセート5mg 〔注 1426 調剤用パビゼシン末 【内 1427 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL 〔注 1428 沈降破傷風トキソイド"生研」(0.5mL) 〔注 1429 低分子デネストラン上注 500mL 〔注 1430 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 〔注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 【内 1434 複カョード・ヴリセリン (健栄) 【外 1435 滅菌精製水 * (大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内 1437 【内 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内 1437 【内 1438 【内 1439 【力 143	1417	注射用ソル・メルコート40	【注】
1420 注射用フィルデシン3mg 【注 1421 注射用フサン50 【注 1422 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 【注 1423 注射用マキシピーム1g 【注 1424 注射用メソトレキセート50mg 【注 1425 注射用メソトレキセート5mg 【注 1426 調剤用パンピタン末 【内 1427 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL 【注 1428 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL) 【注 1429 低分子デキストラン上注 500mL 【注 1430 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 【注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1433 白色ワセリン*(健栄) 【外 複方ヨード・ヴリセリン(液) 【外 複方ヨード・ヴリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内 1437 【内 1436 低 1436 低 1437 【内 1436 【内 1436 【内 1437 【内 1436 【内 1437 【内 1438 【内 1439 【力 1439	1418	注射用ソル・メルコート500	【注】
1421 注射用プサン50 [注 1422 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 [注 1423 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 [注 1424 注射用メソトレキセート50mg [注 1425 注射用メソトレキセート5mg [注 1426 調剤用パンピタン末 [内 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL [注 1428 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL) [注 1429 低分子デキストラン上注 500mL [注 1430 点滴静注用ホスカピル注24mg/mL [注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 [内 1432 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 [内 1433 自色ワセリン*(健栄) [外 1434 複方ヨード・ヴリセリン(液) [外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) [外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) [内 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) [内	1419	注射用フィルデシン1mg	【注】
1422 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 【注 1423 注射用マキシピーム1g 【注 1424 注射用メソトレキセート50mg 【注 1425 注射用メソトレキセート5mg 【注 1426 調剤用パンピタン末 【内 1427 沈降ップテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL 【注 1428 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL) 【注 1429 低分子デキストランL注 500mL 【注 1430 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 【注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1433 自色ワセリン*(健栄) 【外 1434 複方ヨード・ヴリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1420	注射用フィルデシン3mg	【注】
1423 注射用マキシピーム1g 【注 1424 注射用メソトレキセート50mg 【注 1425 注射用メソトレキセート5mg 【注 1426 調剤用パンピタン末 【内 1427 沈降砂場風混合トキソイド"化血研" 1mL 【注 1428 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL) 【注 1429 低分子デキストランL注 500mL 【注 1430 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 【注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 【内 1433 白色ワセリン*(健栄) 【外 1434 複方ヨード・ヴリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1421	注射用フサン50	【注】
1424 注射用メソトレキセート50mg 【注 1425 注射用メソトレキセート5mg 【注 1426 調剤用パンピタン末 【内 1427 沈降砂房風混合トキソイド"化血研" 1mL 【注 1428 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL) 【注 1429 低分子デキストラン上注 500mL 【注 1430 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 【注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 【内 1433 白色ワセリン*(健栄) 【外 1434 複方ヨード・ヴリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1422	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	【注】
1425 注射用メソトレキセート5mg 【注 1426 調剤用パンピタン末 【内 1427 沈降砂傷風混合トキソイド"化血研" 1mL 【注 1428 沈降砂傷風ホキソイド「生研」(0.5mL) 【注 1429 低分子デキストランL注 500mL 【注 1430 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 【注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 【内 1433 白色ワセリン*(健栄) 【外 1434 複方ヨード・ヴリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1423	注射用マキシピーム1g	【注】
1426 調剤用パンピタン末 【内 1427 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL 【注 1428 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL) 【注 1429 低分子デキストラン上注 500mL 【注 1430 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 【注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 【内 1433 白色ワセリン*(健栄) 【外 1434 複方ヨード・ヴリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1424	注射用メソトレキセート50mg	【注】
1427 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL 【注 1428 沈降破傷風トキソイド生研J(0.5mL) 【注 1429 低分子デキストラン上注 500mL 【注 1430 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 【注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 【内 1433 白色ワセリン*(健栄) 【外 1434 複方ヨード・グリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1425	注射用メソトレキセート5mg	【注】
1428 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL) 【注 1429 低分子デキストランL注 500mL 【注 1430 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 【注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 【内 1433 白色ワセリン*(健栄) 【外 1434 複方ヨード・ヴリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1426	調剤用パンピタン末	【内】
1429 低分子デキストラン上注 500mL 【注 1430 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 【注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 【内 1433 白色ワセリン*(健栄) 【外 1434 複方ヨード・ヴリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1427	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL	【注】
1430 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 【注 1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 【内 1433 白色ワセリン*(健栄) 【外 1434 複方ヨード・ゲリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1428	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	【注】
1431 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 【内 1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 【内 1433 白色ワセリン*(健栄) 【外 1434 複方ヨード・グリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1429	低分子デキストランL注 500mL	【注】
1432 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) 【内 1433 白色ワセリン* (健栄) 【外 1434 複方ヨード・グリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水* (大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1430	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	【注】
1433 白色ワセリン*(健栄) 【外 1434 複方ヨード・グリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1431	乳酸カルシウム「ファイザー」原末	【内】
1434 複方ヨード・グリセリン(液) 【外 1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1432	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	【内】
1435 滅菌精製水*(大成薬品) 【外 1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1433	白色ワセリン*(健栄)	【外】
1436 硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 【内	1434	複方ヨード・グリセリン(液)	【外】
	1435	滅菌精製水*(大成薬品)	【外】
1437 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 【注	1436	硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	【内】
	1437	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	【注】