		[F.\ \]
1	1%ディプリバン注ーキット(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	5-FU注1000mg(20mL)	【注】
5	5-FU注250mg(5mL)	【注】
6	ACD-A液 (注射:500mL)	【注】
7	Dーソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
8	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
10	EPLカプセル250mg	【内】
11	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
12	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
13	LHーRH注0.1mg「タナベ」(1mL)	【注】
14	-メントール * (健栄)(末)	【内】
15	MSコンチン錠10mg	【内】
16	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
17	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
18	SG配合顆粒(1g/包)	【内】
19	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】
20	アーガメイト20%ゼリー25g	【内】
21	アーテン錠(2mg)	【内】
22	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
23	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
24	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	【外】
25	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
26	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
27	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
28	アクアチムクリーム1%(10g)	【外】
29	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】
30	アクトネル錠75mg	【内】
31	アクプラ静注用10mg	【注】
32	アクプラ静注用50mg	【注】
33	アクラシノン注射用20mg	【注】
34	アコアラン静注用600	【注】
35	アコファイド錠100mg	【内】
36	アザルフィジンEN錠500mg	【内】
37	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
38	アシクロビル錠200mg「サワイ」	【内】
39	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	[内]
40	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	【内】
41	アズノールうがい液4%10mL	【外】
42	アズノール軟膏0.033%	【外】
43	アスパラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
44	アスパラカリウム錠300mg	【内】
45	アスパラギン酸カリウム注10mEgキット「テルモ」	【注】
46	アスベリン錠10	【内】
47	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)	【内】
48	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	
40 49	アセリオ静注液1000mgバッグ	【外】 【注】
49 50	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
51 52	アゾセミド錠60mg「JG」 アゾルガ配合懸濁性点眼液	【内】
52 52		【外】
53 54	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
54 55	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
55	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
56	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
57 50	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】
58 50	アデホスーLコーワ注 20mg	【注】
59	アデホスコーワ顆粒10%	【内】

60	アトーゼット配合錠HD	【内】
61	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】
62	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】
63	アドレナリン注O. 1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
64	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】
65	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
66	アナペイン注2mg/mL 100mL	【注】
67	アナペイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
68	アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用	【外】
69	アネメトロ点滴静注液 500mg	【注】
70	アネレム静注用50mg	【注】
71	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
72	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	【注】
73	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	【注】
74	アブストラル舌下錠100 μg	【内】
75	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
76	アプレピタントカプセル125mg「NK」	【内】
77	アプレピタントカプセル80mg「NK」	【内】
78	アマージ錠2. 5mg	【内】
79	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
80	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
81 82	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
83	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 アミサリン注100mg	【注】
84	アミヴック注 Toomg アミゼットB輸液 200mL	【注】
85	アミヒットB 制液 200mL アミティーザカプセル12μg	【内】
86	アミティーザカプセル12 μg アミティーザカプセル24 μg	【内】
87	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	【内】
88	アミノレバンEN配合散(コーピー・味/)	【内】
89	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	【注】
90	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	【注】
91	アムバロ配合錠「サンド」	【内】
92	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
93	アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」	【内】
94	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
95	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
96	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
97	アラセナーA点滴静注用300mg	【注】
98	アラセナーA軟膏3%(5g)	【外】
99	アリクストラ皮下注2. 5mg	【注】
100	アリクストラ皮下注5mg	【注】
101	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	【内】
102	アリムタ注射用100mg	【注】
103	アリムタ注射用500mg	【注】
104	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	【注】
105	アルケラン錠2mg	【内】
106	アルケラン静注用50mg	【注】
107	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】 【注】
108	アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
109	アルト原末(パウダー:1g)	【外】 【如】
110	アルト原末(パウダー: 500mg)	【外】 【内】
111	アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」	【内】
112	アルファカルシドールカプセル1. O μg「フソー」	【内】
113 114	アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包) アルブミナー5% 静注12.5g/250mL	【内】 【注】
115	アルフミナー5%	【内】
116	アルプラグラム錠0.4mg「トーウ」 アルプロスタジル注10μgシリンジ「F」	【注】
117	アルプロスタジル注「Oμgシリンジ「F」 アルプロスタジル注5μgシリンジ「F」	【注】
118	アルロイドG内用液5%	【内】
110	/ /VH GI I/II/IKO /V	FLAY

119	アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL)	【外】
120	アレビアチン散10%(100mg/g)	【内】
121	アレビアチン錠100mg	【内】
122	アレロックOD錠5	【内】
123	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
124	アロキシ静注0.75mg(5mL)	【注】
125	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
126	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
127	アンサー皮下注20μg	【注】
128	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
129	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ト-ワ」	【内】
130	アンペック坐剤10mg	【外】
131	イーケプラ点滴静注500mg	【注】
132	イオウ・カンフルローション	【外】 【注】
133	イオパーク300注シリンジ100mL	【注】
134	イオパーク350注 100mL	【注】
135 136	イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL	【注】 【注】
137	イオパーク350注 50mL イオパーク350注シリンジ70mL	【注】
138	イオパーク330注 クケンフィットトーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	【注】
139	イオパミロン注300 100mL	【注】
140	イオパミロン注300 50mL	【注】
141	イオパミロン注300シリンジ100mL	【注】
142	イオパミロン注370 100mL	【注】
143	イオパミロン注370 20mL	【注】
144	イオパミロン注370 50mL	【注】
145	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
146	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
147	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	【注】
148	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	【注】
149	イグザレルトOD錠10mg	【内】
150	イグザレルトOD錠15mg	【内】
151	イクスタンジ錠80mg	【内】
152	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
153	イスコチン錠100mg	【内】
154	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	【外】
155	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
156	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
157	イソビスト注240 10mL	【注】
158	イソビスト注300 10mL	【注】
159	イダマイシン静注用5mg	【注】
160	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	【内】
161	イトリゾールカプセル50mg	【内】
162	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
163	イナビル吸入粉末剤20mg	【内】
164	イニシンク配合錠	【注】
165	イノバン注100mg(5mL)	【外】
166	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
167	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
168	イベニティ皮下注105mgシリンジ	【注】
169	イマジニール300注 20mL	【注】
170	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
171	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
172 173	イムノブラダー膀注用40mg イムラン錠50mg	【注】
173	イムラン延50mg イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホスピーラ」	【内】 【注】
174	1977カフ塩酸塩点滴酵注液 40mg 「木ベビー7」 イリボーOD錠 5μg	【内】
175	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
177	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
1//	I ン ハ コ / J / J / T Collie, *** 一 ソ] / Ollic /	【/工】

178	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
178	インスグン グブルギンBS注ミグダベンドグゲー」 インテバンクリーム1%(50g)	【外】
180	インデラル錠10mg	【内】
181	インデラル錠 Torrig インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
182	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
183	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
184	イントラリポス輸液20% 100mL	注】
185	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
186	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
187	ヴィーン3G輸液 500mL	【注】
188	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
189	ウテメリン錠5mg	【内】
190	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
191	ウブレチド錠5mg	【内】
192	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
193	ウルティブロ吸入用カプセル	【外】
194	ウレパールローション10%(20g)	【外】
195	ウログラフイン注60%(20mL)	【注】
196	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
197	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
198	エイゾプト懸濁性点眼液1%	【外】
199	エイベリス点眼0.002%	【外】
200	エキザルベ	【外】
201	エクザール注射用10mg	【注】
202	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
203	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
204	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
205	エクセグラン錠100mg	【内】 【内】
206 207	エクフィナ錠50mg エクメット配合錠HD	【内】 【内】
207	エクラッド自己 ロ 延 ロ ロ エクラープラスター20 µg/cm2	【外】
209	エクノー フラスメー 20 μ g/ cm2 エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用	【外】
210	エサンブトール錠250mg	【内】
211	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	【内】
212	エストラ―ナテープ0.72mg	【外】
213	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
214	エストリール錠1mg * (持田)	【内】
215	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
216	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
217	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
218	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	【内】
219	エタノール「マルイシ」	【外】
220	エダラボン点滴静注液 30mg「日医工」	【注】
221	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
222	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
223	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
224	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
225	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
226	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】
227	エネーボ配合経腸用液	【内】
228	エネマスター注腸散(400g)	【外】 【 外 】
229	エパルレスタット錠 50mg「ファイザー」	【内】
230 231	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】 【内】
231	エフィエントOD錠20mg エフィエント錠 3.75mg	【内】
232	エフィエンド	【内】
234	エフィエンド 蜒 2. 5 mg エフピーOD錠2.5	【内】
235	エブランチルカプセル15mg	【内】
236	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
		NI 74

237	エホチール注10mg(1mL)	【注】
238	エリキュース錠 5mg	【内】
239	エリキュース錠2. 5mg	【内】
240	エリスロシン錠200mg	【内】
241	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	<u>【注】</u>
242	エルシトニン注20Sディスポ(1mL)	【注】
243	エルシトニン注40単位	【注】
244	エルデカルシトールカプセル0.75 μg「トーワ」	【内】
245	エルネオパNF1号輸液 1000mL	【注】
246	エルネオパNF1号輸液 1500mL	【注】
247	エルネオパNF2号輸液 1000mL	【注】
248	エルネオパNF2号輸液 1500mL	【注】
249	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
250	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
251	エレジェクト注シリンジ (2mL)	【注】
252	エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm)	【外】
253	エレファワイパーEI W (消毒綿4cm×4cm)	【外】
254	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
255	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
256	エンタカポン錠100mg「アメル」	【内】
257	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	【内】
258	エンドキサン錠 50mg	【内】
259	エンレスト錠100mg	【内】
260	エンレスト錠200mg	【内】
261 262	オイパロミン300注シリンジ100mL オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
263	オイパロミン370注シリンジ100mL オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
264	オイパロミン370注シリンジ80mL オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
265	オイパロミン370注ラグラフ80mL オイパロミン注300 100mL	【注】
266	オイパロミン注300 100ML オイパロミン注300 20mL	【注】
267	オイパロミン注300 50mL	注】
268	オイパロミン注370 100mL	【注】
269	オイパロミン注370 20mL	【注】
270	オイパロミン注370 50mL	【注】
271	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
272	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外】
273	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
274	オーキシス9 μgタービュヘイラー60吸入	【外】
275	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
276	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
277	オキサロールローション25 μ g/g(10g)	【外】
278	オキサロール軟膏25μg/g(10g)	【外】
279	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
280	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
281	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
282	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
283	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」	【内】
284	オキナゾール膣錠600mg	【外】 【 外 】
285	<u>オキノーム散2.5mg</u>	【内】
286	オキノーム散5mg	【内】
287 288	オキファスト注10mg オクトレオチド酢酸作虫下注100 μα「サンド」	【注】
288 289	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
289 290	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	【内】
290 291	オビルタミニルカフ ビル 7 5mg「 サウイ] オゼンピック皮下注2mg	【注】
292	オノアクト点滴静注用 50mg	【注】
293	オビソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
294	オフサグリーン静注用 25mg	注
295	オプソ内服液10mg(5mL)	【内】
		N: 74

296	オプソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
297	オプチレイ350注シリンジ100mL	【注】
298	オプチレイ350注シリンジ135mL	注】
299	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
300	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
301	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
302	オムニパーク300注シリンジ 100mL	【注】
303	オムニパーク300注シリンジ 150mL	【注】
304	オムニパーク350注シリンジ 70mL	【注】
305	オメガ−3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	【内】
306	オメプラゾール注射用 20mg「日医工」	【注】
307	オラネジン液1. 5%消毒用アプリケータ25mL	【外】
308	オラネジン消毒液1.5%	【外】
309	オリブ油 * (丸石)	【外】
310	オルケディア錠1mg	【内】
311	オルケディア錠2mg	【内】
312	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	注】
313	オルテクサーロ腔用軟膏0.1%	【外】
314	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
315	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
316	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	【外】
317	オングリザ錠2.5mg	【内】
317	オンコビン注射用1mg	【注】
319	オンジェンティス錠25mg	【内】
320	オンデキサ静注用200mg	【注】
321	カイトリル錠2mg	【内】
322	カイトリル注1mg	【注】
323	ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)	【注】
324	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
325	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】
326	カチーフN錠5mg	【内】
327	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
328	カデックス軟膏0.9%	【外】
329	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」	【注】
330	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	【注】
331	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	【注】
332	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
333	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
334	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
335	カナグル錠100mg	【内】
336	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
337	カナリア配合錠	【内】
338	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
339	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
340	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	【内】
341	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
342	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」	【内】
343	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」	【内】
344	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】
345	カリメート散(5g/包)	【内】
346	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
347	カルセド注射用20mg	【注】
348	カルセド注射用50mg	【注】
349	カルチョール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
350	カルデナリンOD錠1mg	【内】
351	カルデナリンOD錠1mg	【内】
352	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
353	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
354	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
554	/J/V/ IX CLノWLIOUIIIg「ノンノル」	[KAJ]

355	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
356	カルベジロール錠 10mg 「サワイ」	【内】
357	カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」	【内】
358	カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】
359	カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】
360	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】
361	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
362	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	【内】
363	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
364	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
365	カロナール細粒50%	【内】
366	カロナール錠200	【内】
367	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	【内】
368	カンナラルメン薬 oring r めずか」 カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	
		【注】
369	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
370	キシロカインゼリー2% 30mL	【外】
371	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
372	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
373	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
374	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
375	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
376	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
377	キャブピリン配合錠	【内】
378	キュビシン静注用350mg	【注】
379	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】
380	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
381	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
382	グーフィス錠5mg	【内】
383	クエチアピン錠 25mg「トーワ」	【内】
384	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
385	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
386	グラクティブ錠50mg	【内】
387	クラシエ猪苓湯エキス細粒[EK-40] 2.0g	【内】
388	クラシエ補中益気湯エキス細粒[EK-41] 2.5g	【内】
389	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒[EK-68] 2.0g	【内】
390	グラナテック点眼液 0.4% (5mL)	【外】
391	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	【注】
392	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
393		【注】
394	クラフォラン注射用1g	
	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
395	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	【内】
396	グランダキシン錠50	【内】
397	クリアクター静注用80万	【注】
398	グリクラジド錠40mg「サワイ」	【内】
399	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
400	グリセレブ点滴静注 (200mL)	【注】
401	グリチロン配合錠	【内】
402	グリベック錠100mg	【内】
403	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
404	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	【注】
405	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
406	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
407	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
408	グルトパ注1200万単位	【注】
409	グルベス配合OD錠	【内】
410	クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL)	【外】
411	クレメジン速崩錠500mg	【内】
412	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
413	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
		K 14

414	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
415	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
416	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	【外】
417	クロマイ膣錠100mg	【外】
418	クロミッド錠50mg	【内】
419	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
420	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	【内】
421	ケイセントラ静注用1000	【注】
422	ケイセントラ静注用500	【注】
423	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
424	ケーサプライ錠600mg	【内】
425	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
426	ケタスカプセル10mg	【内】
427	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
428	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
429	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
430	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
431	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
432	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
433	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
434	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
435	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
436	ケンエーG浣腸液50% 120mL	【外】
437	ケンエーG浣腸液50% 60mL	【外】
438	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
439	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
440	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
441	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「イワキ」 (10g)	【外】
442	コアテック注5mg(5mL)	【注】
443	コアヒビター注射用10mg	【注】
444	コアヒビター注射用50mg	【注】
445	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
446	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
447	コートリル錠10mg	【内】
448	コスパノン錠80mg	【内】
449	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
450	コメリアンコーワ錠50	【内】
451	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
452	コレクチム軟膏0.5%(5g)	【外】
453	コロネル細粒83.3%	【内】
454	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
455	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
456	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm × 22.9cm)	【外】
457	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外】
458	ザイザルシロップ 0.05%	【内】
459	サイトテック錠200	【内】
460	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
461	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
462	サクシゾン静注用1000mg	【注】
463	サクシゾン注射用100mg	【注】
464	サクシゾン注射用300mg	【注】
465	サテニジン液10(500mL)	【外】
466	サニサーラW(250mL)	【外】
467	サラジェン錠5mg	【内】
468	サラゾピリン錠500mg	【内】
469	サリパラ液	【外】
	2 21 12 12	
470	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
470 471	ザルコニン液0.05(500mL) ザルコニン液10 (10% 500mL)	
	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】

470		F \ \ \ \
473	サンディミュン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
474 475	サンドールP点眼液(5mL)	【外】 【如】
475 476	サンピロ点眼液2%(5mL) サンリズム注射液50(5mL)	【外】 【注】
476	ソフリスム/注射/枚30(3ML/	
477 478	ジアグノグリーン注 25mg ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【注】
476 479	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】 【内】
480	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	
480 481	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【外】 【注】
482	ジェイゾロフトOD錠 25mg	【内】
483	ジェニナック錠200mg	【内】
484	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	【内】
485	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
486	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
487	ジクアスLX点眼液3%(5mL)	【外】
488	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	【内】
489	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	【内】
490	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	【内】
491	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」50g	【外】
492	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
493	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
494	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
495	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
496	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
497	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
498	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
499	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	<u> </u>
500	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	【内】
501	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	<u>【注】</u>
502	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	【注】
503	シプロキサン錠200mg	【内】
504	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	【注】
505	シベクトロ錠200mg	【内】
506	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
507	シベレスタットNa点滴静注用 100mg 「F」	【注】
508	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
509	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
510	ジャディアンス錠 10mg	【内】
511	ジャドニュ顆粒分包360mg	【内】
512	ジャドニュ顆粒分包90mg	【内】
513	酒石酸「ケンエー」	【外】
514	静注用マグネゾール20mL	【注】
515	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
516	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
517	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
518	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	【内】
519	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
520	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
521	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
522	シンビット静注用50mg	【注】
523	スインプロイク錠O. 2mg	【内】
524	スープレン吸入麻酔液	【外】
525	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
526	スタデルムクリーム5%(10g)	【外】
527	スタレボ配合錠L100	【内】
528	スチブロン軟膏0.05%(5g)	【外】
529	ステリクロンR液0.1(500mL)	【外】
530	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】
531	ステリクロンW液0.02(500mL)	【外】

ステリスコーブ3W/V96液	532	ステリクロンW液0.05(500mL)	【外】
ストロカイン酸のmg			
スピール音M(胎付薬)			
大学ルトレビマット 60吸入用	535		【内】
スピリーバ2.5 m g レスピマット60吸入		スピール膏M(貼付薬)	
スピロノラカン酸26mg [ト-フ]			
スポンゼル(Sem × 2.5cm)		スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	
スマトリブタン 錠50mg 「アスペン」		スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	
542			
スシルステック3% 40g		人マトリノダノ延つUmg アスペン フミフリンローション・59//20~\	
スシルフ・ファン 30% イリス・ファン 30%			
スシルア・ション33% スシルア・ション33% スシルア・ション33% スシルア・ション33% スシルア・ション33% スカルア・ション35mg「トーワ」 内別 スルア・ション35mg「トーワ」 内別 スルア・ション35mg「トーワ」 内別 スルア・ション35mg「トーワ」 内別 スルア・ション35mg「トーワ」 大き 生理食塩液 ア・シア・ブラ 1000mL 注注 生理食塩液 ア・シア・ブラ 1000mL 注注 生理食塩液 ア・シア・ブラ 1000mL 注注 生理食塩液 ア・シア・ブラ 1000mL 注注 生理食塩液 ア・シア・ブラ 1000mg であり セパミット・R細粒2% (10mg			
2月			
スルピリン注射液500mg「トーワ」			
スルピリン注射液500mg 日医工」(2mL)			
生理食塩液パッグ「アソー」1000mL	548		【注】
注 生理食塩液バッグ「フソー」1500mL			
たちら セイドシャト錠100mg			【注】
セパミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)			
555 セファゾリンNa点滴静注用1g/Ny「パーツカ」			
大学・ 1		ゼハミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	
(注)			
(内) 557 セファドール錠25mg			
セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付)			
1			
[内] 560 ゼフィックス錠100 [内] 561 セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」 562 セフォチアム静注用1gパッグ「日医工」 563 セフガペンビボキシル小児用細粒10% [内] 564 セフジトレンピボキシル小児用細粒10% [内] 566 セフジニルカプセル10Omg「サワイ」 [内] 566 セフジニルカプセル10Omg「ファイザー」 567 セフタジンム静注用1g「マイラン」 568 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工 「注] 569 セフメタゾールNa静注用1g「NP」 「注] 570 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 「内] 571 セララ錠25mg 「内] 572 セララ錠25mg 「内] 573 セルシン注射液10mg(2mL) 574 セルニルトン錠63mg 「内] 575 ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) 「セレコキシブ錠100mg「VTRS」 「内] 576 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 「内] 577 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 「内] 578 セレジストのD錠5mg 「内] 579 セレスタシ配合錠 「セレニカーン錠200mg「VTRS」 「内] 580 セレニカル顆粒40%(400mg/g) 「内] 581 セレンスス内服液0.2%(2mg/mL) 「内] 582 センノンド錠12mg「サワイ」 「内] 583 ソセゴン注 15mg 「内] 584 ソクロール塩酸塩錠40mg「TE」 「内] 585 ソナソイド注射用 16 μ L 「注] 586 ソビラックス眼軟膏3%(5g) 「外] 587 ソビラッカス眼軟膏3%(5g) 「外] 588 ソフラチュール貼付剤10cm 「外] 589 ソフルーザ錠20mg 「内]			
561 セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 562 セフォアム静注用1gバッグ「日医工」 563 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 564 セフジトレンピボキシルル見用細粒10% 565 セフジトレンピボキシルが見用細粒10% 566 セフジトレンピボキシルが見用細粒10% 567 セフジンルカプセル100mg「ナワイ」 568 セフ・ルカプセル100mg「ファイザー」 569 セフ・リファキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工 570 セオフルリフャリンカトリウム静注用1g「日医工」日医工 570 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 571 セララ錠25mg 572 セララ錠50mg 573 セルシン注射液10mg(2mL) 574 セルニルトン錠63mg 575 ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) 576 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 577 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 578 セレジストOD錠5mg 579 セレスタシン配合錠 579 セレスタシン配合錠 579 セレスタシの配合錠 579 セレスタシの配合錠 579 セレスタン配合錠 580 セレニル系顆粒40%(400mg/g) 581 セレネース内服液0.2%(2mg/mL) 582 センシール塩酸塩錠40mg「TE」 583 ソクロール塩酸塩錠40mg「TE」 584 ソクロール塩酸塩錠40mg「TE」 585 ソナゾイド注射用16μL 586 ゾビラックス眼軟膏39%(5g) 587 ゾビラックス眼軟膏39%(5g) 588 ソフルーザ錠20mg 589 ソフルーザ錠20mg			
1			
セフがペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」		セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	
565 セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」 【内】 566 セフジニルカプセル100mg「ファイザー」 【内】 567 セフタジジム静注用1g「マイラン」 【注】 568 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工 【注】 569 セフメタゾールNa静注用1g「NP」 【注】 570 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 【外】 571 セララ錠25mg 【内】 572 セララ錠50mg 【内】 573 セルシン注射液10mg(2mL) 【注】 574 セルニルトン錠63mg 【内】 575 ゼルフルム(貼付:100mm×125mm) 【外】 576 セレコキシブ錠100mg「VTRS」 【内】 577 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 【内】 578 セレジストOD錠5mg 【内】 579 セレスタミン配合錠 【内】 580 セレニス内服液0.2%(2mg/mL) 【内】 581 セレネース内服液0.2%(2mg/mL) 【内】 582 センノント錠12mg「サワイ」 【内】 584 ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 【内】 585 ソナゾイド注射用 16 μL 【注】 586 ゾビラックス軟膏3%(5g) 【外】 587 ゾブルーザ錠20mg 【内】 588 ソフルーサ錠00mg 【内】	563	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	【内】
566 セフジニルカブセル100mg「ファイザー」 【内】 567 セフタジジム静注用1g「マイラン」 〔注】 568 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工 〔注】 569 セフメタゾールNa静注用1g「NP」 〔注】 570 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 【外】 571 セララ錠25mg 【内】 572 セララ錠25mg 【内】 573 セルシン注射液10mg(2mL) 〔注】 574 セルニルトン錠63mg 【内】 575 ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) 【外】 576 セレコキシブ錠100mg「VTRS」 【内】 578 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 【内】 579 セレスタミン配合錠 【内】 580 セレスタミン配合錠 【内】 581 セレスストスト服被40%(400mg/g) 【内】 582 センノンド錠12mg「サワイ」 【内】 583 ソセゴン注 15mg 【注】 584 ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 【内】 585 ソナゾイド注射用 16 μ L 【注】 586 ゾビラックス軟膏5%(5g) 【外】 587 ゾブルーザ錠20mg 【内】		セフジトレンピポキシル小児用細粒10%	
[注] 568 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工 569 セフメタゾールNa静注用1g「NP」 570 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 571 セララ錠50mg 572 セララ錠50mg 573 セルシン注射液10mg(2mL) 574 セルニルトン錠63mg 575 ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) 576 セレコキシブ錠100mg「VTRS」 577 セレコキシブ錠100mg「VTRS」 578 セレジストOD錠5mg 579 セレスタミン配合錠 579 セレスタミン配合錠 579 セレスタミン配合錠 570 セレニカR顆粒40%(400mg/g) 581 セレオース内服液0.2%(2mg/mL) 582 センノシド錠12mg「サワイ」 583 ソセゴン注 15mg 584 ソクロール塩酸塩錠40mg「TE」 585 ソナブイド注射用 16 μ L 586 ゾビラックス眼軟膏3%(5g) 587 ゾビラックス眼軟膏3%(5g) 588 ソフラチュール貼付剤10cm 589 ゾフルーザ錠20mg 589 ゾフルーザ錠20mg 589 ゾフルーザ錠20mg 580 (内) 581 グブラルコ・15 mg 581 グブラルコ・15 mg 582 グブラルコ・15 mg 583 グブラルコ・15 mg 584 グブラルコ・15 mg 585 グブラルコ・15 mg 586 グブラルコ・15 mg 587 グブルーザ錠20mg 587 グブルーザ錠20mg 588 グブラルコ・15 mg 589 グブルーザ錠20mg 589 グブルーザ錠20mg 589 グブルーザ錠20mg 580 (内) 580 グブルーザ錠20mg 580 (内) 581 グブルーザ錠20mg 581 グブルーザ錠20mg 582 (内) 583 グブルーザ錠20mg 583 グブルーザ錠20mg 584 グブルーザ錠20mg 585 (内) 586 グブルーザ錠20mg		セフジトレンピポキシル錠 100mg「サワイ」	
568 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工 [注] 569 セフメタゾールNa静注用1g「NP」 [注] 570 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 [外] 571 セララ錠25mg [内] 572 セララ錠50mg [内] 573 セルシン注射液100mg(2mL) [注] 574 セルニルトン錠63mg [内] 575 ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) [内] 576 セレコトシブ錠100mg「VTRS」 [内] 577 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 [内] 578 セレジストOD錠5mg [内] 579 セレスタミン配合錠 [内] 580 セレニカR顆粒40%(400mg/g) [内] 581 セレスクR顆粒40%(400mg/g) [内] 582 センノシト錠12mg「サフイ」 [内] 583 ソセゴン注 15mg [注] 584 ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 [内] 585 ソナゾイド注射用 16 μL [注] 586 ゾビラックス軟膏5%(5g) [外] 587 ゾビラックス軟膏5%(5g) [外] 589 ゾフルーザ錠20mg [内]		セフジニルカブセル100mg 「ファイサー」	
569 セフメタゾールNa静注用1g「NP」 [注] 570 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 [外] 571 セララ錠25mg [内] 572 セララ錠50mg [内] 573 セルシン注射液10mg(2mL) [注] 574 セルニルトン錠63mg [内] 575 ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) [外] 576 セレコキシブ錠100mg「VTRS」 [内] 577 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 [内] 578 セレジストOD錠5mg [内] 579 セレスタミン配合錠 [内] 580 セレス外系類40%(400mg/g) [内] 581 セレス内服液0.2%(2mg/mL) [内] 582 センノシド錠12mg「サフィ」 [内] 583 ソセゴン注 15mg [注] 584 ソケリール塩酸塩錠40mg「TE」 [内] 585 ソナゾイド注射用 16 μ L [注] 586 ソビラックス軟膏5%(5g) [外] 587 ゾビラックス軟膏5%(5g) [外] 589 ゾフルーザ錠20mg [内]			
570 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 【外】 571 セララ錠25mg 【内】 572 セララ錠50mg 【内】 573 セルシン注射液10mg(2mL) 【注】 574 セルニルトン錠63mg 【内】 575 ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) 【外】 576 セレコキシブ錠100mg「VTRS」 【内】 577 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 【内】 578 セレジストOD錠5mg 【内】 579 セレスタミン配合錠 【内】 580 セレニカR顆粒40%(400mg/g) 【内】 581 セレネース内服液0.2%(2mg/mL) 【内】 582 センノシド錠12mg「サワイ」 【内】 583 ソセゴン注 15mg 【注】 584 ソクロール塩酸塩錠40mg「TE」 【内】 585 ソナゾイド注射用 16 μ L 【注】 586 ゾビラックス眼軟膏3%(5g) 【外】 587 ゾビラックス軟膏5%(5g) 【外】 588 ソフラチュール貼付剤10cm 【外】 589 ゾフルーザ錠20mg 【内】		セントリアキソンナトリワム静注用1g1日医工」 日医工	
 たフラ錠25mg たフラ錠50mg たカーラン注射液10mg(2mL) たルシン注射液10mg(2mL) たルコルトン錠63mg たカーランがはいフィルム(貼付:100mm×125mm) たカーセレコキシブ錠100mg「VTRS」 たレコキシブ錠200mg「VTRS」 たカーセレコキシブ錠200mg「VTRS」 たカーセレスタミン配合錠 たカーセレスタミン配合錠 たカーセレスの服液0.2%(2mg/mL) たカーセンストス内服液0.2%(2mg/mL) たカーセンノシド錠12mg「サワイ」 たカーリカール塩酸塩錠40mg「TE」 カーリナゾイド注射用 16 μ L カーリンチックス収表である。 カーリンチックス収表である。 カーリンチックス収表である。 カーリンチックス収表である。 カーリンチックス収表である。 カーリンチックス収表である。 カーリンチックス収表である。 カーリンチンク・シール貼付剤10cm カーリンカー・サジを20mg カーリンカー・サンスのよりを表するがあるがある。 カーリンカー・サンスのよりを表する。 カーロー・サンスのよりを表するがあるがある。 カーロー・サンスのよりを表する。 カーロー・サンスのよりを表するがある。 カーロー・サンスのよりを表するがあるがある。 カーロー・サンスのより			
572 セララ錠50mg 【内】 573 セルシン注射液10mg(2mL) 【注】 574 セルニルトン錠63mg 【内】 575 ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) 【外】 576 セレコキシブ錠100mg「VTRS」 【内】 577 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 【内】 578 セレジストOD錠5mg 【内】 579 セレスタミン配合錠 【内】 580 セレニカR顆粒40%(400mg/g) 【内】 581 セレネース内服液0.2%(2mg/mL) 【内】 582 センノシド錠12mg「サワイ」 【内】 583 ソセゴン注 15mg 【注】 584 ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 【内】 585 ソナゾイド注射用 16 μ L 【注】 586 ゾビラックス軟膏3%(5g) 【外】 587 ゾビラックス軟膏5%(5g) 【外】 588 ソフラチュール貼付剤10cm 【外】 589 ゾフルーザ錠20mg 【内】			
573 セルシン注射液10mg(2mL) (注) 574 セルニルトン錠63mg [内] 575 ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) [外] 576 セレコキシブ錠100mg「VTRS」 [内] 577 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 [内] 578 セレジストOD錠5mg [内] 579 セレスタミン配合錠 [内] 580 セレニカR顆粒40%(400mg/g) [内] 581 セレネース内服液0.2%(2mg/mL) [内] 582 センノシド錠12mg「サワイ」 [内] 583 ソセゴン注 15mg [注] 584 ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 [内] 585 ソナゾイド注射用 16 μ L [注] 586 ゾビラックス眼軟膏3%(5g) [外] 587 ゾビラックス軟膏5%(5g) [外] 588 ソフラチュール貼付剤10cm [外] 589 ゾフルーザ錠20mg [内]			
574 セルニルトン錠63mg 【内】 575 ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) 【外】 576 セレコキシブ錠100mg「VTRS」 【内】 577 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 【内】 578 セレジストOD錠5mg 【内】 579 セレスタミン配合錠 【内】 580 セレニカR顆粒40%(400mg/g) 【内】 581 セレネース内服液0.2%(2mg/mL) 【内】 582 センノシド錠12mg「サワイ」 【内】 583 ソセゴン注 15mg 【注】 584 ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 【内】 585 ソナゾイド注射用 16 μ L 【注】 586 ゾビラックス眼軟膏3%(5g) 【外】 587 ゾビラックス軟膏5%(5g) 【外】 588 ソフラチュール貼付剤10cm 【外】 589 ゾフルーザ錠20mg 【内】			
575 ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm) 【外】 576 セレコキシブ錠100mg「VTRS」 【内】 577 セレコキシブ錠200mg「VTRS」 【内】 578 セレジストOD錠5mg 【内】 579 セレスタミン配合錠 【内】 580 セレニカR顆粒40%(400mg/g) 【内】 581 セレネース内服液0.2%(2mg/mL) 【内】 582 センノシド錠12mg「サワイ」 【内】 583 ソセゴン注 15mg 【注】 584 ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 【内】 585 ソナゾイド注射用 16 μ L 【注】 586 ゾビラックス眼軟膏3%(5g) 【外】 587 ゾビラックス軟膏5%(5g) 【外】 588 ソフラチュール貼付剤10cm 【外】 589 ゾブルーザ錠20mg 【内】			【内】
577セレコキシブ錠200mg「VTRS」【内】578セレジストOD錠5mg【内】579セレスタミン配合錠【内】580セレニカR顆粒40%(400mg/g)【内】581セレネース内服液0.2%(2mg/mL)【内】582センノシド錠12mg「サワイ」【内】583ソセゴン注 15mg【注】584ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」【内】585ソナゾイド注射用 16 μ L【注】586ゾビラックス眼軟膏3%(5g)【外】587ゾビラックス軟膏5%(5g)【外】588ソフラチュール貼付剤10cm【外】589ゾフルーザ錠20mg【内】			
578セレジストOD錠5mg【内】579セレスタミン配合錠【内】580セレニカR顆粒40%(400mg/g)【内】581セレネース内服液0.2%(2mg/mL)【内】582センノシド錠12mg「サワイ」【内】583ソセゴン注 15mg【注】584ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」【内】585ソナゾイド注射用 16 μ L【注】586ゾビラックス眼軟膏3%(5g)【外】587ゾビラックス軟膏5%(5g)【外】588ソフラチュール貼付剤10cm【外】589ゾフルーザ錠20mg【内】	576		【内】
579セレスタミン配合錠【内】580セレニカR顆粒40%(400mg/g)【内】581セレネース内服液0.2%(2mg/mL)【内】582センノシド錠12mg「サワイ」【内】583ソセゴン注 15mg【注】584ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」【内】585ソナゾイド注射用 16 μ L【注】586ゾビラックス眼軟膏3%(5g)【外】587ゾビラックス軟膏5%(5g)【外】588ソフラチュール貼付剤10cm【外】589ゾフルーザ錠20mg【内】			
580セレニカR顆粒40%(400mg/g)【内】581セレネース内服液0.2%(2mg/mL)【内】582センノシド錠12mg「サワイ」【内】583ソセゴン注 15mg【注】584ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」【内】585ソナゾイド注射用 16 μ L【注】586ゾビラックス眼軟膏3%(5g)【外】587ゾビラックス軟膏5%(5g)【外】588ソフラチュール貼付剤10cm【外】589ゾフルーザ錠20mg【内】			
581セレネース内服液0.2%(2mg/mL)【内】582センノシド錠12mg「サワイ」【内】583ソセゴン注 15mg【注】584ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」【内】585ソナゾイド注射用 16 μ L【注】586ゾビラックス眼軟膏3%(5g)【外】587ゾビラックス軟膏5%(5g)【外】588ソフラチュール貼付剤10cm【外】589ゾフルーザ錠20mg【内】			
582センノシド錠12mg「サワイ」【内】583ソセゴン注 15mg【注】584ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」【内】585ソナゾイド注射用 16 μ L【注】586ゾビラックス眼軟膏3%(5g)【外】587ゾビラックス軟膏5%(5g)【外】588ソフラチュール貼付剤10cm【外】589ゾフルーザ錠20mg【内】			
583ソセゴン注 15mg【注】584ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」【内】585ソナゾイド注射用 16 μ L【注】586ゾビラックス眼軟膏3%(5g)【外】587ゾビラックス軟膏5%(5g)【外】588ソフラチュール貼付剤10cm【外】589ゾフルーザ錠20mg【内】			
584ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」【内】585ソナゾイド注射用 16 µ L【注】586ゾビラックス眼軟膏3%(5g)【外】587ゾビラックス軟膏5%(5g)【外】588ソフラチュール貼付剤10cm【外】589ゾフルーザ錠20mg【内】			【 分
585ソナゾイド注射用 16 μ L【注】586ゾビラックス眼軟膏3%(5g)【外】587ゾビラックス軟膏5%(5g)【外】588ソフラチュール貼付剤10cm【外】589ゾフルーザ錠20mg【内】			
586ゾビラックス眼軟膏3%(5g)【外】587ゾビラックス軟膏5%(5g)【外】588ソフラチュール貼付剤10cm【外】589ゾフルーザ錠20mg【内】			【注】
587ゾビラックス軟膏5%(5g)【外】588ソフラチュール貼付剤10cm【外】589ゾフルーザ錠20mg【内】			
588 ソフラチュール貼付剤10cm 【外】 589 ゾフルーザ錠20mg 【内】		ゾビラックス軟膏5%(5g)	
589 ゾフルーザ錠20mg 【内】			
590 ゾラデックス1.8mgデポ 【注】		ゾフルーザ錠20mg	
	590	ゾラデックス1.8mgデポ	

E01	\"=="\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/:÷1
591 592	ゾラデックス3.6mgデポ ゾラデックスLA10.8mgデポ	【注】
592 593	ンファックスEATO.onigアル ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
594	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」	【内】
595	ソルアセトF輸液 500mL	【注】
596	ソルデム1輸液 200mL	【注】
597	ソルデム1輸液 500mL	【注】
598	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
599	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
600	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
601	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
602	ダーブロック錠2mg	【内】
603	ダーブロック錠4mg	【内】
604	ダーブロック錠6mg	【内】
605	ダイアモックス注射用500mg	【注】
606	ダイアモックス錠250mg	【内】
607	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
608	ダカルバジン注用100	【注】
609	タケキャブ錠 10mg	【内】
610	タケキャブ錠 20mg	【内】
611	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
612	タシグナカプセル150mg	【内】
613	タシグナカプセル200mg	【内】
614	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	【注】
615	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	【内】
616	タプロス点眼液0.0015%(2.5mL)	【外】
617	タプロスミニ点眼液0.0015% (0.3mL)	【内】
618	タムスロシン塩酸塩OD錠O. 1mg「サワイ」	【外】
619	ダラシンTゲル1%(10g)	【内】
620	タリージェOD錠5mg	【外】
621	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	【外】
622	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	【外】
623	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
624	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
625	タンデトロン注射用20 (20 μg)	【注】
626	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
627	ダントリウム静注用20mg	【注】
628	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
629	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】
630	チウラジール錠50mg	【内】
631	チェクール点滴用O. 5g	【注】
632	チオラ錠100	【内】
633	チガソンカプセル10	【内】
634	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】
635	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
636	チニタゾール錠500mg「F」	
637	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	【外】
638	チャンピックス錠0.5mg	【内】
639	チャンピックス錠1mg	【内】
640	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
641	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】
642	チラーヂンS錠25μg	【内】
643	チラーヂンS錠50μg	【内】
644	チロナミン錠 5mcg	【内】
645	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
646	ツイミーグ錠500mg	【内】
647	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
648	ツートラム錠25mg	【内】
649	ツートラム錠50mg	【内】

050		[
650 651	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[No.137] 2.5g	【内】
652	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17]2.5g ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[No.16]2.5g	【内】 【内】
653	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[No.62]2.5g	【内】
654	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[No.24] 2.5g	【内】
655	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[No.1] 2.5g	【内】
656	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[No.107] 2.5g	【内】
657	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[No.18] 2.5g	【内】
658	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)[No.25] 2.5g	【内】
659	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)[No.31] 2.5g	【内】
660	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[No.12] 2.5g	【内】
661	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[No.10] 2.5g	【内】
662	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)[No.114] 3.0g	【内】
663	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[No.48] 2.5g	【内】
664	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[No.19] 3.0g	【内】
665	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)[No108] 3.0g	【内】
666	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[No.100] 2.5g	【内】
667	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)[No.47] 2.5g	【内】
668	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒(医療用)[No.38] 2.5g	【内】
669	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[No.23] 2.5g	【内】
670	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[No.29] 3.0g	【内】
671	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)[No.7] 2.5g	【内】
672	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[No.14] 2.5g	【内】
673	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)[No.126]2.5g	【内】
674	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[No.54]2.5g	【内】
675 676	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[No.43] 2.5g ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)[No.53] 2.5g	【内】 【内】
677	プムノ味程/古皿/湯エイス根粒(医療用/(No.33) 2.3g ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
678	プログリロールゲーグ IIIg「久光」 ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】
679	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
680	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
681	ディビゲル1mg(ゲル)	【外】
682	ディフェリンゲル0.1%(15g)	【外】
683	デエビゴ錠5mg	【内】
684	テオドール錠100mg	【内】
685	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【内】
686	テオロング錠200mg	【内】
687	デカドロン錠0.5mg	【内】
688	デキサート注射液3. 3mg	【注】
689	デキサンVG軟膏 0.12% (日医工)	【外】
690	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ	【注】
691	デザレックス錠5mg	【内】
692	デスモプレシン・スプレー2. 5協和(125μg1瓶)	【外】
693	テタノブリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】
694	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】
695	テネリアOD錠20mg	【内】
696	デノシン点滴静注用500mg	【注】
697	テノゼット錠 300mg	【内】
698	テプレノンカプセル50mg「サワイ」	【内】
699	テプレノン細粒10%「サワイ」	【内】
700	デベルザ錠20mg	【内】
701	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】 【 外 】
702	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	【内】
703	デュファストン錠 5mg	【内】
704 705	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
705 706	テラルビシン注射用10mg	【注】 【外】
706 707	テリルジー100エリプタ テリルジー200エリプタ30吸入用	【外】
707 708	フリルシー2001フラス30級人用 テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
700		[[KAT

デリビナンと鏡125mg「サブイ」	709	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	【外】
デルミサルタン錠40mg 「DSEP」			
デルモ生食 250mL(注射用)			
トアラセット配合錠 トーワ」	712	テルモ生食 250mL(注射用)	
#注語アイエーコール100mg			
トークチーム配合類粒			
ドキンル注 20mg		動注用アイエーコール100mg	
ドキツルビンツ塩酸塩注射用10mg「NK」		トーワチーム配合顆粒	
ドキソルビン塩酸塩に対用50mg 「NK」			
トコテュールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」		トキソルビンノ温酸温注射用 I Umg! NK」	
トコティールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」		トコフェロールニコチンボをエフテルカプセル、100mg「トーロ」	
ドセタキセル点商静注 20mg/fmL トゲフルト」		トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	
ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤウルト」		ドヤタキヤル点滴静注 20mg/1ml 「ヤクルト」	
「大本ペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」		ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
「大ペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」			
1727 ドパネトン静注25mg(0.25%10mL1管) 注]	725	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
728			
大学工			【注】
トピナ錠50mg			
トプシムゲリーム(5g)			
「プスOD錠100mg			
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」			
「プタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」 注] アプタミン持続静注 150mgシリンジ「KKC」 注] アプタミン持続静注 150mgシリンジ「KKC」 注] ドプタミン持続静注 150mgシリンジ「KKC」 ドプタミン持続静注 150mgシリンジ「KKC」 内] トラセミドOD錠4mg「TE」 内] トラセシが錠 5mg 内] トラセンが変数 5mg 内] トラビンタ錠 5mg 内] トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 内] トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 内] トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 内] トラバシズ点眼液0.004%(2.5mL) 伊] トラマールOD錠 25mg 内] トラマールOD錠 25mg 内] トラマールOD錠 25mg 内] トラマンリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶) ケラマンリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶) ケランコン錠 7.5mg 内] トランコン錠 7.5mg 内] トランコン錠 7.5mg 内] トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」 内] トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」 内] トリアリラム錠 0.25mg「日医工」 内] トリアリタムル金10 内] トリアリタムル金10 内] トリアリタムル金10 内] トリメデチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 内] トリメデチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 内] トルバプタンのD錠15mg「オーツカ」 内] トルドカム注射液10mg2mL 注] トルミカム注射液10mg2mL 注] トルミカム注射液10mg2mL 注] トルーランG液75g (液・225mL) ケラドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL) ケリリンチスタッチ 注] トレーフのD錠 25mg 内] トロレプタン注射液25mg (加L 注] トロレプタン注射液25mg (加L た) トロレプタン注射液25mg (加L た) トロレプタン注射液25mg「0mL トロンピン液モチダソフトボトル 1万(10mL) トロンピン液モチダソフトボトル 1万(10mL) トロンピン液モチダソフトボトル 1万(10mL) トロンピンを手列00 ケラピリンOD錠10 トコトピジルOD錠25mg「EE」 トベルピン注10(1mL) 「注]			
ドプタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」			
「ボベット軟膏 (15g)			
「			
「内			
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」			
140			
「トラマールOD錠 25mg	740	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	
743 トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶) 【外】 744 ドラマミン錠50mg 【内】 745 トランコロン錠 7.5mg 【内】 746 トランコロン錠 7.5mg 【内】 747 トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」 【内】 748 トリキュラー21(錠 21日分1組) 【内】 749 トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 【内】 750 トリプタノール錠10 【内】 751 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 【内】 752 トルパプタンOD錠15mg「オーツカ」 【内】 753 トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 【内】 754 ドルミカム注射液10mg2mL 【注】 755 ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL) 【外】 756 トルノシティ皮下注0、75mgアテオス 【注】 757 トレーランG液75g(液:225mL) 【内】 758 トレシーパ注フレックスタッチ 【注】 759 トレリーフのD錠 25mg 【内】 760 ドロエチ配合錠「あすか」 【内】 761 ドロレプタン注射液25mg10mL 【注】 762 トロンピン液モチダソフトボトル 1万(10mL) 【内】 763 ナウゼリン全額60 【外】 765 ナフトピジルのD錠25mg「EE」 【内】 766 ナプドピジルのD錠25m			
「クラマミン錠50mg			
745 トランコロン錠 7.5mg 【内】 746 トランサミンカプセル 250mg 【内】 747 トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」 【内】 748 トリキュラー21(錠 21日分1組) 【内】 749 トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 【内】 750 トリプタノール錠10 【内】 751 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 【内】 752 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 【内】 753 トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 【内】 754 ドルミカム注射液10mg2mL 【注】 755 ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL) 【外】 756 トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス 【注】 757 トレーランG液75g(液:225mL) 【内】 758 トレシーバ注フレックスタッチ 【注】 759 トレリーフOD錠25mg 【内】 760 ドロエチ配合錠「あすか」 【内】 761 ドロレプタン注射液25mg10mL 【注】 762 トロンピンタモチダソフトボトル 1万(10mL) 【内】 763 ナウゼリン全剤60 【外】 765 ナフトピジルOD錠25mg「EE」 【内】 766 ナプトピジルOD錠25mg「EE」 【内】 766 ナスルピン注10(1mL) 【注】			
トランサミンカプセル 250mg			
「内			
748 トリキュラー21(錠 21日分1組) 【内】 749 トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 【内】 750 トリプタノール錠10 【内】 751 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 【内】 752 トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 【内】 753 トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 【内】 754 ドルミカム注射液10mg2mL 【注】 755 ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL) 【外】 756 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 【注】 757 トレーランG液75g (液:225mL) 【内】 758 トレシーバ注フレックスタッチ 【注】 759 トレリーフOD錠 25mg 【内】 760 ドロエチ配合錠「あすか」 【内】 761 ドロレプタン注射液25mg10mL 【注】 762 トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL) 【内】 763 ナウゼリンOD錠10 【内】 764 ナウゼリン坐剤60 【外】 765 ナフトピジルOD錠25mg「EE」 【内】 766 ナベルビン注10(1mL) 【注】		トノフリミンカフビル 250mg	
749 トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 【内】 750 トリプタノール錠10 【内】 751 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 【内】 752 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 【内】 753 トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 【内】 754 ドルミカム注射液10mg2mL 【注】 755 ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL) 【外】 756 トルリシティ皮下注O. 75mgアテオス 【注】 757 トレーランG液75g(液:225mL) 【内】 758 トレシーバ注フレックスタッチ 【注】 759 トレリーフのD錠 25mg 【内】 760 ドロエチ配合錠「あすか」 【内】 761 ドロレプタン注射液25mg10mL 【注】 762 トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL) 【内】 763 ナウゼリンOD錠10 【内】 764 ナウゼリン坐剤60 【外】 765 ナフトピジルOD錠25mg「EE」 【内】 766 ナベルビン注10(1mL) 【注】		トリキュラー21(錠 21日分1組)	
「内		トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」			
752トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」[内]753トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」[内]754ドルミカム注射液10mg2mL[注]755ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)[外]756トルリシティ皮下注O. 75mgアテオス[注]757トレーランG液75g (液:225mL)[内]758トレシーバ注フレックスタッチ[注]759トレリーフOD錠 25mg[内]760ドロエチ配合錠「あすか」[内]761ドロレプタン注射液25mg10mL[注]762トロンピン液モチダソフトボトル 1万(10mL)[内]763ナウゼリンOD錠10[内]764ナウゼリン坐剤60[外]765ナフトピジルOD錠25mg「EE」[内]766ナベルビン注10(1mL)[注]		トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	
754ドルミカム注射液10mg2mL【注】755ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)【外】756トルリシティ皮下注O. 75mgアテオス【注】757トレーランG液75g (液:225mL)【内】758トレシーバ注フレックスタッチ【注】759トレリーフOD錠 25mg【内】760ドロエチ配合錠「あすか」【内】761ドロレプタン注射液25mg10mL【注】762トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)【内】763ナウゼリンOD錠10【内】764ナウゼリン坐剤60【外】765ナフトピジルOD錠25mg「EE」【内】766ナベルビン注10(1mL)【注】	752		
755ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)【外】756トルリシティ皮下注O. 75mgアテオス【注】757トレーランG液75g (液: 225mL)【内】758トレシーバ注フレックスタッチ【注】759トレリーフOD錠 25mg【内】760ドロエチ配合錠「あすか」【内】761ドロレプタン注射液25mg10mL【注】762トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)【内】763ナウゼリンOD錠10【内】764ナウゼリン坐剤60【外】765ナフトピジルOD錠25mg「EE」【内】766ナベルビン注10(1mL)【注】	753		【内】
756トルリシティ皮下注O. 75mgアテオス(注)757トレーランG液75g(液:225mL)【内)758トレシーバ注フレックスタッチ【注)759トレリーフOD錠 25mg【内)760ドロエチ配合錠「あすか」【内)761ドロレプタン注射液25mg10mL【注)762トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)【内)763ナウゼリンOD錠10【内)764ナウゼリン坐剤60【外)765ナフトピジルOD錠25mg「EE」【内)766ナベルビン注10(1mL)【注)			
757トレーランG液75g (液:225mL)【内】758トレシーバ注フレックスタッチ【注】759トレリーフOD錠 25mg【内】760ドロエチ配合錠「あすか」【内】761ドロレプタン注射液25mg10mL【注】762トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)【内】763ナウゼリンOD錠10【内】764ナウゼリン坐剤60【外】765ナフトピジルOD錠25mg「EE」【内】766ナベルビン注10(1mL)【注】			
758トレシーバ注フレックスタッチ【注】759トレリーフOD錠 25mg【内】760ドロエチ配合錠「あすか」【内】761ドロレプタン注射液25mg10mL【注】762トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)【内】763ナウゼリンOD錠10【内】764ナウゼリン坐剤60【外】765ナフトピジルOD錠25mg「EE」【内】766ナベルビン注10(1mL)【注】			
759トレリーフOD錠 25mg【内】760ドロエチ配合錠「あすか」【内】761ドロレプタン注射液25mg10mL【注】762トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)【内】763ナウゼリンOD錠10【内】764ナウゼリン坐剤60【外】765ナフトピジルOD錠25mg「EE」【内】766ナベルビン注10(1mL)【注】			
760ドロエチ配合錠「あすか」【内】761ドロレプタン注射液25mg10mL【注】762トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)【内】763ナウゼリンOD錠10【内】764ナウゼリン坐剤60【外】765ナフトピジルOD錠25mg「EE」【内】766ナベルビン注10(1mL)【注】			
761ドロレプタン注射液25mg10mL【注】762トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)【内】763ナウゼリンOD錠10【内】764ナウゼリン坐剤60【外】765ナフトピジルOD錠25mg「EE」【内】766ナベルビン注10(1mL)【注】			
762トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)【内】763ナウゼリンOD錠10【内】764ナウゼリン坐剤60【外】765ナフトピジルOD錠25mg「EE」【内】766ナベルビン注10(1mL)【注】			
763ナウゼリンOD錠10【内】764ナウゼリン坐剤60【外】765ナフトピジルOD錠25mg「EE」【内】766ナベルビン注10(1mL)【注】			
764ナウゼリン坐剤60【外】765ナフトピジルOD錠25mg「EE」【内】766ナベルビン注10(1mL)【注】			
765ナフトピジルOD錠25mg「EE」【内】766ナベルビン注10(1mL)【注】			
766 ナベルビン注10(1mL) 【注】		ナフトピジルOD錠25mg「EE」	
767 ナベルビン注40(4mL) 【注】		ナベルビン注10(1mL)	【注】
	767	ナベルビン注40(4mL)	

768	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	【内】
769	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
770	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
771	ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
772	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
773	ニコチネルTTS 30(貼付)	
	ニコアイル・110 30(知刊/	【外】
774	ニコペリック腹膜透析液1500mL ニコペリック腹膜透析液2000mL	【外】
775	ニコペリック腹膜透析液2000mL	【外】
776	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
777	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
778	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
779	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
780	ニドラン注射用50mg	【注】
781	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
		【注】
782	ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)	
783	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	【注】
784	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	【注】
785	ニトロペン舌下錠0.3mg	【内】
786	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
787	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
788	ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」	【内】
789	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
790	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	【内】
791	ニュープロパッチ13. 5mg	【外】
792	ニュープロパッチ4. 5mg	【外】
793	ニュープロパッチ9mg	【外】
794	ネイリンカプセル100mg	【内】
795	ネオアミユー輸液 200mL	【注】
796	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	【外】
797	ネオシネジンコーワ注1mg	【注】
798	ネオバルギンEHD	【内】
799	ネオビタカイン注 5mL	【注】
800	ネオフィリン注 250mg(10mL)	【注】
	ペリノナソノ/エ250mg(10mL/ → ★ A" / リ 上明 法 0.40/ (15)	
801	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)	【外】 【 小 】
802	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】
803	ネクサバール錠200mg	【内】
804	ネスプ注射液120μgプラシリンジ	【注】
805	ネスプ注射液180μgプラシリンジ	【注】
806	ネスプ注射液20μgプラシリンジ	【注】
807	ネスプ注射液40μgプラシリンジ	【注】
808	ネスプ注射液60μgプラシリンジ	<u> </u>
809	ネリゾナソリューション0.1%(10mL)	【外】
810	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)	【外】
811	ノイトロジン注100 µ g	【注】
812	ノイトロジン注250 µg	【注】
813	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】
814	ノイロトロピン錠4単位	【内】
815	ノウリアスト錠20mg	【内】
816	ノーベルバール静注用250mg	【注】
817	ノバスタンHI注10mg	【注】
818	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)	【注】
819	ノバミン錠5mg	【内】
820	ノバントロン注10mg(5mL)	【注】
	ノハフドロフ/エ IUIIB(UIIIL/ ノギニピッピックラッカフジナフトックファクン・/クロの単/ナイナット)	
821	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
822	ノボラピッド注フレックスペン	【注】
823	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
824	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
825	ハーセプチン注射用150	【注】
826	ハーセプチン注射用60	【注】
		= ·

827	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
828	バーフンコーフンベー級の123 バイアスピリン錠100mg	【内】
829	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
830	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
831	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
832	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
833	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
834	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
835	ハイゼット錠50mg	【内】
836	ハイドレアカプセル500mg	【内】
837	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【外】
838	パキシルCR錠12.5mg	【内】
839	パキシルCR錠25mg	【内】
840	バクタ配合錠	【内】
841	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
842	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
843	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
844	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	【内】
845	バックス発泡顆粒	【外】
846	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
847	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
848	パム静注500mg(20mL)	【注】
849	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	【内】
850	パラミヂンカプセル300mg	【内】
851	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
852	バルサルタン錠 40mg 「サンド」	【内】
853	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
854	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
855	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】
856	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	【内】
857	パルモディアXR錠0.2mg	【内】
858	ハルロピテープ24mg	【外】
859	ハルロピテープ8mg	【外】
860	バレイショデンプン「ヨシダ」	【内】
861	バロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
862	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	【内】
863	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
864	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	【内】
865	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「明治」	【注】
866	パンテチン錠 100mg 「YD」	【内】
867	パンテノール注100mg「KCC」	【注】
868	ハンプ注射用1000	【注】
869	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
870	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】 【如】
871	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL) ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】 【如】
872 873	ピーエスエスノフス5000眼准派版0.0184%(20ML) ピーエヌツイン−1号輸液 1000mL	【外】 【注】
874	ピーエヌツイン-1号軸液 1000mL ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
875	ピーエヌツイン-2号軸液 1700mL ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
876	ビーソフテンローション0.3% (50g)	【外】
877	ビーフリード輸液 (500mL)	【注】
877 878	ピヴラッツ点滴静注液150mg	【注】
879	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
880	ビオスリー配合OD錠	【内】
881	ビオフェルミンR散(1g/包)	【内】
882	ビカーボン輸液 500mL	【注】
883	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】
884	ビクシリンカプセル250mg	【内】
885	ビクシリン注射用1g	【注】
500	ニンとノン(工以1/11・2	1. / ⊥ 1

886	ビクトーザ皮下注18mg	【注】
887	ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「イワキ」	【内】
888	ビジパーク270 100mL	【注】
889	ビジパーク270 50mL	注】
890	ビジパーク270注20mL	注】
	ピシバニール注射用5KE	
891	[ンハ_ール注射用3NE	注】
892	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
893	ビスダイン静注用15mg	【注】
894	LスロンH錠200mg	【内】
895	ビソノテープ 2mg	【外】
896	ビソノテープ 4mg	【外】
897	ビソノテープ 8mg	【外】
898	ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「トーワ」	【内】
899	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
900	ビグーザ注射用100mg	【注】
	Lグーリ注列用 TOOMg	
901	ビタジェクト注キット	注】
902	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
903	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
904	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
905	ビタメジン静注用	【注】
906	ヒダントールF配合錠	【内】
907	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】
908	ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
909	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
910	ヒビスコール液A0.5%	
		【外】
911	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
912	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
913	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
914	ビムパット錠50mg	【内】
915	ピムロ顆粒(0.5g/包)	【内】
916	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
917	LューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
918	ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL	注】
919	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200	
920	ビュレル テトラング A TI スタートライス・ヘンサー 用ガートララン メラテラケー式 (版: 1200 ビラノアOD錠20mg	【内】
921		内
922	ビリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
923	ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」	【内】
924	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	【内】
925	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」	【内】
926	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
927	ビレーズトリ エアロスフィア120吸入用	【外】
928	ファーストシン静注用1g	【注】
929	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」	注】
930	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	内】
931	ファルモルビシン注射用10mg	【内】
932	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	【外】
933	フィコンパ錠2mg	【内】
934	フィジオ140輸液 500mL	【注】
935	フィニバックス点滴静注用0. 25g	【注】
936	ブイフェンド200mg静注用	【注】
937	フィブラストスプレー500	【外】
938	フィブロガミンP静注用(4mL)	注】
939	フィルグラスチムBS注 75μgシリンジ「モチダ」	注】
940	フィルグラステムBS注 10μgシリンジ「モチダ」	注】
		【注】
941	フェインジェクト静注500mg	【注】
942	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
943 944	フェジン静注40mg(2mL)	注
	フェソロデックス筋注250mg	【注】

1	945	フェノール・亜鉛華リニメント	[bl]
フェノフィブラー 200mg 田子/灯 日内 1			【外】
948 フェブキンスタット錠 10mg [DSEP] (内) 950 フェロ・グラデュメット錠 105mg (内) 951 フェンタニル注射液の. mmg 「アルモ」 (注) 953 フェンタニル注射液の. 5mg 「アルモ」 (注) 953 フェントステーブ10mg (外) 955 フェントステーブ20mg (外) 956 フェントステーブ20mg (外) 957 フェントステーブ20mg (外) 958 フェントステーブ20mg (外) 959 フェントステーブ20mg (外) 959 フェントステーブ20mg (外) 950 フェントステーブ20mg (外) 951 フェントステーブ20mg (外) 952 フェントステーブ20mg (外) 953 フェントステーブ20mg (内) 954 フェントステーブ20mg (内) 955 フェントステーブ20mg (内) 956 フェントステーブ20mg (内) 957 フェンーが変 50mg (内) 958 フェンーが変 50mg (内) 959 フェンーが変 50mg (内) 950 フェントステーブ20mg (内) 960 ファンーが変 60mg (内) 961 ファンエを記憶 10mg (内) 962 ブラルスコボラミン臭化物注 20mg 「日医エ」 (注) 963 ブラシュ線棒 PC線性をネ入 (外) 964 ブデルルの入が未満100mg (内) 967 ブラデキサガブセル 10mg (内) 967 ブラデキサガブセル 10mg (内) 968 ブラシール降酸 2500mg (内) 969 フラシールを設定 50mg (内) 970 ブラバール配合錠 (内) 971 フラビタン袋を30mg (内) 972 ブラブルカスト錠 22 5 1 日医エ」 (内) 973 ブリティルを30mg (内) 974 ブリティルを30mg (内) 975 ブリスイント許注液 2.5 g 50mL (注) 977 ブルボラン袋 50mg (内) 978 フルスイント能注液 2.5 g 50mL (注) 977 フルオンロンの 1 % 5 mmg (内) 978 フルスイント能注液 2.5 mg (内) 979 フルスイント 1 % 5 mmg (内) 979 フルストサイト 1 % 5 mmg (中) (内) 979 フルストサイト 1 % 5 mmg (中) (内) 971 フルスタン錠 2.0 mg (中) (内) 972 フルスタン錠 2.0 mg (円) 973 フルスタン錠 2.0 mg (円) 974 フルスタン錠 2.0 mg (ア) (内) 975 フルマビエル注射 1 mg (ア) メルリ 987 フルマビエル注射 1 mg (上) 979 フルマビエル音 1 mg (上) 979 フルマビエル音 1 mg (上) 979 フルマビエル音 1 mg (上) 979 フルマビス 1 mg (円) 979 フルマビス 2 mg (円) 979 フルマン 2 mg (円) 979 フルマン 2 mg (円			
1元プキンスタント錠20mg [DSEP]		フェブキソスタット錠10mg「DSFP」	
プロ・グラデュメット鏡 108mg			
フェンタニル注射液の、1mg 「テルモ」		フェロ・グラデュメット錠105mg	
アントステーブ0.5mg	951		
プェントステーブImg	952	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	
フェントステーブAmg			
フェントステーブ4mg			
74シーガ錠 10mg		フェントステープ2mg	
フォンナが 5mg			
75			
79・ジンレイ軟膏2%(10g)		ノオソー刀錠 5mg	
プリフェキ配合錠「SANIK」		ノオリアミノ延(3mg) コミンド・ルナ教亭90/ (10)	
プチルスコポラミン臭化物注20mg 日医工」			
79シュ綿棒P(綿棒2本入)			
965		プッシュ線 (線 kg ク	
506 プラゲキサカプセル10mg			
596			
7ラザキサカプセル75mg			
596			
7ラパール配合錠	968	フラジール内服錠250mg	【内】
7ラピタン錠5mg	969		【外】
7ラリア皮下注60mgシリンジ 7ラリルカト錠225 日医エ」 (内) 974 7リウェル配合錠 LD (内) 975 ブリズバイン下静注液 2.5g 50mL (注) 976 プリディオン静注200mg (注) 977 プリモボラン錠5mg (内) 978 フルオソロンO. 1%点眼液 (内) 979 フルオレサイト静注500mg(10%5mL) (注) 980 フルカリック3号輸液1103mL (注) 981 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 (内) 982 フルスメン錠0.3 (内) 983 フルスメアミン錠25mg「トーワ」 984 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 97ルタイト100μgエアゾール60吸入用 985 フルデカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 (外) 987 フルフトラゼバム錠 1mg「アメル」 (内) 988 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 990 ブルフェン錠100 (内) 991 フルマジニ・注射球の.5mg「ニブロ」 (注) 992 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) 992 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) 993 プレオに計断酸 1注) 994 プレオ注射用15mg (注) 995 プレオ注射用5mg (注) 996 プレオニト百酸塩錠50mg「アイザー」 997 プレガバリンのD錠75mg「ファイザー」 998 プレガバリンのD錠75mg「ファイザー」 999 プレガバリンのD錠75mg「ファイザー」 999 プレガバリンのD錠75mg「ファイザー」 1001 プレドニソ錠5mg 「内」 7レドニソ錠5mg 「内」 7レドニソ錠5mg 「内」 7レドニソ錠60625mg 「内」 1001 プレドニソ錠5mg 「内」 1001 ブレドニソ錠60625mg			
973 プランルカスト錠225「日医工」			
974 フリウェル配合錠 LD			
975 プリズバインド静注液 2.5g 50mL (注) 976 プリティオン静注200mg (注) 977 プリモボラン錠5mg (内) 978 フルオメリロンO. 1%点眼液 (内) 979 フルオレリイト静注500mg(10%5mL) (注) 980 フルカリック3号輸液1103mL (注) 981 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 (内) 982 フルスメシ錠0.3 (内) 983 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 (内) 984 フルダラ静注用50mg (注) 986 フルチカソンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 (外) 987 フルグカプセル200 (内) 988 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 (外) 989 フルテトラゼバム錠 1mg「アメル」 (内) 990 ブルフエン錠100 (内) 991 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 (注) 992 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) (注) 993 フルマイコト15mg (注) 994 ブレオ注射用15mg (注) 995 ブレオ注射用5mg (注) 996 フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 (内) 997 プレガバリンのD錠25mg「ファイザー」 (内) 998 プレガバリンのD錠25mg「ファイザー」 (内) 999 ブレディニンのD錠50 (内) 1000 ブレドニン口の錠1mg (池化成) (内) 1001 ブレドニン錠5mg (上内) 1002 ブレマリン錠0.625mg (上内) 1001 ブレドニン錠5mg (上内) 1001 ブレドニン錠5mg (上内) 1002 ブレマリン錠0.625mg (上内)			
70年 プリディオン静注200mg 【注】 10月			
977 プリモボラン錠5mg		ノリ人ハ1ノト計注液 2.3g 3UML ゴリニッオンキシテ200~~	
978 フルオメリロンO. 1%点眼液		プリチボラン(空 5mg	
979 フルオレサイト静注500mg(10%5mL) [注] 980 フルカリック3号輸液1103mL [注] 981 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 [内] 982 フルスタン錠0.3 [内] 983 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 [内] 984 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 [外] 985 フルダラ静注用50mg [注] 986 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 [外] 987 フルツロンカプセル200 [内] 988 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 [外] 989 フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 [内] 990 ブルフエン錠100 [内] 991 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 [注] 992 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) [注] 993 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) [注] 994 ブレオ注射用5mg [注] 995 ブレオ注射用5mg [注] 996 フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 [内] 997 ブレガパリンのD錠25mg「ファイザー」 [内] 998 ブレガパリンのD錠25mg「ファイザー」 [内] 999 ブレディニンのD錠50 [内] 1000 ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) [内] 1001 ブレドニン錠5mg (内] 1001 ブレドニン錠5mg (内] 1001 ブレドニン錠5mg (内] 1002 ブレマリン錠0.625mg (内]			
980 フルカリック3号輸液1103mL [注] 981 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 [内] 982 フルスタン錠0.3 [内] 983 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 [内] 984 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 [外] 985 フルダラ静注用50mg [注] 986 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 [外] 987 フルツロンカプセル200 [内] 988 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 [外] 989 フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 [内] 990 ブルフェン錠100 [内] 991 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 [注] 992 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) [注] 993 フルマリンキット静注用1g [注] 994 ブレオ注射用15mg [注] 995 ブレオ注射用5mg [注] 996 フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 [内] 997 プレガバリンのD錠25mg「ファイザー」 [内] 998 ブレガバリンのD錠75mg「ファイザー」 [内] 998 ブレガバリンのD錠75mg「ファイザー」 [内] 999 ブレディニンのD錠50 [内] 1000 ブレドニソロン錠1mg(旭化成) [内] 1001 プレドニン錠5mg [内] 1002 プレマリン錠0.625mg [内]			
981 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 982 フルスタン錠0.3 【内】 983 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 【内】 984 フルタイド100 μgエアゾール60吸入用 【外】 985 フルダラ静注用50mg 【注】 986 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μg「武田テバ」56噴霧用 【外】 987 フルツロンカプセル200 【内】 988 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 【外】 989 フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 【内】 990 ブルフェン錠100 【内】 991 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 【注】 992 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) 【注】 993 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) 【注】 994 ブレオ注射用15mg 【注】 995 ブレオ注射用5mg 【注】 996 フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 【内】 997 プレガバリンのD錠25mg「ファイザー」 【内】 998 プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 【内】 999 ブレディニンOD錠50 【内】 1000 ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) 【内】 1001 プレドニン錠5mg			
982 フルスタン錠0.3 [内] 983 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 [内] 984 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 [外] 985 フルダラ静注用50mg [注] 986 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 [外] 987 フルツロンカプセル200 [内] 988 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 [外] 989 フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 [内] 990 ブルフェン錠100 [内] 991 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 [注] 992 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) [注] 993 フルマリン計算用1g [注] 994 ブレオ注射用15mg [注] 995 ブレオ注射用5mg [注] 996 フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 [内] 997 ブレガパリンOD錠25mg「ファイザー」 [内] 998 ブレディニンOD錠50 [内] 1000 プレドニゾロン錠1mg(旭化成) [内] 1001 プレドニン錠5mg (加)			
7ルスルチアミン錠25mg「トーワ」			
984 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 985 フルダラ静注用50mg (注) 986 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 (外) 987 フルツロンカプセル200 (内) 988 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 (外) 989 フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 (内) 990 ブルフェン錠100 (内) 991 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 (注) 992 フルマリンキット静注用1g(生食100mL付) (注) 993 フルマリンキット静注用1g (注) 994 ブレオ注射用15mg (注) 995 ブレオ注射用5mg (注) 996 フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 (内) 997 プレガバリンのD錠25mg「ファイザー」 (内) 998 プレガバリンのD錠50 (内) 1000 プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 1001 プレドニン錠5mg (内) 1002 プレマリン錠0.625mg (内)	983		
986フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μg「武田テバ」56噴霧用【外】987フルツロンカプセル200【内】988フルティフォーム125エアゾール 120吸入用【外】989フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」【内】990ブルフェン錠100【内】991フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】992フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】993フルマリン静注用1g【注】994ブレオ注射用15mg【注】995ブレオ注射用5mg【注】996フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】997プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【内】998プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【内】999ブレディニンOD錠50【内】1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】	984		
987フルツロンカプセル200【内】988フルティフォーム125エアゾール 120吸入用【外】989フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」【内】990ブルフェン錠100【内】991フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】992フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】993フルマリン静注用1g【注】994ブレオ注射用15mg【注】995ブレオ注射用5mg【注】996フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】997プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【内】998プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【内】999ブレディニンOD錠50【内】1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】			
988フルティフォーム125エアゾール 120吸入用【外】989フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」【内】990ブルフェン錠100【内】991フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】992フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】993フルマリン静注用1g【注】994ブレオ注射用15mg【注】995ブレオ注射用5mg【注】996フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】997プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【内】998プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【内】999ブレディニンOD錠50【内】1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】			
989フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」【内】990ブルフェン錠100【内】991フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】992フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】993フルマリン静注用1g【注】994ブレオ注射用15mg【注】995ブレオ注射用5mg【注】996フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】997プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【内】998プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【内】999ブレディニンOD錠50【内】1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】			
990ブルフェン錠100【内】991フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」【注】992フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】993フルマリン静注用1g【注】994ブレオ注射用15mg【注】995ブレオ注射用5mg【注】996フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】997プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【内】998プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【内】999ブレディニンOD錠50【内】1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】			
991フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」(注)992フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】993フルマリン静注用1g【注】994ブレオ注射用15mg【注】995ブレオ注射用5mg【注】996フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】997プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【内】998プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【内】999ブレディニンOD錠50【内】1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】			【八】
992フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)【注】993フルマリン静注用1g【注】994ブレオ注射用15mg【注】995ブレオ注射用5mg【注】996フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】997プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【内】998プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【内】999ブレディニンOD錠50【内】1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】			
993フルマリン静注用1g【注】994ブレオ注射用15mg【注】995ブレオ注射用5mg【注】996フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】997プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【内】998プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【内】999ブレディニンOD錠50【内】1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】			
994ブレオ注射用15mg【注】995ブレオ注射用5mg【注】996フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】997プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【内】998プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【内】999ブレディニンOD錠50【内】1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】			【注】
995ブレオ注射用5mg【注】996フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】997プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【内】998プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【内】999ブレディニンOD錠50【内】1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】			
996フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【内】997プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【内】998プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【内】999ブレディニンOD錠50【内】1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】			
997 プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 【内】 998 プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 【内】 999 ブレディニンOD錠5O 【内】 1000 プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 【内】 1001 プレドニン錠5mg 【内】 1002 プレマリン錠0.625mg 【内】			
998プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【内】999ブレディニンOD錠50【内】1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】		プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	
999 ブレディニンOD錠5O 【内】 1000 プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 【内】 1001 プレドニン錠5mg 【内】 1002 プレマリン錠0.625mg 【内】		プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	
1000プレドニゾロン錠1mg(旭化成)【内】1001プレドニン錠5mg【内】1002プレマリン錠0.625mg【内】		ブレディニンOD錠50	
1002 ブレマリン錠0.625mg 【内】		プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	
1002 ブレマリン錠0.625mg 【内】		プレドニン錠5mg	
1003 プロイメンド点滴静注用150mg 【注】		ブレマリン錠0.625mg	【内】
	1003	プロイメンド点滴静注用150mg	【注】

1004	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
1005	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
1006	プログラフカプセル0.5mg	【内】
1007	プログラフカプセル1mg	【内】
1008	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
1009	プログラフ顆粒0. 2mg	【内】
1010	プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】
1011	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1012	プロジフ静注液400(5mL)	【注】
1013	フロジン外用液5%(30mL)	【外】
1014	プロスコープ300注100mL	【注】
1015	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
1016	プロスタンディン点滴静注用500 µg	【注】
1017	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
1018	プロセキソール錠0.5mg	【内】
1019	フロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
1020	フロセミド錠20mg「NP」	【内】
1021	フロセミド錠40mg「NP」	【内】
1022	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1023	プロタノールS錠15mg	【内】
1024	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1025	ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1026	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
1027	プロトピック軟膏0.1%(5g)	【外】
1028	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1029	プロナーゼMS(10g)	【内】
1030	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg 「オーハラ」	【内】
1031	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1032	プロポフォール静注1%20mL「日医工」	【注】
1033	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1034	ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1035	ブロムフェナクNa点眼液O. 1%「ニットー」	【外】
1036	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1037	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1038	ブロメライン軟膏 * (ジェイドルフ)(20g)	【外】
1039	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1040	フロリード膣坐剤100mg	【外】
1041	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1042	ベオーバ錠50mg	【内】
1043	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1044	ペガシス皮下注180 μ g(1mL)	【注】
1045	ペガシス皮下注90 μ g(1mL)	【注】
1046	ヘキザックAL1%綿棒12	【外】
1047	ヘキザック水溶液1%消毒布 20×30	【外】
1048	ベギンクリーム10% (20g)	【外】
1049	ペグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用	【注】
1050	ペグイントロン皮下注用50 μ g/0.5mL用	【注】
1051	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1052	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1053	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1054	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1055	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1056	ベセルナクリーム5%	【外】
1057	ベタニス錠25mg	【内】
1058	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1059	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1060	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
1061	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1062	ペチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
-		R 4

1063	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1064	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1065	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	【注】
1066	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】
1067	ヘパリンNa注5千単位/5mL 「モチダ」	【注】
1068	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1069	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1070	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1071	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1072	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1073	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)	【外】
1074	ベピオゲル 2.5% (15g)	【外】
1075	ヘブスブリンIH静注1000単位	【注】
1076	ヘプタバックスー Ⅱ 水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1077	ベプリコール錠50mg	【内】
1078	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1079	へモポリゾン軟膏 (2g)	【外】
1080	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
1081	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1082	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1083	ベリキューボ錠10mg	【内】
1084	ベリキューボ錠2.5mg	【内】
1085	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1086	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1087	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1088	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1089	ペルサンチン-Lカプセル 150mg	【内】
1090	ペルサンチン錠25mg	【内】
1091	ペルジピンLAカプセル40mg	【内】
1092	ペルジピン注射液2mg2mL	【注】
1093	ベルソムラ錠 15mg	【内】
1094	ベルソムラ錠 20mg	【内】
1095	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1096	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1097	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1098	ペンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1099	ペンタサ顆粒94% (1000mg/包)	【内】
1100	ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)	【内】
1101	ボアラ軟膏0.12% (5g)	【外】
1102	ボースデル内用液10(液:10mg250mL)	【内】
1103	ホーリンV膣用錠1mg	【外】
1104	ボグリボースOD錠O. 3mg「トーワ」	【内】
1105	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
1106	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】
1107	ホスミシン錠500mg	【内】
1108	ボスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1109	ボスミン注1mg(1mL)	【注】
1110	ホスリボン配合顆粒	【内】
1111	ボトックス注用50単位	【注】
1112	ボナロン経ロゼリー35mg	【内】
1113	ボナロン点滴静注バッグ900μg	【注】
1114	ポビドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)	【外】 【外】
1115	ポビドンヨード外用液10%「VTRS」(250mL)	【外】
1116	ポビドンヨードゲル10%「VTRS」(90g)	【外】
1117	ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1118	ボラザG軟膏	【外】
1119	ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」	【内】
1120	ポララミン注 5mg	【注】
1121	ポララミン錠2mg	【内】
	·- •	12: 72

ボリバカクリレール1963注配L (注) ボリバン角液696 (注) ボルベン角液696 (注) ボルベン角液696 (注) ボルベン角液696 (注) ボルベン角液696 (注) マーカイン注音解用0.5%高比重 4mL (注) マーカイン注音解用0.5%高比重 4mL (注) マイケイジ注用10mg (注) (注) マイケイジ注用10mg (注) (江) (证) (证)	1122	ボリコナゾール錠50mg「トーワ」	【内】
ボルベン輪液ら96	1123		
ボルマリン			
ボンタールシロップ3 2596(32 5mg/mL)			
1128			
129 マーカイン注音版用の59% 学比量 4mL			
1313 マイトマイシン注用10mg 注注 1313 マイナフィシン注用2mg 注注 1313 マキサカルシトール静注透析用5.5μg「トーワ」 注注 1313 マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」 注注 1314 マキュイイ硝子体内注用40mg (注注 1315 マグコロールP(50g) (内力 1317 マグネスコープ静注38%シリンジ11mL 注注 マグネスコープ静注38%シリンジ20mL 注注 1318 マグネスコープ静注38%シリンジ20mL 注注 1319 マグネスコープ静注38%シリンジ20mL 注注 1319 マグェンル液(0.5w/v%)(500mL) (内力 マグミント錠500mg (内力 1414 マネンド・エタール液(0.5w/v%)(500mL) (内力 1415 マブリン散1%610mg (内力 1414 マオンド・エタール液(0.5w/v%)(500mL) (内力 1415 マンジロ皮下注2.5mgアテオス 注注 マンジロ皮下注3.5mgアテオス 注注 マンフトールS注射液「アDJ300mL 注注 ジリステン錠20 (内力 1515 ジリルールOD錠50mg「中7」 (内力 1516 シャベリック1.3kgig透析液2000mL 注注 ジリステン錠20 (内力 1516 シャベリック1.250mg (透析液1500mL 注注 シャベリック1.250mg (透析液1500mL 注注 シャベリック1.250mg (透析液2000mL 注注 シャベリック1.250mg (透析液2000mL 注注 シャベリック1.250mg (内力 1518 シャベリック1.250mg (内力 1518 シャベリック1.250mg (加力 1518 シャベリック1.250mg (加力 1518 シャベリック1.250mg (加力 1518 シャイクリン塩酸塩素析液2000mL 注注 シャイクリン塩酸塩素が100mg「中フ」 (内力 1516 シャベリック1.250mg (加力 1517 シャイクリン塩酸塩素が100mg「中フ」 (内力 1518 シャイクリン塩酸塩素が100mg「中区」 (内力 1518 シャイクリン塩酸塩素が100mg「中区」 (内力 1518 シャイクリン塩酸塩素が100mg「中区」 (内力 1518 1518 シャイクリン塩を塩が100mg「中区」 (内力 1518			
131			
133		マイトマイシン注用10mg	
133			
1313			[注]
1135 マグコロールP(50g)		マキリカルントール評注透析用5μg「トーリ」	【注】
1136 マグネスコーブ静注3896シリンジ20mL (注) 1138 マグネスコーブ静注3896シリンジ20mL (注) 1139 マグネスコーブ静注3896シリンジ20mL (注) マグミット錠500mg (内) マグミット錠500mg (内) マグミット錠500mg (内) マグミット錠500mg (内) (内) マブニットで元合錠 (内) (内) マブロチリン塩酸塩錠10mg[アメル」 (内) マブロチリン塩酸塩錠10mg[アメル」 (内) マブロチリン塩酸塩錠10mg[アメル」 (内) マブロチリン塩酸塩錠10mg[アメル」 (内) マブニットルS注射液[YD]300mL (注) (注) (オールスプレー 0.3mg(0.65967.2g1缶) (力)			
133			
138 マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL			
1139 マグミット錠300mg			
1140 マグミット総500mg			【内】
1441 マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)			
1142 マドパー配合錠			
1144 マブリン散1%(10mg/g)			
1144 マブロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」			
1146 マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (注) 1146 マンジャロ皮下注5mgアテオス (注) 1147 マンニットールS注射液「YD J300mL (注) 1148 ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) (外) 1150 ミブファンギNa点滴静注用50mg (注) 1150 ミヴリアンギNa点滴静注用50mg (注) 1151 ミヴリトールOD錠50mg「サワイ」 (内) 1152 ミケルナ配合点眼液 (外) 1153 ミデヴリトールOD錠50mg「サワイ」 (内) 1154 ミッドベリックL135腹膜透析液1500mL (注) ミッドベリックL135腹膜透析液2000mL (注) ミッドベリックL135腹膜透析液1000mL (注) ミッドベリックL135腹膜透析液1000mL (注) ミッドベリックL135腹膜透析液1000mL (注) ミッドベリックL250腹膜透析液1500mL (注) ミッドベリックL250腹膜透析液5000mL (注) ミッドベリックL250腹膜透析液5000mL (注) ミッドベリックL250腹膜透析液000mL (注) ミッドベリックL250腹膜透析液000mL (注) ミッドベリックL250腹膜透析液1000mL (注) ミッドベリックL250腹膜透析液1000mL (注) ミッドベリックL250腹膜透析液1000mL (注) (内) ミ・オン がのしが にが			
1146			
1147 マンニットールS注射液「YD」300mL (注) 1148 オオールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶) (外) 1150 2ヴリステン錠20 (内) (内) 1151 2ヴリステン錠20 (内) (内) 1152 2ケルナ配合点眼液 (外) 1153 3デヴリニドCa・OD錠10mg「三和」 (内) 1155 ミッドペリッウL135腹膜透析液1500mL (注) 1155 ミッドペリッウL135腹膜透析液1000mL (注) 1157 ミッドペリッウL250腹膜透析液1000mL (注) 1158 ミッドペリッウL250腹膜透析液2000mL (注) 1159 ミッドペリッウL250腹膜透析液2000mL (注) 1159 ミア・ア・リッウL250腹膜透析液2000mL (注) 1159 ミア・ア・リッウL250腹膜透析液2000mL (注) 1159 ミア・ア・リッウL250腹膜透析液2000mL (注) 1159 ミア・ア・リッウL250腹膜透析液2000mL (注) 1160 ミス・ア・フ・リッ・レ・エ・ア・ア・リッ・レ・エ・ア・ア・リッ・レ・エ・ア・ア・リッ・レ・エ・ア・ア・リッ・レ・エ・ア・ア・リッ・レ・エ・ア・ア・リッ・レ・エ・ア・ア・リッ・レ・エ・ア・ア・リッ・レ・エ・ア・ア・リッ・レ・エ・ア・ア・リッ・レ・エ・ア・ア・リッ・レ・エ・ア・ア・リッ・レ・ス・ア・ア・リッ・レ・ス・ア・ア・リッ・レ・ス・ア・ア・リッ・レ・ス・ア・ア・リッ・レ・ス・ア・ア・リッ・レ・ス・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア			
1148 ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)			
1149 ミカファンギNa点滴静注用50mg 【注】	1148		
151 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	1149	ミカファンギNa点滴静注用50mg	
152 ミケルナ配合点眼液	1150	ミグリステン錠20	
153 ミチヴリニドCa・OD錠10mg「三和」	1151		
1154 ミッドペリックL135腹膜透析液1500mL (注) 1155 ミッドペリックL135腹膜透析液2000mL (注) 1156 ミッドペリックL135腹膜透析液1000mL (注) 1157 ミッドペリックL250腹膜透析液1500mL (注) 1158 ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL (注) 1158 ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL (注) 1159 ミドリンM点眼液0.4% (5mL) (外) (外) 1160 ミニブレス錠0.5mg (内) (内) ミニブレス錠0.5mg (内) (内) (上) (内) (上) (上) (上) (上) (上) (上) (上) (上) (L) (L)	1152		
1155 ミッドペリックL135腹膜透析液2000mL			
1156 ミッドペリックL135腹膜透析液1000mL [注] 1157 ミッドペリックL250腹膜透析液1500mL [注] 1158 ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL [注] 1159 ミドリンM点眼液0.4% (5mL) [外] 1160 ミニブレス錠0.5mg [内] 1161 ミネブロOD錠2.5mg [内] 1162 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 [注] 1163 ミノサイクリン塩酸塩塩が100mg「トーワ」 [内] 1164 ミノドロン酸錠50mg「日医工」 [内] 1165 ミヤBM細粒 [内] 1166 ミヤBM錠 [内] 1167 ミラペックスLA錠 0.375mg [内] 1168 ミラペックスLA錠 0.375mg [内] 1169 ミラペックスLA錠 0.375mg [内] 1170 ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL) [注] 1171 ミルセラ注シリンジ200μg(0.3mL) [注] 1172 ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL) [注] 1173 ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL) [注] 1174 ミルセラ注シリンジ50μg (0.3mL) [注] 1175 ミルセラ注シリンジ25μg [注] 1176 ミルセラ注シリンジ25μg [注] 1177 ミルセラ注シリンジ25μg [注] 1177 ミルセラ注シリンジ25μg [注] 1177 ミルクラピラシリンジ25μg [注] 1177 ミルクフリア内用散布液0.8% [内] 1178 ミンクリア内用散布液0.8% [内] 1179 ムコスタ点眼液UD2% [内] 1179 ムコスタ点眼液UD2% [内] 1179			【注】
1157 ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL [注] 1158 ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL [注] 1159 ミドリンM点眼液0.4%(5mL) [外] 1160 ミニプレス錠0.5mg [内] 1161 ミネブロOD錠2.5mg [内] 1162 ミノサイクリン塩酸塩点高静注用100mg「日医工」 [内] 1163 ミノドロン酸蛇塩錠100mg「トーワ」 [内] 1164 ミノドロン酸蛇500mg「日医工」 [内] 1165 ミヤBM細粒 [内] 1167 ミラクリッド注射液10万単位(2mL) [注] 1168 ミラペックスLA錠 0.375mg [内] 1169 ミラペックスLA錠 1.5mg [内] 1170 ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL) [注] 1171 ミルセラ注シリンジ200μg(0.3mL) [注] 1172 ミルセラ注シリンジ250μg [注] 1173 ミルセラ注シリンジ25μg [注] 1174 ミルセラ注シリンジ25μg [注] 1175 ミルタザビン錠15mg「明治」 [内] 1177 ミルサラ注シリン注22.5mgパッグ「外身」(150mL) [内] 1178 ミンクリア内用散布液0.8% [外] 1179 ムコスタ点眼液UD2% [外]			
1158 ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL [注] 1159 ミドリンM点眼液0.4%(5mL) [外] 1160 ミニプレス錠0.5mg [内] 1161 ミネブロOD錠2.5mg [内] 1162 ミノサイクリン塩酸塩点高静注用100mg「日医工」 [注] 1163 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 [内] 1164 ミノドロン酸蛇50mg「日医工」 [内] 1165 ミヤBM細粒 [内] 1166 ミヤBM錠 [内] 1167 ミラクリッド注射液10万単位(2mL) [注] 1168 ミラペックスLA錠 0.375mg [内] 1169 ミラペックスLA錠 1.5mg [内] 1170 ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL) [注] 1171 ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL) [注] 1172 ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL) [注] 1173 ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL) [注] 1174 ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL) [注] 1175 ミルセラ注シリンジ55μg [注] 1176 ミルセラ注シリンジ25μg [注] 1177 ミルセラ注シリンジ25μg [注] 1178 ミルクリア内用散布液0.8% [外] エコスタ点眼液UD2% [外] 1179 エコスタ点眼液UD2% [外]			
1159 ミドリンM点眼液0.4%(5mL)			
1160 ミニプレス錠0.5mg			
1161			
1162 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 [注] 1163 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 [内] 1164 ミノドロン酸錠50mg「日医工」 [内] 1165 ミヤBM細粒 [内] 1166 ミヤBM錠 [内] 1167 ミラクリッド注射液10万単位(2mL) [注] 1168 ミラペックスLA錠 0.375mg [内] 1169 ミラペックスLA錠 1.5mg [内] 1170 ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL) [注] 1171 ミルセラ注シリンジ200μg(0.3mL) [注] 1172 ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL) [注] 1173 ミルセラ注シリンジ50μg (0.3mL) [注] 1174 ミルセラ注シリンジ250μg [注] 1175 ミルタザピン錠15mg「明治」 [内] 1176 ミルトン 1L [内] 1177 ミルリノン注22.5mgハック「分かタ」(150mL) [内] 1178 ミンクリア内用散布液0.8% [外] ムコスタ点眼液UD2% [外]		ミニフレス錠0.5mg	
1163 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」			[四]
1164 ミノドロン酸錠50mg「日医工」		ミノサイクリン塩酸塩品凋醇注用TUUMg! ロ医工」	
1165 ミヤBM細粒 【内】			
1166 ミヤBM錠 「内]			
1167 ミラクリッド注射液10万単位(2mL) 1168 ミラペックスLA錠 0.375mg			
1168 ミラペックスLA錠 0.375mg			【四】
1169 ミラペックスLA錠 1.5mg 【内】			
1170ミルセラ注シリンジ100 μ g (0.3mL)【注】1171ミルセラ注シリンジ200 μ g (0.3mL)【注】1172ミルセラ注シリンジ50 μ g (0.3mL)【注】1173ミルセラ注シリンジ250 μ g【注】1174ミルセラ注シリンジ25 μ g【注】1175ミルタザピン錠15mg「明治」【内】1176ミルトン 1L【内】1177ミルリノン注22.5mgハック「タカタ」(150mL)【内】1178ミンクリア内用散布液0.8%【外】1179ムコスタ点眼液UD2%【外】			
1171ミルセラ注シリンジ200 μ g (0.3mL)【注】1172ミルセラ注シリンジ50 μ g (0.3mL)【注】1173ミルセラ注シリンジ250 μ g【注】1174ミルセラ注シリンジ25 μ g【注】1175ミルタザピン錠15mg「明治」【内】1176ミルトン 1L【内】1177ミルリノン注22.5mgパック「タカタ」(150mL)【内】1178ミンクリア内用散布液0.8%【外】1179ムコスタ点眼液UD2%【外】			
1172ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL)【注】1173ミルセラ注シリンジ250μg【注】1174ミルセラ注シリンジ25μg【注】1175ミルタザピン錠15mg「明治」【内】1176ミルトン 1L【内】1177ミルリノン注22.5mgハック「タカタ」(150mL)【内】1178ミンクリア内用散布液0.8%【外】1179ムコスタ点眼液UD2%【外】			【注】
1173ミルセラ注シリンジ250μg【注】1174ミルセラ注シリンジ25μg【注】1175ミルタザピン錠15mg「明治」【内】1176ミルトン 1L【内】1177ミルリノン注22.5mgバック「タカタ」(150mL)【内】1178ミンクリア内用散布液0.8%【外】1179ムコスタ点眼液UD2%【外】			【注】
1174ミルセラ注シリンジ25μg【注】1175ミルタザピン錠15mg「明治」【内】1176ミルトン 1L【内】1177ミルリノン注22.5mgバック「タカタ」(150mL)【内】1178ミンクリア内用散布液0.8%【外】1179ムコスタ点眼液UD2%【外】			【注】
1175ミルタザピン錠15mg「明治」【内】1176ミルトン 1L【内】1177ミルリノン注22.5mgハック「タカタ」(150mL)【内】1178ミンクリア内用散布液0.8%【外】1179ムコスタ点眼液UD2%【外】			【注】
1176ミルトン 1L【内】1177ミルリノン注22.5mgバック「タカタ」(150mL)【内】1178ミンクリア内用散布液0.8%【外】1179ムコスタ点眼液UD2%【外】			【内】
1177ミルリノン注22.5mgバック「タカタ」(150mL)【内】1178ミンクリア内用散布液0.8%【外】1179ムコスタ点眼液UD2%【外】		ミルトン 1L	【内】
1178ミンクリア内用散布液0.8%【外】1179ムコスタ点眼液UD2%【外】		ミルリノン注22.5mgバック「タカタ」(150mL)	【内】
1179ムコスタ点眼液UD2%【外】1180無水エタノール*丸石 (液:500mL)【外】		ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1180 無水エタノール * 丸石 (液:500mL) 【外】			【外】
	1180	無水エタノール * 丸石 (液:500mL)	【外】

1181	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】
1182	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1183	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
1184	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」	【内】
1185	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1186	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1187	メジコン錠15mg	【内】
1188	メスチノン錠60mg	【内】
1189	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1190	メタライト250カプセル	【内】
1191	メチコバール錠500 µ g	【内】
1192	メチコバール注射液500 μ g(1mL)	【注】
1193	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」	【内】
1194	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1195	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】
1196	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1197	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
1198	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1199	メトリジンD錠2mg	【内】
1200	メナテトレノンカプセル15mg「日医工」	【内】
1201	メノエイドコンビパッチ	【外】
1202	メプチンエアー10 μ g吸入100回	【外】
1203	メプチン錠50 μ g	【内】
1204	メマンチンOD錠 20mg「DSEP」	【内】
1205	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」	【内】
1206	メルカゾール錠5mg	【内】
1207	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」	【注】
1208	モイゼルト軟膏「1%	【外】
1209	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	【外】
1210	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1211	モビコール配合内用剤HD	【内】
1212	モビプレップ配合内用剤	【内】
1213	モメタゾン点鼻液50 μg「杏林」112噴霧用	【外】
1214	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1215	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1216	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1217	薬用炭.OY(原末)	【内】
1218	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1219	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】
1220	ユービット錠100mg	【内】
1221	ユナシン錠375mg	【内】
1222	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1223	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1224	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】
1225	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1226	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	【内】
1227	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1228	ラステットSカプセル25mg	【内】
1229	ラスビック錠75mg	【内】
1230	ラスビック点滴静注キット150mg	【注】
1231	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1232	ラニチジン錠150mg「トーワ」	【内】
1233	ラニラピッド錠0.05mg	【内】
1234	ラベプラゾールNa錠 5mg「明治」	【内】
1235	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	【内】
1236	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1237	ラミクタール錠100mg	【内】
1238	ラミクタール錠25mg	[内]
1239	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	【内】
	The state of the s	K1 J2

ランソプラゾールOD錠 30mg 「サワイ」	【内】
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
ランタスXR注ソロスター	【注】
リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
リオナ錠 250mg	【内】
リオレサール錠5mg	【内】
リクシアナOD錠15mg	【内】
リクシアナOD錠30mg	【内】
リクシアナOD錠60mg	【内】
リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
リシノプリル錠10mg「トーワ」	【内】
リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	【内】
リスミー錠2mg	【内】
リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】
リゾビスト注(44.6mg1.6mL)	【注】
リツキサン点滴静注100mg	【注】
リツキサン点滴静注500mg	【注】
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」(5mL)	<u> </u>
リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(10mL)	【注】
リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(5mL)	【注】
リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL)	【注】
フトガイン温設温圧引促 とが・V TKO」(TOME) Jドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
プトガーン 無 満 再 ア 上 放 「 タロ・タ カ タ 」 200mL リドメックスコー ワロー ション 0.3% (10g)	
プトスックスコーツロー ション0.3%(TOg) Jパクレオンカプセル150mg	
	【内】
パクレオン顆粒300mg分包	【内】
リバゼブ配合錠HD	【内】
リピオドール480注10mL	【注】
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
リフラップシート5%(1シート=25cm2×6枚)	【外】
Jフラップ軟膏5%(30g)	【外】
リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
リボトリール錠0.5mg	【内】
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	<u>【内】</u>
硫酸Mg補正液 1mEq╱mL(注射:20mL)	【注】
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
リュープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	【注】
リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	【注】
リルゾール錠50mg「ニプロ」	【内】
リンゼス錠0.25mg	【内】
リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
リンデロン坐剤0.5mg	【外】
リンデロン坐剤1.0mg	【外】
リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
リン酸Na補正液0. 5mmol/mL	【注】
ルセフィ錠5mg	【内】
ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
ルテスデポー注(1mL)	<u>【注】</u>
ルパフィン錠10mg	【内】
ルボックス錠25	[内]
	【注】
ルムジェフ注ミリオペン	
ルムジェブ注ミリオペン ルリコンクリー / 19610g	
ルムジェフ注ミリオペン ルリコンクリーム1%10g レキソタン錠5	【外】 【内】

1299	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL	【注】
1300	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1301	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1302	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1303	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1304	レクサプロ錠10mg	【内】
1305	レザルタス配合錠HD	【内】
1306	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
1307	レスタミンコーワ錠 10mg レトロゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
1308 1309	レドログール錠2. 5mg「サクト」 レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	【内】 【内】
1310	レバラグニド薬C.5mg「ケット」 レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】
1311	レビトラ錠5mg	【内】
1312	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	【内】
1313	レベチラセタムDS50%「トーワ」	【内】
1314	レペタン坐剤0.4mg	【外】
1315	レペタン注0.2mg(1mL)	【注】
1316	レベトールカプセル200mg	【内】
1317	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」	【内】
1318	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1319	レボビスト注射用 2.5g	【注】
1320 1321	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」 レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	【内】 【外】
1321	レボフロキサシン点 適静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
1323	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1324	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
1325	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1326	レラキシン注用200mg(溶解液付 10mL)	【注】
1327	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1328	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1329	レルミナ錠40mg	【内】
1330	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1331	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】
1332 1333	ロイスタチン注8mg(8mL) ロイナーゼ注用5000	【注】 【注】
1334	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1335	ロキソプロフェンNaデープ100mg「三笠」	【外】
1336	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	【注】
1337	ロケルマ懸濁用散分包5g	【内】
1338	ロコアテープ (7枚/袋)	【外】
1339	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1340	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1341	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1342	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1343	ロスーゼット配合錠HD	【内】
1344 1345	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1346	ロピオン静注50mg	【内】 【注】
1347	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1348	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内】
1349	ロルカム錠4mg	【内】
1350	ロレアス配合錠「SANIK」	【内】
1351	ワーファリン錠1mg	【内】
1352	ワーファリン錠5mg	【内】
1353	ワイスタール静注用1g	【注】
1354	ワイスタール配合点滴静注用1gバック	【注】
1355	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1356 1357	ワンショットプラスヘキシジン0.2 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg(1mL)	【外】 【注】
1007	エノエーノン・ノ ハナコ/エオ) /区十0川宮(川川上/	【/工】

一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 1 4 m (26 m km k	1358	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
接伏フェノール * (健栄)		一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 µg(溶解液付)	【注】
場合 1982			
塩酸メトウロブミド注射液 10mg 「タカタ」			
1936日 競操表し氏術書集「KMB」(6000単位)			
原・耳科用リプロンA軟管 (5g)			
5366			
強力ネオミノアーゲンシー 静注シリンダ40mL		希ヨードチンキ「ニッコー」	
議由ヴェノグロブリンIH1O%静注5g/50mL	1367	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
試加		献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	
消毒用エタノール「ケンエー」(減密ボトル 500mL)			
調酸イソリルビドテーブ 40mg「EMEC」			
1373 調酸イソルビド徐放力でル20mg「St」			
374 前酸銀「ホイ」(未) (か) (か) (が) (
1376 新レシカルボン坐剤 (外)			
377			
1378 水溶性プレドニン10mg(注射用)			
379			【外】
1380 生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリッブ・中口タイプ) [注] 生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ) [注] 生食溶解液キットH 50mL(注射用) [注] 生食溶解液キットH 50mL(注射用) [注] 生理食塩液PL「アソー」20mL(注射用) [注] 大塚塩力ル注2%20mL(7.2mEq) [注] 大塚塩加ル注2%20mL(7.2mEq) [注] 大塚塩和ル注2%20mL(7.2mEq) [注] 大塚素留水(注射: 100mL) [注] 大塚素留水(注射: 500mL) [注] 大塚素留水(注射: 500mL) [注] 大塚生食注 500mL [注] 大塚生食注 500mL [注] 大塚生食注 500mL [注] 大塚生食注 500mL [注] 大塚生食注 100mL [注] 大塚生食注 500mL [注] 大塚生食注2ポート100mL [注] 大塚生食注2ポート100mL [注] 大塚糖液10% 500mL(注射用) [注] 大塚糖液5% 500mL(注射用) [注] 大塚糖液70% 350mL(注射用) [注] 大塚糖液70% 350mL(注射用) [注]			
1381 生食注シリン『ブォーツカ」20mL(ルアーロックタイプ) [注] 1382 生食溶解液キットH 50mL(注射用) 〔注] 生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用) 〔注] 生理食塩液PL「フソー」 2L(注射用) 〔注] 大塚塩加ル注2%20mL (7.2mEq) 〔注] 大塚塩加ル注2%20mL (7.2mEq) 〔注] 大塚塩加ル注2%20mL (7.2mEq) 〔注] 大塚蒸留水(注射:100mL) 〔注] 大塚素留水(注射:100mL) 〔注] 大塚生食注 100mL 〔注] 大塚生食注 100mL 〔注] 大塚生食注 500mL 〔注] 大塚生食注 500mL 〔注] 大塚生食注 500mL 〔注] 大塚生食注 100mL 〔注] 大塚生食注 100mL 〔注] 大塚生食注 10mL 〔注] 大塚生食注 100mL 〔注] 大塚生食注2ポート100mL 〔注] 大塚糖液5% 20mL(注射用) 〔注] 大塚糖液5% 20mL(注射用) 〔注] 大塚糖液5% 20mL(注射用) 〔注] 大塚糖液5% 20mL(注射用) 〔注] 大塚糖液5% 50mL(注射用) 〔注] (内] 並射用ブドキサン100mg 〔注] 注射用ブドキサン500mg 〔注] 注射用ブドキサン500mg 〔注] 注射用ブル・メルコート1000 〔注] 注射用ブル・メルコート125 〔注] 注射用ブル・デン21mg 〔注] 注射用フィルデシ21mg 〔注] 注射用フィルデシ21mg 〔注] 注射用フィルデシ21mg 〔注] 注射用フィルデシ21mg 〔注] 注射用フィルデシ21mg 〔注] 注射用フィルデシ21mg 〔注] 注射用ブサン50 〔注] 注射用ブイルデシ21mg 〔注] 注针用ブイルデシ21mg 〔注] 注针用ブイルデシ21mg 〔注] 注针用ブイルデシ21mg 〔注] 注针用ブイルデシ21mg 〔注] 注针用ブイルデン21mg 〔注] 注针列工21mm 〔注] 注针用工21mm 〔注] 注册工21mm 〔注] 注册工21mm			
1382 生食溶解液キットH 50mL(注射用)			
1383 生理食塩液PL「フソー」20L(注射用)			
1384 生理食塩液PL「フソー」2L(注射用)			「注】
1385 大塚塩加ル注2%20mL(7.2mEq) (注] 1386 大塚蒸留水(注射:100mL) (注] 1387 大塚素留水(注射:500mL) (注] 1388 大塚食塩注10%20mL(34mEq) (注] 1389 大塚生食注 100mL (注] 1390 大塚生食注 500mL (注] 1390 大塚生食注 500mL (注] 1391 大塚生食注2ポート100mL (注] 1393 大塚糖液10% 500mL(注射用) (注] 1393 大塚糖液20% 20mL(注射用) (注] 1394 大塚糖液20% 20mL(注射用) (注] 1395 大塚糖液5% 100mL(注射用) (注] 1396 大塚糖液5% 20mL(注射用) (注] 1397 大塚糖液5% 20mL(注射用) (注] 1398 大塚糖液5% 500mL(注射用) (注] 1399 大塚糖液5% 500mL(注射用) (注] 1399 大塚糖液5% 200mL(注射用) (注] 1399 大塚糖液5% 200mL(注射用) (注] 1401 炭酸ランタンのD錠250mg「フソー」 (内] 1402 炭酸リチウム錠20「ヨシトミ」 (内] 1403 注射用イホマイド1g (注] 1404 注射用エンドキサン100mg (注] 1405 注射用エンドキサン500mg (注] 1406 注射用エンドキサン500mg (注] 1407 注射用エンドキサン500mg (注] 1408 注射用サル・メルコート1000 (注] 1409 注射用サル・メルコート1000 (注] 1410 注射用フル・メルコート500 (注] 1411 注射用フィルデシン1mg (注] 1412 注射用フィルデシン1mg (注] 1412 注射用フィルデシン3mg (注] 1413 注射用フィルデシン3mg (注] 1414 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (注] 1415 注射用ペートトラOmg (注] 1415 注射用ペートトラOmg (注] 1416 注射用ペートトラOmg (注] 1417 注射イートー・トラOmg (注] 1417 注射イー・トー・トラOmg (注] 1417 1			
1387 大塚燕留水(注射:500mL) (注] 1388 大塚生食注 100mL (注] 1390 大塚生食注 500mL (注] 1390 大塚生食注 500mL (注] 1391 大塚生食注 500mL (注] 1392 大塚地液10% 500mL(注射用) (注] 1393 大塚糖液20% 20mL(注射用) (注] 1394 大塚糖液5% 100mL(注射用) (注] 1395 大塚糖液5% 250mL(注射用) (注] 1396 大塚糖液5% 250mL(注射用) (注] 1397 大塚糖液5% 250mL(注射用) (注] 1398 大塚糖液5% 250mL(注射用) (注] 1399 大塚糖液5% 500mL(注射用) (注] 1399 大塚糖液5% 500mL(注射用) (注] 1399 大塚糖液5% 500mL(注射用) (注] 1399 大塚糖液5% 500mL(注射用) (注] 1399 大塚糖液70% 350mL(注射用) (注] 1400 単シロップ*(丸石) (内] (内]			【注】
1388 大塚食塩注10%20mL(34mEq) (注] 1389 大塚生食注 100mL (注] 1390 大塚生食注 500mL (注] 1391 大塚生食注2ポート100mL (注] 1391 大塚推液10% 500mL(注射用) (注] 1393 大塚糖液20% 20mL(注射用) (注] 1394 大塚糖液5% 100mL(注射用) (注] 1395 大塚糖液5% 20mL(注射用) (注] 1396 大塚糖液5% 20mL(注射用) (注] 1397 大塚糖液5% 20mL(注射用) (注] 1398 大塚糖液5% 20mL(注射用) (注] 1398 大塚糖液5% 500mL(注射用) (注] 1398 大塚糖液5% 500mL(注射用) (注] 1399 大塚糖液5% 500mL(注射用) (注] 1400 単シロップ*(丸石) (内] (内] (世) (力) (力)			
1389 大塚生食注 100mL			
1390 大塚生食注 500mL [注] 1391 大塚生食注2ポート100mL [注] 1392 大塚糖液10% 500mL(注射用) [注] 1393 大塚糖液20% 20mL(注射用) [注] 1394 大塚糖液5% 100mL(注射用) [注] 1395 大塚糖液5% 20mL(注射用) [注] 1396 大塚糖液5% 250mL(注射用) [注] 1396 大塚糖液5% 250mL(注射用) [注] 1397 大塚糖液5% 500mL(注射用) [注] 1398 大塚糖液5% 500mL(注射用) [注] 1399 大塚糖液5% 500mL(注射用) [注] 1399 大塚糖液50% 200mL(注射用) [注] 1400 単シロップ*(丸石) [内]			【注】
大塚生食注2ポート100mL			
大塚糖液10% 500mL(注射用)			
大塚糖液20% 20mL(注射用)			
大塚糖液5% 100mL(注射用)			
1396 大塚糖液5% 250mL(注射用) 【注】 1397 大塚糖液5% 500mL(注射用) 【注】 1398 大塚糖液50% 200mL(注射用) 【注】 1399 大塚糖液70% 350mL(注射用) 【注】 1400 単シロップ*(丸石) 【内】 【内】 【技】 【内】 【内】 【技】 【内】 【方】 【方】	1394	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1397大塚糖液50% 500mL(注射用)【注】1398大塚糖液50% 200mL(注射用)【注】1399大塚糖液70% 350mL(注射用)【注】1400単シロップ*(丸石)【内】1401炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」【内】1402炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」【注】1403注射用エンドキサン100mg【注】1404注射用エンドキサン500mg【注】1405注射用サイメリン50mg【注】1406注射用サイメリン50mg【注】1407注射用リル・メルコート1000【注】1408注射用リル・メルコート40【注】1410注射用フィルデシン1mg【注】1411注射用フィルデシン3mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用フサン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			【注】
1398大塚糖液50% 200mL(注射用)[注]1399大塚糖液70% 350mL(注射用)[注]1400単シロップ*(丸石)[内]1401炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」[内]1402炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」[内]1403注射用エンドキサン100mg[注]1404注射用エンドキサン500mg[注]1405注射用エンドキサン500mg[注]1406注射用ソル・メルコート1000[注]1407注射用ソル・メルコート125[注]1408注射用ソル・メルコート40[注]1410注射用フィルデシン1mg[注]1411注射用フィルデシン3mg[注]1412注射用フィルデシン3mg[注]1413注射用アナン50[注]1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位[注]1415注射用メソトレキセート50mg[注]			【注】
1399大塚糖液70% 350mL(注射用)【注】1400単シロップ*(丸石)【内】1401炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」【内】1402炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」【注】1403注射用イホマイド1g【注】1404注射用エンドキサン100mg【注】1405注射用エンドキサン500mg【注】1406注射用サイメリン50mg【注】1407注射用ソル・メルコート1000【注】1408注射用ソル・メルコート125【注】1409注射用ソル・メルコート40【注】1410注射用フィルデシン1mg【注】1411注射用フィルデシン3mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			【注】
1400単シロップ*(丸石)【内】1401炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」【内】1402炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」【内】1403注射用イホマイド1g【注】1404注射用エンドキサン100mg【注】1405注射用エンドキサン500mg【注】1406注射用サイメリン50mg【注】1407注射用ソル・メルコート1000【注】1408注射用ソル・メルコート125【注】1409注射用ソル・メルコート40【注】1410注射用フィルデシン1mg【注】1411注射用フィルデシン3mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			【注】
1401炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」【内】1402炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」【注】1403注射用イホマイド1g【注】1404注射用エンドキサン100mg【注】1405注射用エンドキサン500mg【注】1406注射用サイメリン50mg【注】1407注射用ソル・メルコート1000【注】1408注射用ソル・メルコート125【注】1409注射用ソル・メルコート40【注】1410注射用フィルデシン1mg【注】1411注射用フィルデシン3mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用フサン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			【注】
1402炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」【内】1403注射用イホマイド1g【注】1404注射用エンドキサン100mg【注】1405注射用エンドキサン500mg【注】1406注射用サイメリン50mg【注】1407注射用ソル・メルコート1000【注】1408注射用ソル・メルコート125【注】1409注射用ソル・メルコート40【注】1410注射用フィルデシン1mg【注】1411注射用フィルデシン3mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用フサン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			
1403注射用イホマイド1g【注】1404注射用エンドキサン100mg【注】1405注射用エンドキサン500mg【注】1406注射用サイメリン50mg【注】1407注射用ソル・メルコート1000【注】1408注射用ソル・メルコート125【注】1409注射用ソル・メルコート40【注】1410注射用フィルデシン1mg【注】1411注射用フィルデシン3mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用フサン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			
1404注射用エンドキサン100mg【注】1405注射用エンドキサン500mg【注】1406注射用サイメリン50mg【注】1407注射用ソル・メルコート1000【注】1408注射用ソル・メルコート125【注】1409注射用ソル・メルコート40【注】1410注射用フィルデシン1mg【注】1411注射用フィルデシン3mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用アナン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			【注】
1405注射用エンドキサン500mg【注】1406注射用サイメリン50mg【注】1407注射用ソル・メルコート1000【注】1408注射用ソル・メルコート125【注】1409注射用ソル・メルコート40【注】1410注射用フィルデシン1mg【注】1411注射用フィルデシン3mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用プサン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】		注射用エンドキサン100mg	【注】
1407注射用ソル・メルコート1000【注】1408注射用ソル・メルコート125【注】1409注射用ソル・メルコート40【注】1410注射用ソル・メルコート500【注】1411注射用フィルデシン1mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用フサン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			【注】
1408注射用ソル・メルコート125【注】1409注射用ソル・メルコート40【注】1410注射用ソル・メルコート500【注】1411注射用フィルデシン1mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用プサン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			【注】
1409注射用ソル・メルコート40【注】1410注射用ソル・メルコート500【注】1411注射用フィルデシン1mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用フサン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			
1410注射用ソル・メルコート500【注】1411注射用フィルデシン1mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用フサン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			【注】
1411注射用フィルデシン1mg【注】1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用プサン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			
1412注射用フィルデシン3mg【注】1413注射用フサン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			
1413注射用フサン50【注】1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			【注】
1414注射用ペニシリンGカリウム100万単位【注】1415注射用メソトレキセート50mg【注】			【注】
1415 注射用メソトレキセート50mg 【注】		注射用ペニシリンGカリウム100万単位	【注】
1416 注射用メソトレキセート5mg 【注】		注射用メソトレキセート50mg	【注】
	1416	注射用メソトレキセート5mg	【注】

4 4 4 7	-m +n -m +2 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4	[+]
1417	調剤用パンビタン末	【内】
1418	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	【注】
1419	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	【注】
1420	低分子デキストランL注 500mL	【注】
1421	占海静注田ホフカビル注24mg/ml	【注】
1422	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 乳酸カルシウム「VTRS」原末	
	孔版 カルンフム・VIRS」原木	【内】
1423	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	【内】
1424	白色ワセリン*(健栄)	【外】
1425	白色ワセリン* (健栄) 複方ヨード・グリセリン(液)	【外】
1426	滅菌精製水*(大成薬品)	【外】
1427	硫酸アトロピン「ホエイ」(末) 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	【内】
1428	硫酸ストレプトマイシン注射用1gl 明治」	【注】
		-

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ