

経皮的末梢血管形成術(肘・手首用) 【3泊4日】を受けられる患者さんへ(入院治療計画書)

| | 1日目 | 2日目 治療前 | 2日目 治療後 | 3日目 | 4日目 |
|----------|---|--|--|--|---|
| 治療 処置 |  | ・検査着に着替えます。 | 身体の状態や穿刺部位の異常が無いかを観察します。 肘窩・手首でとめ太使用 →帰室後指示の圧まで下げます。 除去は検査後6時間程たってからです。 肘窩の場合は医師による圧迫除去となります。 | ・カットバンを外します。 | |
| 検査 | | | ・必要に応じて採血などを行います | ・必要に応じて、心電図、採血、血流検査、 血管エコー等を行います。 | ・治療結果により、 ① 退院 |
| 内服 注射 | ・ステント治療の予定の方は、医師の指示で 抗血小板剤の内服が開始されることがあり ます。  | ・治療前より点滴を行います。 ・医師の指示により前日より開始する場合があります。 | ・治療後は医師の指示で点滴を開始します。 ・痛みの強いときは鎮痛剤を使用できます。 ・鎮痛剤内服後も痛みが続く時には、看護師 にお知らせ下さい。 | ・薬は飲み忘れのないように、しっかり内服 して下さい。 ・治療内容によっては内服薬の調整をします。 ・透析の方はこの日に透析を行います | ② 継続入院の上治療 治療の場合は担当医より説明があります。 |
| 安静 | | | ・車椅子又はストレッチャーにて病室へ戻ります。 ・トイレへは歩いて行けます。 ・病室内で安静にお過ごし下さい ・不明な場合は看護師に声をおかけください。 | ・医師の指示に従ってください。 | |
| 清潔 排泄 | ・医師の許可があれば入浴できます。 | | | シャワー浴のみ可能です。  | |
| 食事 |  | ・起床時より翌朝6時まで尿の回数を表に 記入して下さい。 ・食事は治療時間にかかわらず全量摂取でき ます。 (ただし、治療と食事時間が重なる場合は治 療後に食事となります。) | ・帰室直後より水分摂取は可能です ・翌日までに500mlのペットボトルを3本飲 んで下さい。 (病状により水分制限があります) ・起床時より翌朝6時までの飲水量を記入して下さい | | |
| 説明 | ・医師より、治療についての説明がありま す。ご家族の方は説明が終わるまで待機し て下さい。 ・看護師より治療の流れについて説明があり ます。 | ・治療の進み具合や緊急患者入院の場合は予 定時間を大きく変更する場合がありますの でご了承下さい。ご家族の方は、治療日は 予定を入れず、病院へお越し下さい。 ・ご家族が来院できない場合は、医師又は 看護師へ連絡して下さい。 | ・治療後、医師より説明があります ・説明終了後はご家族の方は帰宅できます が、病状によっては、付き添いをお願いす る場合があります。 ・説明が遅い場合は看護師に声をおかけくだ さい。 | ・看護師による、生活指導と 栄養士による栄養指導があります。 ・心臓リハビリ師による運動指導、 薬剤師による服薬指導があります。 | |
| その他 | ・翌日の治療時間が決まるのは、夕方になり ますので、20時過ぎに看護師がお知らせし ます。ご家族の方に来てもらうよう連絡を 入れてください。 ・来られない方はお知らせ下さい。 | | ・疼痛時などお変わりがございましたら、す ぐに看護師を呼んでください。 | ・退院日が決まった場合、入院費用の目安を 知りたい方は16時までに申し出をして下さ い。わかり次第お知らせします。 | ・退院となった場合、手続き終了後10～11時 頃には退院となります。次回の入院・外 来・検査予約及び紹介状等がある場合は、 この時お渡しします。 |

※ 病名や経過などは入院時に考えられるものであり、状況により予定が変更になる場合があります。

小倉記念病院 循環器内科 2016年9月改訂