

a GRACE-2L-OMAT, MLIP-only PhaseForge TDB (no fitting)
T (K)
x_Zr (mole fraction)
L
(βZr)+L
Cu51Zr14+L
(βZr)
Cu5Zr+L
(βZr)+Cu10Zr7
(βZr)+CuZr2
(βZr)+(αZr)
Cu5Zr+(Cu)
Cu10Zr7+Cu51Zr14
Cu10Zr7+CuZr2
CuZr2+(αZr)
prevalence-weighted recall: field 0.43 [0.30, 0.55], n = 28; boundary 0.40 [0.38, 0.43], n = 287
b per-phase recall
L (235)
Cu10Zr7 (110)
CuZr2 (79)
Cu51Zr14 (77)
Cu8Zr3 (75)
CuZr (B2) (67)
Cu5Zr (61)
(Cu) (33)
Cu2Zr * (29)
(βZr) (25)
Cu24Zr13 * (23)
Cu5Zr8 * (23)
Cu5Zr7 * (18)
(αZr) (9)
GRACE MLIP-only
SGTE (Zeng 1994)
recall (field + boundary points)
(n) reference support; * not in either model's phase list
evidence points (colour: reference phases the model recovers)
field point, phases recovered
field point, partly
field point, none
boundary point (±10 K, ±0.01), recovered
boundary point, partly
boundary point, none