



02/06/2026

שם: מזור אורי
תז: 025446865
טלפון: 0526133529
ת.לידה: 31/08/1973

סיכום טיפול פיזיותרפי

פרטי מטופל:

בן/בת **52.10**,

איבר כואב-ברך

צד כואב-ימין .

הרגלי שינה: בין 7-8 שעות שינה בלילה

פציעות קודמות: קרע לברום בירך ימין לפני שנתיים

מחלות רקע: ללא

תלונה נוכחית: בן 51 רץ חובב - 30-40 קמ בשבוע. סובל כאבים בברכיים בעיקר מימין אך לאחרונה יש כאבים גם משמאל. מתכנן למרתון ופנה להערכת הברכיים. בריצה אין כאבים. טיפול בארקוקסיה עוזר לכאבים.

עד כה ללא הדמיות, ביצע טיפול אחד של פיזיותרפיה.

לפני שנתיים עבר שחזור לברום במפרק ירך ימין- לדבריו מרגיש שהירך עדיין לא יציבה בזמן הריצה

אין כאבים במנוחה
כדורים- הפסיק לקחת כדורים נגד כאבים.

בדיקה פיסיקלית:

הגדרת מטרות הטיפול: לרוץ מרתון בלונדון באפריל (עוד 5 חודשים)

מישוש: רגישות קלה ב proximal patellar tendon ימין

טווחים: ירך- כאב בסוף טווח ext.rot בימין לעומת שמאל

ברך- flx- מלא

ext- מלא

תפקוד: סקוואטים- כאב קל בשתי הברכיים, יותר בימין

לאחר טיפוינג בפטלר טנדון- ללא כאב כלל בברך ימין

SLS- קריסה בולטת בברך ימין לעומת שמאל





טיפול:

מבחנים ספציפיים: 28.4.26

בדיקת כוח שריר עם דיננומטר-

13.5 ק"ג בארבע ראשי בשתי הצדדים

13 ק"ג במרחיקי הירך בצד ימין לעומת 15 ק"ג בשמאל, פער של 2 ק"ג (בעבר היתה פגיעה ישנה בירך)

2.6.26

הערכה חוזרת כוח שריר-

מרחיקי ירך 14 ק"ג בצד ימין לעומת 13 ק"ג מלפני חודש, שיפור של 1 ק"ג

השוואה בין שמאל לימין - הבדל של 1 ק"ג.

הטיפול שבוצע (לפי תאריכים): 7.11.24

סקוואט

פרופרוספסיה- לאנצ'ים בעיניים עצומות

Single RDL בתמיכת קיר

טייפנג לגיד הפיקה

28.11.24

מטופל מרגיש כאבים בשתי הברכיים בעיקר לאחר הריצה.

טיפול מנואלי לגיד הפיקה

טייפנג בשתי הברכיים

עבר לריצה 3 פעמים בשבוע- סה"כ 30 ק"מ נפח שבועי.

תרגול לאנצ' בעיניים פתוחות ועצומות

Single RDL

ירידת מדרגות איטית בתמיכת מעקה (הודגם וצולם בטלפון למטופל)

28.4.26 טופל אצלנו לפני שנה וחצי. עדיין סובל כאבים בברך ימין בעיקר בריצה ואחרי ריצה. כעת הפסיק ריצה כדי לראות האם משפר את המצב. ביצע MRI שהראה חשד למרכיב דלקתי בגיד הפיקה. הכאב מגיב ל NSAIDS ולאחר שהפסיק לקחת אחרי 10 ימים חזרו הכאבים.

הונחה ע"י הרופא לא לרוץ שישה שבועות ולנסות טיפול פיזיו בשילוב גלי הלם

בשלב זה מתאמן בפילאטיס ואימוני סטודיו עם מאמן

לאחר בדיקת כוח שריר שהראתה פער של 2 ק"ג במרחיקי ירך בין ימין (הרגל הכואבת) לשמאל

הוחלט לתת דגש על תרגילים ליציבות לטרלית.

טיפול בגלי הלם, 2 סבבים.

תרגילי יציבות וכוח:

1. לאנצ' בולגרי

2. סקוואט על רגל אחת סטאטי עם הגב לקיר (מצליח בשמאל 10 שניות לעומת 3 שניות בימין)

3. פלאנק צידי (מצליח בשמאל עם רגל אחת לעומת ימין בשתי רגליים)

5.5.26





גלי הלם 3 סבבים
תרגול פלאנק צידי
סקוואט סטאטי
Single RDL
side squat על בוסו

12.5.26
מרגיש שיפור קל, עדיין כאוב בירידת מדרגות
טיפול בגלי הלם מדיאלית לפיקה
טייפינג
ירידת מדרגות אקצנטרי
Single RDL
פלאנק צידי
TENS IF

19.5.26
לא מרגיש שיפור משמעותי בכאב
5 שבועות בהפסקה מריצה
טיפול בגלי הלם - 2 סבבים
בין הסבבים תרגול יציבות ברך
התנגדות ל ABD כנגד גומיה בעמידה
פלאנק צידי
single RDL
טייפינג

2.6.26
מרגיש שיפור בכאבים
בבדיקת פלאנק צידי- ללא קושי מצליח לבצע 30 שניות בכל צד עם רגל באוויר
כוח שריר- הבדל של 10% בין הצדדים במרחיקי ירך
תרגול יציבות וכוח-
Single RDL
התנגדות לגומיה- הרחקת ירך הצידה על רגל אחת
התנגדות לגומיה- הרמת ברך ב 90 מעלות וסיבוב חיצוני
TENS IF לברך

סיכום והמלצות: patellar tendinopathy

7.11.24 הנחיות לתרגול ביתי:
לתרגל 3 פעמים בשבוע, כל תרגיל 10 חזרות, 3 פעמים
פרופרוספסיה- לאנצ'ים בעיניים עצומות
Single RDL, עמידה על רגל אחת והרמת הרגל ישרה לאחור עם גו ישר





בנוסף מטופל מתאמן פעם בשבוע בסטודיו אימוני כוח

סרגל מאמצים לריצה-

פעמיים בשבוע ריצת נפח של 10 ק"מ קצב קל
ריצה אחת בשבוע אינטרוואלים עד 20 דקות, 4 דק' קל- דקה מהיר

28.11.24

סרגל מאמצים לריצה- 3 פעמים בשבוע, 30 ק"מ נפח שבועי.
בנוסף לתרגילים שהודרך
ירידת מדרגות איטית בתמיכת מעקה (הודגם וצולם בטלפון למטופל)

28.4.26

תרגילי יציבות וכוח, לבצע 3 פעמים בשבוע:

1. לאנצ' בולגרי
2. סקוואט על רגל אחת סטאטי עם הגב לקיר (מצליח בשמאל 10 שניות לעומת 3 שניות בימין)
3. פלאנק צידי (מצליח בשמאל עם רגל אחת לעומת ימין בשתי רגליים)

2.6.26

תרגילי יציבות לירך-

ניתן לבצע 3 פעמים בשבוע, 8-12 חזרות, 3 סטים
Single RDL - הרמת רגל ישרה לאחור , עם 4 ק"ג
התנגדות לגומיה- הרחקת ירך הצידה על רגל אחת
התנגדות לגומיה- הרמת ברך ב 90 מעלות וסיבוב חיצוני

תכנית ריצה לשבועיים הקרובים:

שבוע 1 - 2 ק"מ פעמיים בשבוע, אינטרוואלים 2 דק' ריצה קלה - 2 דק' הליכה עד שמגיעים ל 2 ק"מ
שבוע 2- 2 ק"מ פעמיים בשבוע, אינטרוואלים 3 דק' ריצה ריצה 1 דק' הליכה.
ניתן להמשיך בתכנית בהדרגה בתנאי שאין כאבים חזקים יום שלם לאחר הריצה.

הנחיות נוספות: תרגילים לפי כאב

ברכית/ טייפינג בזמן האימונים

הגבלות- ללא ריצה וקפיצה בשישה שבועות הקרובים (עד סוף חודש מאי)

ביקור מעקב: פגישה לפי צורך

** ניתן לקרוא אודות פיזיותרפיה ותרגילים באתר המרכז ספורטאג: www.sportag.co.il **

** בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות לטלפון 0775520163 **

