Insumo descriptivo: Sequía de 2026 en Honduras

Orlando Valladares | orlando.valladares.fernandez@gmail.com

Última actualización: 18 de octubre de 2026

1 INTRODUCCIÓN

Honduras actualmente se enfrenta a su mayor sequía a nivel nacional y su segunda mayor sequía en términos de trabajadores agrícolas expuestos a sequía extrema ($z < -2$ DE) en su registro CHIRPS para Primera. Si bien las alertas sobre la sequía actual, enmarcada en un contexto de cambio climático y El Niño, han estado incrementando, esta no se ha cuantificado debidamente. Este insumo aporta a su cuantificación usando los últimos datos de precipitación del registro CHIRPS v3 para los meses de Primera (mayo a agosto), el ciclo hídrico-agrícola principal de la región, complementados con el Censo de Honduras de 2013 (Funk et al., 2015; IPUMS International, 2026).

Este año, Honduras acumuló una preocupante media nacional de 580 mm de lluvia para Primera, $-2,25$ desviaciones estándar por debajo de su media histórica de 889 mm (Figura 1; Figura A2 del apéndice). Los déficits más severos se concentran en el centro, sur y oriente del país. Hablamos de una sequía comparable solo con la de 2015, que hasta entonces había sido la mayor a nivel nacional en el registro CHIRPS y formó parte del mayor episodio de sequía en registros que se extienden hasta 1920 (Pascale et al., 2021). Hoy, el 44,1% de las personas clasificadas en la rama agrícola del censo está expuesto a sequía extrema ($z < -2$); a nivel territorial, 51,9% de las 297 unidades ADM2 observadas también está bajo ese umbral. La exposición agrícola de 2015 fue similar, 45,7%, y sus daños fueron catastróficos (Figura 2; Tabla A1 del apéndice).

Aunque los impactos finales dependerán de factores de pobreza, resiliencia y calidad de tierra que este insumo no presenta, la evidencia descriptiva sugiere que cientos de miles de personas vinculadas a la agricultura están en riesgo de un shock multidimensional y pérdida casi total de su cosecha. La distribución geográfica desigual de este shock hace particularmente relevante la localización de cualquier respuesta según la intensidad de la sequía y la exposición agrícola para no malgastar recursos que las comunidades más afectadas necesitan urgentemente.

2 RESULTADOS

Después de una Primera de 2025 ya por debajo del promedio (802 mm, $z = -0,57$), el país acumuló una preocupante media nacional de 580 mm de lluvia este año, 2,25 desviaciones estándar por debajo de su media histórica de 889 mm (Figura 1; Figura A2 del apéndice). Para reducir ruido estadístico, limité el análisis a las lluvias de Primera, el ciclo agrícola principal del país. En un año promedio, Primera inicia con siembra durante la época lluviosa entre mayo y junio, y termina con cosecha entre agosto y septiembre, cuando los hogares agrícolas principalmente siembran maíz blanco como monocultivo o con frijol y maicillo. Un shock hídrico en las lluvias de Primera comprime o elimina la ventana necesaria para que el maíz, la base de la dieta regional y un cultivo intensivo en agua que requiere entre 500 y 700 mm de lluvia para su desarrollo (Reyna-Méndez, 2018, p. 10), complete su ciclo vegetativo antes del inicio de la época seca. Aunque vuelve a llover alrededor de septiembre y algunos agricultores pueden volver a sembrar en Postrera, hogares sin sistema de irrigación o excedente de semillas suelen reducir su área de siembra y priorizar cultivos de ciclos más cortos como el frijol. Es decir, aunque NOAA predice que un El Niño

Figura 1. Honduras. Puntaje z municipal de lluvia de Primera, 2026.





Figura 2. Honduras. Proporción de unidades ADM2 y personas en la rama agrícola expuestas a sequía extrema, 1981–2026.



Nota. CHIRPS v3; lluvia mayo–agosto. Cada puntaje z se calcula excluyendo el año evaluado de la referencia 1981–2026. La serie territorial usa 297 unidades ADM2 observadas; la exposición agrícola pondera 125 grupos GEO2 completos con la distribución de IPUMS 2013 fija. No reconstruye la composición laboral efectiva de cada año ni inventa conteos municipales.

Figura 3. Honduras. Departamentos: 2015 y 2026 en escala histórica local.





Figura 4. Honduras. Distribución acumulada de puntajes z.



Nota. La Figura 3 ubica, para cada departamento, la media, mediana y media ± 1 DE descriptivas, además de la lluvia de 2015 (triángulo azul) y 2026 (círculo rojo). En la Figura 4, las líneas continuas son CDF de unidades ADM2 y las discontinuas son CDF ponderadas por personas agrícolas en grupos GEO2 de IPUMS 2013. La línea gris es sólo la referencia geográfica municipio–año; no se presenta una serie laboral histórica que sugiera cambios no observados en la composición ocupacional.

fuerte persistirá hasta al menos enero–marzo de 2027 (National Oceanic and Atmospheric Administration, National Weather Service, Climate Prediction Center (2026)), las lluvias de Primera, de las cuales ya hay datos, concentran el determinante hídrico agrícola de sustento principal del país y permiten su radiografía preliminar.

Es en esta ventana crítica de mayo a agosto cuando el país actualmente se enfrenta a su mayor sequía en el registro CHIRPS a nivel nacional y, por un margen estrecho, a su segunda mayor sequía en términos de personas agrícolas expuestas a sequía extrema. Por sequía extrema, me refiero al umbral $z < -2$, siguiendo el Standardized Precipitation Index (SPI) de McKee et al. (1993) y recomendado por la Organización Meteorológica Mundial (McKee et al., 1993; World Meteorological Organization, 2012). Es la realidad para 474.615 de 1.077.033 personas agrícolas observadas (44,1%) y para 154 de 297 unidades ADM2 (51,9%). Si incluimos sequía severa ($z \leq -1,5$), la exposición agrícola alcanza 70,1%; sumando sequía moderada ($z \leq -1$), 84,5% (Figura 2; desglose en la Tabla A1 del apéndice).

Los déficits más severos se concentran en el centro, sur y oriente del país, desde el interior de Olancho hasta el Corredor Seco en departamentos como El Paraíso, La Paz y Choluteca, así como en el occidente del país, mientras que franjas centrales desde Francisco Morazán hasta Santa Bárbara están relativamente menos afectadas (Figura 1 y Tabla A3 del apéndice). Entre las áreas bajo sequía extrema se encuentran Lempira, Intibucá, Ocotepeque y La Paz, cuatro departamentos occidentales clave con vulnerabilidad socioeconómica y participación agrícola elevada.

2.1 COMPARACIÓN HISTÓRICA Y $Z < -2$

Para empezar a traducir la magnitud de este shock a su costo humano, es útil tomar la sequía de 2015 como punto de comparación, que formó parte del episodio regional más seco en registros que se extienden hasta 1920 (GPCC y CRU en Pascale et al., 2021, p. 2). En el registro CHIRPS, fue menor que la sequía actual nacionalmente (613 mm y $z = -1,98$ frente a 580 mm y $z = -2,25$), con una distribución ligeramente más concentrada en municipios de alta exposición agrícola, mientras que la de 2026 es más extensa territorialmente (Figura 3; distribución geográfica en la Figura A2 del apéndice). Sin embargo, la sequía actual entra con mayor acumulación seca en sus tres años previos (2023–2025), un z promedio de $-0,61$, frente a $-0,22$ para 2012–2014. Aunque 2019 es el comparador más cercano en profundidad nacional, 2015 sigue siendo el comparador sustantivo más útil por su amplia extensión territorial y por los impactos documentados.

Esta documentó impactos severos y multidimensionales en el país. COPECO estimó que 280.000 familias en 202 municipios de 13 departamentos fueron afectadas por la sequía, con pérdidas promedio del 80% de sus cosechas de Primera, según la evaluación de seguridad alimentaria coordinada por PMA, FAO, UTSAN y la Red Humanitaria (COPECO, 2016). A escala macroagrícola, el análisis de mercados EMMA, realizado a solicitud de COPECO y SAG, estimó pérdidas de entre 2,3 y 2,4 millones de quintales de maíz y entre 159.000 y 162.000 de frijol rojo. Las pérdidas estimadas de maíz se valoraron entre L747,5 y L1.090,2 millones (aproximadamente USD 33,8–49,3 millones de 2015), según el precio de referencia utilizado (EMMA, 2015). La afectación se extendió a 13 departamentos —El Paraíso, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Comayagua,

Olancho, Copán, Ocotepeque, Yoro y Santa Bárbara—(Figura A2 del apéndice). En 2015 estos departamentos presentaban una media simple de 510 mm y $z = -1,97$; hoy es de 484 mm y $z = -2,08$.

Para hogares agrícolas en las áreas más afectadas, el shock mezcló (1) una pérdida casi total de cosecha destacada por COPECO, con (2) un alza estacional en el precio del maíz justo cuando los hogares pasaron a depender del mercado para adquirirlo. Las áreas menos afectadas sufrieron una mezcla heterogénea y aún impactante de estos factores. Sumados a la prevalencia de pérdidas, la serie mayorista de promedio nacional indica que el maíz blanco subió de L7.758,85 por tonelada en enero de 2015 a L9.810,95 en julio, un alza nominal de 26,4%. Un estudio de UNICEF documentó que la proporción de hogares dependientes de compras en el mercado subió de 62,9% a 80,6% y reportó aumentos de precios de 14–20% en las comunidades analizadas. El análisis EMMA también documentó que numerosos hogares consumieron o perdieron sus reservas de semilla, prolongando su vulnerabilidad alimentaria y dependencia de mercado.


2.2 PANORAMA ACTUAL

Estos mecanismos se empiezan a vislumbrar para la sequía actual, sumados a su mayor acumulación seca en los tres años previos. La evaluación rápida coordinada por Oxfam en el Corredor Seco centroamericano sugiere una prevalencia de pérdidas del 75–100% de cosecha en áreas bajo sequía extrema (agosto de 2026) (Oxfam en América Latina y el Caribe, 2026). Entre los 15 departamentos de su muestra regional (4.260 participantes en 354 grupos focales), en los ocho en sequía extrema (media $z = -2,30$) el 94,9% de hogares comunitarios reportaron pérdidas de 75–100%, frente al 53,6% de hogares en los otros siete (media $z = -1,67$). Aunque notable, esta brecha es sólo sugestiva al no tratarse de una muestra representativa sino de una que priorizó áreas históricamente vulnerables. Sin embargo, se mantuvo en Honduras, donde la muestra incluyó cuatro departamentos, 1.798 participantes y 149 grupos focales: en El Paraíso ($z = -2,11$) y Choluteca ($z = -2,36$), el 100,0% reportó pérdidas de 75–100%; en Lempira ($z = -2,09$), 85,3%, y finalmente 27,5% en Yoro ($z = -1,53$) (Tabla A2 del apéndice).


Sumado, en la misma serie mayorista nacional, el maíz blanco ha sufrido un alza de 46,5% en su máximo obser-

Figura 5. Honduras. Exposición agrícola, priorización de respuesta y contexto de inseguridad alimentaria.


(a) Personas en la rama agrícola




(b) Participación agrícola



(c) Índice combinado de prioridad



(d) Análisis de FEWS NET



Nota. Los paneles (a)–(c) agregan los 125 grupos GEO2 de residencia con cruce CHIRPS completo; INDGEN=010 identifica agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y el denominador de (b) es la población con industria conocida. El índice es $R = 100(Z^{0,50}N^{0,25}S^{0,25})$*, con percentiles de rango medio dentro de Honduras. FEWS NET es contexto independiente y no entra en R.*

vado de agosto de 2026 (L17.445,15 por tonelada), frente a L11.910,44 en enero. El alza supera por 20,0 puntos porcentuales el máximo nominal de 26,4% observado en 2015. Si bien no hay una serie nacional comparable de precios comunitarios para 2026 como la del reporte de UNICEF, esto y la extensión territorial bajo sequía extrema sugieren varios indicadores más adversos que en 2015, si factores de resiliencia o pobreza no han cambiado sustancialmente.

3 CONCLUSIÓN E IMPLICACIONES PARA LA FOCALIZACIÓN

La evidencia descriptiva presentada aquí documenta la exposición extraordinaria de la población agrícola hondureña a la sequía de Primera de 2026. La precipitación nacional fue menor que en 2015, la distribución geográfica actual es más extensa territorialmente y el país se enfrenta a su máximo histórico de proporción de unidades ADM2 bajo sequía extrema, pero no al máximo de proporción agrícola expuesta. Esta diferencia evidencia cómo una media nacional puede ocultar variaciones territoriales sustantivas en la intensidad y exposición a un mismo shock climático.

Esta heterogeneidad hace particularmente importante la focalización territorial de la respuesta. La Figura 5 presenta tres dimensiones complementarias: el número de personas en la rama agrícola, su participación en la población con industria conocida y un índice combinado de priorización. Este último se construye como $R = 100(Z^{0,50}N^{0,25}S^{0,25})$, donde Z, N y S representan los percentiles de intensidad de sequía, población agrícola nominal y participación agrícola, respectivamente. La media geométrica ponderada otorga mayor peso al shock hídrico, sin permitir que una sola dimensión determine por sí misma la prioridad: busca evitar tanto priorizar una localidad pequeña con alta dependencia agrícola pero muy pocas personas, como favorecer automáticamente un gran centro poblado con muchas personas agrícolas, pero una estructura laboral más diversificada que podría ofrecer mayores alternativas de ingreso y resiliencia.

Sin embargo, estos criterios de exposición no sustituyen la consideración de la pobreza y la capacidad de respuesta de los hogares. Una sequía de $z = -1,5$ podría tener consecuencias más severas que otra de $z = -2,0$ para un hogar que no dispone de reservas, activos o ingresos alternativos de los cuales depender, como podría ocurrir en comunidades vulnerables del Corredor Seco. Es por ello que la Figura 5 incorpora también el análisis de FEWS NET para Honduras, que considera las amenazas climáticas junto con las condiciones de los medios de vida, el acceso a alimentos y la capacidad de los hogares para afrontar sus efectos. Esta comparación ilustra por qué la intensidad de la precipitación, por sí sola, no equivale a la severidad final de una crisis alimentaria. Los impactos finales dependerán también de factores como la ya dicha pobreza, resiliencia y calidad de tierra. En este contexto, la distribución de la precipitación y de la población agrícola ofrece una base para orientar y justificar criterios explícitos de focalización, complementados por información local sobre vulnerabilidad y necesidades.

4 DATOS Y MÉTODO

Este análisis usó CHIRPS v3, que combina datos satelitales de infrarrojo térmico con observaciones de precipitación in situ, para crear una imagen granular de lluvia en grillas de 0,05 grados desde 1981 (Funk et al., 2015). Para cada municipio (ADM2) de Honduras, sumé su lluvia en cada celda y calculé una media por área en una proyección equivalente. Para cada año y geografía, calculé su puntaje z contra los otros 45 años de 1981–2026, por lo que 2015 entra en la referencia de 2026 y 2026 entra en la de 2015. Aunque al usar CHIRPS por sus datos actualizados limité el registro a 1981, la sequía de 2015 forma parte del mayor episodio regional de sequía en registros que se extienden hasta 1920 (GPCC y CRU en Pascale et al., 2021, p. 2). Para reducir ruido, limité CHIRPS a sus 24 observaciones de 5 días entre mayo y agosto, que se alinean con Primera, el ciclo agrícola principal del país, por razones ya dichas.

Para estimar exposición agrícola, complementé CHIRPS con el XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda de Honduras de 2013, mediante el extracto de IPUMS International (IPUMS International, 2026). En particular, el número ponderado de personas clasificadas en la rama de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que a escala nacional comprende 1.100.101 personas, 45,4% del universo con industria conocida (2.425.544). Aunque la subcategoría de "campesinos" o "agricultores familiares" sería lo ideal para este análisis de riesgo, no existe una medida contemporánea en la fuente utilizada que la identifique de forma equivalente a escala municipal. Asimismo, la categoría amplia permite considerar el shock en sus efectos sobre los distintos medios de vida agrícolas, donde, al impactar a grandes agricultores, también puede afectar las oportunidades de trabajo de un jornalero sin tierras y los ingresos adicionales de un agricultor familiar, ambos vinculados a la rama agrícola. La distribución espacial agrícola se presenta en la Figura 5 y la Figura A1 del apéndice.

La geografía laboral disponible en el extracto es GEO2 de residencia. Los conteos se conservan en las unidades efectivamente observadas y se vinculan con CHIRPS mediante un cruce explícito de los municipios miembros de cada GEO2; el puntaje hídrico del grupo es la media simple de los puntajes de sus municipios. Los resultados de exposición usan 125 grupos con correspondencia completa, que contienen 1.077.033 personas agrícolas de las 1.100.101 del extracto nacional. No se distribuyen artificialmente conteos GEO2 entre municipios. La ausencia de edad y condición de empleo en el extracto analítico implica, además, que la medida es una aproximación amplia de población en rama agrícola y no un conteo estricto de trabajadores ocupados.

Referencias

Archivo de datos suministrado al proyecto (2026). Hn_gu_grain_tonne_2000–2026: promedio nacional mayorista de maíz blanco, hnl por tonelada. Serie mensual; Honduras 2015 y enero–agosto de 2026. La fuente institucional no consta en el archivo recibido.

Comisión Permanente de Contingencias (2016). Informe de situación sobre la sequía en honduras. Technical report, COPECO.

Dercon, S. and Christiaensen, L. (2011). Consumption risk, technology adoption and poverty traps: Evidence from ethiopia. *Journal of Development Economics*, 96(2):159–173.

Equipo EMMA Honduras (2015). Análisis de mercado de maíz y frijol en el corredor seco de honduras. Technical report, COPECO y Secretaría de Agricultura y Ganadería.

FEWS NET (2026). Honduras: Actualización de la perspectiva de seguridad alimentaria.

Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., and Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2:150066.

IPUMS International (2026). Honduras 2013 population and housing census extract. Weighted microdata extract; GEO2 residence geography and INDGEN harmonized industry.

Janzen, S. A. and Carter, M. R. (2019). After the drought: The impact of microinsurance on consumption smoothing and asset protection. *American Journal of Agricultural Economics*, 101(3):651–671.

Macours, K., Premand, P., and Vakis, R. (2022). Transfers, diversification and household risk strategies: Can productive safety nets help households manage climatic variability? *The Economic Journal*, 132(647):2438–2470.

McKee, T. B., Doesken, N. J., and Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. In *Proceedings of the Eighth Conference on Applied Climatology*, pages 179–184. American Meteorological Society.

National Oceanic and Atmospheric Administration, National Weather Service, Climate Prediction Center (2026). Discusión diagnóstica de El Niño/Oscilación del Sur (ENSO).

Oxfam en América Latina y el Caribe (2026). La sequía, los cultivos y el corredor seco centroamericano: Evidencias de una crisis en evolución en guatemala, honduras y el salvador por el impacto de El Niño.

Pascale, S., Kapnick, S. B., Delworth, T. L., Hidalgo, H. G., and Cooke, W. F. (2021). Natural variability vs forced signal in the 2015–2019 Central American drought. *Climatic Change*, 168:16.

UNICEF Honduras (2016). Ahora lo urgente: impacto de la sequía en hogares de honduras. Technical report, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

World Meteorological Organization (2012). Standardized precipitation index user guide. Technical Report WMO-No. 1090, World Meteorological Organization.