

III- defined patchy area of abnormal signal is seen implicating the right internal capsule, right thalamus and extending along the mid brain and pons (more evident along its posterior aspect):

يتم رؤية منطقة غير مكتملة محددة بشكل غير طبيعي للإشارة تتضمن الكبسولة الداخلية اليمنى، المهاد اليمين والامتداد على طول الدماغ الأوسط ونسيج مُجَسَّر (أكثر وضوحاً على طول جانبه الخلفي):

o It elicits intermediate to low T1, patchy high T2/FLAIR signal with subtle areas of mild diffusion restriction. No appreciable enhancement could be detected at the post contrast images.

تثير إشارة استعادة الانقلاب المخفف للسوائل العالية غير المكتملة من متوسط إلى منخفض زمن الاسترخاء الطولي مع مناطق خفية من تقييد الانتشار الخفيف. لا يمكن اكتشاف أي تحسين ملموس في صور ما بعد التباين.

o It is seen exerting mild mass effect on the aqueduct of Sylvius with consequent prominent supratentorial ventricular system.

يُرى أنه يمارس تأثيرًا خفيفًا للكتلة على قناة سيلفيوس مع نظام البطين الذي فوق الموضع البارز.

-Right posterior parietal para sagittal small cortical well-defined lesion of abnormal signal is seen eliciting intermediate to low T1, intermediate to low T2/FLAIR signal with related subcortical brain edema of low T1, high T2/FLAIR signal and showing post contrast enhancement. It is seen exerting mild mass effect in the form of effacement of the overlying cortical sulci.

شوهدت قشرة صغيرة محددة جيداً للإشارة الغير طبيعية من الجدار الخلفي الأيمن، تشير إشارة زمن الاسترخاء الطولي من المتوسط إلى المنخفض، وإشارة استعادة الانقلاب المخفف للسوائل عالية غير مكتملة من المتوسط إلى المنخفض مع وذمة الدماغ تحت القشرية ذات الصلة من زمن الاسترخاء الطولي المنخفض، وإشارة استعادة الانقلاب المخفف للسوائل العالية غير المكتملة وإظهار تعزيز ما بعد التباين. يُنظر إليه وهو يمارس تأثيرًا خفيفًا للكتلة على شكل صبغ من تلافيف المخ القشري العلوي.