

ما هو دواء فلاجيل؟

What is Flagyl drug?

فلاجيل دواء يعمل عن طريق الانتشار السلبي في السيتوبلازم للبكتيريا اللاهوائية، مما يؤدي إلى تثبيط تخليق الحمض النووي وتدهوره، وفي النهاية موت البكتيريا.

Flagel is a drug that works by passively spreading in the cytoplasm of anaerobic bacteria, inhibiting DNA synthesis and degradation, and eventually the death of bacteria.

دواعي استعمال فلاجيل

Use of flagyl:

1. دواعي استعمال فلاجيل بتصريح من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

Use of flagyl authorized by American FDA

الخُراج اللاهوائي، الزحار الأميبي الحاد، خراج الكبد الأميبي، التهاب السحايا الجرثومي، التهاب المهبل البكتيري، عدوى بسبب البكتيريا اللاهوائية، كعامل مساعد في علاج عدوى العظام، كعامل مساعد في علاج اضطرابات المفاصل، العمليات الخاصة بالقناة الهضمية والقولون والمستقيم والوقاية من عدوى ما بعد العمليات الجراحية، حب الشباب الوردي، التريكوموناس - داء المشعرات المهبليّة.

Anaerobic abscess, Acute amoebic dysentery, Amoebic liver abscess, Bacterial meningitis, Bacterial vaginosis, Infection due to anaerobic bacteria, as an auxiliary factor in the treatment of bone infection, as an auxiliary factor in the

treatment of joint disorders, gastrointestinal and colorectal operations and the prevention of post-surgical infection, Rosacea, Trichomoniasis.

1. استعمال فلاجيل بدون تصريح من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

الوقاية من عدوى ما بعد عملية استئصال الزائدة الدودية الجراحية، الولادة القيصرية -التهاب بطانة الرحم النفائي، الوقاية من التهاب القولون بسبب بكتيريا المطثية العسيرة -العمليات الجراحية الخاصة بالقناة الهضمية، الإسهال، المصاحب لبكتيريا المطثية العسيرة والذي يتضمن التهاب القولون الغشائي الكاذب.، مرض كرون، الإصابة بعدوى الأميبا بوليكي، داء الجارديا (حمى القنطس)، توسيع اللثة، الوقاية من العمليات المتعلقة بصحة المرأة، عدوى القناة الهضمية ببكتيريا الهليكوباكتر بيلوري أو ما يعرف بالملوية البوابية، الإصابة بداء الحبيبات (الدودة الغينية)، الإصابة بعدوى الدودة الشريطية، التهاب الإحليل بغير المكورات البنية، العين الوردية، عمليات الرقبة والرأس، والوقاية من العدوى ما بعد العمليات الجراحية، عمليات الجهاز التناسلي الأنثوي وتشمل عملية الولادة والوقاية من، العدوى ما بعد العمليات الجراحية، التهابات الحوض، أمراض عدوى دواعم الأسنان، الوقاية من الولادة المبكرة، التهاب الجلد المثي، الوقاية من الأمراض المعدية المنقولة بالاتصال الجنسي

Prevention of postoperative infection after appendectomy and cesarean section, Endometriosis, Prevention of Clostridium difficile colitis, Gastrointestinal surgery, Clostridium difficile-associated diarrhea, including pseudomembranous colitis, Crohn's disease, Entamoeba histolytica infection, Giardiasis, Gingival enlargement, Prevention of gynecological surgeries, Helicobacter pylori infection, Dracunculiasis, Tapeworm infection, Non-gonococcal urethritis, Pink eye (or conjunctivitis), Head and neck surgeries, and prevention of postoperative infection, Female genital tract surgeries, including childbirth, and prevention of postoperative infection, Pelvic inflammatory disease, Dental implant infections, Prevention of

preterm birthm Atopic dermatitis Prevention of sexually transmitted infections
(STIs)