

Álgebra lineal I, Grado en Matemáticas

Prueba de Evaluación Continua, curso 2018/19

Matrices, Sistemas lineales y Espacios Vectoriales

Ejercicio 1: (2 puntos)

Dadas matrices A y B de orden n son semejantes si existe una matriz regular P tal que $A = PBP^{-1}$. Demuestre que si A y B son matrices semejantes de orden n y $A^2 - 3A = I_n$, entonces también se cumple $B^2 - 3B = I_n$.

Solución: Dadas A , B y P en las condiciones de enunciado, si sustituimos $A = PBP^{-1}$ en la ecuación matricial $A^2 - 3A = I_n$, entonces

$$(PBP^{-1})^2 - 3(PBP^{-1}) = I_n$$

de donde

$$(PBP^{-1}PBP^{-1}) - 3(PBP^{-1}) = PB^2P^{-1} - 3PBP^{-1} = I_n$$

Aplicando la propiedad distributiva tenemos

$$P(B^2P^{-1} - 3BP^{-1}) = P(B^2 - 3B)P^{-1} = I_n$$

Ahora, multiplicando a ambos miembros de la igualdad por P^{-1} por la izquierda y por P por la derecha, obtenemos

$$P^{-1}P(B^2 - 3B)P^{-1}P = P^{-1}I_nP$$

y simplificando llegamos al resultado deseado

$$B^2 - 3B = I_n .$$

Ejercicio 2: (4 puntos)

Dado el siguiente sistema lineal

$$\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + by + z = b \\ x + y + az = a \end{cases} \quad \text{con } a, b \in \mathbb{K}$$

- (a) Discuta el sistema para todos los valores de $a, b \in \mathbb{K}$.
- (b) Resuelva los casos en que sea compatible e indeterminado.

Solución: Matricialmente, denotamos por $AX = B$ al sistema dado, siendo $(A|B)$ la matriz ampliada, y procedemos a realizar operaciones elementales de filas para transformarlo en un sistema escalonado equivalente $A'X = B'$, con matriz $(A'|B')$ escalonada. Comenzamos haciendo un intercambio de filas para conseguir un pivote en la posición $[A|B]_{11}$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 & b \\ 1 & 1 & a & a \end{array} \right) \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & a \\ 1 & b & 1 & b \\ a & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{f_2 \rightarrow f_2 - f_1 \\ f_3 \rightarrow f_3 - af_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & a \\ 0 & b-1 & 1-a & b-a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a^2 \end{array} \right)$$

- (a) Si $a = 1$ y $b = 1$ el sistema queda reducido a una única ecuación $x + y + z = 1$ que sería compatible e indeterminado y sus soluciones son las ternas de la forma

$$(1 - \lambda - \mu, \lambda, \mu) \text{ con } \lambda, \mu \in \mathbb{K}$$

(b) Si $a = 1$ y $b \neq 1$ la matriz del sistema escalonado equivalente es

$$(A'|B') = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-1 & 0 & b-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Como $\text{rg}(A') = \text{rg}(A'|B') = 2$ y menor que el número de incógnitas, entonces el sistema es compatible e indeterminado. Las soluciones son:

$$(-\lambda, 1, \lambda), \lambda \in \mathbb{K}.$$

(c) Si $a \neq 1$ tenemos que seguir haciendo operaciones elementales de filas para escalar la matriz

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & a \\ 0 & b-1 & 1-a & b-a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a^2 \end{array} \right) \xrightarrow[f_2 \leftrightarrow f_3]{f_3 \rightarrow \frac{1}{1-a}f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & a \\ 0 & 1 & 1+a & 1+a \\ 0 & b-1 & 1-a & b-a \end{array} \right) = (A''|B'')$$

(c.1) Si $b = 1$ entonces la matriz es escalonada

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & a \\ 0 & 1 & 1+a & 1+a \\ 0 & 0 & 1-a & 1-a \end{array} \right) = (A''|B'')$$

y $\text{rg}(A'') = \text{rg}(A''|B'') = 3$ e igual al número de incógnitas. El sistema es compatible determinado.

(c.2) Si $b \neq 1$ seguimos escalonando

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & a \\ 0 & 1 & 1+a & 1+a \\ 0 & b-1 & 1-a & b-a \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 \rightarrow f_3 - (b-1)f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & a \\ 0 & 1 & 1+a & 1+a \\ 0 & 0 & 2-b-ab & 1-ab \end{array} \right) = (A'''|B''')$$

(c.2.1) Si $2-b-ab \neq 0$, entonces $\text{rg}(A''') = \text{rg}(A'''|B''') = 3$ e igual al número de incógnitas, luego el sistema es compatible determinado.

(c.2.2) Si $2-b-ab = 0$ y $1-ab = 0$, el sistema sería compatible indeterminado ya que

$$\text{rg}(A''') = 2 \neq \text{rg}(A'''|B''') = 2.$$

Pero este caso no se puede dar pues sustituyendo $ab = 1$ en la primera condición, obtendríamos $b = 1$, y hemos supuesto $b \neq 1$.

(c.2.3) Si $2-b-ab = 0$, entonces $1-ab \neq 0$ y el sistema sería incompatible ya que

$$\text{rg}(A''') = 2 \neq \text{rg}(A'''|B''') = 3.$$

Ejercicio 3: (4 puntos)

Sea V un \mathbb{K} -espacio vectorial y $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ una base de V . Dados los subespacios vectoriales U y W definidos por:

$$U = L(v_1 + v_2, v_1 - 2v_3 + v_4), \quad W = \left\{ \begin{array}{cccc} x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & = & 0 \\ -2x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & = & 0 \end{array} \right.$$

(a) Determine una base y unas ecuaciones implícitas del subespacio $U + W$.

(b) Determine una base y unas ecuaciones implícitas del subespacio $U \cap W$.

Solución:

(a) Llamamos $u_1 = v_1 + v_2$ y $u_2 = v_1 - 2v_3 + v_4$ a los dos vectores que, por ser linealmente independientes, forman una base de U y determinamos una base de W . Para ello, resolvemos el sistema lineal homogéneo $AX = 0$ que son las ecuaciones implícitas de W obteniendo unas ecuaciones paramétricas y de ahí una base. Tenemos $\text{rg } A = 2$, luego $\dim W = 4 - 2 = 2$. Una base de W es

$$W = L(w_1 = (1, 2, 3, 0), w_2 = (2, 1, 0, 3))$$

Un sistema generador de $U + W$ es $S = \{u_1, u_2, w_1, w_2\}$ y $\dim(U + W) = \text{rg}\{S\}$. Estudiamos el rango utilizando la matriz de coordenadas por filas

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & u_1 \\ 1 & 0 & -2 & 1 & u_2 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & w_1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 & w_2 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & u_1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & u_2 - u_1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & w_1 - u_1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & w_2 - 2u_1 \end{array} \right) \sim_f \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & u_1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & u_2 - u_1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & w_1 - u_2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & w_2 - u_1 - u_2 \end{array} \right)$$

Las matrices contienen conjuntos de vectores equivalentes (hemos hecho operaciones elementales de filas). En la tercera matriz, vemos que las tres primeras filas son linealmente independientes, y las filas 3 y 4 son proporcionales, luego el rango va a ser $3 = \dim(U + W)$. Una base de $U + W$ está formada por tres primeros vectores de la última matriz

$$\mathcal{B}_{U+W} = \{u_1, u_2 - u_1, w_1 - u_2\}$$

y unas ecuaciones de W respecto de la base \mathcal{B} se obtienen al determinar los vectores x con coordenadas (x_1, x_2, x_3, x_4) en \mathcal{B} que son combinación lineal de los vectores de la base \mathcal{B}_{U+W} . En términos matriciales:

$$\text{rg}\{u_1, u_2 - u_1, w_1 - u_2, x\} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & x_1 \\ 1 & -1 & 0 & x_2 \\ 0 & -2 & 1 & x_3 \\ 0 & 1 & 1 & x_4 \end{pmatrix} = 3$$

De donde se obtiene

$$U + W \equiv \{3x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$$

(b) En primer lugar, la fórmula de dimensiones confirma que

$$\dim(U \cap W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U + W) = 2 + 2 - 3 = 1$$

De la última matriz, también podemos obtener una base de este subespacio del siguiente modo: la relación de proporcionalidad entre las filas 3 y 4 es $f_4 = 2f_3$, que en términos de vectores es

$$2(w_1 - u_2) = w_2 - u_1 - u_2$$

Separamos u's y w's en distintos lados de la ecuación y obtenemos

$$u_1 - u_2 = w_2 - 2w_1$$

que es un vector que pertenece a $U \cap W$. Entonces, el vector $u_1 - u_2 = (0, 1, 2, -1)_{\mathcal{B}}$ determina una base de $U \cap W$ y unas ecuaciones implícitas se obtienen de la condición:

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4)_{\mathcal{B}} \in U \cap W \quad \text{si y sólo si} \quad \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 2 & x_3 \\ -1 & x_4 \end{pmatrix} = 1$$

de donde se obtienen unas ecuaciones implícitas

$$U \cap W \equiv \{x_1 = 0, x_3 - 2x_2 = 0, x_2 + x_4 = 0\}$$

Observación: Otro método para determinar el subespacio $U \cap W$ consiste en determinar unas ecuaciones implícitas de U , y resolver el sistema formado por las cuatro ecuaciones lineales homogéneas: las dos de U y las dos de W . De este modo se obtienen unas ecuaciones paramétricas de $U \cap W$, y por tanto una base. Posteriormente se calculan, igual que antes, las ecuaciones implícitas correspondientes.