

Examen de Matemática Discreta

NOTA IMPORTANTE: El espacio máximo para escribir las respuestas es de dos folios por las dos caras. Si se envían más de dos folios, solamente se leerán los dos primeros.

Problema

- a) Demostrar que si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$, entonces $ac \equiv bd \pmod{m}$ (1,5 puntos)
- b) Demostrar que todo número de la forma $2^{2^n} + 1$, con $n \geq 2$, termina en 7. (2 puntos)

Solución

- a) Apartado 4 del teorema 1-5.9 del libro de teoría.
- b) El número terminará en 7 si sólo si $2^{2^n} + 1 \equiv 7 \pmod{10}$ Para ello

demostraremos que $2^{2^n} \equiv 6 \pmod{10}$, y esto lo haremos por inducción sobre n .

Si $n = 2$ entonces $2^{2^2} \equiv 6 \pmod{10}$, supongamos que $2^{2^{n-1}} \equiv 6 \pmod{10}$, entonces $2^{2^n} = 2^{2^{n-1} \cdot 2} = 2^{2^{n-1}} \cdot 2^{2^{n-1}} \equiv 6 \cdot 6 \pmod{10} \equiv 6 \pmod{10}$.

Problema

- a) Sean G y G' dos grafos con la misma matriz de adyacencia. Demostrar que entonces G y G' son isomorfos. (2 puntos)
- b) Dibuje un grafo G cuya matriz de incidencia o adyacencia es

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (1 \text{ punto})$$

Solución

- a) 2-3.4 del libro de teoría
- b) Puesto que A es una matriz cuadrada, G tiene cinco vértices v_1, \dots, v_5 . Hay que dibujar una arista desde v_i hasta v_j si $a_{ij} = 1$.

Problema

- a) ¿Cuántas palabras distintas pueden formarse permutando las letras de la palabra UNIVERSIDADES? (1 punto)
- b) ¿Que polígono regular tiene el doble número de diagonales que de lados?

¿Cuántos triángulos se pueden formar con los vértices de un polígono regular de n lados si los lados del polígono regular no pueden ser lados de ningún triángulo?
(2,5 puntos)

Solución

a) Hay 13 letras. Aparecen dos veces la letra E, la S, la I y la D. Por lo tanto la solución será

$$\left(\begin{matrix} 13 \\ 2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \end{matrix} \right) = \frac{13!}{2!2!2!2!1!1!1!1!1!}$$

b) Un polígono regular de n lados, tiene también n vértices. Dos vértices

determinan un lado o una diagonal. Por lo tanto $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ es el número de lados más diagonales, como hay n lados, el número de diagonales es $\frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}$.

$$\text{Si } \frac{n(n-3)}{2} = 2n \Rightarrow n^2 - 3n = 4n \Rightarrow n(n-7) = 0 \Rightarrow n = 7.$$

El número de triángulos de un polígono regular de n lados es $\binom{n}{3}$. Ahora el número de triángulos con exactamente un lado sobre el polígono n_1 se puede calcular de la siguiente forma, con el número de lados es n , y el número de vértices que puedes elegir es $n-4$, ya que no pueden estar los del lado ni los consecutivos. El número de triángulos con un lado es $n(n-4)$.

El número de triángulos con dos lados n_2 es igual al número de tres vértices consecutivos que existen en el polígono, o las formas de elegir el primer vértice, luego es n . Así el número que queremos es $\binom{n}{3} - n(n-4) - n$.