

Geometría Básica

Capítulo II: Axiomas para la Geometría Euclidiana Plana

Jackie Harjani y Belén López.

UNED, C.A. Las Palmas

Febrero 2011

Ejercicio 2.6.

Sea $r \subset P$ una recta y $A, B \in r$, $A \neq B$. Demostrar que para todo $t \in \mathbb{R}$, existe un punto $P_t \in r$, único, verificando:

$$d(P_t, A) = |t|$$

$$d(P_t, B) = |t - d(A, B)|$$

Ejercicio 2.6.

Sea $r \subset P$ una recta y $A, B \in r$, $A \neq B$. Demostrar que para todo $t \in \mathbb{R}$, existe un punto $P_t \in r$, único, verificando:

$$\begin{aligned}d(P_t, A) &= |t| \\d(P_t, B) &= |t - d(A, B)|\end{aligned}$$

Solución:

Capítulo II: Ejercicio 2.5

Existe $\rho : r \rightarrow \mathbb{R}$ cumpliendo el Axioma P3 y tal que:

- i) $\rho(A) = 0$
- ii) $\rho(B) = d(A, B)$

Si $t \in \mathbb{R}$

Si $t \in \mathbb{R}$
y
 $P_t = \rho^{-1}(t)$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } t \in \mathbb{R} \\ \text{y} \\ P_t = \rho^{-1}(t) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } t \in \mathbb{R} \\ \text{y} \\ P_t = \rho^{-1}(t) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} d(P_t, A) = |\rho(P_t) - \rho(A)| = |\rho(\rho^{-1}(t)) - 0| = |t| \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } t \in \mathbb{R} \\ \text{y} \\ P_t = \rho^{-1}(t) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} d(P_t, A) = |\rho(P_t) - \rho(A)| = |\rho(\rho^{-1}(t)) - 0| = |t| \\ d(P_t, B) = |\rho(P_t) - \rho(B)| = |t - d(A, B)| \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } t \in \mathbb{R} \\ \text{y} \\ P_t = \rho^{-1}(t) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} d(P_t, A) = |\rho(P_t) - \rho(A)| = |\rho(\rho^{-1}(t)) - 0| = |t| \\ d(P_t, B) = |\rho(P_t) - \rho(B)| = |t - d(A, B)| \end{array} \right.$$

Unicidad de P_t

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } t \in \mathbb{R} \\ \text{y} \\ P_t = \rho^{-1}(t) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} d(P_t, A) = |\rho(P_t) - \rho(A)| = |\rho(\rho^{-1}(t)) - 0| = |t| \\ d(P_t, B) = |\rho(P_t) - \rho(B)| = |t - d(A, B)| \end{cases}$$

Unicidad de P_t

Sea $P' \in r$ tal que:

$$\begin{aligned} d(P', A) &= |t| \\ d(P', B) &= |t - d(A, B)| \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } t \in \mathbb{R} \\ \text{y} \\ P_t = \rho^{-1}(t) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} d(P_t, A) = |\rho(P_t) - \rho(A)| = |\rho(\rho^{-1}(t)) - 0| = |t| \\ d(P_t, B) = |\rho(P_t) - \rho(B)| = |t - d(A, B)| \end{array} \right.$$

Unicidad de P_t

Sea $P' \in r$ tal que:

$$\left. \begin{array}{l} d(P', A) = |t| \\ d(P', B) = |t - d(A, B)| \end{array} \right\} \overset{\rho \text{ isom.}}{\Rightarrow} \left\{ \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } t \in \mathbb{R} \\ \text{y} \\ P_t = \rho^{-1}(t) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} d(P_t, A) = |\rho(P_t) - \rho(A)| = |\rho(\rho^{-1}(t)) - 0| = |t| \\ d(P_t, B) = |\rho(P_t) - \rho(B)| = |t - d(A, B)| \end{array} \right.$$

Unicidad de P_t

Sea $P' \in r$ tal que:

$$\left. \begin{array}{l} d(P', A) = |t| \\ d(P', B) = |t - d(A, B)| \end{array} \right\} \overset{\rho \text{ isom.}}{\Rightarrow} \left\{ \begin{array}{l} |\rho(P')| = |t| \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } t \in \mathbb{R} \\ \text{y} \\ P_t = \rho^{-1}(t) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} d(P_t, A) = |\rho(P_t) - \rho(A)| = |\rho(\rho^{-1}(t)) - 0| = |t| \\ d(P_t, B) = |\rho(P_t) - \rho(B)| = |t - d(A, B)| \end{array} \right.$$

Unicidad de P_t

Sea $P' \in r$ tal que:

$$\left. \begin{array}{l} d(P', A) = |t| \\ d(P', B) = |t - d(A, B)| \end{array} \right\} \xrightarrow{\rho \text{ isom.}} \left\{ \begin{array}{l} |\rho(P')| = |t| \\ |\rho(P') - d(A, B)| = |t - d(A, B)| \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } t \in \mathbb{R} \\ \text{y} \\ P_t = \rho^{-1}(t) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} d(P_t, A) = |\rho(P_t) - \rho(A)| = |\rho(\rho^{-1}(t)) - 0| = |t| \\ d(P_t, B) = |\rho(P_t) - \rho(B)| = |t - d(A, B)| \end{array} \right.$$

Unicidad de P_t

Sea $P' \in r$ tal que:

$$\left\{ \begin{array}{l} d(P', A) = |t| \\ d(P', B) = |t - d(A, B)| \end{array} \right\} \xrightarrow{\rho \text{ isom.}} \left\{ \begin{array}{l} |\rho(P')| = |t| \\ |\rho(P') - d(A, B)| = |t - d(A, B)| \end{array} \right.$$

Única solución del sistema $\rho(P') = t$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } t \in \mathbb{R} \\ \text{y} \\ P_t = \rho^{-1}(t) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} d(P_t, A) = |\rho(P_t) - \rho(A)| = |\rho(\rho^{-1}(t)) - 0| = |t| \\ d(P_t, B) = |\rho(P_t) - \rho(B)| = |t - d(A, B)| \end{array} \right.$$

Unicidad de P_t

Sea $P' \in r$ tal que:

$$\left\{ \begin{array}{l} d(P', A) = |t| \\ d(P', B) = |t - d(A, B)| \end{array} \right\} \xrightarrow{\rho \text{ isom.}} \left\{ \begin{array}{l} |\rho(P')| = |t| \\ |\rho(P') - d(A, B)| = |t - d(A, B)| \end{array} \right.$$

Única solución del sistema $\rho(P') = t \xrightarrow{\rho \text{ biy.}} P' = P_t.$