

Numerične metode 2 - definicije, trditve in izreki

Oskar Vavtar
po predavanjih profesorice Marjetke Knez

2020/21

Kazalo

1	Teorija aproksimacije	3
2	Enakomerna aproksimacija zveznih funkcij s polinomi	5
3	Aproksimacija po metodi najmanjših kvadratov	7

1 Teorija aproksimacije

Definicija 1.1 (Aproksimacijska shema). Z X označimo (realni) vektorski prostor, katerega elemente želimo aproksimirati, $S \subseteq X$ označuje podprostor oz. podmnožico, v kateri iščemo aproksimant. *Aproksimacijska shema* je operator $\mathcal{A} : X \rightarrow S$, ki vsakemu elementu $f \in X$ priredi aproksimacijski element $\tilde{f} = \mathcal{A}f \in S$.

Definicija 1.2 (Optimalni aproksimacijski problem). Naj bo X vektorski prostor z normo $\|\bullet\|$, $S \subseteq X$. Za $f \in X$ iščemo $\tilde{f} \in S$, da je

$$\|f - \tilde{f}\| = \inf_{s \in S} \|f - s\| =: \text{dist}(f, S).$$

Definicija 1.3. Recimo, da je $S = S_n$, kjer je n dimenzija. Zanima nas, ali za $f \in X$ in $\tilde{f}_n \in S_n$ napaka $\|f - \tilde{f}_n\|$ konvergira proti 0, ko gre $n \rightarrow \infty$. Če je to res, je aproksimacijska shema *konvergentna*.

Če gledamo zaporedje podprostorov $S_n \subset X$, mora veljati, da z večanjem svobodnih parametrov postane S_n gost v X . Za polinome to sledi iz Weierstrassovega izreka.

Izrek 1 (Weierstrassov izrek). Naj bo $f \in \mathcal{C}([a, b])$ poljubna funkcija. Potem $\forall \varepsilon > 0$ obstaja polinom p , da je

$$\|f - p\|_{\infty, [a, b]} < \varepsilon.$$

Drugače povedano:

$$\text{dist}_{\infty}(f, \mathbb{P}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Definicija 1.4 (Bernsteinov polinom).

$$\mathcal{B}_n f(x) = \sum_{i=0}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot B_i^n(x),$$

kjer je B_i^n *Bernsteinov bazni polinom*:

$$B_i^n(x) := \binom{n}{i} x^i (1-x)^{n-i}, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

Da se pokazati, da gre $\|f - \mathcal{B}_f\|_{\infty, [0,1]} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Bernsteinov aproksimacijski polinom nam poda en možen način aproksimacije funkcije f (na $[0, 1]$).

Definicija 1.5 (Bernsteinov aproksimacijski operator).

$\mathcal{B}_n : \mathcal{C}([a, b]) \rightarrow \mathbb{P}_n$, $f \mapsto \mathcal{B}_n f$:

$$\mathcal{B}_n f(x) = \sum_{i=0}^n f\left(a + \frac{i}{n}(b-a)\right) \cdot B_i^n\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$$

$$\|f - \mathcal{B}_n f\|_{\infty, [a,b]} = \max_{x \in [a,b]} |f(x) - \mathcal{B}_n f(x)|$$

2 Enakomerna aproksimacija zveznih funkcij s polinomi

Problem 2.1. Za dano $f \in \mathcal{C}([a, b])$ iščemo polinom $p^* \in \mathbb{P}_n$, za katerega velja

$$\|f - p^*\|_{\infty, [a, b]} = \min_{p \in \mathbb{P}_n} \|f - p\|_{\infty, [a, b]} = \min_{p \in \mathbb{P}_n} \max_{x \in [a, b]} |f(x) - p(x)|.$$

Ta problem sodi pod optimalne aproksimacijske probleme. Polinom p^* imenujemo *polinom najboljše enakomerne aproksimacije*¹ za f na $[a, b]$. Problem je nelinearen.

Izrek 2. Naj bo $f \in \mathcal{C}([a, b])$. Če je polinom $p \in \mathbb{P}_n$ takšen, da *residual* $r = f - p$ doseže svojo normo $\|r\|_{\infty, [a, b]}$ alternirajoče v vsaj $n + 2$ točkah $x_i \in [a, b]$, $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{n+1} \leq b$, potem je p *p.n.e.a.* za f na $[a, b]$.

Natančneje: Če obstaja $n + 2$ točk $x_i \in [a, b]$, da je $\|r\|_{\infty, [a, b]} = |r(x_i)|$ za $i = 0, 1, \dots, n + 1$, in $r(x_i) \cdot r(x_{i+1}) < 0$ za $i = 0, 1, \dots, n$, potem je $p \in \mathbb{P}_n$ *p.n.e.a.* za f na $[a, b]$.

Definicija 2.1. Naj bo $E = \{x_i; a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{n+1} \leq b\}$. Definirajmo *minimaks* za f na E :

$$M_n(f, E) = \min_{p \in \mathbb{P}_n} \max_{x \in E} |f(x) - p(x)|$$

Polinom, pri katerem je ta minimum dosežen, imenujemo *p.n.e.a.* za f na množici E . Dobimo ga tako, da rešimo sistem linearnih enačb:

$$f(x_i) - p(x_i) = (-1)^i m, \quad i = 0, 1, \dots, n + 1$$

kjer so neznanke koeficienti polinoma p ter število m .²

¹Od tu naprej *p.n.e.a.*

²Imamo $n + 2$ enačb za $n + 2$ neznank.

Algoritem (Remesov postopek). Vhodni podatki: funkcija f , interval $[a, b]$, stopnja n , toleranca ε

Ponavljaj $k = 0, 1, 2, \dots$

1. Poišči polinom $p_k^* \in \mathbb{P}_n$, ki zadošča pogoju

$$f(x_i) - p_k^*(x_i) = (-1)^i m, \quad i = 0, 1, \dots, n+2$$

2. Poišči ekstrem residuala $r_k = f - p_k^*$, torej poišči $u \in [a, b]$, da bo

$$|r_k(u)| = \|r_k\|_{\infty, [a, b]}$$

3. Če je $|r_k(u)| - |m| < \varepsilon$, potem končaj in vrni $p^* = p_k^*$.

Opomba. Da se dokazati, da zaporedje polinomov, ki ga tvori Remesov postopek konvergira proti *p.n.e.a.* p^* . Hitrost konvergence je *linear*na.

3 Aproximacija po metodi najmanjših kvadratov

Definicija 3.1. Naj bo X vektorski prostor nad \mathbb{R} s skalarnim produktom $\langle \bullet, \bullet \rangle$, s kvadratno normo $\|\bullet\|_2 = \sqrt{\langle \bullet, \bullet \rangle}$. $S \subseteq X$ je končnodimenzijski podprostor v X , definiran kot

$$S = \mathcal{L}in\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}, \quad \dim S = n.$$

Za izbran $f \in X$ iščemo $f^* \in S$, da velja

$$\|f - f^*\|_2 = \min_{s \in S} \|f - s\|_2.$$

f^* imenujemo *element najboljše aproksimacije po metodi najmanjših kvadratov*.³

Izrek 3. Naj bo $S \subseteq X$. Element $f^* \in S$ je element najboljše aproksimacije po MNK za $f \in X$ natanko tedaj, ko je $f - f^* \perp S$.

Posledica. Iz izreka sledi konstrukcija. Naj bodo $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ baza podprostora S .

$$f^* = \sum_{j=1}^n \alpha_j \varphi_j,$$

$(\alpha_j)_{j=1}^n$ so neznani koeficienti. Veljati mora $f - f^* \perp S$, torej $f - f^* \perp \varphi_i$ $\forall i = 1, 2, \dots, n$. Na podlagi tega dobimo

$$\begin{bmatrix} \langle \varphi_1, \varphi_1 \rangle & \cdots & \langle \varphi_1, \varphi_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \varphi_n, \varphi_1 \rangle & \cdots & \langle \varphi_n, \varphi_n \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle f, \varphi_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle f, \varphi_n \rangle \end{bmatrix}.$$

Ta sistem enačb imenujemo *Gramov* oz. *normalni sistem*. Numerilno ta sistem rešimo z razcepom Choleskega. Levo matriko imenujemo *Gramova matrika*. Gramova matrika $G = (\langle \varphi_j, \varphi_i \rangle)_{i,j=1}^n$ je *simetrična pozitivno definitna* matrika.

³e.n.a. po MNK

Algoritem (Gram-Schmidt). Vhodni podatki: baza $\{\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n\}$.
 Izhod: Ortonormirana baza $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$.

```

for i = 1:n
     $\varphi_i = \psi_i$ 
end
for i = 1:n
     $\varphi_i = \frac{\varphi_i}{\|\varphi_i\|_2}$ 
    for j = i+1:n
         $\varphi_j = \varphi_j - \langle \varphi_j, \varphi_i \rangle \varphi_i$ 
    end
end
end

```