Verjetnost 1 - definicije, trditve in izreki Oskar Vavtar 2020/21

Kazalo

| 1 | \mathbf{DE} | FINICIJA VERJETNOSTI | 3 |
|---|---------------|-----------------------------------|---|
| | 1.1 | Neformalni uvod v verjetnost | 3 |
| | 1.2 | Aksiomična definicija verjetnosti | 3 |

1 DEFINICIJA VERJETNOSTI

1.1 Neformalni uvod v verjetnost

Definicija 1.1 (Verjetnost). Izvajamo poskus. Opazujemo določen pojav, ki ga imenujemo dogodek. Poskus ponovimo n - krat.

Definirajmo frekvenco dogodka $k_n(A)$ kot število ponovitev, pri katerih se dogodek zgodi.

Relativna frekvenca je definirana kot $f_n(A) = \frac{k_n(A)}{n}$. Zaporedje $\{f_n(A)\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergira k nekem številu $p \in [0, 1]$.

STATISTIČNA DEFINICIJA VERJETNOSTI je definirana kot

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{n \to \infty} \{ f_n(A) \}.$$

Klasična definicija verjetnosti je definirana kot

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{\it št. ugodnih izidov A}}{\text{\it št. vseh izidov A}}.$$

Če je izidov neskončno mnogo uporabimo geometrijsko definicijo verjetnosti.

1.2 Aksiomična definicija verjetnosti

Definicija 1.2. Imamo prostor vseh izidov oz. vzorčni prostor Ω . Dogodki so nekatere (ne nujno vse) podmnožice Ω .

Definicija 1.3 (Operacije na dogodkih).

1. VSOTA oz. UNIJA dogodkov:

$$A + B = A \cup B$$

je dogodek, ki se zgodi, če se zgodi vsaj eden od dogodkov A in B.

2. Produkt oz. Presek dogodkov:

$$A \cdot B = A \cap B$$

je dogodek, ki se zgodi, če se zgodita oba dogodka A in B hkrati.

3. Nasprotni dogodek oz. komplement dogodkov:

$$\bar{A} = A^C$$

je dogodek, ki se zgodi, če se dogodek A ne zgodi.

Opomba. Pravila za računanje z dogodki:

1. Idempotentnost:

$$A \cup A = A = A \cap A$$

2. Komutativnost:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

3. Asociativnost:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

4. Distributivnost:

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

5. de Morganova zakona:

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$$

$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$$

Še več:

$$\left(\bigcup_{i} A_{i}\right)^{C} = \bigcap_{i} A_{i}^{C}$$

$$\left(\bigcap_{i} A_{i}\right)^{C} = \bigcup_{i} A_{i}^{C}$$

$$\left(\bigcap_{i} A_{i}\right)^{C} = \bigcup_{i} A_{i}^{C}$$

Opomba. V splošnem ni vsaka podmnožica $A \subset \Omega$ dogodek.

Definicija 1.4 (σ -algebra). *Neprazna* družina podmnožic (dogodkov) \mathcal{F} v Ω je σ -algebra, če velja:

1. Zaprtost komponente:

$$A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^C \in \mathcal{F}$$

2. Zaprtost števne unije:

$$A_1, A_2, A_3, \ldots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$

Opomba. Če v (2) zahtevamo manj:

$$A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{F},$$

je \mathcal{F} algebra. V algebri imamo torej zaprtost za končne unije in končne preseke, medtem ko je σ -algebra zaprta celo za števne preseke.

Definicija 1.5. Naj bo \mathcal{F} σ -algebra, Ω vzorčni prostor. Verjetnostna mera na (\mathcal{F}, Ω) , je preslikava $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ za katero velja:

- 1. $\mathbb{P} \geq 0$, za $\forall A \in \mathbb{F}$
- 2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- 3. Za poljubne paroma nerazdružljive dogodke velja

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

Trojico $(\mathcal{F}, \Omega, \mathbb{P})$ imenujemo verjetnostni prostor.

Posledica (Posledice verjetnostnih aksiomov).

(a)
$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

Dokaz: v (3.) $vzamemo\ A_i = \emptyset$: $\mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset) + \dots$

(b) \mathbb{P} je končno aditivna, torej za končno mnogo paroma nerazdružljivih dogodkov velja:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup \ldots \cup A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \ldots + \mathbb{P}(A_n)$$

Dokaz:
$$v$$
 (3.) $vzamemo\ A_{n+1} = A_{n+2} = \ldots = \emptyset$ in uporabimo (a)

- (c) \mathbb{P} je monotona, torej $A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \subseteq \mathbb{P}(B)$ Še več: $A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$ **Dokaz:** ker je $B = A \cup (B - A)$, $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$, zaradi (b) velja $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B - A)$
- (d) $\mathbb{P}(A^C) = 1 \mathbb{P}(A)$ **Dokaz:** v (c) $vzamemo\ B = \Omega$
- (e) \mathbb{P} je zvezna:

(i)
$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \ldots \Rightarrow \mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

(ii)
$$B_1 \supseteq B_2 \supseteq B_3 \supseteq \ldots \Rightarrow \mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i) = \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(B_n)$$

Dokaz:

(i) Definiramo: $C_i = A_i \setminus A_{i-1}$ za $i = 2, 3, ..., C_1 = A_1$ Potem je $A_n = C_1 \cup ... \cup C_n$, $C_i \cap C_j = \emptyset$ za $i \neq j$, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i$ Torej je

$$\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(C_i) =$$

$$= \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(C_i) = \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{n} C_i) = \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

(ii) Ker je $B_1 \supseteq B_2 \supseteq B_3 \supseteq \ldots$, sledi $B_1^C \subseteq B_2^C \subseteq B_3^C \subseteq \ldots$ Po (i) je $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i^C) = \lim_{i \to \infty} \mathbb{P}(D_i^C)$, toda $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i^C = (\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i)^C$. Zato je $1 - \mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i) = \lim_{i \to \infty} (1 - \mathbb{P}(B_i))$, od koder sledi želena neenakost.