

Verjetnost z mero - definicije, trditve in izreki

Oskar Vavtar
po predavanjih profesorja Matija Vidmarja

2021/22

Kazalo

1	Merljivost in mera	3
1.1	Merljive množice	3
1.2	Mere	4
1.3	Merljive preslikave in generirane σ -algebre	6
1.4	Borelove množice na razširjeni realni osi $[-\infty, \infty]$ in Borelova merljivost numeričnih funkcij	9
1.5	Argumenti monotonega razreda	11
1.6	Lebesgue-Stieltjesova mera	13
2	Integracija na merljivih prostorih	15
2.1	Lebesgueov integral	15
2.2	Konvergenčni izreki s posledicami	17
3	Rezultati, ki se tičejo menjave vrstnega reda integracije	19
3.1	Nedoločena integracija in absolutna zveznost	21

1 Merljivost in mera

1.1 Merljive množice

Definicija 1.1. Naj bo $\mathcal{A} \subset 2^\Omega$ (t.j. $\mathcal{A} \in 2^{2^\Omega}$). Potem rečemo, da je \mathcal{A} *zaprta* za:

- c^Ω (t.j. za komplement v Ω)

$$\stackrel{\text{def}}{\iff} \quad \forall A : (A \in \Omega \Rightarrow \Omega \setminus A \in \mathcal{A});$$

- \cap (t.j. za preseke)

$$\stackrel{\text{def}}{\iff} \quad A_1 \cap A_2 \in \mathcal{A} \text{ brž ko je } \{A_1, A_2\} \subset \mathcal{A};$$

- \cup (t.j. za unije)

$$\stackrel{\text{def}}{\iff} \quad A_1 \cup A_2 \in \mathcal{A} \text{ brž ko je } \{A_1, A_2\} \subset \mathcal{A};$$

- \setminus (t.j. za razlike)

$$\stackrel{\text{def}}{\iff} \quad A_1 \setminus A_2 \in \mathcal{A} \text{ brž ko je } \{A_1, A_2\} \subset \mathcal{A};$$

- $\sigma\cap$ (t.j. za števne preseke)

$$\stackrel{\text{def}}{\iff} \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A} \text{ za vsako zaporedje } (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ iz } \mathcal{A};$$

- $\sigma\cup$ (t.j. za števne unije)

$$\stackrel{\text{def}}{\iff} \quad \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A} \text{ za vsako zaporedje } (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ iz } \mathcal{A}.$$

Definicija 1.2. \mathcal{A} je σ -algebra na Ω

$$\stackrel{\text{def}}{\iff} \quad (\Omega, \mathcal{A}) \text{ je merljiv prostor}$$

$$\stackrel{\text{def}}{\iff} \quad \emptyset \in \mathcal{A} \text{ in } \mathcal{A} \text{ je zaprt za } c^\Omega \text{ in za } \sigma\cup.$$

V primeru, da \mathcal{A} je σ -algebra na Ω :

- A je \mathcal{A} -merljiva $\stackrel{\text{def}}{\iff} A \in \mathcal{A}$;
- \mathcal{B} je pod- σ -algebra $\stackrel{\text{def}}{\iff} \mathcal{B}$ je σ -algebra na Ω in $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$.

Trditev 1.1. Naj bo $\mathcal{A} \subset 2^\Omega$ zaprta za \cap^Ω in naj bo $\emptyset \in \mathcal{A}$. Potem je \mathcal{A} σ -algebra na Ω , če je \mathcal{A} zaprta za števne preseke, in v tem primeru je \mathcal{A} zaprta za \cap , \cup in \setminus .

1.2 Mere

Definicija 1.3. Naj bo (Ω, \mathcal{F}) merljiv prostor in $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$. μ je *mera* na (Ω, \mathcal{F}) $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

- $\mu(\emptyset) = 0$;
- $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$ za vsako zaporedje $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ iz \mathcal{F} , ki sestoji iz paroma disjunktih dogodkov.

Lastnosti:

- Mera μ na (Ω, \mathcal{F}) je *končna* $\stackrel{\text{def}}{\iff} \mu(\Omega) < \infty$.
- Mera μ na (Ω, \mathcal{F}) je *verjetnostna*¹ $\stackrel{\text{def}}{\iff} \mu(\Omega) = 1$
- Mera μ na (Ω, \mathcal{F}) je *σ -končna* $\stackrel{\text{def}}{\iff}$ obstaja zaporedje $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ v \mathcal{F} , da je

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \Omega \quad \text{in} \\ \mu(A_n) < \infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ je prostor z mero $\stackrel{\text{def}}{\iff} \mu$ je mera na (Ω, \mathcal{F}) . Če je μ mera na (Ω, \mathcal{F}) potem je $\mu(\Omega)$ *masa* mere μ . Če je $A \in \mathcal{F}$, potem je:

- A je μ -zanemarljiv $\stackrel{\text{def}}{\iff} \mu(A) = 0$;

¹Tudi: μ je *verjetnost*.

- A je μ -trivialna $\stackrel{\text{def}}{\iff} A$ ali $\Omega \setminus A$ je μ -zanemarljiva

Če imamo poleg tega še lastnost $P(\omega)$ v $\omega \in A$, potem

- $P(\omega)$ drži μ -skoraj povsod (μ -s.p.) v $\omega \in A \stackrel{\text{def}}{\iff}$

$$A_{\neg P} := \{\omega \in \Omega \mid \neg P(\omega) \in \mathcal{F} \text{ in } \mu(A_{\neg P}) = 0\};$$

- $P(\omega)$ drži μ -skoraj gotovo (μ -s.g.) $\stackrel{\text{def}}{\iff} P(\omega)$ drži μ -skoraj povsod in μ je verjetnostna.

P drži μ -skoraj povsod na $A \stackrel{\text{def}}{\iff} P(\omega)$ drži μ -skoraj povsod v $\omega \in A$. Podobno za ostale.

Trditev 1.2. Naj bo μ mera na (Ω, \mathcal{F}) . Potem:

- (i) μ je aditivna:

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

za vsaki disjunktivni množici $A, B \in \mathcal{F}$.

- (ii) μ je monotona:

$$\mu(A) \leq \mu(B),$$

če je $A \subset B$ in $A, B \in \mathcal{F}$

- (iii) μ je zvezna od spodaj:

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \uparrow\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

za vsako zaporedje $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ iz \mathcal{F} , ki je nepadajoče glede na inkluzijo:
 $A_n \subset A_{n+1} \ \forall n \in \mathbb{N}$.

- (iv) μ je števno subaditivna:

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

za vsako zaporedje $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ iz \mathcal{F} .

(v) Naj bo μ končna:

$$\mu(\Omega \setminus A) = \mu(\Omega) - \mu(A) \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

Naprej, μ je zvezna od zgoraj:

$$\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \downarrow\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

za vsako zaporedje $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ iz \mathcal{F} , ki je nenaraščajoča glede na inkluzijo:
 $A_n \supset A_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

(vi) Za vsak $A \in \mathcal{F}$ je

$$\mathcal{F}|_A := \{B \cap A \mid B \in \mathcal{F}\}$$

σ -algebra na A in $\mu_A := \mu|_{\mathcal{F}|_A}$ je mera na $(A, \mathcal{F}|_A)$.

Definicija 1.4. $\mu_A := \mu|_{\mathcal{F}|_A}$ rečemo *mera μ zožana na A* oz. *zožitev μ na A* .

1.3 Merljive preslikave in generirane σ -algebre

Definicija 1.5. Naj bo $\mathcal{A} \subset 2^\Omega$:

$$\sigma_\Omega(\mathcal{A}) := \bigcap \{\mathcal{F} \in 2^{2^\Omega} \mid \mathcal{F} \text{ } \sigma\text{-algebra na } \Omega \text{ in } \mathcal{F} \supset \mathcal{A}\},$$

rečemo σ -algebra z \mathcal{A} na Ω . Če sta \mathcal{B}_1 in \mathcal{B}_2 obe σ -algebri na Ω , potem definiramo

$$\mathcal{B}_1 \vee \mathcal{B}_2 := \sigma_\Omega(\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2)$$

in ji rečemo skupek \mathcal{B}_1 in \mathcal{B}_2 . Bolj splošno, če imamo družino σ -algebr $(\mathcal{B}_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ na Ω , potem postavimo

$$\bigvee_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{B}_\lambda := \sigma_\Omega\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{B}_\lambda\right).$$

Definicija 1.6. Naj bo $f : \Omega \rightarrow \Omega'$. Če je dana σ -algebra \mathcal{F}' na Ω' , potem definiramo

$$\sigma^{\mathcal{F}'}(f) := \{f^{-1}(A) \mid A \in \mathcal{F}'\}.$$

Začetno strukturo f glede na \mathcal{F}' (tudi, σ -algebra generirana s f glede na \mathcal{F}'). Če je dana σ -algebra \mathcal{F} na Ω , potem definiramo

$$\sigma_{\mathcal{F}}^{\Omega'}(f) := \{A' \in 2^{\Omega'} \mid f^{-1}(A') \in \mathcal{F}\}$$

končno strukturo f na Ω' glede na \mathcal{F} . Če sta dani σ -algebri \mathcal{F} na Ω in σ -algebra \mathcal{F}' na Ω , potem rečemo: f je \mathcal{F}/\mathcal{F}' -merljiva $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

$$f^{-1}(A') \in \mathcal{F}, \quad \forall A' \in \mathcal{F}.$$

Definicija 1.7. Če je \mathcal{F} σ -algebra na Ω in je \mathcal{F}' σ -algebra na Ω' , potem označimo

$$\mathcal{F}/\mathcal{F}' := \{f \in \Omega'^{\Omega} \mid f \text{ je } \mathcal{F}/\mathcal{F}'\text{-merljiva}\}.$$

Definicija 1.8. Za $A \subset \Omega$ definiramo $\mathbb{1}_{A_{\Omega}} : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$,

$$\mathbb{1}_{A_{\Omega}}(x) := \begin{cases} 1; & x \in A, \\ 0; & x \notin A, \end{cases}, \quad x \in \Omega,$$

ki ji rečemo *indikatorska funkcija A na ambientnem prostoru Ω* .²

Trditev 1.3. Za σ -algebri $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$, kjer $f \in \mathcal{F}/\mathcal{G}$ in $g \in \mathcal{G}/\mathcal{H}$ je

$$g \circ f \in \mathcal{F}/\mathcal{H}.$$

Trditev 1.4. Naj bo $f : \Omega \rightarrow \Omega'$:

- (i) Za σ -algebro \mathcal{F}' na Ω' je $\sigma^{\mathcal{F}'}(f)$ σ -algebra na Ω ; ona je najmanjša (glede na inkluzijo) σ -algebra \mathcal{G} na Ω , da je $f \in \mathcal{G}/\mathcal{F}'$.
- (ii) Za σ -algebro \mathcal{F} na Ω je $\sigma_{\mathcal{F}}^{\Omega'}(f)$ σ -algebra na Ω' ; ona je največja (glede na inkluzijo) σ -algebra \mathcal{G}' na Ω , da je $f \in \mathcal{F}/\mathcal{G}'$.

²Ponavadi namesto $\mathbb{1}_{A_{\Omega}}$ pišemo le $\mathbb{1}_A$.

(iii) Za σ -algebro \mathcal{F} na Ω in σ -algebro \mathcal{F}' na Ω' je

$$f \in \mathcal{F}/\mathcal{F}' \iff \sigma^{\mathcal{F}'}(f) \subset \mathcal{F} \iff \mathcal{F}' \subset \sigma_{\mathcal{F}}^{\Omega'}(f).$$

(iv) Naj bo $\mathcal{A}' \subset 2^{\Omega'}$ ter \mathcal{F} σ -algebra na Ω . Potem je

$$f \in \mathcal{F}/\sigma_{\Omega'}(\mathcal{A}') \iff (f^{-1}(A') \in \mathcal{F}, \forall A' \in \mathcal{A}').$$

Velja tudi

$$\sigma^{\sigma_{\Omega'}(\mathcal{A}')} (f) = \sigma_{\Omega}(\{f^{-1}(A') \mid A' \in \mathcal{A}'\}).$$

Definicija 1.9. Sled \mathcal{A} na A definiramo kot

$$\mathcal{A}|_A := \{B \cap A \mid B \in \mathcal{A}\}.^3$$

Trditev 1.5 (Sledi komutirajo v generirani σ -algebri). Naj bo $\mathcal{A} \subset 2^{\Omega}$ in $A \subset \Omega$. Potem je

$$\sigma_A(\mathcal{A}|_A) = \sigma_{\Omega}(\mathcal{A})|_A.$$

Trditev 1.6. Naj bo $f : \Omega \rightarrow \Omega'$ in naj bo \mathcal{F} σ -algebra na Ω ter \mathcal{F}' σ -algebra na Ω' .

(i) Če je $A' \subset \Omega'$ in $f : \Omega \rightarrow A'$, potem je

$$f \in \mathcal{F}/\mathcal{F}' \iff f \in \mathcal{F}/(\mathcal{F}'|_{A'}).$$

(ii) Če je $A \in \Omega$ in $f \in \mathcal{F}/\mathcal{F}'$, potem

$$f|_A \in (\mathcal{F}|_A)/\mathcal{F}'.$$

(iii) Če je $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ zaporedje v \mathcal{F} in $\Omega = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ in je $f|_{A_i} \in (\mathcal{F}|_{A_i})/\mathcal{F}'$ $\forall i \in \mathbb{N}$, potem je

$$f \in \mathcal{F}/\mathcal{F}'$$

.

³Zapis je isti kot za zožitev, vendar ne pomeni isto.

1.4 Borelove množice na razširjeni realni osi $[-\infty, \infty]$ in Borelova merljivost numeričnih funkcij

Definicija 1.10. Definirajmo *razširjeno realno os*:

$$\begin{aligned} [-\infty, \infty] &:= \mathbb{R} \cup \{\infty\} \cup \{-\infty\} \\ [-\infty, a] &:= \{-\infty\} \cup (-\infty, a] \quad \text{za } a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \end{aligned}$$

Relacijo \leq na \mathbb{R} razširimo na $[-\infty, \infty]$ kot sledi:

$$-\infty \leq x \leq \infty \quad \forall x \in [-\infty, \infty].$$

Temu ustrezno imamo “($<$) := (\leq) \ ($=$)”, itd.

Definicija 1.11. Borelovo σ -algebro na $[-\infty, \infty]$ definiramo kot

$$\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]} := \sigma_{[-\infty, \infty]}(\{[-\infty, a] \mid a \in \mathbb{R}\}).$$

Za $A \subset [-\infty, \infty]$ je

$$\mathcal{B}_A := \mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}|_A$$

Borelova σ -algebra na A . Elementom Borelovih σ -algebr pravimo *Borelove množice*.

Definicija 1.12. Funkcija f je *numerična*, če je $\mathcal{Z}_f \in [-\infty, \infty]$.

Definicija 1.13. Če je funkcija f numerična:

- $\sigma(f) := \sigma^{\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}}(f)$;
- če je \mathcal{F} σ -algebra na domeni f , je f \mathcal{F} -merljiva $\stackrel{\text{def}}{\iff} f$ je $\mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$ -merljiva;
- če je $g : \mathcal{D}_f \rightarrow [-\infty, \infty]$, je

$$\begin{aligned} g \wedge f &:= \min\{g, f\}^4 \\ g \vee f &:= \max\{g, f\}. \end{aligned}$$

Definiramo *pozitivni* in *negativni del* f :

$$\begin{aligned} f^+ &:= f \vee 0 \\ f^- &:= (-f) \vee 0 \end{aligned}$$

Opomba.

- $f = f^+ - f^-$
- $|f| = f^+ + f^-$

Definicija 1.14. Dogovorimo se

$$\begin{aligned} 0 \cdot (\pm\infty) &:= 0 =: (\pm\infty) \cdot 0 \\ \infty + (-\infty) &:= 0 =: (-\infty) + \infty. \end{aligned}$$

Preostanek aritmetike na $[-\infty, \infty]$ definiramo na naraven način, npr.

$$\begin{aligned} a \cdot \infty &:= \operatorname{sgn}(a) \cdot \infty \quad \text{za } a \in [-\infty, \infty] \setminus \{0\} \\ a + \infty &:= \infty \quad \text{za } a \in (-\infty, \infty] \\ \infty - \infty &:= \infty + (-\infty) = 0 \\ &itd. \end{aligned}$$

Trditev 1.7. Če je $A \subset [-\infty, \infty]$ in je $f : A \rightarrow [-\infty, \infty]$ zvezna, potem je $f \in \mathcal{B}_A/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$. Če je $\{f, g\} \subset \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$ za σ -algebro \mathcal{F} , potem je

$$\{f + g, f \cdot g\} \subset \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$$

in

$$\{\{f \leq g\}, \{f = g\}, \{f < g\}\} \subset \mathcal{F}$$

.

Trditev 1.8. Naj bo \mathcal{F} σ -algebra in $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zaporedje v $\mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$. Potem je

$$\{\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n, \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n\} \subset \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}.$$

Če je $f_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$, potem je

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[0, \infty]}.$$

Definicija 1.15. Naj bo \mathcal{F} σ -algebra. Za $\{f, g\} \subset \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$ je

$$\{f \vee g, f \wedge g, f^+, f^-, |f|\} \subset \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}.$$

Za zaporedje $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ v $\mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$ je

$$\{\{f_n \text{ konverg.}, \text{ ko } n \rightarrow \infty\}, \{f_n \text{ konverg. v } \mathbb{R}, \text{ ko } n \rightarrow \infty\}, \{\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f_\infty\}\} \subset \mathcal{F}.$$

1.5 Argumenti monotonega razreda

Definicija 1.16. Naj bo \mathcal{F} σ -algebra na Ω in $f : \Omega \rightarrow [0, \infty)$:

$$f \text{ je } \mathcal{F}\text{-enostavna} \stackrel{\text{def}}{\iff} f \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[0, \infty)} \text{ in } \mathcal{Z}_f \text{ je končna.}$$

Trditev 1.9. Naj bo (Ω, \mathcal{F}) merljiv prostor in $f : \Omega \rightarrow [0, \infty]$. Potem je f \mathcal{F} -enostavna \iff

$$f = \sum_{i=1}^n c_i \mathbb{1}_{A_i},$$

za neke $c_i, i \in [n]$, iz $[0, \infty)$, neke $A_i, i \in [n]$, iz \mathcal{F} in nek $n \in \mathbb{N}$. Naprej; če je $f \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[0, \infty]}$, potem je

$$((2^{-n} \lfloor 2^n f \rfloor) \wedge n)_{n \in \mathbb{N}}$$

zaporedje \mathcal{F} -enostavnih funkcij, ki ne padajo k f (celo enakomerno na vsaki množici na kateri je f omejena).

Posledica (Izrek o monotonem razredu). Naj bo \mathcal{F} σ -algebra na Ω in $\mathcal{M} \subset \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[0, \infty]}$. Če je

$$\mathbb{1}_A \in \mathcal{M} \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

in je \mathcal{M} zaprta za nenegativne linearne kombinacije (je stožec)⁵ in je \mathcal{M}

⁵Pomeni:

$$\{m_1, m_2\} \subset \mathcal{M}, \{c_1, c_2\} \subset (0, \infty) \Rightarrow c_1 m_1 + c_2 m_2 \in \mathcal{M}$$

zaprta za nepadajoče limite⁶ potem je

$$\mathcal{M} = \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[0,\infty]}.$$

Trditev 1.10 (Doob-Dynkinova faktorizacijska lema). Naj bo $X : \Omega \rightarrow A$, (A, \mathcal{A}) merljiv prostor. Potem je

$$Y \in \sigma^{\mathcal{A}}(X)/\mathcal{B}_{[-\infty,\infty]} \iff \exists h \in \mathcal{A}/\mathcal{B}_{[-\infty,\infty]}, \text{ da je } Y = h \circ X = h(X).$$

Definicija 1.17. Naj bo $\mathcal{D} \subset 2^\Omega$. \mathcal{D} je Dynkinov sistem (tudi λ -sistem) na $\Omega \xLeftrightarrow{\text{def}}$

- $\Omega \in \mathcal{D}$,
- $B \setminus A \in \mathcal{D}$ brž ko je $\mathcal{D} \ni A \subset B \in \mathcal{D}$,
- če je $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ je nepadajoče zaporedje v \mathcal{D} je tudi $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{D}$.

\mathcal{D} je π -sistem $\xLeftrightarrow{\text{def}}$ \mathcal{D} je zaprt za \cap .

Trditev 1.11. Naj bo $\mathcal{D} \subset 2^\Omega$. Potem je \mathcal{D} Dynkinov sistem \iff

- $\Omega \in \mathcal{D}$,
- \mathcal{D} zaprta za c^Ω ,
- $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ zaporedje iz \mathcal{D} , $A_i \cap A_j = \emptyset$ za $i \neq j$ iz $\mathbb{N} \implies \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{D}$.

\mathcal{D} je σ -algebra na $\Omega \iff \mathcal{D}$ je λ -sistem na Ω in π -sistem.

Definicija 1.18. Za $\mathcal{L} \subset 2^\Omega$ postavimo

$$\lambda_\Omega(\mathcal{L}) := \bigcap \{ \mathcal{D} \in 2^{2^\Omega} \mid \mathcal{D} \text{ je } \lambda\text{-sistem in } \mathcal{D} \supset \mathcal{L} \}.$$

⁶Pomeni: $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nepadajoče zaporedje iz \mathcal{M} , potem je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \in \mathcal{M}$$

Trditev 1.12. Naj bo \mathcal{L} π -sistem in $\mathcal{L} \subset 2^\Omega$. Potem je

$$\lambda_\Omega(\mathcal{L}) = \sigma_\Omega(\mathcal{L}).$$

Posledica (π - λ izrek/Dynkinova lema). Naj bo \mathcal{L} π -sistem in \mathcal{D} λ -sistem na Ω , $\mathcal{L} \subset \mathcal{D}$. Potem je

$$\sigma_\Omega(\mathcal{L}) \subset \mathcal{D}.$$

Trditev 1.13. Naj bosta μ, ν meri na merljivem prostoru (E, \mathcal{E}) , $\mathcal{L} \subset \mathcal{E}$ π -sistem, $\sigma_E(\mathcal{L}) = \mathcal{E}$. Predpostavimo, da je $\mu|_{\mathcal{L}} = \nu|_{\mathcal{L}}$ in da obstaja zaporedje $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ iz \mathcal{L} , ki je nepadajoče ali sestoji iz paroma disjunktnih množic, in za katerega je

- $\mu(L_n) = \nu(L_n) < \infty$,
- $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} L_n = E$.

Potem je

$$\mu = \nu$$

.

1.6 Lebesgue-Stieltjesova mera

Izrek 1.1 (Lebesgue-Stieltjesov izrek). Naj bo $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, nepadajoča in zvezna z desne (*ca'd*). Potem obstaja natanko ena mera μ na $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, da je

$$\mu([a, b]) = F(b) - F(a) \quad \forall a \leq b \in \mathbb{R}.$$

Definicija 1.19. μ iz prejšnjega izreka rečemo *mera prirejena F v Lebesgue-Stieltjesovem smislu* in jo označimo z dF . V posebne primernu primeru, ko je $F = \text{id}_{\mathbb{R}}$ ji rečemo *Lebesgueva mera* in jo označimo

$$\mathcal{L} := d(\text{id}_{\mathbb{R}}).$$

Trditev 1.14. Naj bo $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ *ca'd*, nepadajoča. Potem je dF :

- σ -končna \iff je F omejena:

$$dF(\mathbb{R}) = \lim_{n \rightarrow \infty} dF((-n, n])$$

- verjetnostna $\iff \lim_{\infty} F - \lim_{-\infty} F = 1$.

Za $x \in \mathbb{R}$ je

$$dF(\{x\}) = F(x) - F(x^-),$$

$$\{x\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (x - \frac{1}{n}, x].$$

2 Integracija na merljivih prostorih

2.1 Lebesgueov integral

Definicija 2.1. Naj bo $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ prostor z mero $f \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$.

(a) Za f , ki je \mathcal{F} -enostavna postavimo

$$\int f d\mu := \sum_{a \in \mathcal{Z}_f} d\mu(\{f = a\}) = \sum_{a \in \mathcal{Z}_f} d\mu(f^{-1}(\{a\})).$$

(b) Za $f \geq 0$, ki ni \mathcal{F} -enostavna postavimo

$$\int f d\mu := \sup\left\{\int g d\mu \mid g \leq f, g \text{ } \mathcal{F}\text{-enostavna}\right\}.$$

(c) Za $\neg(f \geq 0)$, ki ni \mathcal{F} -enostavna postavimo

$$\int f d\mu := \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu.$$

Dogovor.

$$\mu[f] = \mu^x[f(x)] := \int f(x) \mu(dx) := \int f d\mu$$

Če je še $A \in \mathcal{F}$, potem označimo še

$$\mu[f; A] := \mu^x[f(x); x \in A] := \int_A f(x) \mu(dx) := \int_A f d\mu := \int f \mathbb{1}_A d\mu.$$

Integral f proti μ je *dobro definiran* $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

$$\int f^+ d\mu \wedge \int f^- d\mu < \infty;$$

f je μ -integrabilna $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

$$\int f^+ d\mu \vee \int f^- d\mu < \infty.$$

Definicija 2.2. Naj bo $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ prostor z mero:

$$\mathcal{L}^1(\mu) := \{f \in \mathcal{F}/\mathcal{B} \mid f \text{ je } \mu\text{-integrabilna}\}.$$

Za $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ z $\{\Re(g), \Im(g)\} \subset \mathcal{L}^1(\mu)$ je

$$\int g \, d\mu := \int \Re(g) \, d\mu + i \int \Im(g) \, d\mu.$$

Izrek 2.1. Naj bo $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ prostor z mero. Integral ima naslednje lastnosti:

(i) Aditivnost:

$$\int f + g \, d\mu = \int f \, d\mu + \int g \, d\mu,$$

za $\{f, g\} \subset \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$ z $\mu[f^-] \vee \mu[g^-] < \infty$

(ii) Integral indikatorja:

$$\int \mathbb{1}_A \, d\mu = \mu(A), \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

V posebnem primeru je $\mu[0] = 0$ in torej $\mu[f^+] - \mu[f^-] = \mu[f] \, \forall f \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$.

(iii) Integrali, ki so 0 in so končni:

za $f \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[0, \infty]}$:

- $\mu[f] = 0 \iff f = 0 \text{ s.p.-}\mu$
- $\mu[f] < \infty \implies f < \infty \text{ s.p.-}\mu.$

(iv) Trikotniška neenakost:

$$\left| \int f \, d\mu \right| \leq \int |f| \, d\mu, \quad \forall f \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}.$$

(v) Integral “ne vidi” množic z mero 0:

če je $\{f, g\} \subset \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$ in je $f = g$ s.p.- μ , potem je $\mu[f] = \mu[g]$ in je $\mu[f]$ d.d. $\iff \mu[g]$ je d.d.

(vi) Monotonost: če je $\{f, g\} \subset \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$, $g \leq f$ in $\mu[g^-] < \infty$, potem je

$$\int g \, d\mu \leq \int f \, d\mu.$$

(vii) Homogenost:

$$\int cf \, d\mu = c \int f \, d\mu$$

za vse $f \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$ za katere je $\mu[cf^-] \wedge \mu[cf^+] < \infty$, za $\forall c \in [-\infty, \infty]$.

Vsi integrali v (i),(ii),(iii),(vi) so d.d. Enako velja za (vii), razen, ko je $c = 0$ in $\mu[f^+] = \mu[f^-] = \infty$.

Trditev 2.1. Naj bosta $a \leq b$ realni števili in $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Če je f zvezna, potem je \mathcal{L} -integrabilna in

$$\int_{[a, b]} f \, d\mathcal{L} = \int_a^b f(x) \, dx.$$

2.2 Konvergenčni izreki s posledicami

Izrek 2.2. Naj bo $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ prostor z mero in $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zaporedje iz $\mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$.

(i) Naj bo $g \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[0, \infty]}$ z $\mu[g] < \infty$ in $f_n^- \leq g \, \forall n \in \mathbb{N}$. Potem velja:

(a) Polzveznost od spodaj (Fatou):

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu$$

(b) Monotona konvergenca (Lévy):

$$\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu = \uparrow - \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu$$

(ii) Naj bo $g \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[0, \infty]}$ μ -integrabilna z $|f_n| \leq g \, \forall n \in \mathbb{N}$. Potem velja dominirana konvergenca (Lebesgue):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - \lim_{m \rightarrow \infty} f_m| \, d\mu = 0$$

in v posebnem je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu,$$

če seveda $\exists \lim_{m \rightarrow \infty} f_m$ (povsod).

Posledica. Naj bo $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ prostor z mero in $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zaporedje iz $\mathcal{F}/\mathcal{B}_{[0, \infty]}$. Potem je

$$\int \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n d\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \int f_n d\mu,$$

kjer so integrali d.d.

Posledica. Naj bo $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zaporedje mer na merljivem prostoru (Ω, \mathcal{F}) . Potem je $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_n$ mera na (Ω, \mathcal{F}) :

$$\left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_n \right) (A) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_n(A), \quad A \in \mathcal{F}.$$

Poleg tega je za $\forall f \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$:

$$\int f d\left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_n\right) \text{ je d.d.} \iff \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \int f^+ d\mu_n \right) \wedge \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \int f^- d\mu_n \right) < \infty$$

in tedaj je

$$\int f d\left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \int f d\mu_n.$$

Definicija 2.3. Naj bo $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ porostor z mero, (Ω', \mathcal{F}') merljiv prostor, $f \in \mathcal{F}/\mathcal{F}'$. Potem definiramo

$$f *_{\mathcal{F}'} \mu \quad \text{oz.} \quad \mu \circ_{\mathcal{F}'} f^{-1} \quad \text{oz.} \quad \mu_{f_{\mathcal{F}'}}$$

kot preslikavo $f *_{\mathcal{F}'} \mu : \mathcal{F}' \rightarrow [0, \infty]$, dano s predpisom

$$(f *_{\mathcal{F}'} \mu)(A') := \mu(f^{-1}(A')), \quad A' \in \mathcal{F}'.$$

To preslikavo imenujemo *potisk mere μ naprej pod f glede na \mathcal{F}'* . Če je μ verjetnostna, rečemo temu *porazdelitev*.

Posledica (Izrek o sliki mer). Naj bo $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ prostor z mero, (Ω', \mathcal{F}') merljiv prostor, $f \in \mathcal{F}/\mathcal{F}'$. Potem je $f * \mu$ mera na \mathcal{F}' , verjetnostna, če je μ verjetnostna. Če je $g \in \mathcal{F}'/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$, je

$$\int g d(f * \mu) = \int g \circ f d\mu,$$

pri čemer je integral na levi d.d. \iff je to res za integral na desni.

Posledica (Odvajanje pod integralnim znakom). Naj bo $(\mathcal{X}, \Sigma, \mu)$ prostor z mero, \mathcal{O} odprt v \mathbb{R} . $F : \mathcal{X} \times \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ in naj velja:

- $\forall t \in \mathcal{O}$ je $\mathcal{F}(\cdot, t) \in \mathcal{L}^1(\mu)$;
- $\forall x \in \mathcal{X}$ je $\mathcal{F}(x, \cdot)$ odvedljiva.

Naj naprej $\exists g \in \Sigma/\mathcal{B}_{[0, \infty]}$ z $\mu[g] < \infty$ tako, da je

$$\left| \frac{\partial F}{\partial t}(x, t) \right| \leq g(x), \quad \forall (x, t) \in \mathcal{X} \times \mathcal{O}.$$

Potem velja:

- (a) $\forall t \in \mathcal{O}$ je $(\mathcal{X} \ni x \mapsto \frac{\partial F}{\partial t}(x, t)) \in \mathcal{L}^1(\mu)$;
- (b) $(\mathcal{O} \ni t \mapsto \int F(x, t) \mu(dx))$ je odvedljiva;
- (c) $t \in \mathcal{O}$:

$$\frac{d}{dt} \int F(x, t) \mu(dx) = \int \frac{\partial F}{\partial t}(x, t) \mu(dx).$$

3 Rezultati, ki se tičejo menjave vrstnega reda integracije

Definicija 3.1. Naj bosta (Ω, \mathcal{F}) in (Ω', \mathcal{F}') merljiva prostora. Potem definiramo

$$\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}' := \sigma_{\Omega \times \Omega'}(\{A \times A' \mid (A, A') \in \mathcal{F} \times \mathcal{F}'\}),$$

in ji rečemo *produktna σ -algebra \mathcal{F} in \mathcal{F}'* .

Trditev 3.1. Če je $A \subset \mathbb{R}^2$ in $f : A \rightarrow [-\infty, \infty]$ zvezna, potem je

$$f \in \mathcal{B}_A/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}.$$

Trditev 3.2. Naj bosta (Ω, \mathcal{F}) in (Ω', \mathcal{F}') merljiva prostora. Potem je $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$ najmanjša (glede na inkluzijo) σ -algebra na $\Omega \times \Omega'$ glede na katero sta merljivi kanonični projekciji, tj. $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$ je najmanjša σ -algebra \mathcal{G} na $\Omega \times \Omega'$, da je:

- $(\Omega \times \Omega' \ni (\omega, \omega') \mapsto \omega) \in \mathcal{G}/\mathcal{F}$;
- $(\Omega \times \Omega' \ni (\omega, \omega') \mapsto \omega') \in \mathcal{G}/\mathcal{F}'$.

Naprej, če je $f \in \mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$, potem je $f(\omega, \cdot) \in \mathcal{F}'/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$, $\forall \omega \in \Omega$ in $f(\cdot, \omega') \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$, $\forall \omega' \in \Omega'$. Obratno, naj bo (G, \mathcal{G}) merljiv prostor; potem je

$$(f, f') \in \mathcal{G}/\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}' \iff f \in \mathcal{G}/\mathcal{F} \text{ in } f' \in \mathcal{G}/\mathcal{F}'.$$

Izrek 3.1. Naj bosta $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ in $(\Omega', \mathcal{F}', \mu')$ prostora z mero, μ in μ' σ -končni.

- (i) Obstaja natanko ena mera ν na $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$, ki jo označimo $\mu \times \mu'$, za katero velja

$$\nu(A \times A') = \mu(A)\mu'(A'), \quad \forall (A, A') \in \mathcal{F} \times \mathcal{F}'.$$

- (ii) Naj bo $f \in (\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}')/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$ in naj velja

- (a) $f \geq 0$ (*Tonelli*) ali
- (b) $\int |f| d(\mu \times \mu') < \infty$ (*Fubini*) ali
- (c) $\iint f^-(\omega, \omega') \mu(d\omega) \mu'(d\omega') \wedge \iint f^-(\omega, \omega') \mu'(d\omega') \mu(d\omega) < \infty$

Potem je

- $(\Omega' \ni \omega' \mapsto \int f(\omega, \omega') \mu(d\omega)) \in \mathcal{F}'/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$;
- $(\Omega \ni \omega \mapsto \int f(\omega, \omega') \mu'(d\omega')) \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$;
- $\int f^-(\omega, \omega') \mu(d\omega) < \infty$ s.p.- μ' v ω' ;
- $\int f^-(\omega, \omega') \mu'(d\omega') < \infty$ s.p.- μ v ω ;

in

$$\begin{aligned} \int f d(\mu \times \mu') &= \iint f(\omega, \omega') \mu(d\omega) \mu'(d\omega') \\ &= \iint f(\omega, \omega') \mu'(d\omega') \mu(d\omega). \end{aligned}$$

Vsi zunanji integrali zgoraj so d.d.

Definicija 3.2. Notacijo $\mu \times \mu'$ zadržimo, $\mu \times \mu'$ rečemo *produkt μ in μ'* .

Trditev 3.3. $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ prostor z mero, (Ω', \mathcal{F}') merljiv prostor, $X \in \mathcal{F}/\mathcal{F}'$, (A, \mathcal{A}) še en merljiv prostor, da je

$$D_A := \{(x, x) \mid x \in A\} \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{A}$$

in $\{f, g\} \subset \mathcal{F}'/\mathcal{A}$. Potem je $f(X) = g(X)$ s.p.- $\mu \iff f = g$ s.p.- $X_*\mu$.

3.1 Nedoločena integracija in absolutna zveznost

Definicija 3.3. Naj bosta $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ prostor z mero, $f \in \mathcal{F}'/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$ in naj bo integral f pod μ d.d. Potem preslikavi

$$f \cdot \mu := \left(\mathcal{F} \in A \mapsto \int_A f d\mu \right)$$

rečemo *nedoločeni integral f proti μ* ⁷, ali tudi *μ -nedoločeni integral f* .

Definicija 3.4. Naj bosta μ in ν dve meri na merljivem prostoru (Ω, \mathcal{F}) . μ je absolutno zvezna glede na ν (pišemo $\mu \ll \nu$) $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

$$\nu(A) = 0 \Rightarrow \mu(A) = 0, \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

μ je ekvivalentna ν , (pišemo $\mu \sim \nu$) $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

$$\mu \ll \nu \quad \text{in} \quad \nu \ll \mu.$$

Trditev 3.4. Naj bo $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ prostor z mero in $f \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[0, \infty]}$. Potem je $f \cdot \mu$ mera, ki je absolutno zvezna glede na μ ; naprej

$$\int g d(f \cdot \mu) = \int g f(d\mu)$$

za vse $g \in \mathcal{F}/\mathcal{B}_{[-\infty, \infty]}$, pri čemer je integral na levi d.d. \iff je integral na desni d.d. in v slednjem primeru je

$$g \cdot (f \cdot \mu) = (gf) \cdot \mu.$$

Če je $f > 0$ s.p.- μ , potem je $f \cdot \mu \sim \mu$.

⁷Beri: glede na μ .