

Gurbanguly  
Berdimuhamedow

# Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri





Gurbanguly  
Berdimuhamedow

# Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri

## III

Türkmen döwlet neşirýat gullugy  
Aşgabat – 2012





## GADYRLY OKYJYLAR!

Türkmen topragymyzyň melhemler hazynalarynyň naýbaşylarynyň biri bolan, adam saglygyna peýdaly, jana tenekar dermanlyk ösümlikleriniň 3-nji jiltini öz mähriban halkyma bagyş edýärim.

Allanyň nazar salmagy netijesinde, türkmen tebigatynda hiç bir zat bilen çalşyp bolmajak ençeme dermanlyk ösümlikleri ösýär. Klimat şertlerine garamazdan, Türkmenistanyň ösümlük dünýäsi örän baýdyr we olar dürli-dürlüdür. Dermanlyk ösümliklerine ýurdumyzyň daglyk sebitleri, esasan hem Köpetdag has-da baýdyr. Onda ýabany bitýän derman ösümlikleriniň 1600-den gowrak görnüşi ösüp, olardan 330-a golaýy endemikdir, ýagny dünýäniň hiç bir ýerinde duşmaýan, diňe şol ýerde ösýän derman ösümlikleridir.

Türkmen halk lukmançylygynda peýdalanylýan derman ösümliklerini hemme taraplaýyn ygtybarly öwrenmeklige täze Galkynyş we beýik özgertmeler zamanasynda has-da giň ýol açyldy. Şol sebäpli-de ata-babalarymyzyň asyrlar boýy sünnäläp türkmeniň milli gymmatlygyna ýetirilen halk lukmançylygynda ulanylýan derman ösümlikleri barasyndaky döp-dessurlaryny we dürli tärlerini ylmy esasyda öwrenip, men olar barada häzirki zaman lukmançylygynyň dünýä tejribesinde gazanylanlaryny üstüne goşmak bilen, köklerini gadymyýetden alyp gaýdýan türkmeniň dermanlyk ösümlikleri bilen baglanyşykly ylmy sungatyny, olaryň melhemlik namalaryny «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabymyň 1-nji we 2-nji jiltleriniň üsti bilen türkmen halkyma ýetiripdim. Kitabyň 3-nji jiltinde bolsa milli lukmançylyk mirasy, şol sanda onuň bilen baglanyşykly türkmen diýarymyzda ösýän dermanlyk ösümlükler dünýäsindäki seýrek duş gelýän endemik, reliket we ýitip gitmek howpy abanýan görnüşleriniň melhemlik häsiýetleri, olary ekip ýetişdirmek baradaky tärlerini öňe sürýärim. Şeýle-de şol dermanlyk ösümlikleriň gelip çykyşy barasyndaky rowaýatlardyr hekaýatlar barada giňişleýin maglumat berýärim.

Kitabyň esasy maksady lukmançylyk ulgamynyň işgärlerine, dermanlyk çig mallary taýýarlaýanlara, ýygnaýjylara we ösümlük dünýäsi bilen iş alyp barýan ähli adamlara, dermanlyk ösümlükler barada öz bilimleriniň üstüni ýetirmek, olaryň daşky gurluşy, ösüş şertleri, himiki düzümi, lukmançylyk amalyýetinde peýdalanylyşy hem taryhy, ýygnamaklygyň möhleti hem-de usullary, saklamaklygyň düzgünleri baradaky maglumatlary giňeltmekden ybaratdyr.

Derman ösümliklerini öwrenmekligiň taryhyna degişli maglumatlarda türkmen topraгыnda ýaşan belli tebipler we alymlar bolan Abu Ali ibn Sinanyň, Abu Reýhan Birunyň, Seýit Ysmaýyl Gürgenliniň, Muhammet Gaýmaz Türkmeniň we Muhammet Huseýniň nusgawy eserlerinde häzirki Türkmenistanyň çäklerinde ösýän derman ösümlikleri baradaky berilýän maglumatlary has gymmatlydyr hem-de guwandryjydyr.

Türkmen lukmançylygynyň milli mirasynyň köklerini goýup giden beýik şahsyýetleriň ömrüni, hünär döredijiligini, ylmy mirasyny öwrenmek biziň nesillerimiziň mukaddes borjudur. Biziň milli lukmançylyk mirasymyz müdimidir, ol asyrlar boýy ýaşap, şu günki günümize şuglasyny gaýgyrman saçar.

Dünýä tejribesinde ilkinji gezek milli äheňde ylmy lukmançylyk sungatyna düýpleýin çuň çemeleşen «Türkmenistanyň derman ösümlikleri» atly eserlerim meniň türkmen halkym üçin lukman kalbymdan joşup çykan namamdyr.

Gadyrly okyjylar! Bu kitabym hem sizi Türkmenistanyň ajaýyp tebigatyna, ösümlük dünýäsiniň adamlara we onuň saglygyna möhümdigine has oňat düşünmäge kömek eder diýip umyt edýärim! Goý, siziň hemişe janyňyz sag bolsun!



**Gurbanguly Berdimuhamedow,**  
*lukmançylyk ylmylarynyň doktory, professor*



TÜRKMENISTANYŇ SAGLYGY GORAYYŞY WE DÄRMAN SENAGATY MINISTRLIGI

# **TÄZE GALKYNYŞLAR WE BEÝIK ÖZGERTMELER ZAMANASYNDA TÜRKMENISTANYŇ SAGLYGY GORAÝYŞ ULGAMY ÖSÜŞINI DOWAM EDÝÄR**

Özüniň 20 ýyllyk şanly toýuny bellän Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzda ynsan saglygy döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň arasynda öňdäki orunlaryň birini eýeleýär. “Saglyk” döwlet maksatnamamyz ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek, ony düýpli özgertmek ýolunda biziň şu günki we ertirki maksatlarymyzy kesgitleýär.

Galkynyşlar zamanamyzda paýtagtymyzda çar ýanyňy gurşap alan, halkymyzyň amatly, rahat durmuşda ýaşamagy üçin gurlan dünýä ülnülerine gabat gelýän ajaýyp ýaşaýyş jaýlarydyr öndürijilikli zähmet çekmek üçin ähli mümkinçilikler döredilen edara-kärhanalaryň kaşaň binalary guwanjymyzy goşalandyrýar. Ak şäherimiz Aşgabatda bina edilen ajaýyplyklary sanasaň sogaby bar. Biz bu gün şol üstünlikli geçilen menzile ser salanymyzda, eziz Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň dünýä döwletleriniň arasyndaky at-abraýyny galdyrmakda näderejede kämil ýoly saýlap alandygyna şaýat bolýarys. Iň esasy mesele bolsa, döwletiň baş baýlygy bolan halkymyzyň saglygy, onuň nesilleriniň geljegi, halkymyzyň hemişe bolelin durmuşda ýaşamagy hakyndaky aladalarydyr. Şol maksat bilen welaýat merkezlerinde, Aşgabat şäherinde köpugurly we ýöriteleşdirilen hassahanalar, etraplardyr şäherlerde bir bütewi etrap hem-de şäher hassahanalary, şeýle hem obalarda Saglyk öýleri guruldy hem gurulýar.

Ýurdumyzyň etrap merkezlerindäki we çetki obalarynda hereket edýän hassahanalarydyr saglyk öýleriniň durky täzelenip ulanylmaga berildi. Has takygy, diýarymyzyň Ahal welaýatynyň Ruhabat etrabyňyň Herrikgala obasynda, Altyn asyr etrabyňyň Çäçe obasynda, Kaka etrabyňyň Duşak şäherçesinde, Sarahs etrabyňyň Ata geňeşliginde we Tejen etrabyňyň Agalaň geňeşliginde bina edilip ulanylmaga berlen oba saglyk öýleridir merkezleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 20 ýyllyk toýuna uly sowgat boldy. Şeýle döwrebap saglyk öýleridir merkezleri gurmak Balkan welaýatyny-da-da amala aşyrylýar. Welaýatyň Bereket şäherinde köpugurly 130 orunlyk hassahanasy hem-de saglyk öýi we Magtymguly etrabyňyň Ak oba, Hojagala obalarynda täze saglyk öýleri gurlup ulanylmaga berildi. Şeýle-de 2011-nji ýylyň dowamynda Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherçesiniň, Etrek etrabyňyň, Hazar, Gumdag şäherleriniň hassahanalarynyň we saglyk öýleriniň, Etrek etrabyňyň Madaw obasynyň saglyk öýüniň durky täzelenilip, halka hyzmat edip başlady.

Biziň iň gymmatly baýlygymyz adamlaryň jan saglygydyr. Muny ýurdumyzda alnyp barylýan asyryň gurluşyklary, beýik maksatnamalar doly subut edýär. Munuň mysalynda bolsa, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 20 ýyllyk toýuna Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyňyň Sazanda geňeşliginde, Akdepe etrabyňyň Mollanepes, Aşgabat geňeşliklerinde, Saparmyrat Türkmenbaýy etrabyňyň Bitaraplyk geňeşliginde, S.A.Nyýazow adyndaky etrabyňyň Dostluk, Şatlyk obalarynda, Görogly etrabyňyň Aksaraý obasynda, Köneürgenç etrabyňyň Ezbergöl









saglyk öýleriniň täze binalary, Boldumsaz etrabynyň Zähmetkeş geňeşliginde hem-de Gurbansoltan eje adyndaky etrap hassahanasynyň, Akdepe etrap hassahanasynyň, Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrap hassahanasynyň, S.A.Nyýazow adyndaky etrap hassahanasynyň, Görogly etrap hassahanasynyň, Köneürgenç etrap hassahanasynyň, Boldumsaz etrap hassahanasynyň, Gubadag etrap hassahanasynyň durkunyň täzelenmegi welaýatyň ýaşajyjlaryna uly sowgat boldy.

Şanly sene mynasybetli şeýle sowgatlar ýurdumyzyň Lebap we Mary welaýatlarynyň ýaşajyjlaryny hem begendirdi. 2011-nji ýylyň dowamynda Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Ak altyn, Körkak, Hojagörlük we Aşgabat geňeşliklerinde, S.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň oba saglyk öýleri, Mary welaýatynyň Mary, Garagum, Murgap, Sakarçäge, Türkmenkala, Tagtabazar, Serhetabat we Wekilbazar etraplarynyň etrap hassahanalarynyň durky täzelenilip halka hyzmat edip başlady.

Türkmenistanda saglygy goraýyş ulgamynda özüniň işini tölegli hyzmatlar esasynda amala aşyran, dünýä derejesindäki in soňky enjamlar bilen abzallaşdyrylan Daşoguz, Mary, Balkan, Lebap welaýatlarynda Saglygy goraýyş we anyklaýyş merkezleri ilatyň saglygyny goramakda, keseliň önüni almakda we olary öz wagtynda anyklamakda uly ýardam berýän anyk mysallaryň biridir.

Ýurdumyzda saglygy goraýyş we derman senagaty pudagynda ösen maglumat we kommunikasiýa tilsimatlaryny giňden ornaşdyrmak arkaly elektron resmi namalar dolanyşygy ulgamyny döretmek hem-de bu pudakda iş ýöretmek, dolandyrmak usullaryny has-da kämilleşdirmek maksady bilen saglyk ulgamynda elektron resmi namalar dolanyşygy ulgamyny Aşgabat şäherindäki saglygy goraýyş edaralarynda we welaýatlardaky saglygy goraýyş edaralarynda doly işe girizilmek babatda uly işler alnyp barylýar.

Ýylyň dowamynda paýtagtymyz Aşgabatda 120 orunlyk Göz kesellerini bejeriş halkara merkeziniň we 180 orunlyk Şikesleri bejeriş halkara merkeziniň gurlup ulanylmaga berilmegi bolsa, döwletimiziň ilatymyzyň saglygy hakyndaky aladalarynyň biridigine güwä geçýär.

Ýaşlarymyz ruhubelent, sagdyn, sport we bedenterbiýe bilen işjeň meşgullanyp, öz saýlan kärleriniň ussat hünärmenleri bolup ýetişmekleri üçin sport lukmançylygy hünäri döredilip, Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde sport lukmançylygy kafedrasyny açyldy we onda 2011-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-ne ilkinji talyplar okadylyp başlandylar.

Durky täzelenip, häzirki zaman enjamlary bilen abzallaşdyryljak Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň, “Berzeňni”, “Mollagara” şypahanalary raýatlarymyzyň saglygyny dikeltmekde we oňat dynç almaklarynda uly ýardam berer.

Ýurdumyzda halkymyzy we bejeriş edaralaryny derman serişdeleri bilen doly derejede üpjün etmek işine hemişe in wajyp mesele hökmünde garalýar. Bu meseläni çözmek maksady bilen ýurdumyzda häzirki “Türkmen dermansenagat” birleşigi döredildi. Birleşigiň düzümine “Saglyk” we “Tenekär” derman kärhanalary, “Buýan” obasenagat toplumu, bilelikdäki “Türkmen derman Ajanta Farma Limited” türkmen-hindi kärhanasy girýär. Olarda öndürilýän derman serişdeleriniň görnüşi we önümçiligiň umumy göwrümi ýyl-ýyldan artýar. Häzir birleşikde jemi 200-den gowrak görnüşli derman serişdeleri öndürilýär. Olaryň 30 sanysy ýerli dermanlyk otlar we olardan taýýarlanýan toplumlardyr. Öndürilýän dermanlaryň aglaba köpüsi saglyk ätiýaçlandyrmasyna girýän dermanlar bolup, olar hili, howpsuzlygy we täsirliligi taýdan dünýä derejesindäki talaplara gabat gelýär.



Şeýlelikde, "Türkmenistanyň derman senagatyny ösdürmegiň 2011–2015-nji ýyllar üçin" döwlet maksatnamasy kabul edildi. Maksatnamanyň durmuşa ornaşdyrylmagy bolsa şu netijeleri berer:

– „Saglyk“ derman kärhanasynyň daşky durky täzelener we ýoduň 5%-li spirtli erginini öndüriji täze bölüm açylar. Onuň ýerleşjek binasy aýratyn bolup, ol kärhananyň çäginde gurlar. Mundan başga-da, ol ýerde spirt bilen zyýansyzlandyrylan sanjym üçin birgezeklik antiseptiki hasa öndüriji bölüm, dünýä derejesindäki talaplara gabat gelýän dermanlyk çäýlary birgezeklik gaplarda öndüriji bölüm gurlar. Çäý gaplaýan bölümde Türkmenistanda bitýän, kitabyň birinji we ikinji tomlarynda giňişleýin beýan edilen dermanlyk ösümliklerinden taýýarlanýan toplumlar we çäýlar gaplanylyp halkymyza ýetiriler. Şeýle-de kärhanada gerdejikler bölüminiň durkuny, önümçilik enjamlaryny täzelemek we öndürilýän önümiň görnüşini, mukdaryny artdyrmak göz önünde tutulýar. Kärhananyň sanjymlyk dermanlary öndürýän bölümlerinde bolsa, ulanylýan arassalanan suwy taýýarlajak desga gurlar. Bu desga bir sagatda 2 tonna arassalanan sanjymlyk serişde taýýarlanýan suw öndürer. Ol ýerde „korwalol“ derman serişdesini guýjak bölümiň we Hindistanyň „Akiriti Export Agencies“ firmasy bilen hyzmatdaşlykda buýan kökünüň şerbetini öndürjek we guýjak bölümiň taslamasy taýýarlanylady we ýakyn wagtlarda gurluşyk işlerine başlanar. Bölümleriň işe girizilmegi bilen „korwalol“ we buýan kökünüň şerbetiniň hilini, önümiň daşky görnüşini has-da gowulandyrmaga, mukdaryny artdyrmaga, daşary ýurtlara eksport etmäge uly mümkinçilik berer. Umuman aýdylanda, saglygy goraýyş we derman senagaty pudagynda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde şanly Garaşsyzlygymyzyň 20 ýyllyk toýuna sowgat hökmünde uly ruhubelentlik bilen birnäçe işler alnyp barylady.

Gysga döwrüň içinde asyrlara barabar durmuşa geçirýän uly işlerimiz, Watanymyzy ýokary depginler bilen ösdürmek babatda edýän tagallalarymyz il-ýurdumyzyň şöhratyny mundan beýlägem arşa göterjekdigine men berk ynanýaryn.

















RKEZLERİ MÜDİRİYETİ







































YRAMALY ŞYPAHANASY





























































































I bap

DERMANLYK ÖSÜMLIKLERIŇ  
HÄSIÝETNAMASY

# ADATY ATÝELMIK

Коельпиния линейная

*Koelpinia linearis*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Nepisje täsin ösümligiň Türkmenistanda 4 görnüşi duş gelyär.

Adaty atýelmik – çylşyrymygüllüler maşgalasynyň atýelmikler urugynyň boýy 10–40 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Baldagy şahalanan, galýan ýa-da göni, tüylüje, çal keçe ýaly tüý bilen örtülen, ýa-da tas ýalaňaç. Ýapraklary inçe çyzykly, gyalary abat, uzynlygy 6 sm çenli we ini 3 mm çenli, köp bölegi bir damarly.

Sebetjigi ownuk, uzynlygy takmynan 7 mm. Olaryň gül sapagy ýalaňaç. Gynynyň daşky ýaprajyklarynyň sany 2–5, ownuk, teňňe şekilli; içkisi – has uzyn, 7–8 mm çenli. Çigitjagazynyň sany 6–12, gynyndan iki esse uzyn, ýyldyz kysmy bulam-bujar, ýaşajyk miweleri göni, has garrylary – ýaý kysmy süýnen, uzynlygy 1,5–2,0 sm we ini 2 mm çenli (çitenepleri bilen bile), içki tarapy ýylmanak, ujunda ildirgiç kysmy egri çiteneكلي, uzynlygy 1,0–1,5 mm ýa-da çigitjikleri ýalaňaç.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Adaty atýelmik ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol düzlüklerde, çägelí duzlaşmadyk topraklarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik (aprel) maý–iýun gülleýär, maý–iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik Türkmenistanyň hemme etraplarynda duşýar.

**Tebigy gory.** Adaty atýelmik ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Her ýylda 35–40 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlik gülleýän döwründe (aprel–iýun) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutulara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Atýelmigiň düzümine alkaloidler girýär. Onuň ýerüsti böleginde kumarinler saklanýar. Ýapraklarynda azot saklaýan birleşmeler, kumarinler: sihoriin, eskulin, eskuletin bar. Güllerinde kumarinler: sihoriin, eskulin, eskuletin saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň oty we gülleri meteorizmde, ýürek we soguljan kesellerinde peýdalanylýar.

Ýerli ilat baharda azyklyk üçin ýaşajyk gök bölegini ulanýar.

Bezeg, bal beriji we ot-ýmlik ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümligiň 4 çay çemçe (20 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 15 minut gaýnatmaly. 45 minutyň dowamynda otag temperaturasyna çenli sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 2–3 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Atýelmigiň 1 çay çemçe (5 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan alawda 5 minut gaýnatmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Peti gün içinde 3 ýola 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.



# ADATY BIRÝUÇINA

Бирючина обыкновенная

*Ligustrum vulgare*



**Häsiýeti.** Medeni derman ösümlik. Dünýäde takmynan 40, Türkmenistanda 1 görnüşi duşýar.

Adaty birýuçina – zeýtunlar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 3,5 metre çenli ýetýän gyrymsy agaç wekili. Ösümliğin köne şahajyklary çal-goňur reňkli mäjzagazly, ýaşajyk pudaklarynda çal-ýaşylymtyl-goňur reňkli ýaýbaň ownuk goňrumtyl mäjzagazlar ýerleşýär. Ýapragy ýönekeý, gyralary abat, derijimek, inçe ujy çowludan tegelek-elliptikä çenli, uzynlygy 3–7 sm, gara ýaşyl reňkli, ýalaňaç, aşagy agymtyl reňkli. Ýapragyň sapagy gysga, giň gynly.

Gyrymsynyň gülleri dik salkyma ýygnaýyp, ownuk, ak-sarymtyl reňkli, hoşboý ysly, gabarasy 4–6 mm, trubkasy uzyn däl, näçe egrelidigine ýa-da sähelçe gysgararak, gysga gül sapakly. Miwesi – gara reňkli togalak iýmiş, gabarasy 5–10 mm, tohumynyň sany 1–4, uly, iki-üç gyraňly. Onuň eti çal-syýa reňkli, gyzarýar.

**Ýaşayşy aýratynlygy.** Adaty birýuçinany ölkämiziň ähli medeni oturumlarynda medeni bezeg ösümliği hökmünde ekip ýetişdirýärler. Köplenç, ony ýaşyl haýat hökmünde ulanýarlar. Ol aprelde gülleýär, sentýabr–oktyabrda miweleýär. Ösümlik wegetatiw (çybygy) ýoly arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzyň ähli medeni oturumlarynda duşýar.

**Tebigy gory.** Adaty birýuçina ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ösümlik baglarda, seýilgählerde we ýöriteleşen hojalyklarda ekilip ýetişdirilýär.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin ýapraklary, gülleri we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär.

Ýapraklaryny we güllerini ösümlik gülleýän döwründe (aprel), miwelerini – bişýän wagtynda (sentýabr–oktyabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada ýa-da oňat ýel çekerli ýaýda galyň matanyň ýa-da kagzyň üstünde umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklardan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleriniňkini we miweleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury we salkyn ýerde saklamaly. Ýapraklarynyň we gülleriniň saklanýş möhleti – 1–2, miweleriniňkini – 4 ýyla çenli.

**Himiki düzümi.** Daragtyň gabygynda sakyz, fenollar we olaryň ýakyn birleşmeleri: siringozid; eý maddalary saklanýar. Ýapraklarynda – uglewodlar: şeker; 0,05–0,30% alkaloidler: sinhonin, sinhonidin; C witamini; karotinoidler; 6–10% eý maddalary, flavonoidler: rutin, 7-glýukozid we 7-rutinozid lýtulin, 7-glýukozid we 7-rutinozid apigenina bar. Güllerinde efir ýaglary saklanýar. Miwelerinde antosianlar: 3-glýukozid we 3-rutinozid sianidin, 3-rutinozido-5-glýukozid malwidin bar. Tohumynda 18%-e çenli ýag saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümlik diareýada hem metrorragiýada gamaşdyryjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Ýapraklarynyň we gülleriniň peti gemostatik, garamükrüniň garşysyna, ginekologik kesellerinde, angina-da, faringit granulezinde, laringitde, stomatitde ulanylýar. Gabygynyň şerbeti çakyr bilen pnewmoniyada, dowamly bronhitlerde ulanylýar.

Merkezi Aziýanyň, şol sanda Türkmenistanyň halk lukmançylygynda ösümliğin ýerüsti böleginden taýýarlanan peti ýürek-damar kesellerinde, ysytmada; miweleriniňkini – dowamly içgatamada ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda şahalarynyň we ýapraklarynyň şulara Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli antibakterial işjeňligi, jöwherleriniň, suw we suwak spirtli ekstraktynyň kardiotonik, gipotenziw, antiwirus, bakterisid, protistosid we fitonsid häsiýetleri ýüze çykaryldy.

Daragtyň ýapraklary, esasan, miweleri zäherli. Ulanmazyň ön ýanynda hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Ösümliğin gülleriniň efir ýaglary parfýumeriýa senagatynda; agajy – nilegärligde sary reňki almak üçin ulanylýar. Ýapraklary çäýiň surrogaty bolup hyzmat edýär.

Bezeg, azyklyk, baldyr peýga beriji, tehniki, boýag we topragy berkidýän ösümlik.

## Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Ösümliğin 1 çäý çemçe (5 g) guradylan ýapraklaryny we güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp,

içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Bir sagadyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.

Birýuçinanyň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan miwelerini 0,5 litrlik termosda demläp, 20 minut saklamaly. Soňra hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 gezek 1 çay çemçeden (5 ml) nahardan ön kabul etmeli. Melhem netijeli iç sürüji serişde.

## ADATY BÜRELIJE

### Блошница обыкновенная

### *Pulicaria vulgaris*



**Häsiýeti.** Düzlük derman ösümligi. Adaty bürelije çylşyrymgüllüler maşgalasynyň bürelijeler urugynyň boýy 20–40 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik çalymtly ak keçe ýaly tüýjagazlar bilen örtülen. Baldagy dik, tas esasyndan ýaýraň şahalanan, sähelçe joýaly, gysga ýumşak tüýjagazlar bilen örtülen, ýokarky bölegi has gü. Ýapragy süýri, gysga ýitileşen, gyalary abat ýa-da seýrek we ownuk dişlije, birneme tolkunly, uzynlygy 1–2 (3) sm we ini 4–6 mm, aşaklary – esasy gysylan, beýlekileri – sapaksyz, ýöne esasy baldaga bitişmedik.

Gül sebetleri ýarym şar kysmy, boýy 56 mm we ini 7–10 mm, köpsanly, şahajyklaryň depesinde ýerleşýär, umuman, sübse şekilli gül toplumyny emele getirýär. Ýaprajyklarynyň gyny siňňillije, 3–4 setirden ýerleşýär, çzykly-ujy çowly, ýitileşen, ownuk mällice, ýokarsynyň gyalary kirpik şekilli, daşyklary – has gysga, uzynlygy, takmynan, 2 mm, içkileri – uzynlygy 3–4 mm we ini 0,2 mm, ortasy ýaşyl damarly, gyalary perdeli. Dil şekilli güljagazlary pestikli, sary reňkli, gysga, uzynlygy 2,5 mm, tas gyny bilen deň. Diljagazy togalak, 1x1 mm, trubkasynyň uzynlygy 1,5 mm, üpüjigi –

2 mm, sütünjigi – 2,2 mm. Trubkaly güljagazlary iki jynsly, uzynlygy 2,5–3,0 mm. Çigitjagazlary goňur reňkli, uzynlygy 1 mm çenli we ini 0,3 mm, ýaýbaň ujy çowly, gapdalyndan gysylan, tüýlçe, üpükli, uzynlygy 2,0–2,5 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Adaty bürelije ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol dag derýajyklarynyň we ýaplaryň kenarynda ösüp boý almany halayar. Ösümlik iýul–oktyabrda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Köpetdagetäk medeni oturymynda: Köşüde, Bagyrda, Akpedepede duşýar.

**Tebigy gory.** Adaty bürelije ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ony ekip ýetişdirmek maslahat berilýär.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (iýul–awgust) ýygnamaly we teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümliğin düzümine kauçuk girýär. Onuň ýerasty böleginde efir ýagy, poliasetilen birleşmeler: tridekadiýen-1,11-tetrain-3,5,7,9, tridesen-1-pentain-3,5,7,9,11 saklanýar. Ýerüsti böleginde 7,3% uglewodlar, 12,4% organiki turşular, 0,3% efir ýaglary, 0,1% alkaloidler, 6% eý maddalary, 1% kumarinler, 2% flawonoidler, C witamin bar. Ösümliğin ýapragynda efir ýaglary, kosmen monoterpenoidler, poliasetilen birleşmeler: 4100-pigment (tridesen-1-pentain-3,5,7,9,11) saklanýar. Gül toplumynda alkaloidler, tohumynda efir ýagy bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin otuny inçekeselde, ganly içgeçmede, diuretik serişde hökmünde peýdalanylýarlar. Peti çagalar üçin umumyberkidiji (wannalary), jöwheri – proteinuriýada, iç sürüji hökmünde, diş agyryda (buguna tutmak), baba-sylda (wannalar, klizmler) ulanylýar. Bu ösümlik bilen öz-özüni bejermek örän howpludyr, ýagny ösümlik zäherlidir. Şonuň üçin hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Ylmy lukmançylykda adaty bürelijäniň ýapraklarynyň we gülleriniň insektisid işjeňligi ýüze çykaryldy.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 5 minut gaýnatmaly. Soňra



süzme. Taýýar bolan peti çagalar üçin wanna görnüşinde peýdalanmaly.

Adaty bürelijäniň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 4 sagat goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Jöwheri her gün 3–4 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli. Şeýle-de klizm etmeli.

## ADATY GALGAN

Бодяк обыкновенный

*Cirsium vulgare*



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Dünýäde 200-den gowrak, Türkmenistanda 8 görnüşü duş gelýär.

Adaty galgan – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň galganlar urugynyň boýy 60–80 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ösümligiň baldagy gür ýaprakly, ýokarky bölegi şahalanan, joýaly, kepjeli, gyralary uzyn çitenecli, ganatlyja, inçe kerep şekilli tüylüje. Ýaprak ülüşi çuň per şekilli bölünen, sudury süýrümlik-çyzykly, ýokarsy ownuk gysylan tikenek görnüşli çitenekler bilen örtülen, aşagy azda-kände inçe kerep kysmy ýa-da ak keçe kimin tüylüje, gyralary ownuk kirpik şekilli çitenekli we iki-üç bölünen ýumurtga şekilli ýapraklary segmentli, ülüşleriniň ujunda dişjagazlary uzyn berk gaty çitenekli. Kökýanynyň we

aşaky baldak ýapraklary süýndürilen, uzynlygy 25 sm çenli, sapajygyna gysylan, esasyňa çenli tas per şekilli bölünen, ýumurtga kysmy üçburç segmentleri bölünip aýrylýar. Baldakdaky ýapraklary ortasyndan ýokarlygyna çenli yzygiderlilikde kiçelýär, ýaýbaň kepje şekilli ganatlyklary baldakdan gaçmaýar.

Gül sebetleri ýekeleşýän, ýokarda ýa-da ýapragyň goltugynda, 2–4-den umumy gülsaklaýjyda gysgajyk sapakly ýakyn ýerleşýär, ini 2,5–3,5 sm, goltugyndakylary – käte has ownuk. Gyny inçe, seýrek kerep şekilli tüýjagazly. Gynyň içki ýaprajyklary çyzykly – ujy çowly görnüşde, yzygiderlilikde gysylp süýrelýär, adatça, ýokarsy egrelen, ujy gysga, ýiti; içindäkisi – çyzykly, germewli. Gülleri gülgün reňkli. Çigitjagazyň uzynlygy 3,5–4,0 mm. Üpüjigi agymtyl reňkli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Adaty galgan ölkämizde düzlüklerde, deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol, köplenç, haşal ösüp boý almaklygy halaýar. Ösümlik iýun–sentýabrda güleşýär hem miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Ayyderede, Tutlygalada, Arpekilende; Merkezi Köpetdagda: Deşde, Garawulda, Degirmenlide, Mergenölende, Çopurçynarda, Arçabilde, Hanýaýlada, Gurtlusuwda; Gündogar Köpetdagda: Çyrlakda; Köýten-dagda; Köpetdagetok medeni oturymynda: Bamyda, Bөрmede, Bagyrda duşýar.

**Tebigy gory.** Adaty galgan ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ösýän ýerlerinde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Käte haşal ösümligi hökmünde duşýar. Her ýylda 15 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň kökleri we oty dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallyk kökleri ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny ösümligiň güleşän döwründe (iýun–iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýygnamaly hem taýýarlamaly. Köküniň taýýar bolan çig malyňy kagyz haltalara ýa-da gutujyklara, otunyňkyny mata haltalara gaplamaly. Olary gury hem salkyn ýerde saklamaly. Kökleriniň saklanyş möhleti – 2–3, otunyňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Adaty galganyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümligiň düzümine kauçuk girýär.

**Peýdalanylyşy.** Öz wagtynda meşhur alym-lukman Abu Aly ibn Sinanyň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly belli düýpleýin diwanynda ösümligiň gany togtadyjy

we umumy berkidiji täsiri, şeýle-de onuň nemli çişlerde peýdasyny, aşgazan nogsanlyklarynda, mädä dykyn almasynda, dowamly içgeçmede, içýanlar we zäherli mör-möjekler çakanda haýyrylydgy barasynda ýazýar. Mundan başda-da, ol öz tejribesinde otuň petini diň agyryda, köklerini – öýkenden gan gitmesinde, peşewi kynlyk bilen çykarylanda, tohumyny – myşsalaryň işiniň näsazlyklarynda peýdalanyndyr.

Halk lukmançylygynda ösümligiň köklerinden taýýarlanylýan petini içege nogsanlyklarynda, böwrek we bagyr sanjysynda, respirator ýokançlarynda, şeýle-de spazmolitik, sedatiw, der çykaryjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Mundan başga-da, ol ýapgy hökmünde çişlerde, bakteriside, absesslerde, dokuzdonluda ulanylýar. Melhemlik peti ýarany bitiriji we sowuklamanyň garşysyna serişde hökmünde hem peýdalanylýar. Ösümligiň ýerüsti böleginden taýýarlanylýan petleri çaga newrozlarynda we aşgazan sanjysynda ulanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly, Gökdepe, Köýtendag, Ruhabat etraplarynda) otunyň petleri we jöwherleri tromboflebitlerde, rewmatizmde, babasylda, diareýada, howply täze döremelerde, kynlyk bilen bitýän ýaralarda ulanylýar. Täze gülleri agyz boşlugyndaky ýakymсыz ysly dep edýär.

Ylmy lukmançylykda adaty galganyň tohumynyň spirtli ekstraktynyň antioksidant häsiýeti ýüze çykarylady. Mundan başga-da, galen derman serişdeleri antibakterial we der çykaryjy işjeňlige eýedirler.

Gündogar aşhanasynda ösümligiň ýaşajyk pudaklary we ýapraklary, naharlara hoşboý tagam beriji hökmünde goşmak arkaly ulanylýar.

Bezeg, azyklyk we bal beriji ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylýşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnan suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön 3 nahar çemçeden (45 ml) içmeli.

Galganyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnan suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Peti gün içinde 3 gezek nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnan suwuň içine atyp, 40 minut goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

## **ADATY GYZGAN**

**Дере́за русская**

***Lycium ruthenicum***



**Häsiýeti.** Çöldür düzlük derman ösümligi.

Adaty gyzgan – itüzümler maşgalasynyň gyzganlar urugynyň boýy 1,5–2,0 metre ýetýän gyrymsy agaç wekili. Daragt has tikenli, pudagy inçe, agymtyl reňkli, gür gysylan gysga tikenli, uzynlygy 4–20 mm, açyk reňkli şahalanan, gysga ýapraksyz tikenlerinden başga, ýene has uzyn, ýapraklarynyň bogunlarynda ýapraklar we güller kemala gelýär. Ýapragy çal reňkli, kütäk, etleşen, damary görünmeýär, cyzykly, tas silindrik, inçe ters ujy çowla çenli, uzynlygy 0,5–2,5 sm we ini 0,75 sm, depesi kütäk, esasyna yzygiderli gysylýar, sapagy görünmeýär.

Gülleri çogdamda gysga gapdal pudaklarda (uzynlygy 1,5–4,0 mm) 1–3-den ýerleşýär, gül sapajyklarynyň uzynlygy 5–8 mm. Okarajygy inçe jaňjagaz şekilli, uzynlygy 4,5 mm we ini 2,5–3,0 mm, 1/3 dilnen, 2 kepjeli. Gültäjiniň giň trubkaly. Epilen yeriniň ülüşi süýrümlik, trubkanyň uzynlygyndan sähelçe gysga. Tyçinkaly sapagy tüýlçe. Iýmişi gara reňkli, şar şekilli, uzynlygy 4–7 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Adaty gyzgan ölkämizde çöllerde, derýajyklaryň jülgelerinde, medeni oturumlarda, deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol azda-kände duzly topraklarda ösüp boý almany halaýar. Daragt aprel–maýda gülleýär, maý–iýulda miweleýär. Ol tohumy we kök çykyngysy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Daragt Türkmenistanyň hemme etraplarynda diýen ýaly duşýar.

**Tebigy gory.** Adaty gyzgan ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary



üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol, topbak-topbak bolup duşýar. Her ýylda takmynan 15–20 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly bişen döwründe (maý–ijul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara ýa-da kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig maly gury, Gün şöhlesiniň göni düşmeýän ýerinde saklamaly. Möhleti – 2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Adaty gyzganyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümligiň şahalarynyň düzüminde alkaloidleri saklaýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň ýetişen miwelerinden taýýarlanylýan petidir jöwherini aşgazan-içege gysymalarynda, sanjylarda, kynlyk bilen dem alnanda, bronh demgysmasynda, sarygetirmede peýdalanylýar. Yöne çenden artyk ulanmaklyk güýçli zäherlenmäge eltmeği mümkin. Şonuň üçin hökman lukmanlar bilen maslahatlaşmaly.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) mäjumlanan miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Otag temperaturasyna çenli sowatmaly. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek nahardan 20–30 minut öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli. Dowamlylygy – 10–15 gün.

Gyzganyň 2 nahar çemçe (30 g) guradylan miwelerini 1 litrlik termos demlemeli, 1–2 sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri günde nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

## **ADATY KARLINA**

### **Колючник обыкновенный**

#### **Carlina vulgaris**



61

**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Otjumagyň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Adaty karlina — çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 20–80 (100) sm ýetýän ikiýyllyk otjumak wekili. Baldagy yönekeý ýa-da ýokarsy şahalanan, sähelçe kereplije, sarymtyl-ýaşyl, ýokarky bölegi symgylt goýy gymyzy. Ýapraklary abat, inçe, uýy çowly ýa-da hatda çyzykly-uýy çowly, ýitileşen, esasy inçe tegelenen ýa-da gysylan, sapaksyz, gyalary tikenli kirpiklikli ýa-da hatda byçgyly-kirpiklikje, ýokarsy ýalaňaç ýa-da tas ýalaňaç kerep pisintli-ýüňlülje, ýasy ýa-da birnäçe ternawlyja-burlan we birneme içine ýaý şekilli egrenen. Kökýanynyň ýapraklary yzygiderli sapajyga gysylýar.

Sebetjigi kese kesiminde 3,5–5,0 sm. Gynynyň daşky ýaprajyklary ýaprak şekilli kereplije, ýokarsy tikenli; ortaklary — köp bölegi gara-goýy gymyzy, içkileriniňkiden uly, sarymtyl-perdeli, aşagy gülgün reňkli, dil kysmy güllülje. Gülleri köp sanly, ownuk, ýokarsy gara-goýy gymyzy, gysga epilen. Çigitjagazy tüýlülje, uzynlygy 2,5–4,0 mm. Üpüjigi çitenekli, adatça, uzboýuna iki-üç bölünen, per şekilli.

**Ýaşaýyş aýratynlygy.** Adaty karlina ölkämizde deňiz derejesinden 1200–1600 metr belentlikde bitýär. Ol jülgeriň ýapgytlarynda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–awgustda güllýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpelýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Könekesir obasynyň ýokarsyndaky jülgede, Ýokarky Sumbarda, Kiçi Üçtükçiler jülgesinde; Merkezi

Köpetdagda: Arwazda duşýar. Ösümligiň duşýan bu ýerleri Türkmenistanda we Merkezi Aziýada ýeke-täk mekanydyr.

**Tebigy gory.** Aday karlina ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (iýun–iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Aday karlinanyň düzümine alka-loidler girýär. Onuň köklerinde poliasetilen birleşmeleri: 2-(sis, sis-nonadien-6,8-dini-2,4-iliden)-2,5-digidrofurán, sis, sis-tridekatrien-2,10,12-triin-4,6,8-al-1, trans, sistridekatrien-2,10,12-triin-4,6,8-al-1, 4-(nonadien-6,8-diin-2,4-iliden) butenilid saklanýar. Baldagynda eý maddalar, ýapraklarynda flavonoidler: rutin, orientin, gomooorientin, şaftozid, karlinozid bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin otunyň peti we jöwheri diuretik, der çykaryjy, aşgazan üçin, sedatiw serişde (aşgazanyň gipofunksiýasynda) hökmünde peýdalanylýar. Şeýle-de reumatizmde ýapgy we çalgý görnüşinde ulanlanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümliğin gül toplumynyň we miweleriniň ekstraktynyň, jöwheriniň, emulsiýasynyň (az mukdarda) sedatiw netijeliligi ýüze çykarylady.

Bezeg we eýleýji ösümlik.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylýşy:**

Ösümliğin 3 nahar çemçe (45 g) gury otuny 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri bedeniň agyryly ýerlerine çalmaly.

Karlinanyň 1–2 çay çemçe (5–10 g) owradylan otuny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, 2 sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3 gezek nahardan ön 1–2 nahar çemçeden (15–30 ml) kabul etmeli.

## ADATY NAR

Гранат обыкновенный  
*Punica granatum*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliği. Gadymy ösümliğin dünýäde 2, Türkmenistanda 1 görnüşü duş gelýär.

Aday nar — narlar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 1,5–3,5 metre ýetýän gyrymsy agaç ýa-da köpsütünli çogdum görnüşli agaç wekili. Ýaşajyk pudaklary gögümtil-çal reňkli, ösüşiniň ikinji ýarymynda — goňur, birýylyklarynyňky — sary-ýaşylymytyl, ýalaňaç ýa-da tas ýalaňaç, uýy iňňe şekilli çitenekli. Köne pudaklarynyň gabygy symgylt-çal reňkli, jaýrykly. Ýapraklary ýönekeý (uzynlygy 3–8 sm we ini 1,3–1,6 sm), garşylyklaýyn, käte çogdama ýakyn, küti, ýalpyldawuk, giň uýy çowlanan, elliptik ýa-da inçe uýy çowly, esasy inçe pahna şekilli, gýralary abat, ýalaňaç, gýşyna gaçýar. Sapajygy gysga (uzynlygy 0,7–0,8 sm), ýalaňaç. Gülleri iri (kese kesiminde 5 sm çenli), küşe şekilli, ownuk jaňjagaz şekilli, adatça, ýyllyk pudaklarynda we olaryň uçlarynda, ýapraklaryň goltugynda emele gelýär.

Okarajygy 5 (käte 9) giň üçburçly kepjeli (uzynlygy 3–4 sm), guýguç kysmy jaň şekillije, gara gyzyl ýa-da goýy gyrgyzy reňkli, derijimek. Gül ýapraklarynyň uzynlygy we ini 3–4 sm, ters ýumurtga şekilli, açyk ýa-da narynç-gyrgyzy reňkli. Miwesi uly, şar şekilli (gabarasy 8–15 sm), polýusa tarap birneme süýrümlik, derijimek bardaly, okarajygynyň ýokarsy açyk-gyrgyzy ýa-da sarymytyl reňkli. Miwesiniň içi 6–12 höwürtgeli, perdeli germewler bilen bölünen, höwürtgelerde köp sanly, burçly, şireli, gülgün, içi görnüp duran etli, turşy ýa-da turşy-süýji tagamly tohumlar (miwede 300-si) ýerleşýär.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Aday nar ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol gury daşlaşan, çagylyly we bajaklaşan eňňitlerde, jülgeriň



düýbünde, derýajyklaryň we wagtlaýyn akýan suwlaryň gyrmançalarynda, dag kemerlerinde ösüp boý almany halaýar. Daragt maý–awgustda gülleýär, sentýabr–oktyabrda miweleýär. Köplenç, wegetatiw (kök çykyntgylary) we tohumy arkaly köpeliýär. Şitilleri aprelde çykyş başlaýar. Haýal ösýär, 10–12 ýylda 1 metre ýetýär. Daragt 50–70 ýyla çenli ýaşaýar.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Soňudagda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Äýyderede, Tämil jülgesinde, Süntde, Ýolderede, Palyzakda, Sumbur we Çendir jülgesinde; Merkezi Köpetdagda: Nohurda, Gylgylawda, Arçabilde (Göniderede, Şeýtan agzynda, Sarygaýada), Duşakerekdagda; Hazaryaka çölünde: Etrekde duşýar.

**Tebigy gory.** Adaty nar ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ýurdumyzyň ähli medeni oturumlarynda, ýöriteleşdirilen hojalyklarda, melleklerde, şeýle-de Aşgabadynyň botanika bagynda we Magtymgulynyň ylmy-önümçilik synag merkezinde ekilip ýetişdirilýär. Ol Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar. Daragt Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) we TGHB-niň Gyzyl sanawyna (2007) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Daragtyň gabygy, sütiňi, şahajyklary, sapajyklary, gülleri, miweleri we olaryň gabygy, tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köküniň gabygyny ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), baldagynyň gabygyny we şahajyklaryny, şeýle-de sapajyklaryny we gülleri – ösümlik gülleýän döwründe (maý–awgust), miwelerini, olaryň gabygyny we tohumyny – ýetişýän wagtynda (sentýabr–oktyabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada ýa-da oňat ýel çekerli jaýda, galyň matanyň ýa-da kagyzyň üstünde umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Gabykdan taýýarlanylýan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara, sapajyklarynyňkyny we gülleriňkini mata haltalara, tohumynyňkyny we miweleriňkini kagyz gutujyklara ýa-da agzy berk ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesiniň göni düşmeýän ýerinde saklamaly. Kök gabygynyň, baldagynyň, şahajyklarynyň, şeýle-de sapajyklarynyň we gülleriň saklanyş möhleti – 1–2, miweleriňki, olaryň gabyklarynyňki we tohumynyňki – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümliğin kökleriniň, sütiňiniň we şahalarynyň gabygy uglewodlary we beýleki kowumdaş birleşmeleri: krahmaly, 0,5–1,9% maniti, 0,91% sorbiti; triterpenoidleri: urosolow, betulin turşulary, fridelin;

steroidleri:  $\beta$ -sitosterini; sakyzy, 0,1–2,0% alkaloidleri: pelleterin, izopelterin, metilizopelterin, pseudopelterin, fenolkarbon turşulary we olaryň ugurdaşlaryny: gallow, ellagow; 15,0–32,7% eý maddalary we mummy saklaýar. Ýapragynda 0,45% ursol, 0,2% betulin triterpen turşulary,  $\beta$ -sitosterin steroidleri, fenolkarbon turşulary we olaryň ugurdaşlaryny: ellagow; 10,2% eý maddalar bar. Güllerinde 3,5- pelargonidin diglúkózid antosianlar, punisin reňkleýji madda saklanýar. Miweleriniň gabygynda fitonsidler, 20–28% eý maddalar, pektinler, 0,6% ursolow turşusy, tannidler we boýajy maddalar bar. Miwelerinde 12–20% şeker uglewodlary, 5,87–9,05% organiki turşular: limon, alma, turşuja; titerpenoid turşusy: ursolow; C witamin, eý we pektin maddalar saklanýar. Miweýanynda 0,6% ursolow triterpenoid turşusy, 25–30% eý maddalar bar. Tohumynda uglewodlar we olaryň kowumdaş birleşmeleri: manit, 17,11% ýag (onuň düzüminde punisow turşusy) saklanýar. Şiresinde 8–20% şeker, 4–10% glúkóza; 0,2–9,0% turşular, 7 mg%-e çenli C vitamini, kükürtturşusy, hlorly we beýleki duzlar, kalsiý, kaliý, natriý, fosfatlar, marganes, magniý bar. Ýabany naryň miweleri 50%-e çenli şire berýär, onda, takmynan, 9%-e çenli limon turşusy saklanýar, çünki ol limonyňkydan hem ýokarydyr.

**Peýdalanylyşy.** Naryň dermanlyk häsiýetleri irki wagtlardan belli bolupdyr. Ol barasyndaky ilkinji maglumatlar Pliniý ulyňy (b.e. 23–79-njy ýyllary) «Tebigy taryh» atly nusgawy eserinde, şeýle-de Kolumellanyň (b.e. I asyry), Awrelianyň (b.e. ön V asyr) işlerinde duş gelýär.

Gadymy grekler nary ýerasty şalygyň hudaýy Persefonyň daragty diýip hasaplapdyrlar. Ynançlara görä, ol üzümçiligiň we çakyr önümçiliginiň hudaýy Dionisiň ganynyň damjajyklaryndan emele gelipdir. Ösümliğin miwesini (däneleriniň jemi) hasyllylygyň we nika sapagynyň alamaty hökmünde kesgitläpdirler. Naryň almasıny deň ikä bölende, açyk duran ýarany ýatladýar we simwoliki ýagdaýda ölümi we täze ýaşayşy aňladýar.

Orta asyrlardaky Gündogaryň parlak ýyldyzlarynyň biri Abu Aly ibn Sina özüniň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly eserinde ösümliğin ähli organlary dermanlykdyr: naryň gülleri «ýelmeşýär, her bir akmalary saklaýar...Olar dişiň etinden gan gitmede haýyrlýr..., gymyldap duran dişleri pugtalandyryr..., gan gusmada örän peýdaly..., içegelerdäki ýaralarda we ýatgydan gan gitmede nepli». Ýabany naryň gülleriň şiresiniň güýji «... edil naryň etiniň güýji ýalydyr». Turşy naryň şiresi «ganat şekilli plewalara», ysytma, aşgazanyň sowuklamasyna haýyrlýr. Naryň tohumyny ýagyş suwy bilen içseň gan

gusmasyna peýdalydyr. Naryň gülleri sepgi görnüşinde ulanylanda «köne ýaralary we başlary, jaýrylan we bölünen ýerleri bitirýär». Ondan ingi üçin plastyr ýasaýarlar. Naryň tohumy ary baly bilen garylýan ýagdaýynda dyrnagyny iýýänler, artbujakdaky başlar we howply täze döremeler üçin oňat merhem bolýar, naryň sapajyklaryny ýakyp diş we gulak agyryda peýdalanylýarlar. Täze şahajyklarynyň gabygy gurçuklary kowýar, peşew çykaryjy, aýbaşy getiriji, şeýle-de soguljanlary çykaryjy serişdedir. Naryň mäjümy ötli içgeçmede we mädäni pugtalandyrmakda nepli. Akyldar alymyň pikirine görä, naryň ähli bölekleri ýüregiň näsazlyklaryna peýda edýär diýip belleýär.

Orta asyrlaryň görnükli alym-ensiklopedistleriniň biri Abu Reýhan Biruny hem özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly düýpleýin işinde Ibn Sinanyň sözlerini tassyklaýar.

Öz wagtynda belli alymlaryň biri bolan Seyit Ysmaýyl Gürgenli (Jürjany) «Horezm şanyň genji-hazynasy» atly diwanynda nary melanholiýada we göz kesellerinde haýyrlanmaklygy tekarlaýar.

Gündogaryň beýik alymy we tebibî Muhammet Gaýmaz Türkmen özüniň «Pygamber tebiçiligi» atly işinde naryň dermanlyk gymmatyny has doly açyp görkezýär. Naryň ähli görnüşleri ýürek tolgunmasyny köşeşdirýän häsiýete eýedir. Ösümlik miwesiniň şiresi üsgülewügi aýyryar we öt çykaryjy serişde hökmünde hyzmat edýär. Awtoryň tassyklamagyna görä, üç günläp birnäçe nar dänesini iýen adamyň, bir ýyllap gözi agyrmaz. Narpyz garylýp ýasalan nar içgisi gusdurmak üçin ajaýyp serişdedir, ol aşgazaný berkidiýär.

Orta asyrlaryň ezber tebibî hem alymy Muhammet Huseýn özüniň «Melhemler hazynasy» atly nusgawy diwanynda şeýle ýazýar «...nar ajaýyp gamaşdyryjy häsiýete eýedir, dykyn almalary açýar, arassalaýar, içegeleri ýumşadýar, peşew çykaryar, suwsuzlyga getirýär, bagry pugtalandyrmak, sarygetirmede, dalak kesellerinde, ýürek çalt urmada, kükrek yzalarynda, üsgülewükde, sesiň durlamakda, bedeni kaddyna getirmekde, gijilewükde, yüzüň reňkini nurlandyrmakda» peýdaly.

Halk lukmançylygynda ösümliğin gabygyny, şahalaryny, sapajyklaryny, güllerini, miwelerini, olaryň gabyklaryny, miweýanyny we tohumyny sarygetirmede, tultuklykda, üsgülewükde, ganazlykda, aterosklerozda, stenokardiýada, artralgiýada, süňkleriň çykmasynda we döwürleşme, kellagyrýda, diş etiniň ganamasynda, sestodozda, metrarragiýada, aşgazan şiresi pes bolan dowamly gastritde, gepatitde we enteritde, ganly içgeçmede, funksional diareýada, kolitlerde, holesistitlerde,

madda alyş-çalyşygy bozulanda, aşgazan-ıçege ulgamynyň organlarynyň, bagryň, böwregiň, agyz boşlugynyň, görüş we eşidiş organlarynyň sökelliklerinde peýdalanylýar. Mundan başga-da, aşgazana haýyrlý, agyryny dep ediji, sowuklamanyň garşysyna, gemostatiki, gamaşdyryjy, pugtalandyryjy, ýarany bitiriji, soguljanlary çykaryjy we antigelmint serişde hökmünde haýyrlanylýar. Onuň bilen stomatitlerde, angina, laringitlerde agyz boşlugy çäýkalýar. Kökleriniň peti ýiti respirator kesellerde, yzaly hem gijilewükli dermatozlarda, ysytmada, süňkler döwürleşme ýa-da çykanda sedatiw serişde hökmünde ulanylýar. Şeýle-de gabygynyň jöwheri bagryň, böwregiň, agyz boşlugynyň, görüş we eşidiş organlarynyň sowuklamalarynda, bogunlaryň yzasynda, süňkleriň döwürleşme, ýatgydan gan gitmede, diş etiniň ganamasynda, gelmintozlarda peýdalanylýar. Gülleriniň we gabygynyň peti hem jöwheri ganly içgeçmede, parodontozda, enteritde, süýji keselinde, bokurdagy çäýkamak üçin gamaşdyryjy we antiseptik serişde hökmünde haýyrlanylýar. Miweýanlarynyň peti gyzzymanyň garşysyna, pugtalandyryjy, sowuklamanyň garşysyna we ýara bitiriji derejine neplenýär. Gülleriniň we miweleriniň jöwheri gany togtadyjy serişdedir. Naryň gabyklarynyň, gülleriniň, miweleriniň we miweýanlarynyň tozlary, sepgileri we merhemleri epiteliýanyň bütewliligi bozulan ýagdaýynda, maserasiýalarda, jaýryklarda, deriniň iriňli kesellerinde, bitmesi kyn ýaralarda we çagalarda göni içegesiniň çykmagynda ulanylýar. Tohumynyň melhemini ary baly bilen garyp dyrnagyň etleriniň sowuklamasynda, iriňli ýaralarda, gulagyň we burnuň sökelliklerinde peýdalanylýar. Täze miwelerini we miweýanyny üsgülewükde, ýiti respirator ýokançlarynda, sowuklama kesellerinde, gyzzymada, asitde, sarygetirmede, ýanykda, dermatozda, umumy berkidiji serişde hökmünde ulanylýar. Onuň şiresi böwrek, öt haltasynyň kesellerinde we ýürek sökelliklerinde, gipertoniki kesellerde, garamükrüde, süýji keselinde, gastralgiýada, böwrek sanjysynda, işdä kesilende, baba-sylda, ýanykda, konýunktivitlerde, pugtalandyryjy, gyzzgyny peseldiji, ýarany bitiriji, gany arssalaýjy, teşneligi gandyryjy serişde hökmünde peýdalanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplary) naryň dürli bölekleri bilen keselleri bejermek giňden ýaýbaňlanandyr. Naryň owradylan kökleri teniň güýçli möjükmesinde, damarlaryň süňmesinde çykmalarda we süňkleriň döwürleşme agyryny aýryjy bolup hyzmat edýär. Daragtyň gabygy soguljan kesellerinde ulanylýar. Gülleri we miweýanlary gamaşdyryjy we sowuklamanyň garşysyna täsirli. Miweleriniň gabygy



enteritleri, başly kolitleri, babasyly bejermekde, içgeçmede, ganly içgeçmede, aşgazanyň we içegeleriň sowuklamasynda oňat gamaşdyryjy we sowuklamanyň garşysyna serişde hökmünde ulanylýar. Miweleri we şiresi gijilewükde, tultuklykda, sarygetirmede, ýürek çalt urmasynda, döş yzalarynda, garamükrüde, ateroskleroza, ganazlykda, işdän kesilende, şeýle-de peşew we öt çykaryjy, sedatiw, sowuklamanyň garşysyna, gany arassalaýjy, witaminli we pugtalandyryjy hem-de aşgazanyň işjeňlik ukybyny pugtalandyryjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Tohumy täze görnüşinde diareýada, ýiti respirator ýokançlarynda, gan gusmada; güllälek bilen garylyp gowurlany – içgeçmede, ganly içgeçmede, üsgülewükde ulanylýar. Ary baly bilen garylyp ýasalan merhemi paronihýada, howply başlarda, diş agyryda, gulak we burun kesellerinde peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümliğinň şahalarynyň, gabygynyň, ýapraklarynyň, gülleriniň, miweýanlarynyň ekstraktynyň lenta şekilli gelmintleriň garşysyna göreşmekde hem-de süýji keselinde netijeliligi ýüze çykarylady. Mundan başga-da, ýapraklarynyň spirtli ekstraktynyň grampoložitel bakteriýalaryň garşysyna antibakterial işjeňligi, miweleriniň we miweýanlarynyň antikoagulyant häsiýetleri mälüm edildi. Tohumynyň ýagy estrogen işjeňlige eýedir. Bulardan başga-da, miweleri witaminlere baý berhiz önümi hasaplanýar, C witaminiň, limon turşusynyň şekeriniň we medisina tanininiň çeşmesi bolup hyzmat edýär.

Ösümlikden alnýan «eksgran» we «broseulin» derman serişdeleri, birinjiden, diareýada simptomatiki serişde, aşgazan-ıçege ulgamynyň hyzmatynyň bozulmasynda; ikinjiden, bitmesi kyn ýaralarda ulanylýar. Miwesiniň gabyklaryndan taýýarlanylýan dermanlyk serişdeleri aşgazan-ıçege bozulmalarynda gamaşdyryjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Gabygynyň ekstrakty lanteli soguljanlaryň garşysyna haýyrlanylýar. Ýapraklaryny *Artemisia dracunculus* kökleri bilen bilelikde (toz) stomatitlerde we gingiwitlerde neplenýär. Şahajyklarynyň we sütünleriniň gabygy, gülleri, miweleri, olaryň gabyklary ýürek, aşgazan we umumy berkidişi ýyggyndylarynyň düzümine girýär.

Şahalary we olaryň gabygy birnäçe Ýewropa döwletleriniň farmakopeýasyna girizildi. Germaniýada resmi ýagdaýda gamaşdyryjy serişdedir. Mundan başga-da, olar weterinariýada ýarany bitiriji serişde hökmünde peýdalanylýar.

Nar gönleri eýlemekde, boýag senagatynda: matalary dürli öwüşginli reňklere boýamakda ulanylýar. Ol, esasan, gara we gyzyl reňki beryär.

Özüniň hoşboý gamaşdyryjy tagamy bolanlygy sebäpli, miweleri we miweýanlary dürli içgileri, mürepbeleri taýýarlamakda, köke-süýji senagatynda peýdalanylýar. Gündogar aşhanasynda ikinji naharlara jaz hökmünde ulanylýar. Ýapraklary çäýiň surrogaty bolup hyzmat edýär.

Bezeg, azyklyk, witamin saklaýjy, bal beriji, ot-ıymlik, tehniki, boýag, eýleýji, çäge we toprak berkidişi ösümlik.

### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Naryň 3 nahar çemçe (45 g) owradylan gabygyny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, 6 sagat goýmaly, içi syrçaly gapda pessaý otda iki esse azalýança (200 ml) gaýnatmaly. Süzüp, sowatmaly. Taýýar bolan peti bir sagadyň dowamynda içmeli. Gelmintozlarda peýdalanmaly.

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan gabyklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnaga atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. 10 minut goýmaly. Hasadan geçirmeli. Peti dessine 1 gezek haýyrlanmaly.

Naryň 2 çay çemçe (10 g) guradylyp owradylan gabygyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan otda 15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti 2 günün dowamynda içmeli.

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan tohumyndan taýýarlanylýan tozyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly, birsalym goýmaly. Taýýar bolan pete bokurdagyňy çaykamaly.

Naryň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan miweýanyny ýa-da güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gaba ýerleşdirmeli, suw hammamynda 15 minut gaýnatmaly, 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3 sapar nahardan ön 2 nahar çemçeden (30 ml) kabul etmeli.

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) gabygyny 1 bulgur (200 ml) gaýnaga atyp, suwuň reňki gülgün bolýança goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Jöwheri günde 1 bulgurdan (200 ml) içmeli.

Naryň 1 çay çemçe (5 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 10 minut goýmaly. Taýýar bolan jöwheri ary balyny garyp, edil çay ýaly nahardan 20 minut ön kabul etmeli.

Daragtyň 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp owradylan gabygyny 2 çay çemçe (10 ml) aloeniň şiresi we 1 nahar çemçe wazelin (15 g) bilen garmaly. Merhemi deriniň zeperlenen ýerlerine çalmaly.

Naryň tohumyndan mäjumlanyň taýýarlanylýan tozyny ary baly bilen 1:4 gatnaşykda garmaly. Mäkäm bulamaly. Taýýar bolan merhemi günün dowamynda 2 gezek (irden hem aqşam) deriniň şikeslenen ýerlerine çalmaly.

Naryň şiresini her gün nahardan 30 minut ön 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

## ADATY SYGYRGUÝRUK

Коровяк обыкновенный

*Verbascum thapsus*



**Häsiýeti.** Çöl derman ösümligi. Täsin owadan güllüje ösümligiň dünýäde, takmynan, 300, Türkmenistanda 10 görnüşü duş gelýär.

Adaty sygyrguýruk — noriçnikler maşgalasynyň sygyrguýruklar urugynyň boýy 30–120 sm ýetýän ikiýyllyk otjumak wekili. Tutuş ösümlik gür küljümek-ak ýa-da açyk-sarymtyl ýüňjümek, ak keçe ýaly tüýjagazlar bilen örtülen. Baldagy göni, ýönekeý, seýrek — ýokarsy şahalanan, gür ýaprakly. Kökýanynyň ýapraklary süýrümlik-elliptik (uzynlygy 9–18 sm we ini 4–7 sm); gýralary ownuk we kütäk dügürlü ýa-da tas gýralary abat. Baldagynyň ortaky ýapraklary süýrümlik ýa-da süýrümlik-ters ýumurtga şekilli (uzynlygy 8–14 sm we ini 2–5 sm), gysga sapajykly ýa-da sapaksyz. Gülýanynyň ýapraklary ýumurtga kysmysüýrümlik, ýitileşen.

Sary reňkli gülleri baldagyň ýokarsynda baş şekilli gül toplumyna ýygananan. Miwesi — ýumurtga şekilli gozajyk, uzynlygy 0,5–1,0 sm. Tohumy ownuk, goňrumtyl reňkli.

**Ýaşayuş aýratynlygy.** Adaty sygyrguýruk ölkämizde galyndyly eňňitlerde, çägeli topraklarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun—awgustda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Hazaryaka çölünde, Türkmenbaşyda duşýar.

**Tebigy gory.** Adaty sygyrguýruk ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary

üçin gory ýabygorly. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Hazar döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň ýapraklary we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlik gülleýän döwründe (iýun—iýul) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Oňat guran gül ýapraklaryň açyk-sary reňki bolýar, tagamy süýjümtik, nemli, gowşak hoşboý ysly. Taýýar bolan çig mallyk ýapraklary mata haltalara, güllerini — agzy ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Möhleti — 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Sygyrguýrugyň düzümine saponinler, flavonoidler, nem, sakyzlaşan we reňkleýji maddalar, şeker (takmynan 11%) girýär. Onuň gülleriniň düzüminde 2,5% nemler, takmynan 11% şeker, karotin, kumarinler, saponinler we flavonoidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümligiň dermanlyk häsiýetleri irki wagtlardan belli bolupdyr. Ol barasynda ilkinji maglumatlar Gippokratyň (b.e. ön 460–377-nji ýyllar) işlerinde berilýär.

Orta asyrlarda Gündogaryň meşhur lukman-ensiklopediýaçysy Abu Aly ibn Sina özüniň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» eserinde sygyrguýrugyň şypaly häsiýetleri barasynda söz açýar. Awtor sygyrguýrugyň myşsa tonusyna, dowamly üsgülewüge we içgeçmä, gany togtadyjy haýyrlý serişdedigini mälüm edýär. Mundan başga-da, ýapraklarynyň petiniň çişlerde; göz kesellerinde, başlarda we ýaralarda (ýapgy etmek), diş agyryda (agyzy boşlugyny çäykamak) peýdalanmaklygy ündeiýär.

Gündogaryň parlak ýyldyrlazynyň biri, alym, tebigaty öwreniji Abu Reýhan Birunyň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly nusgawy işinde hem sygyrguýrugyň melhemlik häsiýetleri beýan edilýär.

Halk lukmançylygynda ösümligiň güllerini bagryň, aşgazan-ichege ulgamynyň, kükrek, dem alyş ýollarynyň kesellerinde: traheitde, bronhitde, pneemoniýada, bronh demgysmasynda, inçekeselde, şeýle-de gakylyk goparyjy, ýumşadyjy, ýylmaýyjy, ýarany bitiriji, sowuklamanyň garşysyna serişde hökmünde peýdalanylýar. Şeýle hem dermatitiň dürli görnüşlerinde suwa düşünmek we ýapgy ýapmak arkaly haýyrlanylýar. Ýapraklaryndan taýýarlanylýan tozy we tohumynyň merhemi ýaralary bitirmekte ulanylýar. Ýapraklarynyň süýtde taýýarlanylýan peti ýanyklarda, başlarda we cykuwlarda neplenilýär.

Ösümligiň güllerinden demlenen melhemlik çäý Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda halk lukmançylygynda iç sürüji, gakylyk goparyjy, peşew çykaryjy



we sowuklamanyň garşysyna serişde hökmünde ulanylyar. Ýapraklarynyň peti aşgazanyň we içegeleriň katarynda, bagryň hem dalagyň sökelliklerinde, reumatizmde, demikmede, bronh demgysmasynda, öýkeniň inçekesesinde peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda gülleriniň, käte ýapraklarynyň jöwherini üsgülewükde, öýkeniň katarynda, şeýle-de aşgazan kesellerinde ulanmak maslahat berilýär. Çagalaryň üsgülewüginde sygyrguýrugyň güllerinden we çerbiýäniň köklerinden taýýarlanylýan toşaby haýyrlanylýar.

Bezeg, bal beriji we boýag ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümliğin 1 çay çemçe (5 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 5–6 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 2–3 gezek 1/3–1/2 bulgurdan (75–100 ml) içmeli. Jöwheri ýapgy we wannajyk etseň hem bolýar.

Sygyrguýrugyň 1 çay çemçe (5 g) guradylan güllerini, çerbiýäniň owradylan kökleriniň 1 çay çemçesini (5 g), 1 bulgur (200 ml) gaýnaga atyp, oňa 1 bulgur (200 g) şeker goşmaly. Toşap bolýança gaýnatmaly. Melhemi her gün 3 gezek nahardan öň 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.

## **ADATY PYŞDYLOTY**

### **Амбербоа обыкновенная**

### **Amberboa amberboi**



**Häsiýeti.** Dagetek derman ösümliği. Türkmenistanda bu ösümliğin 3 görnüşi duşýar.

Adaty pyşdyloty — çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň pyşdylotular urugynyň boýy 10–60 sm ýetýän, baldakly ýa-da baldaksyz birýyllyk otjumak wekili. Baldagy esasynda ýa-da ondan birnäçe ýokary şahalanan. Ösümliğin ýaprak-

lary süýrümlik, uýy çowly, iň aşaklary, köplenç, süýrümlik, ýokarkylary — çyzykly. Hemme ýapraklary diş-diş bölünen ýa-da kepjeli bölünen, seýrek ýokarkylary — ýelek şekilli bölünen ýa-da ýelek şekilli damarlanan, uýy ýiti, abat ýa-da birneme diş-diş ülüşli. Sebetleri uzyn sapakly, kähallatlarda tas sapaksyz. Ýaprajyklary tyyjümek: içki ýaprajyklary we çykyngylary uýy çowly ýa-da süýrümlik-ýumurtga şekilli, teňňeli, goňur reňkli, köplenç has ýyrtylan, esasy has ýaybaň we içi görünip duran.

Ösümliğin gülleri iki reňkli: symgylt-sary, soňra goýy gyrmyzy reňkine öwrülýär. Gyalary şöhleli, köplenç, uzyn trubkaly. Çigitjagazlary oňat ösen üpüklije.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Pyşdyloty ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol ýanan toýunly duzlaşan we ösümlik örtüklü eňňitlerde ýaşap, boý almagy halaýar. Ösümlik aprel–mayda gülleýär, may–iýunda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly we Kiçi Balkanda: Sekidag jülgesinde, Çalsuwda, Mollagarada, Şorjada; Kürendagda: Jebelde, Däneatada, Temenlilerede, Torgaýda, Margyzda, Oboýda, Jelilede, Akobada, Hasrawda, Bkyda, Isgenderde; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Gamyşlyda, Magtymguluda, Altytoganda, Hojagalada; Merkezi Köpetdagda: Arçmanda, Garagaçda, Ahaltekede; Gündogar Köpetdagda: Şamlyda; Bathyzda: Rabat-Kaşanda, Akarçeşmede; Hazarýaka çölünde: Akjaguýmada, Çatda, Etrekde; Köpetdagetek medeni oturymynda: Bereketde, Serdarda; Tejen medeni oturymynda: Tejende duşýar.

**Tebigy gory.** Pyşdyloty ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeliýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Her ýylda, takmynan, 15–25 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçiligi bar.

**Dermanlyk çig maly.** Dermanlyk maksatlary üçin pyşdylotunyň oty çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümliğin gülleýän döwründe (aprel–may) ýygnamaly, guratmak we taýýarlamak — teläriň aşagynda, açyk howada, umumy kabul edilen usulyýet boýunça amala aşyrmaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Çig maly gury ýerde saklamaly we oňa Gün şöhesi düşmeli dälidir. Saklanyş möhleti 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Pyşdylotunyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine seskwiterpenoidler girýär.

**Peýdalanylşy.** Ylmy lykmançylykda ösümlikdäki seskwiterpenoidleriň jeminiň işjeňligi netijesinde antibakterial we antifungal täsirleri ýüze çykaryldy.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

# ADATY TORUMGALDYRAN

Кресса критская  
*Cressa cretica*



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Aday torumgaldyran — peçekler maşgalasynyň torumgaldyranlar urugynyň boýy 20–30 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ösümlük ýylmanak, gysylan we bulam-bujar tüýlüje. Baldagy köp sanly, esasyndan şahalanan, gür ýaprakly. Ýapraklary ownuk, sapaksyz, ýitiräk, ownuk gysylan tüýlüje, baldakdakylary esasy, sähelçe ýürek şekilli, süwürmtik-ýumurtga kysmy ýa-da uýj çowly.

Gülleri gür, gysga, uýj baş şekilli gül toplumyna ýyganan, sapaksyz ýa-da örän gysga sapakly. Okara ýaprajyklary ters ýumurtga şekilli, gür we ownuk gysylan tüýlüje, okarajygynyň esasy 2 gülyanyň ýaprajyklary bilen üpjün edilen. Gültäji agymtyl ýa-da menekli, okarajygundan iki esse uzyn, daşyna egrelen uýj çowly kepjeli. Tyçinkalary gültäjiniň trubkasynyň ortasyndan aşagyna berkidilen. Gozajygy süýri, tohumy ýumurtga şekilli.

**Ýaşajyş aýratynlygy.** Aday torumgaldyran ölkämizde düzlük çöllerinde, medeni oturumlarda, seýrek — deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol jülgelerde, şorlaşan cygly topraklarda, käte haşal ösüp boý almany halaýar. Ösümlük maý–iýulda gülleýär, iýul–awgustda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Kürendagda: Ýagytda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda, Hojagalada; Bathyzda: Serhetabatda; Hazarýaka çölünde: Türkmenbaşyda; Demirgazyk-Günbatar Garagumda:

Geçitlide; Etrek medeni oturymynda: Esenguluda, Etrekde; Köpetdagetok medeni oturymynda: Gökdepede, Aşgabatda, Artykda; Tejen-Murgap medeni oturymynda; Amyderýa medeni oturymynda: Atamyratda, Farapda, Galkynyşda, Türkmenabatda; Daşoguz medeni oturymynda duşýar.

**Tebigy gory.** Aday torumgaldyran ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde haşal ösümligi hökmünde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Her ýylda 20–25 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallyk otuny ösümlük gülleýän döwründe (maý–iýul), tohumyny — bişen wagtynda (awgust) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, tohumyňkyny — kagyzy gutujyklara ýa-da agzy berk ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Otuň saklanyş möhleti — 1–2, tohumyňky — 3–4 ýyl.

**Himiki düzümi.** Aday torumgaldyranýň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümligiň düzümine alkaloidler, konwolwulin glikozidi we C witamini girýär.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň oty bilen tohumyndan taýýarlanylýan petini hem jöwherini gany arassalaýyş we peşew çykaryjy, şerbetini iç sürüji hökmünde peýdalanylýar.

Bezeg ösümlük.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylýp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 15 minut gaýnatmaly. 10 minutyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti günüň dowamynda 2 gezek (irden hem aşşam) 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Torumgaldyranýň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 40 minut goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapa 1–2 nahar çemçeden (15–30 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) guradylan tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnaga atyp, bir sagat goýmaly. Hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 wagtyna nahardan 30 minut ön 2 nahar çemçeden (30 ml) içmeli.

Torumgaldyranýň 2–3 nahar çemçe (30–45 g) owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) 70%-li medisina



spirtiniň içine atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 14 gün goýmaly. Birsyhly çaykap durmaly. Soňra süzmeli. Şerbeti gün içinde 3 ýola nahardan 20 minut ön 1 çay çemçeden (5 ml) kabul etmeli.

## ADATY ÜZÜM

Виноград культурный

Vitis vinifera



**Häsiýeti.** Medeni derman ösümligi. Dünýäde, takmynan, 700, Türkmenistanda 2 görnüşi duş gelýär.

Adaty üzüm – üzümler maşgalasynyň adybir urugynyň uzynlygy 15–20 metre ýetýän, murtjagazlary bilen ýapysýan iri liana wekili. Ýaş pudaklarynyň bogny çişen. Gabygy ýylmanak, açyk-goňrumtyl reňkli. Garry baldaklarynda gabygy ýasy, çyzyk-çyzyk. Ýapragy ýönekeý ýa-da azda-kände kepjeli. Ýaş pudaklary we ýapraklary köplenç tüýljuje, käte ýalaňaç. Garry ýapraklary ýalaňaç, ýalpyldawuk, aşagy ýalaňaç ýa-da kerepli tüýljuje, ýa-da damarly we kähälatda goltugynyň aşagyndaky damarlarlary ownuk tüýjagazlar bilen örtülen.

Gülleri ownuk, çylşyrymly salkymy emele getirýär, iki jynsly ýa-da bir jynsly (funksional enelikleriniňki). Gül ýapraklary ýokarlygyna bitişen, gapajyk görnüşinde gaçýar. Tyçinkasy baş sany. Miwelig bir, ýagny çogdamlayyn tumşujakly. Iýmişi şireli, dürli reňkli (agy we garasy agdyklyk edýär), üsti örtüklü, bir-dört çigitli (seýrek çigitsiz): tohumy armyt şekilli, arka ýüzünde iki joýaly we arkasynda çuň halazaly.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Medeni köp sanly sortlary giňden ýaýran, mundan başga-da, olaryň ýabanlaşanlary jülgerlerde, derýajyklaryň we çeşmeleriň kenarynda ösüp boý alýar. Ösümlik aprel–maýda gülleýär, awgust–

sentýabrda miweleýär. Ol tohumy arkaly we wegetatiw köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda medeni we ýabanylaşan görnüşinde Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Hozluda, Tutluda, Güýende, Guratyda, Tämilde, Garagaçda, Ýolderede, Porderede, Bakjada; Merkezi Köpetdagda: Kiçi Nyýazymda, Ypaýderede, Sarymsaklyda, Germapda (Sekizýap derýajygynyň kenarynda), Arçabilde, Gökderede; Gündogar Köpetdagda: Kelteçynarda, Guru-howdanda, Çyrlakda, Stefanowiçiň çeşmesinde, Bakjada duşýar.

**Tebigy gory.** Adaty üzüm ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Üzümi daýhan birleşiklerinde, ýöriteleşen hojalyklarda we melleklerde ekip ýetişdirýärler.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin ýapraklary we iýmişleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Ýapraklaryny ösümlik gülleýän döwründe (aprel–maý), iýmişlerini – bişýän wagtynda (awgust–sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapragyndan taýýar bolan çig maly mata haltalara, iýmişiniňkini – kagyz haltalara, gutujyklara ýa-da agzy ykjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesiniň göni düşmeýän ýerinde saklamaly. Ýapragynyň saklanýş möhleti – 1, iýmişiniňki – 3–4 ýyl.

**Himiki düzümi.** Üzümiň düzümine uglewodlar: glýukoza, fruktoza, sahara; 80%-e çenli suw, azotly maddalar, organiki turşular: çakyr, glýukuron, alma, limon, sadap, turşuja; eý maddalar, pektinler girýär. Ösümliğin ýapraklarynda flawonoidler, eý maddalar, holin, organiki turşular saklanýar. Miwelerinde 20% ýokary uglewodlar we olaryň ugurdaşlary: glýukozalar, fruktozalar; organiki turşular: çakyr, limon, alma; pigmentler, eý maddalar, flawonoidler: kempferol, kwersetin we beýlekiler; antosianlar, B, C, P, PP toparynyň witaminleri, fermentler, mineral duzlar – kaliý, demir, fosfor, magniý; mikroelementler – marganes, kobalt we beýlekiler bar. Tohumynda ýag, eý maddalary saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümliğin dermanlyk häsiýetleri gadymy döwürden bäri bellidir. Bu baradaky ilkinji maglumatlar Pliniý ulynyň (b.e. 23-79-njy ýyllary), Kolumellanyň (b.e. I asyry) nusgawy işlerinde mälüm edilýär.

Orta asyrlarda Gündogaryň beýik akyldarlary düýpli ensiklopediki eserleriniň birnäçesinde üzümiň bejeriji häsiýetini beýan edipdirler. Abu Aly ibn Sina özüniň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly kitabynda üzümiň ter we kakadylan iýmişiniň içegelerde agyry dörände,

böwregiň we peşew haltasynyň keselleri ýüze çykanda ulanylyşy barada gürrüň berýär. Abu Reýhan Biruny hem «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly eserinde üzümiň peýdasy barasynda tekrarlaýar.

Seyit Ysmaýyl Gürgenliniň (Jürjany) «Horezm şanyň genji-hazynasy» atly eserinde üzümiň göwnüçökgünlikde (melanholiýa), beýni kesellerinde, göze gül düşende oňyn, täsirli serişdedigi agzalyar. Alymyň bellemegine görä, turşy üzümiň şiresi nerw bozulmalarynda oňat köşeşdiriji serişde bolup durýar.

Muhammet Gaýmaz Türkmen özüniň «Pygamber tebibçiligi» atly eserinde üzümiň dermanlyk häsiýetlerini giňişleýin beýan edýär. Üzüm öt haltasynyň kesellerine haýyrly. Ondan sykylp alnan şiresi içgeçmäni we gusmany aýyrmakda iň oňat serişdedir. Jynsy höwesini oýarýar. Sykylp alnan üzüm şiresine narpyz ýa-da burç garyp içmek ýürek bulanmany dessine kesýär. Ter üzümler iç ýellenmesini aýyrýar.

Meşhur tebib Muhammet Huseýniň «Melhemler hazynasy» eserinde beýan edilşiňe görä: «...üzüm – iň peýdaly miweleriň biri. Ol bedeni oňat semredýär, iýmitlendirýär, gurplandyryar, dem alyş ýollarynyň we öýkeniň ýagdaýyny gowulandyryar, böwrekleriň ýag dokumalarynyň emele gelmegine itergi berýär. Ony iň gowusy iki iýmitlenişini aralygynda, nahardan iki-üç sagat ön ýa-da soň kabul etmeli...».

Halk lukmançylygynda ösümligiň iýmişi giper-toniýanyň başlangyç döwründe, ganazlykda, bronh demgysmasynda, inçekeselde, aterosklerozda, bogunlaryň gaýtalap durýan yzalarynda, babasylda, dowamly nefritde, peşewdaş kesellerinde, şeýle-de bagyr kesellerinde, nerw ulgamynyň gowşaklygynda, bedende ýaglaryň we minerallaryň alyş-çalşy bozulanda peýdalanylýar. Mundan başga-da, üzüm peşew we öt çykaryjy, gakylyk goparyjy, umumy berkidiji serişde hökmünde ulanylýar. Ýapraklarynyň jöwheri anginada bokurdak çäykamak üçin, başly ýaralara olary bitirmek üçin haýyrlanylýar, maýdalananyň ter ýapraklary ýaralara (çybana) ýapylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplary) üsgülewükde, laringitde, ýürek gowşaklygynda, peşew haltasynyň kesellerinde, babasylda, iç süriji hökmünde ösümligiň kişmişini bejeriji hökmünde ulanmak giňden ýaýrandyr. Mundan başga-da, üzüm sirkesinde saklanan kişmiş sary getirmede we dalanyň çişlerinde neplenýär. Mynjyradylp, mal ýagy bilen garylan kişmiş çişlere, çybana ýapylýar, şeýle-de nädogry ösýän dyrnaklary aýyrmak üçin peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda üzümiň çigitjagazlary iýlende, merkezi nerw ulgamynyň degeneratiw keselleriniň (Alsgeýmeriň keseli) garşysyna kömek edýändigini ýüze çykarylady.

Üzüm täze we gaýtadan işlenen görnüşinde peýdalanylýar. Ondan şireler, kişmiş, çakyr we konjak ýaly alkohol içgiler taýýarlanylýar. Üzümiň iýmişi örän gowy berhiz önümidir. Birnäçe görnüşleri bezeg maksatlary üçin hem ösdürilip ýetişdirilýär.

Özüniň hoşboý tagamynyň bolandygy sebäpli aşpezlikde peýdalanylýar. Gündogar aşhanasynda ete we palawa hoşboý tagam berer ýaly ulanylýar.

Bezeg, iýmitlik, baldyr perga beriji we ot-iýmlilik ösümlük.

### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Üzümiň 100 gram kişmişini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3–4 gezek 1/3–1/2 bulgurdan (75–100 ml) içmeli. Gakylyk goparyjy we üsgülewügiň garşysyna haýyrly serişde.

Ak üzümiň guradylan 2 nahar çemçesini (30 g) 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, syrçaly gapda haýal ýanýan otda 10–15 minut gaýnatmaly. Hasadan geçirmeli. Peti gün içinde 3–4 sapa ýyly görnüşinde 1/3 bulgurdan (75 ml) kabul etmeli. Bokurdagyň gyrkydanda we sesiň gyrlanda peýdaly.

Ösümligiň 2–3 nahar çemçe (30–45 g) gýralary mähzumanan çybyklaryny 0,5 litr suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 1,5 bulgur (300 ml) bolýança gaýnatmaly. Yzsüre süzmeli. Taýýar bolan peti günde nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli. Dowamlylygy 15–20 gün.

Daragtyň 2 nahar çemçe (30 g) kişmişini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Bir sagadyň dowamynda sowatmaly. Peti her gün 3 wagtyna 1/3 bulgurdan (75 ml) içmeli; iýmişlerini iki sapa kabul etmeli.

Guradylyp mähzumanan üzümiň 100 gramyny 200 gram guýruk ýagy bilen garmaly, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün goýmaly. Birsyhly garyp durmaly. Taýýar bolan melhemi günün dowamynda 2 gezek (irden hem agşam) deriniň zeperlenen ýerlerine çalmaly.

Üzümiň ýaşajyk ýapraklaryny hasaň arasynda salyp, yzaly ýerleriňe ýapmaly, bir sagatdan ýyly suw bilen ýuwmalý. Sowuk kompressory günün dowamynda 10 sapa etmeli. Ýaranyň guramagy üçin haýyrly serişde.



Daragtyň şiresiniň 1 bulguryňy (200 ml) her gün 3 wagtyňa nahardan bir sagat ön içmeli. Dowamlylygy – 1–1,5 aý. Melhem ateroskleroza ulanylýar.

Gaytalanyp durýan bogun agyryda (podagrada) 3 aýlap her gün üzüm iýmeli. Soňra günde 2 gezek (irden hem agşam) nahardan 1 sagat ön şiresini içmeli. Şire aşakdaky tertipde ulanylýar: 5 günläp 1/4 bulgurdan (50 ml); 5 günläp – 1/2 bulgurdan (100 ml); 5 günläp – 3/4 bulgurdan (150 ml); 5 günläp – 1 bulgurdan (200 ml); 5 günläp – 1,25 bulgurdan (250 ml) kabul etmeli.

Üzüm bilen bejerginiň dowamlylygy – 1–1,5 aý. Her gün täze üzümden 200 gram iýmeli, ýuwaş-ýuwaşdan 1,5–2 kilograma ýetirmeli. Nahardan 1,5–2 sagat ön ajöze iýmeklik maslahat berilýär. Şu wagtlarda çig süýdi, alkogoly, mineral içgileri peýdalanmak bolmaýar.

## ADATY ÝYLANGÜL

Синяк обыкновенный

*Echium vulgare*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Adaty ýylangül – buraçnikler maşgalasynyň ýylangüller urugynyň boýy 30–60 (100) sm ýetýän ikiýyllyk otjumak wekili. Adatça, baldagy ýekeleşýän, örän uzyn, ýönekeý, göni, berk, birneme gyraňly, gür bolmadyk we känbir gaty bolmadyk, dik çitenekli-tüýlçe, çitenekleri ýalaňaç. Baldakdaky ýapraklary has köp sanly, ujy çowly, aşaklary we kökanyňnyňkylary diňe gülläýän döwründe saklanýar, esasy zygiderli çekilen; ortaklary we ýokarkylary sapaksyz, ählisi ýiti, ýasy, ýaşylymytyl, seýrek tas çal, ýarym dik, çitenekli, zygiderli ýokarlygyna, gül toplumyna gysgalan we has inçe.

Gül toplumu inçe salkym şekilli, köplenç, baş kysmy, uzyn, käte 20–30 sm çenli, gür. Gülyňanyň ýapraklary ujy çowly-çyzykly, güle öwürülmeýär. Okarajygynyň uzynlygy takmynan 7 mm, gür çiteneksiz, ülüşi çyzykly, ýiti. Gültäji gara-gyzyl reňkli, trubkaly-jaňjagaz şekilli. Tyçinkalaryň sapagy we süňünjigi abat. Miweleri – hozjagaz, gara reňkli.

**Ýaşajyk aýratynlygy.** Adaty ýylangül ölkämizde dag sähralyklarynyň eňňitlerinde bitýär. Ol iýun–iýulda gülläýär, iýul–awgustda miweleşýär. Ösümlik tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Arwazda, Heýratatda duşýar.

**Tebigy gory.** Adaty ýylangül ýurdumyzdaky seýrek ot-çöplerň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlik gülläýän döwründe (iýun–iýul) ýygnamaly. Çig mallary teläniň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Adaty ýylangülüň düzümine alkaloidler, kurearekysmy we narkotik täsirli: sinoglossin we başgalar; holin, saponinler, C, E witaminler, karotin girýär. Onuň tohumynda 32%-e çenli guraýan ýag saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin otundan taýýarlanylýan petidir jöwherini üsgülewürde we gökbogmada gakylyk goparyjy serişde hökmünde peýdalanylýar.

Ösümliğin ýapraklary we ýaşajyk baldaklary azyklyk üçin ýaramly.

Bezeg, azyklyk, bal beriji we boýag ösümlik.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gyzgyn suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Ýylangülüň 1 çay çemçe (5 g) owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Jöwheri gün içinde 4 sapa 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

# AJYJA

## Горькуша солончаковая Saussurea salsa



**Häsiyeti.** Haşal derman ösümligi. Bu ösümligiň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Ajyja – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 15–50 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Köki uzyn, bir ýa-da birnäçe baldakly. Baldagy ýylmanak ýa-da tüýlçe, azda-kände şahalan. Ýapraklary etlek, ýylmanak we ýalaňaç ýa-da бүдүр-сүдүр gysgajyk gaty tüýlçe, aşaky tarapynda köp sanly ýalpyldawuk mäjzagazlar ýerleşýär. Aşaky ýapraklary uzyn sapaklyja, liro görnüşli per kysmy bölünen, esasy uly, peýkam şekilli, gyalary oyuk dişlije ýa-da seýrek gyalary abat ülüşlije. Gapdal ülüşleri az sanly, üçburçly, adatça, gyalary abat, aşaklygyna egilen. Ýokarky ýapraklary kiçi, uýy çowly, sapaksyz ýa-da tas sapaksyz, adatça, gyalary abat, baldagyň bogunaralaryna egrelmeýär, köplenç, ganatlyja.

Sebetjigi ownuk, köp sanly, giň sübsejik gül toplumyna ygynanan. Gyny ýalaňaç ýa-da tüýlçe ýaprajykly: daşkysy – has ownuk, ýumurtga şekilli, içkisi – süýrümlik; hemmesiniň depesi küteträk. Gülyatagy gür perdeli. Gülleri gülgün reňkli, tozanjyklary tüýlçe, çykyntguly. Çigitjagazlary ýylmanak, gysylan, bişen görnüşinde üpükiden 2 esse gysga, iki hatarly: daşkysynyň çitenekleri ownuk, dişlije, port, içkileri – per şekilli.

**Ýaşajyş aýratynlygy.** Ajyja ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol şorlaşan çemenliklerde, dagetek jüljelerinde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–awgustda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Köýtendagda: Öküzbulakda duşýar.

**Tebigy gory.** Ajyja ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ujypsyzja. Ekip ýetşdirmek maslahat berilýär. Ol Köýtendag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (iýun–iýul) ygynamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada ýa-da oňat ýel çekerli jaýda, galyň matanyň ýa-da kagyzyň üstünde ýaýradyp, umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Çig maly gury hem salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ajyjanyň düzümine saharažo ug-lewodlar, kauçuk, kardenolidler, 0,1% alkaloidler, 0,7% eý maddalar, antraglikozidler girýär. Onuň ýerasty böleginde eý maddalar we kumarinler saklanýar. Ösümligiň ýerüsti böleginde sinaropikrin seskwiterpenoidler, alkaloidler, eý maddalar bar. Baldagynda kumarinler saklanýar. Gül toplumynda 0,2% efr ýagy, alkaloidler, eý maddalar we flawonoidler bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň petini zenan we ýokanç kesellerinde, howply täze döremelerde, ýokanç-allergiki poliartritde, diareýada, ysytmada, garaguş keselinde, gyzgyny peseldiji, gemostatiki serişde hökmünde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümlikdäki seskwiterpenoidleriň jeminiň hasabyna suw-metanol ekstraktynyň sitotoksiki, çişleriň garşysyna we antibakterial, şeýle-de petiniň bakterisid almatlary ýüze çykarylýdy. Ösümligiň kökleriniň efril ekstrakty we şerbeti antibakterial, tuberkulostiki we antiprotozoý häsiýetlere eýedir. Ajyjanyň tohumynyň spirtli ekstrakty antioksidant täsirlidir.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 20 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3–4 gezek 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Ayjanyň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Ony 15 minut goýmaly. Yzsüre süzmeli. Taýýar bolan peti gün içinde 3 ýola nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.



# AJY KEKRE

Горчак ползучий

*Acroptilon repens*



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Dünýäde, şol sanda Türkmenistanda 2 görnüşi duş gelýär.

Ajy kekre — çylşyrymgüllülür maşgalasynyň ajy kekrelere urugynyň boýy 25–45 sm ýetýän köpylyk otumak wekili. Ösümligiň köki ok kök bolup, örän uzyn (6 metre çenli), gapdaldakylary kese ýa-da uzynlygy 1 metre çenli ýetýän we köpräk gysyk çykýan kök çykyntgylý. Baldagy göni, köp bölegi tas esasyndan güýçli şahalanan, köp sanly ýaýraň, adatça, yokarky bölegi gowşak şahalanan, uzyn, sebedine çenli şahalary gür ýaprakly, ýekeleýin ýa-da sany — 2–3, gapyrgaly, çalymtyl kerepli tüýljuje, aşaky bölegi has gür tüýljuje, seýregräk tas uzaboýuna ýalaňaç, ýerasty bölegi gara-goňur reňkli, goňrumtyl ýa-da gararak reňkli teňňejikler bilen örtülen. Ýapraklary ýaşyl reňkli, ýalaňaç ýa-da sähelçe çalymtyl, seýrek ýeterlik gür, kerepli tüýljuje, gyalary ýa-da ýaprak ülüşiniň iki tarapy hem gysga, bulambujar, kütüleşenräk, gaty, ýiti tüýljuje ýa-da kütelen çiteneكلي, gaty, bol sapaksyz nokatly mäzjagazly, sapaksyz süýrümlik ujy çowly ýa-da çyzykly-ujy çowly, ýiti, dişlije ýa-da çuň dişlije bölünen. Ortaky ýapraklarynyň uzynlygy 2,5–7,0 sm we ini 1 sm (ortaça ululygy), käte uzynrak we inli; yokarkylary has ownuk, köp böleginiň gyalary abat ýa-da aşaky bölegi 1–2 gysga dişlije; aşakylary, adatça, lirogörnüşli bölünen, seýregräk lirogörnüşli bölünen; has aşakylary — basym süllerýän.

Sebetjikleri ownuk. Gyny süýrümlik-ýumurtga şekilli, köplenç, ýumurtga kysmy, uzynlygy 10–13 mm we ini 5–7 (8) mm. Onuň içki ýaprajyklary tas tegelek, gysga, aglaba kütäk ýa-da ýitiräk, köplenç, sähelçe dagynyk çykyntgylý.

Ortakylary — tegelek-elliptik, süýrümlik elliptige çenli, kütäk, uzynlygy 5,5–8,0 mm (çykyntgysyz) we ini 3–4 mm, gysylan, sähelçe gysga tüýljuje, kütäken ýitä çenli, käte sähelçe ýitileşen, adatça, gyalary abat, ýaýbaň, uzynlygy 2,5 mm we ini 4–6 mm, bölekleýin örtülen we çykmaýan has içki ýaprajykly, çykyntgylý. İçkileri — süýrümlik ujy çowly ýa-da ujy çowly, örän inçe, birneme gysaran, has gür uzyn tüýljuje, uzynlygy 3,0–4,5 mm we ini 0,7–1,5 mm, esasy çykyntgylý. Gülleri gülgün reňkli. Tohumjagazlary sarymtly-ýaşyl reňkli, uzynlygy (2,5) 3,0–4,0 mm we ini (1,5) 2,0 mm. Üpüjiginiň uzynlygy 8–11 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Ajy kekre ölkämizde düzlüklerde, seýrek — daglarda, ekinlerde, köne ekin meýdanlarynda, suwarynly yerlerde, segetal we ruderal haşal bolup ösmäni halaýar. Ösümlik may–awgustda gülleýär, iýun–oktyabrda miweleýär. Ol tohumy we poruklary arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Bathyzda: Akarçeşmede, Serhetçide; Köýtendagda: Marguşyda, Hojapilatada; Etrek medeni oturymynda; Köpetdagetok medeni oturymynda: Gowşutda; Tejen-Murgap medeni oturymynda: Maryda, Baýramalyda, Gumuşdepede, Dörtguýuda; Amyderýa medeni oturymynda: Ystykda, Farapda, Türkmenabatda; Daşoguz medeni oturymynda duşýar.

**Tebigy gory.** Ajy kekre ýurdumyzdaky seýrek ot–çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän yerlerinde haşal ösümligi hökmünde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Her ýylda 55 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny ösümlik gülleýän döwründe (may–awgust), miwelerini — bişen wagtynda (iýun–oktyabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlama. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, miweleriniňkini — kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, salkyn yerde saklamaly. Otunyň saklanýş möhleti — 1–2, miweleriniňkini — 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ajy kekranıň düzümine kauçuk girýär. Onuň kökünde flavonoidler, baldagy bilen ýapraklarynda alkaloidler saklanýar. Ösümligiň gül ýapraklarynda we gül toplumlarynda repin, akroptilin seskwiterpenoidler bar. Tohumynda — alkaloidler, flavonoidler, ýag (onuň düzüminde linol, olein, palmitin turşusy) saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň otunyň peti gyzzymada, garaguş keselinde, gijilewükde ulanylýar. Ösümligiň miweleri antigelmit serişde hökmünde hyzmat edýär.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň suw we spirt ekstraktynyň antibakterial, antiwirus, antiprtozoý, antifungal işjeňligi ýüze çykarylady. Bular seskwiterpenoidleň jemiňiň hasabyna amala aşyrylýar.

Peýdalanylyjak bolnanda önünden hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Bal beriji, ot-iymlik we insektisid ösümlik.

### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanyan otda 5–10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyňa 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli, şeýle-de deriniň gijeyän ýerini ýuwmaly.

Ajy kekräniň 2 çay çemçe (10 g) mäjumlanan miwelerini 0,5 litrlik termosda demlemeli. 30 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Jöwheri gün içinde 3 gezek nahardan ön 1 bulgurdan (200 ml) kabul etmeli.

## **ALA GÖZLI AKARGÜL**

**Девясил христово око**

**Inula ocul-christi**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Ala gözli akargül – çylşyrymygüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň

boýy 20–40 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ösümlük ýumşak tüýlülje. Baldagy göni, yönekey, diňe ýokarky bölege şahalanan. Ýapraklary süýrümlik; aşaklarynyň – uzynlygy 10–15 sm we ini 1,5–2,0 sm, süýnmek-elliptik, kütegräk, uzyn sapajyga gysylan; ýokarkylary – ownuk, uzynlygy 3–4 sm we ini 1 sm, sapaksyz, baldaga çolanyan, esasy ýürek şekilli. Ähli ýapraklarynyň iki tarapy hem gür ýarym gysylan ak bulam-bujar tüýlülje, mämişi reňkli başjagazly sapaksyz mählije.

Sebetjikleri aralyk ululykda, gabarasy, takmynan, 1,5–2,0 sm, ýarym şar şekilli, 2–6-dan ýokarky, galkan şekilli gül toplumyna ýyganan, köp hatarly; onuň daşky we ortaky ýaprajyklary ýiti, gür gysylan tüýjagazly, uzynlygy 6–8 mm we ini 1,5–2,0 mm; içkileri – inçe çyzykly, uzynlygy 10–12 mm we ini 0,5–0,75 mm. Sebetjikäki gapdal güljagazlary pestikli, dillije, uzynlygy 12–15 mm, diljagazy inçe, ini 1,0–1,5 (2,0) mm. Trubkaly gülleri iki jynsly, uzynlygy 8–10 mm. Tozgaýygynyň uzynlygy 3 mm, iki ösüntgili, uzynlygy 1 mm. Tohumygynyň uzynlygy 1,50 mm we ini 0,25 mm, inçe ters koniki, ak, gysga, çitenecli, ýarym gysylan tüýlülje. Üpükjigi köp sanly çitenejikleri çigitjagazyndan 2,5 esse uzynrak.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Ala gözli akargül ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol gyýak-typçakly ösümlükleriň arasyndaky ownuk topurly demirgazyk otjumak eňňitde ösüp boý almany halaýar. Ösümlük (may) iýun–iýulda gülleýär, iýul–awgustda miweleýär. Ol tohumy we porrugy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Kesedagda, Hasardagda, Süntde; Merkezi Köpetdagda: Deştde, Saýwanda, Garaýalçyda, Arwazda, Tagarawda, Degirmenlide, Sülüklide, Müsünewde, Hozderede, Mergenölende, Gylgylawda, Heýrabatda, Arçabilde, Çopandagda, Uly Garaňkyda, Duşakerekdagda, Babazawda, Dagşyda, Daştoýda, Dogruderede, Hunçada, Asylmada, Howdanda, Nagdawda duşar.

**Tebigy gory.** Ala gözli akargül ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Her ýylda, takmynan, 5 tonna çig mal ygynamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň ýapraklary we gülleri dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlük gülleýän döwründe (iýun–iýul) ygynamaly. Çig mallary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklardan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Olary gury, garaňky, Gün



şöhlesiniň göni düşmeýän ýerinde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Akargülüň düzümine seskwiterpenoidler: gaýllardin, izo gaýllardin; alkaloidler girýär. Ösümligiň porrugynda we köklerinde efir ýagy (esasan, alantolakton izoalantolakton garnuwy; olaryň garyndysy ön gelenin diýip atlandyrylýar), saponinler, sakyzlar, nemler we aýy maddalar, digidroalantolakton, fridelin, dammaradienilasetat, dammaradienol, fitomelan, durnusyz polienler we beýleki asetilen birleşmeler, stigiasterin, köp mukdarda inulin we psewdoinulin saklanýar. Onuň ýerüsti böleginde efir ýagy, kauçuk, aromatik birleşmeler, kumarinler we flavonoidler bar.

**Peýdalanylyşy.** Gadymy ynançlara görä, akargülüň dürli keselleri bejermekligi ylahy güýjüň täsirine daýanýar. Munuň şeýledigini orta asyrlaryň görnükli fransuz alymy hem lukmany Odo iz Mena özüniň «Otalaryň häsiýetleri barada» atly meşhur poemasynda akargülüň şypaly häsiýetlerini wasp edipdir.

Halk lukmançylygynda ösümlik peşew haltasynyň keselerinde, dümewde, inçekeselde, sarygetirmede, tultuklykda, reumatizmde, süýji keselinde ulanylýar. Ýapraklary ýarany bitiriji serişde hökmünde peýdalanylýar. Ösümligiň peti we jöwheri deri, dümew we ýokary dem alyş ýollarynyň keselerinde, kellagyryda, diotezde, gipertonýada, gökbogmada, intoksikasion, tonizirleýji, ýarany bitiriji serişde hökmünde ulanylýar. Mundan başga-da, olar çişleri sorýar, aýbaşyny getirýär (onuň saklanmagynda).

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplary) akargül aşgazan-içege ulgamynyň organlarynyň keselerinde, ýaralary bitirmekte we deridäki örgünleri aýyrmakda peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň ýapraklarydyr gülleriniň antibakterial we fitsosid (ýapraklar) işjeňligi ýüze çykaryldy. Şeýle-de ösümlik antibakterial, antifungal we antiprotozoý häsiýete eýedir.

Bezeg, bal beriji we boýag ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Akargülüň guradylan porrugynyň, ýerbahasynyň we boýbodranynyň otunyň 1 nahar çemçe (15 g) garyndysyny

0,5 litr suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. 30 minutyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön ýyly görnüşinde 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli. Dowamlylygy – 1–2 aý.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan kökleridir porrugyny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan otda 15 minut gaýnatmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Peti günün dowamynda her sagatdan 2 nahar çemçeden (30 ml) kabul etmeli. Böwrek kesellilere içmek maslahat berilmeýär.

Akargülüň owradylan kökleriniň, aýypenjäniň we hozuň ýapraklarynyň 1 nahar çemçe (15 g) garyndysyny 1 bulgur gaýnag suwa (200 ml) atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti günün dowamynda her 3 sagatdan 1 bulgurdan (200 ml) içmeli.

Ösümligiň 100 gram owradylan porrugyny 1 litr suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan alawda 15 minut gaýnatmaly. Bir sagat sowatmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Pet bilen ýaralary ýuwmaly.

Çopurtelpegiň gülleriniň we akargülüň deň gatnaşykda 1 çay çemçe (5 g) garyndysyny 2 bulgur gaýnag suwa (400 ml) atyp, 1,5 sagat goýmaly. Hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jöwheri gün içinde 3 sapa, nahardan 2 sagat ön 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

Akargülüň, çerbiýäniň we buýanyň deň gatnaşykda köklerinden taýýarlanylýan 2 çay çemçe (10 g) garyndyny, 0,5 litr suwa atyp, 8 sagat goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Jöwheri her gün 3 wagtyna 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Ösümligiň 100 gram gury köküdir porrugyny 4 bulgur (800 ml) gaýnag suwa atyp, 4 sagat goýmaly. Yzysüre süzmeli. Taýýar bolan jöwheri gijäp agyrýan deri örgünlerinde ulanmaly.

Her günde akargülü 6,5 grama çenli peýdalanmaly.

# ALMAÇÖR

Шерстолистник

хлопчатниковый

*Lachnophyllum gossypinum*



**Häsiýeti.** Dagöňüniň derman ösümligi. Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Almaçöp – çylşyrymgüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 20–50 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik tutuşlygyna hoşboý ysly, gür we ýumşak ýüňjümeň ak keçe ýaly örtülen (esasan, ýaşka), bol mählije. Baldagy göni. Ýapraklarynyň iň aşaklary süýrümlik, esasy gysylan, baldakdakylary yzygider ýokarlygyna gidip kiçelýär, ýumurtga şekilli-süýrümlik, baldaga saralyp duran, gulaklyja, ýokarkylary – esasynda oturan, ýürek şekilli, hemmesi ýiti, gýralary abat, olar sähelçe tolkunly.

Gül sebetjikleri şahasynyň depesinde ýekeleşýän ýerleşýär, gül toplumu galkan şekilli sübsejige toplanýar. Ýaprajyklarynyň gyny köp sanly, çyzykly, ýokarsy ýiti, daşkylary – uýy çowly, uzynlygy 2–3 mm we ini 0,5 mm, içkileri – has uzyn, çyzykly, ýitileşen, gýralary perdeli, orta çyzygy tolkunly, seýrek tas ýalaňaç, uzynlygy 8–10 mm we ini 1 mm, gülyatagy ýalaňaç. Gapdal gülleri pestikli, dillije, uzynlygy 7–8 mm, ülüşiniň diljagazyň uzynlygy

3–4 mm we ini 1 mm. Disk gülleri iki jynsly, trubkaly, baş dişlije, uzynlygy 5 mm, tozanjyklary esasynda çykyntgysyz. Çigitjagazlary pahna şekilli, ýasy, gysgajyk, ýöne görnün gysylan üpüklige, uzynlygy 2,5 mm, ini 0,75 mm, galyňlygy 0,25 mm, agymtyl, gysylan, tüýjagazlary ýokaryk gönügen, ýokarsynda gysgajyk byçgy şekilli uçýan agymtyl tüýjagazlar ýerleşýär, uzynlygy 5–6 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Almaçöp ölkämizde dagöňüniň düzlüklerinde, deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol seýrek deňiz derejesinden 800–1600 metr belentlikde, ownuk topurly we ownuk topurly-çagyly topraklarda, gyrtýç-ýylakly, dürli otly ösümlik örtügiň arasynda has bol. Ösümlik awgust–noýabrda güleşýär hem miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Torgaýda, Soňudagda, Serdarda, Uzynsuwda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda; Merkezi Köpetdagda: Arçabilde, Giňdiwarda, Gökderede, Gurtlusuwda, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Guruhowdanda; Bathyzda: Serhetabatda, Kepelede; Köýtendagda: Hojaçilikde; Sandykly çölünde: Pulyzyndanda duşýar.

**Tebigy gory.** Almaçöp ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Ösümlik Sünt-Hasardag, Köpetdag, Bathyz we Köýtendag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin ýapraklary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik güleşýän döwründe (awgust–sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury hem garaňky ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Almaçöpün himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine 0,1–0,4% efir ýagy girýär. Onuň ýerüsti böleginde alkaloidler we γ-laktonlar saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin ýapraklarynyň şiresinden taýýarlanylýan merhemi ýaralary bitirmekde, çykuwlarda, çybanda ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümliğin efir ýagyndan çykarylýan birleşmesiniň  $C_{11}H_{12}O_2$  (az mukdarda) peýdalanylanda, spazmolitik nerw ulgamynda güýçli oňyn täsiri ýüze çykaryldy.

Onuň efir ýagy parfümer-kosmetik senagatynda peýdalanylýar.

Ot-iymlik, tehniki we boýag ösümlik.



### Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Ösümligiň ýapraklaryndan sykylyp alnan ýarym bulgur (100 ml) täze şiresini 1 bulgur (200 ml) zeýtun ýa-da günebakar ýagyna guýup, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün goýmaly. Yzygiderli çäýkap durmaly. Taýýar bolan merhemi süzmeli, günün dowamynda 2 gezek (irden hem agşam) deriniň zeperlenen ýerlerine çalmaly.

## ANDROSOWYŇ DAŞKEKRESI

Василек Андроcова  
*Centaurea androssovii*



**Häsiýeti.** Dagetek derman ösümligi. Androsowyň daşkekresi — çylşyrymygüllüler maşgalasynyň daşkekrelere urugynyň boýy 80–100 sm çenli ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ösümligiň baldagy dik, şahalanan, ýalaňaç, diňe esasynda, bogunlarda we ýapraklaryň goltugynda ýek-tük tüýjagazlar bar (tüýjagazlary gaçýar). Ýapraklary iri, ortaça uzynlygy 20–40 sm, baldakdakylary — sapaksyz, per şekilli bölünen, byçgy kysmy, üçburçly ýa-da süýnmegräk-üçburçly, ýokarsy kitirdewük pisint ýitileşen dişlije. Ýapragyň ýokarky segmenti has uly, süýrümlik-güberçek, ini 3–5 sm, uzynlygy 8–12 sm, gaçmaýan. Gapdal segmentleri has inçe, süýrümlik, olaryň ýokarkylary we ortadakylary gaçmaýar, in aşakylary galýar, has ownuklary we onuň esasy — süýndürilen. Aşaky ýapraklary sapakly, sapagyň esasy käte tüýljuje, ýokarkylary — güýçli kiçelen, abat.

Gül sebetleri ýekeleşýin, uzyn baldakly. Gyny tas silindrik, uzynlygy 25–30 mm, gabarasy 20,0–27,5 mm, esasy gysylan, ýalaňaç, symgylyt-ýaşyl reňkli. Onuň daşky

ýaprajyklary ýarym tegelek, ortakylary — süýrümlik-ýumurtga şekilli, içkileri — süýrümlik, hemmesi gysylan, kütäk, çyzyklyja, gyralary inçe perdeli-parawuzly. Gültäji sary reňkli, uzynlygy 35–40 mm, 8–10 mm uzynlykda egrelen, üpüjikleri haparak, dişlije.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Androsowyň daşkekresi ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly we ownuk topurly-çagyly demirgazyk eňnitlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlükde kseromorf we mezomorf alamatlaryň bolmagy, ýapragynyň we baldagynyň mikroskopiki gurluşynda ekologiki faktorlara esaslanlydy. Ol (maý) iýun–iýulda gülleýär hem miweleşýär. Androsowyň daşkekresi tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Asylmada (2-nji Hunçada) duşýar. Bu ýer ösümligiň ýeke-täk duşýan mesgenidir. Endemik.

**Tebigy gory.** Androsowyň daşkekresi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Ol Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar. Ösümlük Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) we TGHB-niň Gyzyl sanawyna (1998) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň dermanlyk maksatlary üçin ýapragy we gülleri çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary ösümligiň gülleýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly we umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklardan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleriniň — kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Olary gury we Gün şöhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Ýapraklarynyň we gülleriniň saklanýş möhleti — 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Androsowyň daşkekresiniň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümligiň düzümine alkaloidler, flavonoidler, saponinler, eý maddalary girýär.

**Peýdalanylşy.** Daşkekresiniň gülleriň dilinde bagt, üstünlik, işewürlük, näziklik, duýjuýlyk manyny aňladýar.

Orta asyrlaryň parlak ýyldyzlarynyň birisi meşhur alym-ensiklopedist Abu Aly ibn Sinanyň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly düýpleýin diwanynda ösümligiň katarda, çişlerde, gangusmada, plewritde, dalak keselinde, içegäniň sanjylarynda, ýatgy sökelliklerinde haýyryldygy görkezilýär. Ol ýaralary dezinfirleýär, aýbaşyňy getirýär, bagryň dykyn almasyny açýar, dowamly we howply çuň ýaralary bitirýär. Abortiw, soguljanlary we peşew çykaryjy serişde bolup hyzmat edýär. Toz kysmy garyndysy, otuň täze sykylyp alnan şiresine ary balyny goşmak bilen, ýaş

mäzleriniň we ýaş çykaryjy ýollaryň sowuklamasynda deriniň üstüne ýapgy edilýär.

Halk lukmançylygynda ösümligiň jöwheri sowuklamada, ysytmada, ýiti respirator kesellerinde, kellagyryda gyzgyny peseldiji serişde hökmünde peýdalanylýar. Melhemlik jöwheri ýapgy görnüşinde gözün nemli bardasyny ýuwmakda, şeýle-de kirpikleriň gyzarmagynda hem ittirsekde ulanylýar. Ösümligiň jöwheri we güllerinden taýýarlanylýan çäý böwregiň we peşew haltasynyň dowamly kesellerinde peşew çykaryjy serişde hökmünde, işdäsizlikde, aşgazan-ichege ulgamynyň hyzmatynyň bozulmalarında, aşgazandan gan akmada, bagyr we öt ýollarynyň sökelliklerinde öt çykaryjy hökmünde ulanylýar. Melhemlik şerbeti sarygetirmede peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň gülleri peşew we öt çykaryjy garnuwlaryň düzümine girýär. Melhemligi peşewdaş kesellerinde, pielitde, sözenekde, uretritde, newrozda we beýleki sökelliklerde ulanylýar.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Daşkekräniň 2 nahar çemçe (30 g) güllerinden, tozganyň 1 nahar çemçe (15 g) köklerinden, dyrnaklyjanyň 4 nahar çemçe (60 g) güllerinden, çitçitiniň 1 nahar çemçe (15 g) köklerinden, eşekýorunjanyň 1 çäý çemçesinden (5 g) taýýarlanylýan 1 nahar çemçe garyndyny, bir litrlik termosada demlemeli, islegiňe görä şeker goşmaly, garyşdyrmaly, bir sagat goýmaly. Taýýar bolan jöwheri her gün 4–5 gezek 1 nahar çemçeden (200 ml) içmeli.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Jöwheri gün içinde 3–4 sapar 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Daşkekräniň 1 çäý çemçe (5 g) guradylyp owradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 20 minut goýmaly. Yzysüre hasdan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3–4 ýola nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Ösümligiň 3 nahar çemçe (45 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Jöwheri kirpikleriň düýbi çişip gyzaranda we ittirsekde wannajyk görnüşinde (buguna tutmak) ulanmaly.

Daşkekräniň 4 çäý çemçe (20 g) guradylan gül ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) medisina spirtiniň içine atyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün goýmaly. Yzygiderli çäýkamaly. Taýýar bolan şerbeti her gün

3–4 gezek nahardan ön 20–30 damjany 1 nahar çemçe (15 ml) ýyly suwa garyp içmeli.

## ARÇA

## ARSEWTOBIUMY

### Арцевтобиум

### можжевельниковый

### Arceuthobium oxycedri



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Türkmenistanda 1 görnüşü duşýar.

Arça arsewtobiумы – lorantuslar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 5–12 (20) sm ýetýän gyrymsyja wekili. Uly bolmadyk güýçli şahalanan ýaşyl mugthor. Ösümlük ýalaňaç. Şahalary agaçlaşýan, olar gysylan, bogunly. Ýapraklary ownuk, uly bolmadyk gyna çolaşan, teňňe görnüşli, jübüt-jübütdeň oturan.

Gülleri ýekeleşýän, bir jynsly, ýapraklaryň goltugynda ýerleşýär, iki öýli: atalyk gülleri iki-baş bölünen, bükük. Tozanjygy sapaksyz. Enelik gülleri iki bölünen güňjanlyja. Miweliği ýumurtga şekilli, sütünjigi gysga, konus kysmy, tumşujagy kütäk. Miwesi – iýmiş şekilli; mawumtyl reňkli, ýumurga şekilli, ýokarsynda güňjanynyň bükülen galyndylary ýerleşýär. Miwesi bişende güňjanynyň bükülen ýeri aýrylyp, kese kesimli jaýryk emele gelýär we miwe gaçýar. Düwünçegi bol beloklar bilen doldurylan.

**Ýaşayyş aýratylygy.** Ösümlük ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol arçalyklaryň toparlarynda, türkmen we zerewşan



arçalarynda mugthorlyk edip ýaşaýar. Ösümlik iýul—awgustda gülleýär, awgust—sentýabrda miweleýär. Gyrymsyja tohumy bilen köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda; Arlanda; Merkezi Köpetdagda: Müsünewde, Çopandagda, Sibirde, Ljüjde; Köýtendagda: Hojagarawulda, Meýdanda duşýar.

**Tebigy gory.** Arça arsewtobiumy ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

**Dermanlyk çig maly.** Gyrymsyjanyň dermanlyk maksatlary üçin baldagy we ýapraklary çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümligiň gülleýän döwründe (iýul—awgust) ýygnamaly, umumy kabul edilen usulyýet boýunça teläriň aşagynda açyk howada ýa-da galyň syk matanyň üstünde, oňat ýel çekerli ýajda guratmaly we taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz halta gaplamaly. Olary gury ýerde saklamaly. Möhleti — 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümligiň düzümine saponinler; 0,7% alkaloidler; kofe, n-kumar fenolkarbol turşular; mirisetin, kwersetin flavonoidler; leykoantosianlar; антоцианы: delfinidin, sianidin antosianlar girýär. Onuň ýapragynda flavonoidler: 3-O-glýukozid mirisetin saklanýar. Miwelerinde — 34–49% ýag; 8–15% ýokary ýag turşulary: linol, olein bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň baldagy we ýapragy tutgaýda, miweleri — iriňli çykywlarada peýdalanylyar.

Ylmy lukmançylykda arça arsewtobiumyň topragüsti böleginiň protistosid häsiýetleri ýüze çykaryldy, şeýle-de suw wytýažkasynyň infuzoriýalaryň hereketini dessine saklaýan we hatardan çykmaklygyna oňyn täsirleri mälim edildi.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan baldagyny we ýapragyny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10–15 minut gaýnatmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna bulguryň 1/4-ni (50 ml) içmeli.

Gyrymsyjanyň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 0,5 litrlik termosda demlemeli, 30 minut saklamaly. Hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 gezek ýarym bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

## АТАБАЇЕВИЊ НАРАМÇУВУГУ Пузырник Атабаева Colutea atabajewii



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Atabaýewiň haramçybygy — kösükliler maşgalasynyň haramçybyklar urugynyň boýy 60–150 sm ýetýän ýarym gyrymsy wekili. Ýapraklarynyň uzynlygy 3–4 sm, 1–2 jübüt yaprajykly. Ýaprajyklary togalak-ters ýumurtga şekilli, dilnen ýa-da basylan, ini 7–8 mm, uzynlygy 12–15 mm.

Gül toplumy 3–5 güllüje salkym, uzynlygy, takmy-nan, 5 sm. Gülleriniň uzynlygy 14–15 mm, baldagy açyk sary reňkli, esasy açyk menekli we syýa reňkli damarlyja. Gaýykjygy goýy gyrymsy reňkli. Okarajygy giň jaňgaz şekilli, seýrek gara reňkli tüylüje. Ganatjygy gaýykjygyndan gysga, ýasy, uýj towlanan, 100–130° burç boýunça egrenen, epilen yerinde ownuk ösüntgili. Gaýykjygyň uýj oýuk, çünki oňat bildirýär. Düwünçeği ýalaňaç. Köşügi uly däl, süýrümтік-ýumurtga şekilli.

**Ýaşaýyş aýratynlygy.** Atabaýewiň haramçybygy ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol daşly-çagylyly, çagylyly we efemer ösümlik örtüklü ownuk topurly ýapgytlarda ösüp boý almany halaýar. Ol örän çäklі meýdançada ösýär, topbajyklary emele getirýär. Ösümlik aprel—maýda gülleýär, maý—iýunda gülleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: 2-nji Hunçada; Gündogar Köpetdagda: Robergowskiýde, Zeraköwde, Guruhowdanda, Kişmirlide, Çyrlakda (Şamlyň golaýynda) duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Atabaýewiň haramçybygy ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ol Aşgabadyň botanika bagynda ekip ýetişdirilýär. Ösümlik Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) we TGHB-niň Gyzyl sanawyna (1998) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin ýapraklary, miweleri we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Ýapraklaryny – ösümlik gülleýän döwründe (aprel–maý), miwelerini hem tohumlaryny bişen wagtynda (iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklardan taýýar bolan çig maly mata haltalara, miweleriňkini we tohumyňkyny – kagyz gutujyklara ýa-da agzy berk ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Çig mallary gury, salkyn ýerde saklamaly. Ýapraklaryň saklanyş möhleti – 1–2, miweleriňki hem tohumyňky – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Atabaýewiň haramçybygynyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine 0,033% alkaloidler girýär.

**Peýdalanylyşy.** Türkmen halk lukmançylygynda (Ak bugdaý etrabynyň daglyk obalary) ösümliğin ýapraklarynyň peti we jöwheri dowamly icgatamada içsürüji serişde hökmünde peýdalanylýar. Miweleri ýiti respirator ýokançlarynda, tohumlary gusduryjy serişde hökmünde ulanylýar.

Bezeg, bal beriji we topragy berkidiji ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessay otda 10–15 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Haramçybygyň 1 çay çemçe (5 g) guradylan tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan otda 5 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Peti gün içinde 3 ýola 1 bulgurdan (200 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owardylan ýapraklaryny bir litrlik termos demlemeli, 30 minut goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 sapor nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli. İç sürüji haýyryly serişde.

## BAŞBUGDAÝ

### Канатник Теофраста

### Abutilon theophrasti



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümliği. Täsin derman ösümliğin Türkmenistanda 1 görnüşi duşýar.

Başbugdaý – mamamçörekler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 40–150 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümliğin baldagy yönekeý ýa-da ýokarsy şahalanan, göni, ýapragy bilen bilelikde ýumşak ak keçe kysmy tüýlçe. Ýapragy uzyn sapaklyja, olaryň ülüşleri giň ýumurtga şekilli, esasy yürek kysmy, ýokarlygyna ýitileşen, dişlije, iki tarapyndan hem mahmal ýaly ýumşak.

Gülleri ýekeleýin ýa-da salkym görnüşli gül toplumyny emele getirip, ýapraklaryň goltugynda ýerleşýär. Okarajygy ýarsyna çenli ýa-da çuň bölünen. Gül ýapraklary sary, okara ýaprajyklarynyňkydan 1,5–2 esse uzyn, oýuk, uzynlygy 12–15 mm. Miwejikleriniň sany 12–15, gür ýumşak çitenekler bilen örtülen. Tohumy böwrek şekilli, ini 4 mm, agymtyl, örän ownuk sakgaljykly.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Başbugdaý ölkämizde medeni oturumlarda, ekinlerde haşal ösümliği hökmünde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–awgustda gülleýär, awgust–oktyabrda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Ýartygalada, Magtymguluda; Bathyzda: Tagtabazarda; Köpetdagetok medeni oturymynda: Arçmanda, Aşgabatda; Tejen-Murgap medeni oturymynda: Wekilbazarda, Baýramalyda; Amyderýa medeni oturymynda: Farapda duşýar.

**Tebigy gory.** Başbugdaý ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Haşal ösümliği hökmünde duşýar. Her ýylda



azyndan 70–80 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň kökleri, oty we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otlaryny, ýapraklaryny we güllerini – ösümlik gülläýän döwründe (iýun–awgust) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerinden, otundan we ýapraklaryndan taýýar bolan çig mallary mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, salkyn ýerde saklamaly. Kökleriň saklanýş möhleti – 2, otlardyr ýapraklaryň we gülleriňki – 1 ýyl.

**Himiki düzümi.** Başbugdaýyň düzümine nem girýär. Onuň köklerinde uglewodlar: nem (onuň düzüminde 1,41% pentoza, 1,25% pentozana, 5,13% metilpentozana, 17,2% uronow turşusy), saponinler, flavonoidler saklanýar. Ýapraklarynda uglewodlar: mukopolisaharid (onuň düzüminde uronow turşusy, aminoşeker), C witamin, flavonoidler: 0,1% rutin bar. Tohumynda alkaloidler, 15–30% ýag (onuň düzüminde turşular: 14–16% dykz, 16% iki baglanyşykly bir dykz däl, 1% ikileýin baglanyşykly üç, 0,7% sis-12,13-epoksiolein), 0,8% fosfolipidler, 3% fitin saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň oty içege, göz we limfatik kesellerde, kataraktda, ganly içgeçmede, dowamly kör içegede, diuretik, tonizirleýji, ýarany bitiriji, zyýansyzlandyryjy we antiseptik serişde hökmünde peýdalanylýar. Kökleri, ýapraklary we gülleri ýumşadyjy, gakylyk goparyjy we regenerirleýji serişde. Kökleriniň peti deri kesellerinde, diareýada, gastralgiýada ulanylýar. Ýapraklarynyň we gülleriniň peti teniň çüýremesinde haýyrlanylýar. Dokuzdonluda onuň buguna tutulýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly we Baharly etraplary) ösümligiň gülleriniň petidir jöwheri derlediji, tohumy diuretik, içsürüji, ýumşadyjy serişde hökmünde peýdalanylýar.

Ösümligiň tohumyndan alynýan ýagy olif, lak, sabyn önümçiliginde giňden peýdalanylýar. Baldaklary sapak we ýüp öndürmekde, halta, keten, balyk tutulýan tor, tehniki, şeýle-de ýaglyk matalaryny dokamakda ulanylýar. Galyndysy kagyz önümçiliginde ulanylýar.

Bezeg, bal beriji, tehniki we sellýuloza-kagyz beriji ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) guradylp owardylan köklerini 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly

gapda pessaý otda 15–20 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli. Şeýle-de melhemi deriniň zeperlenen ýerlerine çalmaly.

Başbugdaýyň 4 çay çemçe (20 g) guradylan ýapraklaryny ýa-da güllerini 1 bulgur gaýnag suwa atyp (200 ml), syrçaly pitide haýal ýanyan alawda 5–7 minut gaýnatmaly. Otag temperaturasyna çenli sowatmaly. Hasadan geçirmeli. Peti gün içinde 2 gezek 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 2–3 nahar çeçme (30–45 g) guradylan güllerini bir litrlik termosda demlemeli, 6 sagat goýmaly. Yzysüre süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3–4 ýola nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

## **BATGA BÜRELIJESI**

**Блошница болотная**

**Pulicaria uliginosa**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Owadan güllüje otjumagyň Türkmenistanda 4 görnüşi duşýar.

Batga büreljesi – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň büreljeliler urugynyň boýy 40–80 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ösümligiň baldagynyň daşy gysga çalymtyl-tüýlülje, dik, suwda ösýär, güýçli şahalanan, esasan, ýokarky bölegi. Baldakdaky ýapraklaryň esasy çuň ýürek şekilli, sapaksyz, baldaga bitişip duran, ownuk dişlije, süýrüntik-ujy çowly, uzynlygy 3–8 sm we ini 0,5–1,0 sm, ýiti.

Gül sebetleri köp sanly, galkan şekilli gül toplumyna ýygananan, ýarym şar kysmy, boýy 7–8 mm we ini 10–12 mm. Gyny tüýlülje, köp sanly çyzykly ýaprajyklardan durýar. Güňatagy öýjükli, uly bolmadyk perdeli öýjükler bilen

jäheklenen. Dil şekilli gülleri inçe, uzynlygy 4–5 mm, inçe çyzykly köp sanly dillije, uzynlygy 2,5 mm, birneme gynnyndan uly. Trubka gülleri tas gyn bilen deň, uzynlygy 3 mm, üpükli, çitenekli, uzynlygy 2,5 mm çenli. Üpüjigi iki setirli: daşkysy – gysga, perdeli-okara görnüşli, diş-diş okarajygy bitişen, perdeli, boýy, takmynan, 0,1 mm; içkisi – köp sanly (200-e çenli) çitenekli, uzynlygy 3 mm çenli. Çigitjagazy burunsyz, ýokaryk ugrugyp duran gysgajyk tüýlçe, boýy 0,8 mm we ini 0,3 mm, gapdalyndan gysylan.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Batga bürelijesi ölkämizde deňiz derejesinden 400–2800 metr belentlikde bitýär. Ol, köplenç, dag derýajyklarynyň we ýaplaryň kenarynda, çygly ýerlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–oktyabrda güllýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Tutluda, Könekesirde, Güýende, Ýuwangalada, Garagaçda, Magtymguluda, Sumbarda, Arpekilende, Goçdemirde, Ýolderede, Çakangalada, Şyhbederde; Merkezi Köpetdagda: Garaýalçyda, Sarymsaklyda, Mergenölenide, Germapda, Sekizýapda, Arçabilde, Gökderede; Gündogar Köpetdagda: Çyrlakda, Şamlyda, Hiwabatda, Arçynýanda; Bathyzda: Serhetabatda; Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Batga bürelijesi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Her ýylda 15–20 tonna çig maly ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin ýapraklary we gülleri dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary ösümlik güllýän döwründe (iýun–iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklaryndan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, garaňky, Gün şöhləsi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümliğin ýerasty böleginde poliasetilen birleşmeler: tridekadien-1,11-tetranin-3,5,7,9, tridekapentain-3,5,7,9,11-on-2, tridesen-1-pentain-3,5,7,9,11 saklanýar. Ýerüsti böleginde 4,5% uglewodlar, 2,4% organiki turşular, 0,24% efir ýagy, 0,1% alkaloidler, 5,1% eý maddalar, 0,94% kumarinler, 1,3% flavonoidler, C witamini bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin ýapraklary we gülleri ganly içgeçmede gamaşdyryjy, ýeňil iç sürüji, şeýle-de insektiside (büreleriň garşysyna) serişde

hökmünde peýdalanylýar. Ýöne ony çendenaşa ulanmak maslahat berilmeyär, çünki ol zäherli ösümlikdir.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 2 çay çemçe (10 g) owradylan güllerini 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.

Batga bürelijesiniň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan ýapraklaryny 0,5 litr termosda demlemeli, 20 minut saklamaly. Soňra hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 gezek nahardan ön 1 çay çemçeden kabul etmeli.

Ösümliğin 1 çay çemçe (5 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnan suwa atyp, bir sagat saklamaly. Hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 2–3 ýola 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

## BATGA OTY

Жерушник болотный

Rorippa palustris

**Häsiýeti.** Haşal derman ösümliği. Türkmenistanda 1 görnüşü duş gelyär.

Batga oty – atanakgüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 10–40 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Baldagy ýalaňaç ýa-da seýrek ýönekeý tüýlçe, adatça, şahalanan gögümtil-gyzylymytl reňkli. Ýapraklary lirogörnüşli, per şekilli bölünen ýa-da dilnen, süňmek-ýumurtga şekilli ýa-da ujy çowly, gapdal segmentleri azda-käne dişlije we has oýuk-dişlije ýa-da ýokarky kepjeli. Aşaky ýapraklary has iri, uzyn sapakly, ýokarkylary – sapaksyz, esasynda uly bolmadyk «gulaklyja».

Okara ýaprajyklarynyň uzynlygy 1,5–2,5 mm, gül ýapraklary açyk-sary reňkli, uzynlygy takmynan 2 mm. Kürejigi süýrümlik, sähelçe egreden, iki tarapyň ujy kütäk ýa-da tegelenen, uzynlygy 5–8 mm we ini 2–3 mm, ýokarsynda gysgajyk sütünjikli, sapajygynyň uzynlygy 5–10 mm. Tohumynyň ululygy, takmynan, 0,50–0,75 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Batga oty ölkämizde derýalaryň arnasyndaky we medeni oturumlaryň çygly, elmydama cygjaryp duran ýerlerinde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýunda güllýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.



**Ýaýrawy.** Ösümlik Köýtendagda: Kelifde; Murgap medeni oturymynda; Amyderýa medeni oturymynda: Farapda; Daşoguz medeni oturymynda: Daşoguzuň golaýynda duşýar.

**Tebigy gory.** Batga oty ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Haşal ösümligi hökmünde duş gelýär.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (maý) ýygnamaly, teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1 ýyl.

**Himiki düzümi.** Batga otunyň köklerinde kükürt saklaýan birleşmeler: 8-metilsulfiniloktilizotiosianat, glýukohirsutiniň desulfonirli ugurdaşlary, dezoksiglýukohirsutin, 4-metoksiglýukobrassinin saklanýar. Ösümligiň ýerüsti böleginde saponinler, alkaloidleriň yzlary, C witamin, flavonoidler: monoglikozidler, biozidler, kempferolyň we kwersetiniň diglikokozdleri bar. Ýapraklarynda C witamin, tohumynda 22% ýag saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň otunyň peti we jöwheri öýken inçeselinde, trihinozda, kellagyrýda, antigelmint we gany arassalaýjy serişde hökmünde ulanylýar. Taze sykylp alnan şiresi garamükrüde haýyrlanylýar. Tonumy hem antigelmint häsiýete eýe, gyzzyrgyjy çalşyjy bolup hyzmat edýär.

Batga oty weterinariýada (ownuk şahly mallardaky gyzamykda) hem peýdalanylýar.

Durmuşda ýaşajyk ösümligi işdäaçar hökmünde ulanylýar.

Bezeg, azyklyk, bal we perga beriji we ot-iymlik ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 2 nahar çemçe (30 g) owradylan otuny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10–15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Batga otunyň 4 çay çemçe (20 g) guradylp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 3 sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 4 gezek 1 bulgurdan (200 ml) kabul etmeli.

Taze oty maýdalap, 1:1 gatnaşykda sowan gaýnag suwda bir sagat goýmaly, gysyp şiresini çykarmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 4 sapar 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

## **BERK BUGRATIKEN**

**Колючелистник железистый**  
**Acanthophyllum glandulosum**



83

**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Berk bugratiken – myhaklar maşgalasynyň bugratikenler urugynyň boýy 20–40 sm ýetýän ýarym gyrymsyja wekili. Ösümlik güýçli şahalanan, inçe gaty tüýlçe. Ýapraklary bulam-bujar biz kysmy-tikenli, uzynlygy 20–30 mm we ini 0,5–1,0 mm, ýokarsy ternawly, aşaklygyna egrelen, köplenç, goltugynda miwesiz gysgalan pudaklar ýerleşýär.

Gülleri gürr, baş şekilli gül toplumyny emele getirýär (gabarasý 15–20 mm). Ýokarky ýapraklary has ownuk. Güllýany süýrümlik, gaýyjak şekilli, gýalalary perdeli, ýiti, okarajygynadan gysga. Okarajygynyň uzynlygy, takmynan, 9 mm, süýrümlik-silindrik, ýiti, ýöne tikensiz dişlije, gaty tüýlçe. Gül ýapraklary ak ýa-da gülgün reňkli, süýrümlik-kepjeli, kütegräk, okarajykdan 1,5 esse uzyn. Tohum düwünçeginiň sany – 10. Gozajygy süýri, uzynlygy 3,5 mm. Tohumy togalak – böwrek pisint, inçe ştrihlenen, ýalpyldawuk, gabarasý 2 mm.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Berk bugratiken ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol arçaly guşaklykda we typjakly-deleli sähralyklaryň daşly eňňitlerinde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýün–awgustda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Aýydere bilen Nohuryň aralygyndaky ýokary tekizliginde; Merkezi Köpetdagda: Nohur – Deşt gerşinde, Nohuryň golaýyndaky tekizlikde, Garaýalçyda, Sülüklide, Çayekde, Çopandag daglarynda, Sandykdag jülgesinde, Garadagda, Arçabile ýakyn Tutluda,

Garaňkyda, Neftanowskiý şäherçesiniň ýokarsynda, Gökderede, Duşakerekdagda, Asylmada, Howdanda, Namalyzawda duşýar.

**Tebigy gory.** Berk bugratiken ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň kökleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury hem salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Berk bugratikeniň himiki düzümi az derňelen. Ösümligiň köklerinde 12–30% triterpen saponinler: gipsogenin glikozidler, B we C akantofillazidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň kökleriniň peti bronhitlerde, üsgülewükde, gakylyk goparyjy, gusdurjy, iç sürüji, ýarany bitiriji serişde hökmünde peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda bugratikeniň kökleri arassa saponin almak üçin çig mal bolup hyzmat edýär, weterinariýada sibir başynyň we brusellýozyň garşysyna waksinalary öndürmekde ulanylýar.

Bezeg ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) guradylyp owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Otag temperaturasyna çenli sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek nahardan öň 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Bugratikeniň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gyzgyn suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan otda 10–15 minut gaýnatmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapa 1 çay çemçeden (5 ml) kabul etmeli, şeýle-de güniň dowamynda 2 gezek (irden hem agşam) deriniň zeperlenen ýerlerine çalmaly.

## BEÝİK KERTIKLI

### Гулявник высочайший *Sisymbrium altissimum*



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümliki. Otjumagyň dünýäde takmynan 90, Türkmenistanda 8 görnüşi duş gelýär.

Beýik kertikli – atanakgüllüler maşgalasynyň kertikliler urugynyň boýy 30–80 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlikiň baldagy göni, ýaýraň şahalan, aşaky böleginde gysylan uzyn bulam-bujar tüýjagazlar ýerleşýär, ýokarsy ýalaňaç ýa-da tas tüýsüz. Aşaky ýapraklary per şekilli bölünen, ujy çowly, azda-kände tolkunly-dişlije ülüşli. Baldakdaky ýapraklary – per şekilli bölünen, uzyn, inçe süýrüntik-çyzykly we çyzykly-ujy çowly ülüşli. Ýokarky ýapraklary – inçe çyzykly, tas sapak şekilli ülüşli. Okaraýaprajyklarynyň uzynlygy 4–5 mm.

Gül ýapraklary symgylt-sary reňkli (guran ýagdaýynda tas ak reňkli), çyzykly-kepjeli, uzynlygy 7–9 mm. Kürejikleri göni, gödeňsi we uzyn, dört gyraňly-silindrik, galyňlygy boýunça uzaboýuna birmeňzeş we diňe iň ýokarsy (tumşujagy) sähelçe gysylan, uzynlygy 70–100 (125) mm we ini 1,25–1,50 (1,80) mm, küti öýjükli germewli. Kürejiginiň sapajyklary gyşaran, uzynlygy 5–10 (12) mm, kürejigi bilen birmeňzeş galyňlykda. Tumşujagy örän gysga sütünjikli, etlek. Tohumy süýrgült-dört burçly, sary-goňur reňkli, uzynlygy, takmynan, 1 mm we ini 0,6–0,7 mm.

**Ýaşaýyş aýratynlygy.** Beýik kertikli ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol çüýrüntgä baý topraklarda, ýollaryň gyalarynda, ekinlerde, eňnitlerde haşal ösüp boý almany halaýar. Ösümlik aprel–iýunda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Tersa-kanda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Sumbar derýasynyň boýunda, Hasardagda, Süntde; Merkezi



Köpetdagda: Nohuryň golaýynda, Arwazda, Tagarawda, Sarymsaklyda, Degirmenlide, Germapda, Sekizýapda, Heyrabatda, Çopandagda, Amaratda, Neftanowskiý şäherjiginde, Gökderede, Ýablonowskide, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide; Bathyzda: Serhetabatda; Hazarýaka çölünde: Türkmenbaşyda; Etrek medeni oturymynda; Köpetdagetäk medeni oturymynda: Bamyda, Aşgabatda; Murgap medeni oturymynda duşýar.

**Tebigy gory.** Beýik kertikli ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Haşal ösümlik hökmünde duşýar. Her ýylda 100 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny ösümlik gülleýän döwründe (aprel–maý), tohumyny – bişýän wagtynda (iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, tohumynyňkyny – kagyz gutujyklara ýa-da agyz berk ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Çig mallary gury, garaňky ýerde saklamaly. Otunyň saklanýş möhleti – 1–2, tohumynyňky – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Kertikliniň düzümine glikozidler, gyzyrgyç ýagy girýär. Onuň ýerüsti bölegi kardenolidleri saklaýar. Ösümliğin baldaklarynda flavonoidler, ýapraklarynda C witamin, karotin, flavonoidler, miwelerinde kardenolidler bar. Tohumynda 25–38% ýag, 140–159,93 ýod sanlary (onuň düzüminde turşular: 37,8–42,8% linolen, 18,8–20,6% erukow, 12,0–13,9% linolew, 7,2–8,3% olein, 5,6–7,4% eýkozen, 5,0–5,4% palmitin, 2,5–3,0% arahin, 0,8–1,3% tetrakozen, 0,5–0,9% palmitolein, 0,6–1,0% stearin, 0,6–1,0% eýkozadienow) saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyrlarda Gündogaryň par-lak ýyldyzlarynyň biri Abu Reýhan Birunyň meşhur «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly ensiklopediýasynda ösümliğin dermanlyk häsiýetleri açylyp görkezilýär.

Halk lukmançylygynda kertikliniň oty garamükrüniň garşysyna, gany togtadyjy, gyzgyny peseldiji, ýarany bitiriji we gamaşdyryjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Ösümliğin tohumy sowuklamanyň garşysyna, demgysmada, gakylyk goparyjy, stimullirleýji, umumy berkidiji, gyjyndyryjy dermanlyk serişdelik üçin ulanylýar.

Durmuşda ösümliğin ýaşajyk pudaklary salaty, ajte-räni we ysmanagy çalyşyjy hökmünde haýyrlanylýar.

Bezeg, azyklyk, bal beriji, ot-iymlik we boýag ösümlik.

### Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Ösümliğin 1–2 nahar çemçe (15–30 g) guradylan tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 30 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Kertikliniň 1 çay çemçe (5 g) guradylyp owradylan otuny 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwa atyp goýmaly. Sowadyp süzmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapar 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

## BIBERŞTEÝNIŇ ÝYLANGÜLI Синяк Биберштейна Echium biebersteinii



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliği. Dünýäde 50, Türkmenistanda 2 görnüşü duş gelyär.

Biberşteýniň ýylangülü – buraknikler maşgalasynyň ýylangüller urugynyň boýy 40–70 sm ýetýän ikiýyllyk otjumaq wekili. Ösümlik gür, gysylan, gaty tikenli, uzyn çiteneكلي tüýjagazlar bilen örtülen. Baldagy göni, küti, has şahalanan. Kökýanynyň ýapraklary köp sanly, iki ujy hem

birmeñeş gysylan. Sapajygynyň uzynlygy 2–5 (8) sm. Ýaprak ülüşi ujy çowly, uzynlygy 5–15 (20) sm we ini 12–20 mm. Baldakdaky ortaky we ýokarky ýapraklary gaty iri däl. Gülýanynyň ýaprajyklary inçe çyzykly.

Gül toplumy sübsejik kysmy şahalan, köplenç, baldagyň aşagynda, ol tutuş ösümlige özboluşly keşbi berýär. Okarajygy uly däl, gür gysylan ak tikenli çitenekli; onuň ülüşleri ujy çowly. Gültäji agymtyl-gögümtik, daşy tüýlçe, inçe, uzynlygy 10–13 (15–17) mm, okarajygundan iki esse uzynrak. Tyçinkalary gültäjiniň trubkasyndan çykyp durýar. Sütünjiginiň ýokarsy çuň ikileýin bölünen. Hozjagazy çal reňkli, boýy, takmynan, 3 mm, görnetin eginlije, ýiti ak gasyňly, dügürlü.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Biberşteýniň ýylangüli ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol jülgerlerde we eňňitlerde, seýrek dagöňüniň düzlüklerinde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär, iýun–awgustda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Torgayda, Jelilede; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Nohurda, Sülüklide, Mergenölen, Germapda, Arçabilde, Uly Garaňkyda, Bagyrda, Gökderede, Wanowskide; Gündogar Köpetdagda: Kelteçynarda duşýar.

**Tebigy gory.** Biberşteýniň ýylangüli ýurdumyzdaky seýrek ot-çöplerň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri we oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Kökleriniň saklanyş möhleti – 2–3, otlarynyňky – 2 ýyla çenli.

**Himiki düzümi.** Biberşteýniň ýylangülünüň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin kökünde 5,5% çenli saponinler we reňkleýji alkanin pigmenti saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin kökleri bilen oty köne, bitmesi kyn ýa-da iriňli ýaralary, başlary bejermek üçin peýdalanylýar.

Bezeg, bal beriji we boýag ösümlik.

### Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Ösümliğin 1 çay çemçe (5 g) guradylan köklerini we 2 çay çemçe (10 g) owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, bir sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri ýapgy etmeli. Netijeli ýara bitiriji we regenerasiya serişdesi.

Ýylangülün 2 nahar çemçe (30 g) guradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 40 minut goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri günün dowamynda 2 gezek (irden hem agşam) deriniň zeperlenen yerlerini yuwmalı.

## BIRÝYLLYK FRANKENIÝA

Франкения порошистая  
*Frankenia pulverulenta*



**Häsiýeti.** Çöl derman ösümliki. Birýyllyk frankeniýa – frankeniýalar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 10–20 sm ýetýän birýyllyk otumak wekili. Baldagy ýaýbaň şahalan, gysga tüýlçe. Ýapraklary ters ýumurtga şekilli, kütäk ýa-da egrelen, aşagy unjumak tüýlçe, uzynlygy 2–7 mm we ini 1,0–2,5 mm, köp bölegi 4-den çogdama ýyganan.

Gülleri tas ýekeleýin, ownuk, ýapraklaryň goltugynda ýa-da çarşak şekilli ikä bölünen şahajyklarda ýerleşýär. Okarajygy ýalaňaç, silindrik, uzynlygy 3–4 mm, 5 sanly çykyp duran gapyrgalyja we 5 dişlije. Gül ýapraklary gülgün reňkli, uzynlygy, takmynan, 4–6 mm. Tyçinkalarynyň sany 6. Gozajygy üç germewli, uzynlygy 2 mm we ini 1 mm. Tohumy süýrümlik-ellipis kysmy, uzynlygy 0,5–0,7 mm we ini 0,3 mm, symgylt-goňur reňkli.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Birýyllyk frankeniýa ölkämiziň düzlük çölllerinde, şeýle-de jülgerlerde, deňiz derejesinden



400–600 metr belentlikde bitýär. Ol şorlaşan topraklarda, şorluklarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik aprel–iýunda gülleýär, iýun–awgustda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik Türkmenistanyň hemme etraplarynda duşýar.

**Tebigy gory.** Birýyllyk frankeniýa ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşýar. Her ýylda 20–30 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlik gülleýän döwründe (aprel–iýun) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Birýyllyk frankeniýanyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine fenolkarbon turşusy we olaryň ugurdaşlary, saponinler, alkaloidler, flavonoidler, eý maddalar girýär.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin oty iç sürüji, antikataral, ýylmaýy, agyryny köşeşdiriji, rahatlandyryjy serişde hökmünde peýdalanylýar.

Bezeg we ot-ýmlik ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Frankeniýanyň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, bir sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapa nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

## **BUASSÝENIŇ ARMYDY**

**Груша Буассье**

**Pyrus boissieriana**



87

**Häsiýeti.** Dag derman ösümliği. Armydyň dünýäde takmynan 60, Türkmenistanda 4 görnüşi duş gelyär.

Buassýeniň armydy – bähüller maşgalasynyň armytlar urugynyň boýy 2,5–4,0 metre ýetýän gyrymsy ýa-da açaş wekili. Şahalary tikensiz, ösümliğin ähli bölegi ýalaňaç. Ýapraklary uzyn (ülşünden uzynrak) inçe sapaklyja, togalak ýumurtga şekilli ýa-da tas togalak, esasy dilnen ýa-da sähelçe oýuk, ýokarsy kütäk ýa-da gysga ýitileşen, gyalary ownuk byçgyly, jähklenen.

Gülleri ownuk. Miweleri saýawan şekilli galkanjyga ýygnan, uzyn (4 sm çenli) inçe miwe sapaklyja, miwesinden birneme uzyn. Miweleri ownuk, gabarasy, takmynan, 1 sm çenli, tas şar şekilli, gyzylymtyl reňkli, ýalpyldawuk, nokatly siňňiljikler bilen örtülen, ýokarsy okara ýapraksyz, ýagny ir gaşýar.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Buassýeniň armydy ölkämizde deňiz derejesinden 800–1200 metr belentlikde bitýär. Ol gury ownuk topurly-daşlaşan we toýunly eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Seýrek, ýeke açaş ýa-da topbak bolup (100 düýpden köp bolmadyk) ösýär. Kserofit. Daragt aprel–maýda gülleýär, awgust–oktyabrda miweleýär. Ol tohumy hem kök çykyntylary arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Çohagaşda, Hasardagda, Palyzak gerşinde we Günuzyndagda, Tutluda, Hozludagda, Könekesirde; Merkezi Köpetdagda: Garagaşda, Sülükli de duşýar.

**Tebigy gory.** Buassýeniň armydy ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary

üçin gory ýabygory. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Daragt Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Daragtyň miweleri we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary bişýän döwründe (awgust—oktyabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mal güýçli hoşboý tagama eýe. Olary kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti — 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Buassýeniň armydynyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümlikde uglewodlar, organiki turşulyklar: limon, alma, C we P witamin, pektinler, eý maddalary we demir saklanýar.

**Peýdalanlyşy.** Daragtyň dermanlyk häsiýetleri barasyndaky ilkinji maglumatlar Katonyň (b.e. ön 234–149-njy ýyllar), Wergiliýanyň (b.e. ön 70-nji—b.e. 19-njy ýyllary), Pliniý ulynyň (b.e. 23–79-njy ýyllary), Makrobiýanyň (b.e. IV–V asyrlary) ylmy işlerinde berilýär.

Gadymy grek rowaýatlarynda diňe Geranyň we Afroditiň gudratly agajy bolman, özüniň şekili boýunça hem zenan bedenini ýada salýar. Güllerini dilinde «aram tapýaryn» diýen manyny aňladýar.

Gündogaryň ajaýyp alymy we tebigaty öwrenijisi Abu Aly ibn Sina «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly ensiklopediýasynda guradylan armydyň pugtalandyryjy, ýaralary bitiriji, teşneligi gandyryjy dermanlyk häsiýetleriniň bardygyny tassyklaýar. Onuň miweleri we tohumy aşgazany pugtalandyryr. Şiresi ganly içgeçmede haýyryly. Daragtyň küli awuly kömelekler bilen zäherlenende peýdaly.

Orta asyrlaryň alymy Abu Reýhan Biruny özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly nusgawy işinde armydyň şypaly häsiýetlerini belleýär.

Öz wagtynda görnükli alym-lukman Seyit Ysmaýyl Gürgenli (Jürjany) «Horezm şanyň genji-hazynasy» atly kitabynyda turşy armydyň şiresini beýni we kelle kesellerinde, şeýle-de rahatlandyryjy serişde hökmünde ulanmaklygy maslahat berýär.

Orta asyrlaryň meşhur tebibisi Muhammet Huseýn «Melhemler hazynasy» atly nusgawy eserinde tekarlaýar «...armyt pugtalandyryjy häsiýete eýe, şonuň üçin içegeleriň bozulmalaryna has haýyryly. Ol şähdiňi açýar, tämizlendiriji täsirli, keýpiňi çaglaýar, çalt ýürek urma, peşew haltasynyň çawlamasynda peýdaly, mädäni pugtalandyryr, iýmitiň

siňmekligine ýardam berýär. ...Haçanda, armydyň ysy güýçli bolsa, şonça-da onuň peýdasy köpdür, esasanam ýürek üçin. Armydyň almadan tapawydy şeýle-de ol öýken kesellerine peýdalydyr».

Halk lukmançylygynda armydyň miweleri ýürek çalt urmada, dartgynlykda, peşew-jyns ulgamlarynyň sowuklamasynda, peşew çykaryjy ýollarynyň kesellerinde, sözenekde, böwrek sökelliklerinde, prostatitde peýdalanýlar. Guradylan miweleriniň peti allergiýada, içgeçmede, gastritde, kolitlerde, peşewdaş kesellerinde, üsgülewükde, dümewde, inçekeselde ulanylyr. Armydyň turşy we gataňsy sortlary aşgazany we bagry pugtalandyryr, işdäni açýar, ýöne olar kynlyk bilen özleşýärler, şonuň üçin garry adamlara, şeýle-de nerw ulgamy güýçli bozulana, ysmazlara we başgalara peýdalanmak maslahat berilmeýär. Uly ýaşly adamlar üçin armydyň ýumşak sortlary peýdalydyr, şeýle-de semizligi we süýji keselini bejermekde haýyryly.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly we Gökdepe etraplarynyň daglyk obalarynda) armydyň miweleri kömeleklerden güýçli zäherlenilende, tohumy soguljan kesellerinde ulanylyr.

Ähli iýmişler ýaly armydy hem çendenaşa iýmeli däl (ony aç garna iýmek bolmaýar, diňe nahardan ýarym sagat soň iýmeli), yzyndan suw içmek (esasan, çig we sowuk), şeýle-de gaty doýansoň we etden soňra iýmek maslahat berilmeýär.

Armyt özünde ýokumly maddalary köp saklaýanlygy üçin iýmişleriň arasynda ilkinji ýerleri eýeleýär. Onuň agaçlaryndan mebelleri, saz gurallaryny, çeperçilik önümlerini ýasaýlar.

Bezeg, azyklyk, witamin saklaýjy, bal beriji, tehniki we boýag ösümliگی.

### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Daragtyň 100 gram owradylan miwelerini 1 litr suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 30 minut gaýnatmaly. 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Armydyň 100 gramyny we süläniň ýarmasynyň 75 gramyny 0,5 litr suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan otda 30 minut gaýnatmaly. Bir sagat goýmaly, birsalyndan süzmeli. Taýýar bolan peti gün içinde 3–4 gezek nahardan ön 1/4–1/2 bulgurdan (50–100 ml) kabul etmeli.

Daragtyň 100 gram guradylyp owradylan miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnaga atyp, syrçaly gapda pessaý alawda 30 minut gaýnatmaly. Sowuk suwda krahmaly eretmeli we ony gaýnap duran pete goşmaly. Bulap, gaýnatmaly. Soňra sowatmaly. Peti iç geçmede 1 gezek içmeli.



Armydyň arassalanan gabygyny we tohumyny aýna ýa-da jäch gaba ýerleşdirmeli, mäjumlamaly we 0,5 sm çenli gatlakda ýüzün, boýnuň, eliň, döşüň derisine çalyň, 15–20 minut goýmaly. Soňra ýyly suw bilen ýuwmaly, deriňe ýumşak el süpürgiç goýmaly we krem çalmaly.

Her günde armydyň täze miwelerinden 100 grama çenli iýmeli.

## BUNGENIŇ PORSUKERTI

Цельнолистник Бунге  
*Harlophyllum bungei*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Bungeniň porsukerti – rutalar maşgalasynyň porsukertler urugynyň boýy 30–60 sm yetýän köpyýlyk otjumak wekili. Ösümlik tutuş ýaşyl reňkli, ýalaňaç, gara, sähelçe bildirýän mäjzagazlar bilen örtülen. Baldagy sarymytyl, ýalpyldawuk, göni, şahalanan. Ýapraklary abat, yzygiderli gysylyp gysga sapajyga birleşýär, küteträk. Aşaky ýapraklary giň süýrümlik ýa-da togalak, ortakylary we ýokarkylary – süýrümlik ýa-da uýy çowly, käte gyalary az-kem buýrally, sapagy bilen bilelikde uzynlygy 1,5–3,0 sm.

Gül toplumy ýumşak, gülleri sapakly ýa-da sapaksyz. Gülyanynyň ýapraklary ownuk köp sanly däl, uýy çowly. Okarajygy galýar. Okara ýaprajyklary ýumurtga şekilli, kütüräk, uzynlygy, takmynan, 0,75 mm. Gül ýapraklary sary reňkli, süýrümlik, kütäk, gysylan gysga (takmynan, 1 mm) dyrnaklyja, uzynlygy 6 mm we ini 2 mm. Tyçinkalarynyň esasy gültäjjinden 1,5 esse gysga, aşaky bölegi giňän, ol ýeri dügürlü. Düwünçegi ýalaňaç, dügürlü bilen örtülen, tas

ösüntgisiz, her höwürtgede 2 miwedanly. Gozajygy açylyan, dügürlü, gabarasy, takmynan, 4–5 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Bungeniň porsukerti ölkämizde düzlüklerde, deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol çägesow topraklarda, dürli reňkli dag jynslarynyň çykýan ýerlerinde, çagyly-toýunsow eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär, iýun–iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Balkanda: Balguýuda, Gurtlybilde, Adamguýuda, Ajyguýuda, Baleýşemde; Kiçi Balkanda; Kürendagda: Jebelde; Bathyzda: Ýeroýulanduzda, Tegelekgyrda; Köýtendagda; Hazaryaka çölünde; Üstýurtda; Demirgazyk-Günbatar Garagumda: Akjaguýmada, Geçitde; Üňüzaňyrsy Garagumda: Mürzeçalede, Daşajyda, Takyrdamlyda; Merkezi Garagumda: Başkakda, Soltandestde; Gündogar Garagumda: Üçajyda, Hatyrdaşda; Sandykly çölünde; Tejen-Murgap medeni oturymynda: Ymambabada, Gökjede, Baýramalyda, Gadynguýuda, Mollaguýuda, Saryýazyda; Amyderýa medeni oturymynda: Farapda, Türkmenabat – Barhanlarda duşýar.

**Tebigy gory.** Bungeniň porsukerti ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty hem ýapraklary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury hem salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Porsukertiň düzümine alkaloidler: skimmianin, diktamnin, robustinin girýär. Onuň köklerinde 0,09–0,13% alkaloidler saklanýar. Ösümligiň ýerüsti böleginde 0,01–0,04% alkaloidler, kumarinler: ostol (osthol), 6-metoksi-7-(3',3'-dimetilalliloksi) kumarin, 5-gidroksi-7-metoksikumarin, skopoletin, izoskopoletin, bungendiol bar. Ýapraklarynda 0,03–0,04% alkaloidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyrlarda Gündogaryň beýik alymy, tebigaty öwreniji Abu Aly ibn Sina özüniň dünýä medisina edebiyatynda mynasyp orun alan «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly işinde soguljanly we beze kesellerini, demrewi, uçuklary, ysmazy, nerw sowuklamasyny, dowamly bogun we kellagyryny, ýarlary, başlary, burundan gan gitmäni bejermekde haýyrlý diýip tkrarlaýar. Şeýle hem ol aşgazany pugtalandyryýar, ýiti içege sanjylaryny aýyryýar, dem alyş we jynsy işjeňliginiň ýokary

ahwalyny kadalaşdyrýar, şeýle-de damarlary giňeldiji, soguljanlary çykaryjy we zäherleriň garşysyna täsire eýe. Gulak agyryda, ondaky sesleri aýyrmakda, porsukertiň şiresini gulaga damdyrmak arkaly agyryny köşeşdiriji serişde hökmünde ulanylýar. Ýumurtgajyklaryň çişinde ýapgy edilýär. Tohumy synçygylawugy aýyrýar, iýmitiň siňmegine ýardam berýär, işdäni açýar, esasan, maýdalanar hoz we injir bilen garylany aşgazany we dalagy pugtalandyrýar. Oty görşüni gowulandyrýar, sarymsagyň we soganyň ysyny aýyrýar. Giden peýdaly häsiýetleri bilen bir hatarda, ösümlik zäherlidir, şonuň üçin ony gereginden artyk ulanmaly däl. Ulanmazynň ön ýanynda hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Gündogaryň meşhur alym-lukmany Seyit Ysmaýyl Gürgenli (Jürjany) özüniň «Horezm şanyň genji-hazynasy» atly nusgawy eserinde ösümliğin infarktda we letargiyada şypaly häsiýete eýedigini barasynda ýazýar.

Halk lukmançylygynda ösümliğin ýerüsti böleginiň peti kükrek we aşgazan kesellerinde, garnyň ýellenmesinde ulanylýar. Mundan başga-da, deri kesellerinde otunyň jöwherine suwa düşünilýär.

Boýag ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–6 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Porsukertiň 100 gram owradylan ýapraklaryny 5 litr gaýnag suwa atyp, ýarym sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Melhemlik jöwhere günün dowamynda 2 gezek suwa düşünmeli.

## **BUNGENIŇ ÝÝLGYNY**

**Гребенщик Бунге**

**Tamarix bungei**



**Häsiýeti.** Çöl-düzlük derman ösümliği. Gyrymsy agajyň dünýäde takmynan 90, Türkmenistanda 14 görnüşü duş gelýär.

Bungeniň ýylgyny – ýylgynlar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 5–6 metre ýetýän gyrymsy agaç wekili. Sütünleriniň gabygy goňur-gyzyl reňkli. Ýapraklary ýumurtga şekilli, uzynlygy 1,0–1,5 mm we ini 0,5–1,0 mm, ýitiräk, baldaga ýarym saralýan. Salkymy ýokarky, gür, tas baş şekilli, uzynlygy 0,7–3,0 sm we ini 3,0–4,0 mm, tas sapaksyz ýa-da gül saklaýjylarda, gysga, uzynlygy 0,5 mm, sübsejige gysylan. Gülyanynyň ýaprajyklary ujy çowly, ýitiräk, uzynlygy 0,7–1,0 mm, gyralary perdeli, okarajykdan gysga ýa-da oňa deň (gül saklaýjy bilen bilelikde).

Gülleri baş agzaly. Okarajygy gül ýapraklaryndan 1/4 gysga, ýumurtga şekilli, gyralary giň perdeli, kütgräk ülüşli. Gül ýapraklary süýrüntik ýumurtga şekilli, gülgün reňkli, uzynlygy 1,5–2,0 mm we ini 0,5–1,0 mm, gaçyan, kütäk. Tyçinkasynyň sany – 5. Baş kepjeli diski inçe sapajyga birigen, gültäjjinden sähelçe uly. Tozgajyklary kütäk. Sütünjiginiň sany – 3, düwünçekden 3–4 esse gysga. Gozajygy okarajygyndan 3–4 esse uzynrak, uzynlygy 4–5 mm we ini 1,2 mm.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Bungeniň ýylgyny düzlük çöllerde, çägeleşen şorluklarda, çägeli çöllerde ösüp boý almany halaýar. Daragt maý–awgustda gülleýär, iýun–awgustda miweleýär. Ol wegetativ ýoly bilen köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly we Kiçi Balkanda; Kürendagda; Günorta-Günbatar Köpetdagda; Merkezi Köpetdagda: Sekizýapda; Gündogar Köpetdagda: Guruhowdanda, Çyrlakda; Bathyzda; Köýtendagda:



Atamyraýyň golaýyndaky Zeýitde; Hazarýaka çölünde: Aýdyňda; Merkezi Garagumda: Başkakda; Günorta-Gündogar Garagumda: Kyrkguýuda; Sandykly çölünde; Tejen-Murgap medeni oturymynda: Ymambabada; Amyderýa medeni oturymynda: Hatapda duşýar.

**Tebigy gory.** Bungeniň ýylgyny ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

**Dermanlyk çig maly.** Daragtyň ýapraklary we gülleri dermanlyk maksatlary üçin hyzmat edýär. Olary ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýul) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda, aýk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklardan taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara, gülleriniňkini – gutujyklara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Bungeniň ýylgynyň himiki derňewi doly ýerine ýetirilmedik. Onuň gök şahajyklarynda 0,80–3,75% eý maddalary saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Daragtyň dermanlyk häsiýetleri irki wagtlardan belli bolupdyr. Ol barasyndaky ilkinji maglumatlar gadymy grek alymy we akyldary Kolumellanyň (b.e. I asyry) işlerinde duş gelýär.

Ösümlik özüniň «tamariks» latyn adyny öňler Pireneýadaky «Tamariz» derýasynyň kenarynda ösenliginden alypdyr.

Gündogaryň görnükli lukmany, meşhur alym-tebib Abu Aly ibn Sina özüniň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly düýpleýin işinde ösümliğin petini ýatgydan gan gitmede, bitleri aýyrmakda; onuň tüssesini çygly başlarda we mamada peýdalanmaklygy maslahat berýär. Daragtyň ýapraklary, çişleriň garşysyna serişde bolup hyzmat edýär. Olaryň petleri dalak keselinde, dowamly içgeçmede, diş agyryda (agyz boşlugyny çäýkamak) ulanylýar. Awtor onuň miwelerini göz kesellerini bejermekde, dişleriň döwürmeginiň we çüýremeginiň önüni almakda, gany togtadyjy serişde hökmünde, tohumyny zenan kesellerinde giňden peýdalanyndyr.

Abu Reýhan Biruny özüniň «Lukmançylykda farmakognosiýa» atly ensiklopediýasynda hem ýylgynyň melhemlik häsiýetleri barasynda söz açýar.

Orta asyrlarda ýaşap geçen görnükli lukman Muhammet Gaýmaz Türkmen «Pygamber tebigçiligi» atly diwanynda ösümliğin pugtalandyryjy häsiýetleri barasynda tekrarlaýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Gökdepe, Ak bugdaý, Serhetabat we Köýtendag etraplary) daragtyň ýaşajyk şahajyklaryndan taýýarlanýan peti reumatizmde ulanylýar.

Bezeg, bal beriji, eýleýji we çäge berkidiji ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) gury ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10–15 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Ýylgynyň 100 gram gyradylan ýapraklaryny we güllerini 1 litr gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan alawda 10 minut gaýnatmaly. Ýarym sagat goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Peti ýyly wanna görnüşinde kabul etmeli. Ýatgy gan akmasyna netijeli serişde.

## BURÇLY GÜLHATMA

### Шток-роза угловатая

### Alcea angulata



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliگی.

Burçly gülhatma – mamamçörekler maşgalasynyň gülhatmalar urugynyň boýy 60–150 sm ýetýän ikiýyllyk ýa-da köpýyllyk otjumak wekili. Baldagynyň esasynda köp sanly şahajyklar çykýar, olar gür ýumşak ak keçe ýaly tüýjagazlar bilen örtülen. Aşaky we ortaky ýapraklarynyň ýaprak ülüşleri togalak ýa-da ýaybaň ýumurtga şekilli, ýürek kysmy, sähelçe baş-ýedi kepjeli, gyralary dişlije, iň ýokarkylarynyň esaslary tegelenen ýa-da kesilen, tas üç kepjeli.

Gülleri salkyma ýygananan, aşaky bölegi ýaprakly. Kiçi okarajygy (6–9) bitişen, ýaprajyklaryndan 1/3–1/4 esse

uzyn, okarajyga deň ýa-da ondan gysga ýa-da oňa ýakyn. Gültäji okarajygyndan 2,25–2,5 esse uly, ak reňkli, esasy guramadyk ýagdaýynda sary, guranda ýaşyl reňkli. Miweleri 25–32 sany aýry miwejiklerden ybarat, kese kesimi 16–20 mm. Miwejikleri ganatsyz, arkasy görnetin tutuş guýguçly, kese kesimi gasyňly we tutuş gyalary ýyldyz şekilli tüýlçe, gapdaly ýalaňaç, tas egrelýän ýerine çenli torly-gasyňly. Tohumy goňur reňkli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Burçly gülhatma ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol eňňitlerde we jülgelerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýulda gülläýär, iýun–awgustda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Jelilede, Soňudagda, Serdarda, Gamyşlyda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Tutlybilde, Ýuwangalada, Çohagaçada, Sumbar derýasynyň jülgesinde, Parhaýda, Gudzundagda, Bakjada duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Burçly gülhatma ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeliýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory çäkli. Ekip ýetirdirmek maslahat berilýär. Ol Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri we porrugy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Gazylp alnan kökleri arassalamaly, ýuwmaly hem guratmaly, deslapky ülüşlere bölüşdirmeli. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde goýmaly. Kökleriň we porrugyň saklanyş möhleti – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Burçly gülhatmanyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine nemler girýär. Onuň ýerüsti bölegi kumarinleriň yzlaryny saklaýar.

**Peýdalanylyşy.** Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly etrabyň daglyk obalarynda) ösümliğin kökleri hem porruklary ýumşadyjy, sowuklamanyň garşysyna, gakylyk goparyjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Mundan başga-da, süňk döwürlerinde, bogunlaryň çykmasynda, deri kesellerinde, yzaly gijeýän dermatitde, psoriazda, ekzemada ulanylýar.

Bezeg, bal beriji, ot-iymlik, tehniki we boýag ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 2 nahar çemçe (30 g) gury köklerini 0,5 litr gyzgyn suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5 minut gaýnatmaly. Bir sagadyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti içegeleriň sowuklama

ahwallarynda klizm üçin ulanmaly, şeýle-de yzaly yerlerine çalmaly.

Gülhatmanyň 1 çay çemçe (5 g) owradylan köklerini 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suwuň içine atyp, bir sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde her 2 sagatdan 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli. Deriniň zeperlenen yerlerine çalmaly.

## BÜDÜR-SÜDÜR AKARGÜL

Девясил шероховатый  
*Inula aspera*



**Häsiyeti.** Dag derman ösümliği. Būdūr-sūdūr akargül – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 30–40 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Baldagy göni, tas ýalaňaç, iň aşaky bölegi käte gara goýy gyrmyzy reňkli, yokarsy açyk ýaşyl, süýrümlik-joýaly, tas ýalaňaç ýa-da sähelçe bulam-bujar, seýrek çiteneqli, tüýlçe. Ýapraklary ýalpyldawuk, derijimek, gaty, iň aşakysyndan özgesi sapaksyz, ýarym baldaga dolanýar, esasy ýürek şekilli, süýrümlik ujy çowly, uzynlygy 4–6 sm we ini 2–3 sm, daşkylary ýitileşen, iki tarapy hem ýalaňaç, görnetin tor şekilli damarly, gyalary ownuk dişlije, mundan başga-da, yokaryk gönügen goýy gyrmyzy çiteneqli.

Sebetjigi gysga sapakly, ownuk, gabarasy 10–15 (20) mm, 2–6-dan galkana ýygnan, seýrek ýekeleşýin. Gyny köp hatarly; onuň daşky ýapraýyklary gysylan, giň ýumurtga şekilli ýa-da süýrümlik ýumurtga şekilli, uzynlygy 5–7 mm we ini 1,5–2,5 mm, arkasy ýalaňaç, ýalpyldawuk, gyalarynda yokaryk gönügen tüýlçe, yokarsy otjumak, goýy gyrmyzy, togalagrak-kepjeli, bükülmedik, gysga, ýiti. Gynynyň içki ýapraýyklary çzykly, uzynlygy 9–10



mm we ini 1 mm, ýiti, germewli, ýokarsy sähelçe tüýljuje. Gülýatagy ýalaňaç. Gapdal gülleri sary reňkli, dillijesi gyndan uzynrak, uzynlygy 15–16 (20) mm, diljagazynyň uzynlygy 9 mm, we ini 1,5 mm. Trubkaly gülleri has gysga, uzynlygy 7–8 mm we ini 1 mm. Tozanjygynyň uzynlygy 3,0–3,5 mm, 2 çykyntgylý, uzynlygy, takmynan, 1 mm. Çigitjagazy ýalaňaç, uzynlygy 2 mm we ini 0,5 mm. Üpüjiginiň uzynlygy 5–6 mm.

**Ýaşaýyş aýratynlygy.** Būdūr-sūdūr akargül ölkä-mizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol gyýak-typçakly ösümlikleriň arasyndaky ownuk topurly demirgazyk otjmak eňňitde we gyrymsy agaçlaryň, dag jülgelerinde ösüp boý almany halaýar. Ösümlük (maý) iýün–awgustda güllýär, iýul–sentýabrda miweleýär. Ol tohumy we porrugy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Tutlybilde, Güýen we Ýoldere jülgelerinde; Merkezi Köpetdagda: Garaýalçyda, Arwazda, Degirmenlide, Müsünewde, Hozderede, Hyrsderede, Gylgylawda duşýar.

**Tebigy gory.** Būdūr-sūdūr akargül ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeliýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat beriliýär. Her ýylda, takmynan, 5 tonna çenli çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň porrugy, oty we ýapraklary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Porrugyny ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny we ýapraklaryny ösümlük güllýän döwründe (iýün–awgust) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Porrukdan taýýar bolan çig maly kagyz haltalara, otunyňkyny we ýapraklarynyňkyny – mata haltalara gaplamaly. Çig mallary gury, garaňky, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Porrugyň saklanýş möhleti – 2–3, otuňky we ýapraklaryňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Akargülüň ýerasty böleginde uglewodlar we onuň ugurdaşlary: 52% inulin; 2,6% efir ýagy, seskwiterpenoidler: alantolakton, izoalantolakton; triterpenpodler: fridelin; steroidleri: β-sitosterin; 0,06% alkaloidleri; poliasetilen birleşmeleri: winilpentaasetilen; aromatik birleşmeleri: 0,18% metil efir 7-izobutiriloksitol, 0,11% dimetil efir 7-izobutiriloksitol saklanýar. Ösümligiň ýerüsti böleginde 0,06% efir ýagy, seskwiterpenoidler, eý maddalar, flavonoidler bar. Güllerinde triterpenoidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň peti we jöwheri çişlerde, bagryň, bokurdagyň, ýiti respirator

we weneriki kesellerde, siňnillerde, stenokardiýada, apazmofiliýada, garaguş keselinde peýdalanylýar. Ösümligiň ýerüsti böleginiň peti we jöwheri zäherli ýylanlar çakanda detoksikasion serişde hökmünde, olaryň bugy başlarda, swişlerde, çybanlarda ulanylýar. Akargülüň otunyň jöwheri diareýada, miometriýanyň inwolýusiýasynda, iriňli otitde, diş agyryda, sedatiw, gemostatik, gakylyk goparyjy, diuretik, derlediji, garamükrüniň garşysyna serişde hökmünde haýyrlanylýar. Porrugynyň jöwherini aşgazanyň howply täze döremelerinde, stenokardiýada, gepatitde, çybanda, skorofulýozda, giperacid gastritde, dogrumdan soňky döwürde, detoksikasion we öt çykaryjy serişdelik üçin ulanylýar. Ösümligiň täze ýapraklary ýarany bitiriji serişde. Anginada we örgünlerde oňa bokurdagyň çaykalýar hem buguna tutulýar.

Ýöne welin, akargül çendenaşa köp peýdalanylanda gany zaýalaaýar, tohumyň mukdaryny kemeldýär, ony guradýar we jynsy işjeňligini peseldýär. Bu ýagdaýlary bitaraplaşdyrmak üçin sirke, miweleriň turşy şireleri we nar ulanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplary) akargüli aşgazan-ičege ulgamynyň organlarynyň kesellerinde, gyzzymada, suwa düşünmek arkaly rahatde peýdalanylýar.

Ösümlükden taýýarlanýan derman serişdeleri içege-leriň motor we sekret hyzmatynyň ýokarlanmasyny peseldýär. Ol gakylyk goparyjy, sowuklamanyň garşysyna täsir ediji häsiýete eýe. Ösümligiň köklerinde we porrugynda saklanýan efir ýaglary antiseptik we soguljanyň garşysyna täsirli.

Durmuşda etli çorbalara we palawa hoşboý tagam bermekde ulanylýar.

Bezeg, bal beriji we boýag ösümlük.

### **Derman taýýarlanlyşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnaga atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti günüň dowamynda her 3 sagatdan 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Akargülüň we aýypenjäniň köklerinden deň gatnaşykda 200 gram garyndysyny 10 litr gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan alawda 15 minut gaýnatmaly. 1,5 sagat goýup, süzmeli. Peti çaga rahatinde wanna görnüşinde haýyrlanmaly.

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) owradylan köklerini 3 bulgur (600 ml) sowan gaýnag suwa atyp, 8 sagat goýmaly. Yzysüre süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 4 ýola nahardan 15 minut ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Akargülüň 1 çay çemçe (5 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 10 minut goýmaly. Hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri günün dowamynda içmeli.

Akargülüň, çerbiýäniň we buýanyň deň gatnaşykda köklerinden taýýarlanylýan 2 çay çemçe (10 g) garyndyny, 0,5 litr suwa atyp, 8 sagat goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri her gün 3 wagtyňa 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Ösümligiň 4 çay çemçe (20 g) owradylan porrugyny 1/2 bulgur (100 ml) 96%-li spirte atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 2 hepde goýmaly. Birsyhly çäýkap durmaly. Taýýar bolan şerbeti günün dowamynda 3 gezek 10 damjadan içmeli.

Her günde akargülü 6,5 grama çenli peýdalanmaly.

94

## ÇAL GALGAN

Бодяк седой

*Cirsium incanum*



**Häsiýeti.** Dagetek haşal derman ösümligi. Çal galgan – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň galganlar urugynyň boýy 50–100 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ösümligiň köki ok kök bolup, uzyn şahalanýar, olardan kökýanynyň ýapraklarynyň palajy emele gelýär. Baldaklary dik, joýaly, inçe kerep şekilli tüýljuje, ýokarky bölegi şahalanan, ak keçe kimin tüýljuje. Kökýanynyň ýapraklary süýrümlik ýa-da giň elliptik, uzynlygy 8–10 sm we ini 2,5–6,0 sm, çuň bolmadyk per şekilli bölünen ýa-da tas abat, aşagy ak keçe ýaly tüýljuje, ýokarsy ýaşyl, ýalaňaç ýa-da inçe kerep kysmy tüýljuje, gyralary ownuk ýa-da uly kirpik şekilli çitenekli, ýokarsy kütelen, esasy gysylan, gysgajyk sapakly. Baldakdaky

ýapraklary ýaýbaň ujy çowly ýa-da elliptik, uzynlygy 10–18 (25) sm we ini 2–6 sm, tas ortasyna çenli per şekilli bölünen, gyralary käte inçe uzyn çitenekli, gysga, baldakdan gaçmaýar. Baldagyň ýokarky ýapraklary, adatça, abat, has kiçelen.

Gül sebetleriniň uzynlygy 1,5–2,0 sm we ini 10 mm çenli, baldagyň depesinde we şahajygy ekeleýin ýa-da 2–4-den bir-birine ýakyn, olar umumy galkan görnüşli gül toplumyny emele getirýär. Ýapraklaryň gyny ýaşylymtyl-goýy gyrgyzy reňkli, adatça, çitenekleri gaňyrlan, aşaky bölegi sähelçe kerep kysmy tüýljuje. Gynyň daşky we ortaky ýapraklary ýumurtga şekilli görnüşde, içkileri – çyzykly ujy çowly. Gülleri gyzylymtyl-sowsany reňkli, uzynlygy 15 mm çenli. Çigitjagazyň uzynlygy 3 mm. Üpüjigi sym-gylt-ak reňkli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Çal galgan ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol dag derýajyklarynyň golaýyndaky jülgerlerde, köne ekin meýdanlarynda we suwarymly meýdanlarda haşal ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–awgustda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Sumbarda, Bendesende, Çendirde; Merkezi Köpetdagda: Sarymsaklyda, Hyrsderede, Mergenölende, Gylgylawda, Arçabilde, Gosysda, Gökderede, Duşakerekdagda, Wanowskide; Etrek medeni oturymynda duşýar.

**Tebigy gory.** Çal galgan ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Kähalatlarda haşal ösümligi hökmünde duş gelýär. Her ýylda, takmynan, 15 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň kökleri, oty, ýapraklary, gülleri we miweleri çig mal bolup hyzmat edýär. Çal galganyň köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny, ýapraklaryny we güllerini – gülleýän döwründe (maý–iýun), miwelerini – bişýän wagtynda (iýul–awgust) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada ýa-da oňat ýel çekerli jaýda umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ösümligiň otundan we ýapraklaryndan taýýar bolan çig maly mata haltalara, köklerini, güllerini we miwelerini kagyz haltajyklara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Olary gury we salkyn ýerde saklamaly. Kökleriniň saklanş möhleti – 2–3, otunyňky, ýapraklarynyňky, gülleriniňki – 1–2, miweleriniňki – 3–4 ýyl.



**Himiki düzümi.** Çal galganyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümligiň ýerüsti böleginde linarin, pektolinarin (7-rutinozidn pektolinarigenin) flavonoidleri saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümlük umumy berkidiji we bagyr hem öt ýollarynyň sökelliklerinde öt çykaryjy hökmünde, şol sanda sarygetirmede, sowuklama ahwallarynda, bitmesi kyn ýarlarda; kökleri – dem alyş ýollarynyň kesellerinde, pnewmoniyada, bronhektaziýada, öýkeniň absesinde, gangusmada; ýapraklary – deri kesellerinde peýdalanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplary) ösümligiň otunyň we gülleriniň petidir jöwherini öt ýollarynyň kesellerinde, gastritde, enteritlerde, gipergidrozada, öýken inçe keselinde, üsgülewükde, newrasteniýada, newrozlarda; miwelerini – zenan kesellerinde ulanylýarlar.

Ylmy lukmançylykda flavonoidleriň jeminiň sowuklamanyň garşysyna, ýara bitiriji, inçe keseliň garşysyna bolan işjeňlik häsiýetleri ýüze çykaryldy.

Bezeg, iýmitlik we bal beriji ösümlük.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 5 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Galganyň 1 çay çemçe (5 g) owradylan köklerini 0,5 litrlik termos demlemeli, bir sagat goýmaly. Hasa bilen süzmeli. Jöwheri gün içinde 3 ýola nahardan 15 minut ön 1 nahar çemçeden (15 ml) peýdalanmaly.

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 40 minut goýmaly. Yzsüre süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 sapar nahardan 30 minut ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Galganyň 2 nahar çemçe (30 g) gury ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, bir sagat goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Jöwheri deriniň zeperlenen ýerlerine çalmaly.

## **ÇALA TÜÝLÜJE PEÇEK** **Вьюнок слабоволосистый** **Convolvulus subhirsutus**



95

**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Çala tüýlülje peçek – peçekler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 40–70 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ösümlük esasyndan göni baldakly ýaýraň şahalanan, gysga bulam-bujar ýüňjümek tüýlülje, aşaky tarpý gysylan tüýlülje, ýokaryk gönüggär, inçe we uzyn, gapdallaýyn ýokarlygyna şahajykklar gönüggär, bol çalymtyl we ownuk gysylan tüýlülje. Ýapraklary süýrümтик, aşaklygyna gysylan sapaklyja, aşagy gür tüýagazlar bilen örtülen, ýokarsy tüülje (ýöne gür däl), ýokarlygyna ululygy boýunça kiçelýär.

Gülleri şahajygynyň depesinde ýekeleşýän ýerleşýär, inçe gysga sapajykly, umuman, ýaýraň sübsejik gül toplumyny emele getirýär. Okaraýaprajyklary ujy çowly, ýokarsy ýitileşen, içkileri – ters ýumurtga şekilli, ýokarlygyna birden-kä gysylýar we uly bolmadyk çitenejik emele getirýär, ownuk gysylan tüýlülje, miwede – egrelen, uzynlygy 4–5 mm. Gültäji açyk gülgün reňkli, gyralary gowşak kepjeli, uzynlygy (12) 15–20 mm, daşy 5 sany kese tüýjagazly, çyzykly. Gozajygy açyk reňkli, süýrümтик, ýalaňaç, dykz diwarly, ululygy, takmynan, 4–6 (7) mm. Tohumy süýrümтик şar şekilli, ýalaňaç, gara-çalymtyl ýa-da goňur reňkli, ululygy, takmynan, 3–4 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Çala tüýlülje peçek ölkämizde deňiz derejesinden 400–800, şeýle-de 800–1600 metr belentlikde bitýär. Ol mele toprakly ownuk topurly eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlük maý–iýunda gülleýär, iýun–awgustda miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Yaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Jelilede, Soňudagda, Çukurgalada; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda, Ýokarky Sumbarda, Hojagalada, Kösedagda, Hasardagda, Süntde, Çendirde; Merkezi Köpetdagda: Garaýalçyda, Arwazda, Tagarawda, Aksuwda, Degirmenlide, Sülüklide, Müsünewde, Mergenölende, Mürzedagda, Gylgylawda, Germapda, Heyrabatda, Çäýekde, Çopandagda, Arçabilde, Hanýaýlada, Giňdiwarda, Bozukýamowda, Uly Garaňkyda, Bagyrda, Gökderede, Duşakerekdagda, Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Dagysda, Daştoýda, Asylmada, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Guruhowdanda, Çyrlakda, Şamlyda, Babadurmazda, Hiwabatda, Arçynýanda, Gyzgynçaýda; Bathyzda: Pulhatynda, Akarçeşmede, Serhetabatda; Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Çala tüýlüne peçek ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde haşal ösümliگی hökmünde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Her ýylda, takmynan, 40–50 tonna çig maly ýygnamaga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliگیň köki, oty, gülleri we tohumy dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Peçegiň kökünü ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny we güllerini – gülleýän döwründe (may–iýun), tohumyny – bişýän wagtynda (iýul–awgust) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Kökünden taýýar bolan çig maly kagyz haltalara, otuny – mata haltalara, güllerini we miwelerini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün şöhesi göni düşmeyän ýerde saklamaly. Kökleriň we tohumlaryň saklanýş möhleti – 2–3, otunyňky we gülleriniňki – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Peçegiň düzümine alkaloidler girýär. Onuň köklerinde 2,68–4,10% alkaloidler: 1,5% konwolwin, 0,81% konwolamin, konwolwisin, konwolidin, konfolin, fillalbin, subhirzin saklanýar. Ösümliگیň ýerüsti böleginde 0,50–2,08% alkaloidler: 1,057% konwolwin, 0,28% konwollamin, konwolwisin, konwolwidin; kumarinler we flavonoidler bar. Tohumynda 0,52% alkaloidler: konwolwin hem konwolamin saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliگیň otunyň petleri we jöwherleri demgysmada we öýken inçekesinde, şeýle-de agyryny aýryjy, damar çekmäniň garşysyna we ýarany bitiriji serişde hökmünde peýdalanylýar. Peçegiň tohumyndan taýýarlanylýan jöwheri aşgazan-ichege kesellerinde ulanylýar.

Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda ösümliگیň otunyň peti hem jöwheri öýken inçekesinde, bronh demgysmasyna, ýarany bitiriji, agyryny aýryjy, damar çekmesiniň garşysyna serişde hökmünde ulanylýar. Ýapraklarynyň jöwheri akaridid we detoksikasion (ýylanlar çakanda) işjeňligi ýüze çykarýar.

Ylmy lukmançylykda ösümliگیň kökleriniň we tohumynyň sedatiw (ýerli anestezirleýji) almatlary ýüze çykarylady, şeýle-de akuşerçilik amalyýetinde peýdalanylýar. Mundan başga-da, fosfoorganiki birleşmelerden, holinesteraz awylar bilen zäherlenilende bejermek üçin serişde bolup hyzmat edýär.

Peçek alkaloidleri we olaryň ugurdaşlaryny almak üçin çig mal hökmünde birnäçe ýurtlaryň farmakopeýasyna girýär. Onuň esasynda «tropasin» derman serişdesi (tropinli efir difenilsirke turşulary) hödürlenildi. Ol holinolitik, gangliblokirleýji serişde, aşgazan we on iki barmak içegäniň başlarynda, bronh demgysmasyna, Parkinsonyň keselinde, spastiki parezlerde, ysmazda, gan damarlarynyň we garyn boşlugynyň organlarynyň ýylmanak muskullarynyň gysylmasyna netijeli serişdedir.

«Konwokain» derman serişdesi anestezirleýji serişde hökmünde otorinolarinologiki, oftalmologiki we stomatologiki amalyýetinde peýdalanylýar.

Bal beriji we ot-ýimlik ösümlik.

### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Peçegiň 1 çay çemçe (5 g) guradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Ösümliگیň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan alawda 10–15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti gün içinde 3 ýola 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli. Netijeli iç sürüji serişde.

Peçegiň 1 nahar çemçe (15 g) güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Emele gelen peti günde 3–4 sapa nahardan 30 minut ön 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.

Ösümliگیň 1 çay çemçe (5 g) guradylan tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, goýmaly. Az salymdan süzmeli. Taýýar bolan jöwheri gün içinde nahardan ön 3 gezek 1/2 bulgurdan haýyrlanmaly.

Peçegiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan ownuk otuny we güllerini 1/2 bulgur (100 ml) 70%-li medisina spirtiniň



içine atyp, agzy berk ýapylýan aýna gaba salyp, garaňky ýerde 10–15 gün saklamaly. Yzygiderli çaykamaly. Soňra hasadan geçirmeli. Şerbeti her gün 3 ýola bitmesi kyn ýarlara çalmaly, oň ýanyndan bir nahar çemçe (15 ml) şerbeti 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suw bilen gatnaşygynda deslapky garmaly.

## ÇOPANDAG AÝGÜLI

### Смолевка чопандагская

### *Silene czopandagensis*



**Häsiýeti.** Beýikdag derman ösümligi. Çopandag aýgüli – myhaklar maşgalasynyň aýgüller urugynyň boýy 10–15 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Köki küti, köp kelleli, baldaklarynyň köpüsi gülsüz, diňe käbirleri gül we miwe emele getirýär. Kökanynyň pudaklarynyň ýapraklary süýrümlik-ters ýumurtga şekilli ýa-da uýy çowly ýumurtga şekilli, yzygiderli süňüp giň sapaga çekilýär. Ýapraklarynyň uzynlygy 3,5–6,0 sm, ini 0,5–1,3 sm, ýokarsy ýiti. Baldakdaky ýapraklary (2–3 jübüt), kökanyndakylara meňzeş, ýöne has ownuk, uzynlygy 1,5–2,0 sm we ini 0,4–0,6 sm, esasyň gýralary sähelçe kirpiklije ýa-da ýalaňaç. Baldagyň aşaky ýarysy ýalaňaç, ýokarsy örän gysga we seýrek gaty tüýljuje.

Gülleriniň sany 3–8, baldagyň depesine toplanan we käte gysgajyk şahajykly ýokarky ýapraklaryň goltugynda ýerleşýär, gysga (uzynlygy 2–5 mm) tüýljuje sapakly. Gülýanynyň ýaprajyklary uýy çowly, ownuk, gýralary agymtyl, tüýljuje. Okarajygy jaňjagaz şekilli, sähelçe çişik, uzynlygy 12–14 mm we ini (3) 5–6 mm, gysga gaty tüýjagazlar bilen örtülen we ýitileşen dişlije, uzynlygy 3,0–3,5 mm. Gül ýapraklary agymtyl, okarajygyndan 1,5 esse uzynrak. Ülüşi esasynda 1/3-e çenli dilnen, 2 gysga

kütek gültäç ülüşlije, dynnajygy ýalaňaç, ýokarlygyna gulajyk kysmy giňän. Gozajygy ýumurtga şekilli, uzynlygy 6–9 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Çopandag aýgüli ölkämizde deňiz derejesinden 2600–2800 metr belentlikde bitýär. Ol ereýän garlaryň daşly eňňitlerinde, arçalyklarda we göwenliklerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýul–awgustda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy we kök çykyntgylary arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda diňe Merkezi Köpetdagda: Çopandagda duşýar. Ýeke-täk belli bitýän ýeri. Endemik.

**Tebigy gory.** Çopandag aýgüli ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ösümliğin aýratynlykda alnan üç meýdançasyndaky 100 m<sup>2</sup> ýerde 37 düýp (degişlilikde 12, 10, 5) hasaba alyndy (A.Akmyradow, 2009, 2011 ý.ý.). Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlik gülleýän döwründe (iýul) ýygnamaly. Çig maly teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Çopandag aýgüliň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine triterpenoidler, steroidler, azot saklaýyş birleşmeler, flavonoidler girýär.

**Peýdalanylyşy.** Ösümliğin dermanlyk häsiýetleri barasynda orta asyrlarda Gündogaryň parlak ýyldyzlarynyň biri, meşhur alym-ensiklopediýaçy Abu Reýhan Birunyň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly nusgawy işinde beýan edilýär.

Türkmen halk lukmançylygynda (Ruhabat etraby) otuny howply täze döremeleriň garşysyna, gusduryjy; petini – diş agyryda sedatiw; jöwherini – kellagyryda rahatlandyryjy serişde hökmünde, ukusyzlykda, ýürek we böwrek ýetmezçiliklerinde, ginekologiki kesellerde, ýatgydan, babasylda, öykenden, aşgazandan, burundan we beýleki gan gitmelerinde, iriňli otide peýdalanýarlar.

Ylmy lukmançylykda ösümliğin ýerüsti böleginiň antibakterial işjeňligi ýüze çykaryldy.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda

pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli, şeýle-de agzyňy çaykamaly.

Çopandag aýgülüň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 nahar çemçe (200 ml) gaýnag suwa atyp, az-kem goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapar 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

## ÇÖL PEÇEGI Вьюнок пустынный Convolvulus hamadae



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Çöl peçegi – peçekler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 25–40 sm ýetýän ýarymgrymsyja wekili. Ösümlik köp sanly çalymtyl-tüýlüje, has şahalanan, baldagynyň esasy ownuk gysylan tüýlüje, agaçlaşan. Baldagynyň şahajygynda gülleri ýerleşýär, has egilen, gataňsy, tas tikenli. Ýapraklary süýrümlik-çyzykly, inçe çyzykly, ownuk gysylan tüýjagazly, uzynlygy 5 sm çenli.

Gülleri ownuk ýokarky ýaprajyklaryň goltugyndaky şahajyklaryň ýokarsynda yekelýin ýerleşýär, tas sapaksyz. Okara ýaprajyklary süýrümlik-çyzykly ýa-da süýrümlik, ýiti, bol agymtyl-ýüňjümeň tüýlüje, uzynlygy (3)–4 mm. Gültäji ak reňkli, sähelçe egrenen, gyralary tas abat, uzynlygy, takmynan, (8) 10 mm, daşy baş sany kese tüýlüje çyzykly. Gozajygy süýrümlik şar şekilli, ýüňlüje, ululygy 4 mm.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Çöl peçegi ölkämizde düzlük çöllerinde, çagylyly we ownuk daşy çägesow topraklarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär hem miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Demirgazyk-Günbatar, Üňüzaňrýsy, Merkezi, Gündogar, Günorta-Gündogar Garagumda duşýar.

**Tebigy gory.** Çöl peçegi ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Käte haşal ösümligi hökmünde duş gelyär. Ol Gaplaňgyr, Repetek we Amyderýa döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň köki we oty dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Peçegiň kökünü ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny gülleýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda aýyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Kökünden we otundan taýýar bolan çin çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Kökleriň saklanyş möhleti – 2–3, otunyňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Peçegiň düzümine 0,42% alkaloidler girýär. Onuň kökleri 0,32–0,45% alkaloidleri: gigrini, kuskigirini, gamadini saklaýar. Ýerüsti böleginde kumarinler bar. Baldaklary we ýapraklary 0,05–0,09% alkaloidleri saklaýar.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyrlarda Gündogaryň parlak ýyldyzlarynyň biri, meşhur alym hem akyldar Abu Aly ibn Sina özüniň dünýä belli «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» eserinde «...ösümlik damarlary arassalaýar, bagryň we aşgazanyň dykyn almalaryny açýar, ol organlary pugtalandyrýar, synçygylawugy, içegelerdäki ýiti agyryny we sanjylary dep edýär, peşewi we aýbaşyny kowýar, gany togtadýar. Gowrulan oty organizmi pugtalandyrýar we ýatgyny nemlerden arassalaýar; tohumy, şiresi dowamly ysytmada nepli» diýip ýazýar.

Halk lukmançylygynda ösümligiň mäjumlanan täze oty hem guradylany ýarany bitiriji, gany togtadyjy, iç sürüji, der çykaryjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Porrugynyň tozy uky bozulmalarynda we ukusyzlykda ulanylýar.

Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda, ony ýarany bitiriji serişde hökmünde peýdalanylýar.

Ösümlik zäherli bolanlygy sebäpli, ulanmazyň ön ýanynda hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Bal beriji we ot-iymlik ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) guradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.



Peçegiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, syrçaly pitide haýal ýanyan otda 10–15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, hasadan geçirmeli. Peti gün içinde 1/2 bulgurdan (100 ml) 3 gezek kabul etmeli. Netijeli iç süriji serişde.

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) owradylp toz görnüşine çenli ýagdaýa ýetirilen köklerini bir litrlik termosada demlemeli, 30 minut goýmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jowheri her gün uka gitmeziň ön ýanynda ýarym bulgurdan (100 ml) peýdalanmaly.

## DÄNELIJE

### Шербушка круглолистная *Acinos rotundifolius*



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümlük. Otjumagyň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Dänelije – dodakgüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 5–15 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Baldagy бүдүр-сүдүр түýlüje, göni, şahalanan. Ýapraklary togalak-elliptik, sähelçe byçgy şekilli dişlije, sapaklyja. Ýokarky ýapraklary baldagyňyňka meňzeş, gül toplumy ýokarda.

Gülleri 4–6-dan ýalan çogdama ýygnanyp, ýapraklaryň goltugynda ýerleşýär. Okarajygy tüýlüje, egri trubkaly, esasy бүкүк, gaty бүдүр-сүдүр kirpiklije, egreden dişlije. Gültäji goýy gyrgyz reňkli, birneme okarajykdan uly. Hozjagazlary ownuk, uzynlygy, takmynan, 1,6 mm, ini 0,7 mm, ýumurtga

kysmy, ýokarlygyna burlan, aşaklygyna yzygiderli gysylýar, inçe öýjükli-dügürlü, uly, agymtyl, egreden, ýiti burçly gasyňly.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Dänelije ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol gury ownuk topurly we çagylyly eňňitlerde, käte haşal ösümligi hökmünde ösüp boý almany halaýar. Ösümlük aprel–maýda gülleýär, maý–iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Uly we Kiçi Balkanda: Garajaçesmede; Kürendagda: Däneatada, Temenderede; Günorta-Günbatar Köpetdagda; Merkezi Köpetdagda: Garawulda, Arwazda, Degirmenlide, Müsünewde, Heýrabatda, Arçabilde, Uly Garaňkyda, Ljüde, Duşakerekdagda, Damçada, Howdanda (Nagdaw); Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Dänelije ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeliýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde haşal ösümligi hökmünde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Her ýylda 8–12 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlük gülleýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Dänelijäniň düzümine fenolkarbon turşulary we olaryň ugurdaşlary: rozmarin, kriptohlorogen, hlorogen, flavonoidler: gomoeriodiktiola glikozidi, lýtuteolin, izosakuranetin, akasetin girýär. Ösümligiň ýerüsti böleginde 0,12–0,14% efir ýagy (onuň düzüminde 25% α-pinen, β-pinen, kamfen, terpinolen, 60% menton) saklanýar.

**Peýdalanlyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň oty aşgazan-ičege kesellerinde peýdalanlyýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň efir ýagynyň bakteriostatik işjeňligi ýüze çykarylady, şeýle-de mentolyň çeşmesi hökmünde peýdalanmak mümkinçiligi açylyp görkezildi.

Bezeg, bal beriji ösümlük.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) gury otuny 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 15 minut gaýnatmaly. 45 minutyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3–4 gezek nahardan ön 1 bulgurdan (15 ml) içmeli.

Dänelijäniň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan otuny 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 40 minut goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3–5 sapa 2 nahar çemçeden (30 ml) kabul etmeli.

## DOGRY SIELLA

Сиелла прямая

*Siella erecta*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Bezeg hem azyklyk otjumagyň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Dogry siella — saýawanlylar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 50–80 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Baldagy göni, içi boş, inçe joýajykly, bol şahalanan, ýapraklary bilen bilelikde ýalaňaç. Ýapraklary ýekeleýin däl. Aşaky ýapraklary suwa çümyär, inçe ýerleri gaýtadan per şekilli dilnen. Ýokarsynda, meýdançada 9–19 per şekilli ýapraklary ýerleşýär, olar süýri, oýuk ýa-da dilnen kütäk dişlije, kepjesiniň uzynlygy 5 sm çenli we ini 3 sm. Baldak-daky ýapraklary uýy çowly we çyzykly-uýy çowly, dilnen ýiti dişlije meýdançaly.

Sebetjigi 10–20 şöhlleje, gysga, garşylyklaýyn sapaklyja. Şöhleleri birmeňzeş däl, uzynlygy 2–3 sm. Gynlary otjumak, uýy çowly, köplenç, dilimlenen, aşaklygyna eglen, tas şöhllejiň ýaprajyklaryna deň. Sebetjigi köp güllüje, gynylyja. Gül ýapraklarynyň uzynlygy 0,5 mm. Miweleriniň uzynlygy 2 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Dogry siella ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol ýuwaş akýan çeşmeleriň we derýajyklaryň suwunda, çygly kenarda

ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–iýulda gülläýär, awgustda miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Tutluda, Guratyda, Sumbarda, Ymaratda, Ýolderede, Çendirde, Çakangalada, Garasuwderede; Merkezi Köpetdagda: Nohurda, Sülüklide, Mergenölende, Gernapda, Garagaçda, Arçabilde, Bagyrda, Gökderede, Wanowskide; Bathyzda: Serhetabatda; Köýtendagda: Hojapilatada duşýar.

**Tebigy gory.** Dogry siella ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ujypsyzja. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Sünt-Hasardag, Köpetdag, Bathyz we Köýtendag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri we ýapraklary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), ýapraklaryny — ösümlik gülläýän döwründe (iýun–iýul) ýygnamaly. Gazylyp alnan kökleri arassalamaly, ýuwup guratmaly, deslapky ülüşlere bölüşdirmeli. Çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Kökleriň saklanyş möhleti — 2–3, ýapraklaryňky — 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Dogry siellanyň düzümine uglewodlar we onuň kowumdaş birleşmeleri: manit; 0,12–0,18% efir ýagy, kumarinler: angelisin; 0,21–0,23% flavonoidler girýär. Onuň köklerinde poliasetilen birleşmeler saklanýar. Ýerüsti böleginde flavonoidler: kwersetin, 3-ramnoziliglyukozid, 3-glyukozid we 3-kwersetin poliglyukozid, 3-kemferol ramnoziliglyukozid bar. Güllerinde kwersetin flavonoidleri, miwelerinde 18,6–21,8% ýag (onuň düzüminde turşular: 4,70–5,97% kaprin, palmitin, 1,3% sterin, 12,29–18,0% olein, 48,70–65,76% petrozelin, 24,50–25,95% linol, 0,7% linolen) saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin ýapraklarynyň peti, jöwheri we şiresi stimullirleýji, garamükrüniň garşysyna we diuretik serişde hökmünde ulanylýar. Köklerini diş agyryda agyryny aýyrmakda haýyrlanylýar. Yöne öz-özünü bejermek howply, sebäbi ösümliğin köki örän zäherlidir. Şonuň üçin ulanmazyn ön ýanynda hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Ýerli ilat ösümliğin ýaşajyk ýapraklaryny işdäaçar hökmünde ulanýar.

Bezeg, azyklyk ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümliğin 2 çay çemçe (10 g) guradylyp owradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5 minut gaýnatmaly. Bir



sagadyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan öň 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Siellanyň 2 çay çemçe (10 g) owradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 2 sagat goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 2 nahar çemçe (30 g) owradylan köklerini 1 litrlik termos demlemeli, bir sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwher bilen agzyňy çaykamaly.

## DÖRTDIŞ RINDERE

### Риндера четырехщитковая

### Rindera tetraspis



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Nepisje owadan ösümligiň Türkmenistanda 2 görnüşi duş gelýär.

Dörtdeş rindere – buraçnikler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 20–30 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Köki küti, gara reňkli. Baldagy (1–3) pes, ýokarsy ýüňjüme, gyraňly, gül toplumynda şahalanan. Ýapraklary sähelçe tüýlüje, soňra tas ýalaňaç, zyzykly-ujy çowly ýa-da süýrümlik-ujy çowly, kökýanyndakylary yzygiderli sapaga gysylýar, käte ini 7 sm çenli, uzynlygy 20 sm, ýöne köplenç has inçe we gysga (uzynlygy 10 sm we ini 1,5 sm).

Gültäji syýa reňkli, trubkaly. Onuň kepjeleri uýy çowly, göni, tas trubka deň ýa-da ondan 1,5 esse gysga. Okarajygy ak keçe ýaly tüýlüje, onuň ülüşleri zyzykly, gültäjiniň trubkasyna deň. Gül sapajygy galkan şekilli sübseli, uly bolmadyk uzyn gül toplumyny emele getirýär. Diňe ýokarkylary gysga okaraly, tüýlüje-ýüňjüme. Gümmezjigi kese gasynjyk görnüşinde tas agzynda ýerleşýär. Tozgalygynyň uzynlygy 2–3 mm, süýrümlik, ýokarsy kütäk, giňän gysga sapajygyndan 2–3 esse uzynrak, esasy peýkam şekilli. Miweleri togalak, giň ganatlyja, diskasy ýylanak, ganatjygynyň daşky gyrasy, köplenç, gögümtil reňkli we görnetin ownuk dişlije.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Dörtdeş rindere ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol daşly we ownuk topurly eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik aprel–mayda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Müsünewde; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide, Guruhowdanda, Wahçada, Çyrlakda, Şamlyda; Bathyzda; Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Dörtdeş rindere ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ujypsyzja. Ekip ýetdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Köpetdag, Bathyz we Köýtendag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny ösümlik gülleýän döwründe (aprel) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün şöhləsi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Dörtdeş rinderäniň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümligiň düzümine saponinler, flavonoidler, efir ýagy, C vitamini, organiki turşular girýär.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň oty peşew we der çykaryjy, diuretik, iç sürüji, sowuklamanyň garşysyna, rahatlandyryjy serişde hökmünde, deri kesellerinde peýdalanylýar.

Bezeg we boýag ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 4 çay çemçe (20 g) gury otuny 1–1,5 bulgur (200–300 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan öň 1 bulgurdan (15 ml) içmeli.

Dörtdeş rinderäniň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, doly sowayança goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri günün dowamynda kabul etmeli.

Ösümligiň 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 4–5 sagat goýmaly. Hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 5–6 gezek nahardan 30 minut ön 2 nahar çemçeden (30 ml) içmeli.

## DÜRLI REŇKLI

## PORSUKERT

Цельнолистник разноцветный  
*Haplophyllum versicolor*



**Häsiýeti.** Dagetek derman ösümligi. Dürli reňkli porsukert – rutalar maşgalasynyň porsukertler urugynyň boýy 10–20 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ösümlük tutuş çal reňkli, gysga, bujur-sujur tüýlüje, nokatly mäjzagazlar bilen örtülen. Baldagy inçe, ýokaryk galyp duran, ýeterlik ýaprakly, şahalanan ýa-da, köplenç ýönekeý, ýöne gysgajyk az sanly ýaprakly goltukly şahajykly. Ýapraklary abat, tas sapaksyz, esasynda yzygiderli gysylan, köplenç, gyralary burumly. Iň aşaky ýapraklary ters ýumurtga şekilli ýa-da tas togalak, kütek. Ortaky we ýokarky ýapraklary süýrüntik ýa-da süýrüntik-ujy çowly (ujy çowla çenli), kütek ýa-da ýiti, uzynlygy 1,0–3,5 sm.

Gül toplumy ýumşak, merkezi güljagazlary tas sapaksyz, has ulurak. Gülýanyň ýapraklary çyzykly. Okarajygy galýar. Okara ýaprajyklary ýumurtga şekilli, kütüräk, uzynlygy, takmynan, 0,75 mm. Gül ýapraklary

çal-sary reňkli, arkasynda ýaşylymytl ýa-da symgylt-goýy gülgün, tüýlüje, süýrüntik, kütek, gysylan gysga (takmynan, 1 mm) dyrnaklyja, uzynlygy 5–6 mm we ini (2) 2,5 (3) mm. Tyçinkalary gül ýapraklaryndan 1,5 esse gysga, esaslary özaralarynda bitißen, aşaky bölegi giňän, ol ýeri sakgallyja. Düwünçeği ýalaňaç, sapaksyz, dügürli, gysgaja ösüntgili, her höwürtgede 2 miwedanly. Gozajygy açylyan, gysgajyk sapajykly, dügürli, gabarasy, takmynan, 3 mm.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Dürli reňkli porsukert ölkämizde düzlüklerde, dageteklerinde, çägesow we çagylyly toprakda, daşly we ownuk topurly eňnitlerde, jyglym daşly jarda ösüp boý almany halayar. Ösümlük aprel–mayda gülläýär, iýun –iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Gündogar Köpetdagda: Gäwersde, Aksuwda, Armansagatda, Kakada; Bathyzda; Köytendagda: Bazardepede, Hojaçilikde, Leýlimekanda; Sandykly çölünde; Köpetdagetek medeni oturymynda: Änewde; Tejen medeni oturymynda: Tejende, Sarahsda; Murgap medeni oturymynda: Baýramalyda, Sakarçägede duşýar.

**Tebigy gory.** Dürli reňkli porsukert ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeliýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty hem ýapraklary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlük gülläýän döwründe (may–iýun) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury hem salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Porsukertiň otunda alkaloidler, wersikozid lignanlar, wersikolin kumarinler saklanýar. Tohumynda ýokary ýag turşulary: linolew bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň otunyň peti we jöwheri deri kesellerini bejermekde (suwa düşünmek), ýapraklarynyň peti – diş agyryda, aşgazan kesellerinde, meteorizmde; gijilewükde çalgy we suwa düşünmek arkaly peýdalanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Serhetabat we Köytendag etraplary) otunyň petini gyzyldödegiň howply täze döremelerinde ulanylýarlar.

Ylmy lukmançylykda ýerüsti böleginiň ekstraktynyň Erlihiň ragynyň garşysyna sitotoksiki işjeňligi yüze çykaryldy. Boýag we ot-iymlik ösümlük.

### Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly



gapda haýal ýanýan otda 5–6 minut gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli. Şeýle-de günün dowamynda 2 gezek oňa suwa düşünmeli.

Porsukertiň 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp owradylan ýapraklaryny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, birneme goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 sapar nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 100 gram owradylan ýapraklaryny 5 litr gaýnag suwa atyp, ýarym sagat goýmaly. Yzsüre hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jöwhere günün dowamynda 2 gezek suwa düşünmeli.

## EÝRAN GYZYLAGAJY

Рябина персидская

*Sorbus persica*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Tenekar gadymy daragtyň dünýäde 90-dan gowrak, Türkmenistanda 3 görnüşi duş gelýär.

Eýran gyzylagajy – bägüller maşgalasynyň gyzy-lagaçlar urugynyň boýy 4–5 metre ýetýän agaç wekili. Pyntyklary sähelçe tüýljuje. Ýapraklary elliptik, togalak-elliptik ýa-da süýrümlik-elliptik, ýokarsy kütäk ýa-da ýitiräk, esasy birneme pahna kysmy gysylan, uzynlygy 5,5–7,5 (9,5) sm, ini 3,5–4,5 (6,5) sm, dört-alty kepjeli (kepjesiniň ýokarsy germewli), aşaky we ortaky kepjeleriniň çuňlugu 1/3–1/4-ne, ýapragyň ininiň ýarysyna deň.

Derjimek – ýokarsy ýalaňaç, aşagy ak keçe ýaly tüýljuje, gyalary 25–35 dişlije. Dişjagazlary ýiti, kese üçburç kysmy, ýokarky bölegi aşakysyndan iri. Gapdal damarlarynyň sany – 5–7 (8) olaryň burçy damarlaryň

ortasynda 45°. Kejjeleri süýrümlik-togalak, seýrek süýrümlik-üçburçly. Ýokarsy kütäk, seýrek ýitileşen, daşky gyalary birnäçe, içkileri 1–2 dişlije. Sapajyklary ak keçe ýaly tüýljuje, uzynlygy 1–2 sm.

Galkanjygy köp güllüje – gül sapajyklary güllýän wagtynda ak keçe ýaly tüýljuje, soňra ýalaňaç. Okarajygy ýiti üçburçly dişlije, ak keçe ýaly tüýljuje. Gül ýapraklary ak, togalak-ters ýumurtga şekilli, esasy has gysylan. Miweleri togalak, seýrek süýri, mämişi-gyzylymytl reňkli.

**Ýaşajyş aýratynlygy.** Eýran gyzylagajy ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2300 metr belentlikde bitýär. Ol daşly-ownuk topurly demirgazyk eňňitlerde we giň jülgeleriň daşly ýapgytlarynda, agaçdyr gyrymsy agaçlaryň jeňňellikleriniň arasynda ösüp boý almany halaýar, örän seýrek, ýekeleyin duşýar. Daragt gurakçylyga çydamly, ýagtylygy halaýar. Ösümlik maý–iýunda güllýär, awgust–sentýabrda miweleýär. Ol tohumy we kök çykyntylary arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Garaýalçyda, Tyrnawda, Tagarawda, Garagura dagynda – Baharlyda, Sarymsaklyda, Sülüklide (Želdar agzynda), Müsünewde, Hyrsdere jülgesiniň demirgazyk eňnidinde, Tazytahtynda, Hatynagada, Arçabilde (Ýaýlada) duşýar.

**Tebigy gory.** Eýran gyzylagajy ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Hasaplamalara görä, Merkezi Köpetdagda: Garaýalçyda, Tagarawda, Garagurada, Tyrnawda agajyň 50-ä golaýy, Sarymsaklyda, Sülüklide, Müsünewde 300-e ýakyn düýbi hasaba alyndy (A.Akmyradow, 2011 ý.). Ekip ýetirdirmek maslahat berilýär. Daragt Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Daragtyň sütüniniň gabygy we miweleri dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Gabygyny ir baharda (mart), miwelerini – bişen wagtynda (sentýabr) ýygnamaly. Olary galyň matanyň üstünde oňat ýel çekerli jaýda umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mala özboluşly, hoşboý ys häsiýetli. Gabykdan taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara, miweleriňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Eýran gyzylagajynyň miwesinde uglewodlar, esasan, monosaharidler: glýukoza, fruktoza; pektinler; organiki turşular: alma, çakyr, limon, sorbin; C, P, E, B2 vitaminleri, karotinler; antosianlar; eý maddalar saklanýar. Tohumynda 22%-e çenli ýag bar.

**Peýdalanylyşy.** Daragtyň dermanlyk häsiýetleri barada ezber alym Abu Reýhan Birunyň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly nusgawy eserinde, orta asyrlarda Gündogaryň belli lukmany, lukmançylyk äleminde meşhurlyga eýe bolan Muhammet Huseýniň «Melhemler hazynasy» diwanynda: «...gyzylagaç üsgülewükde haýyry, aşgazan berkidyär» diýlip ýazylýar.

Halk lukmançylygynda sütüniniň gabygyndan taýýarlanylýan peti atero we kardiosklerozda, şeýle-de peşew we öt çykaryjy serişde hökmünde; jöwheri – ýeňil iç sürüji, böwregiň daşly sökelliklerinde, gaýtalanyp durýan bogun agyryda, rewmatizmde; tozy – süýjükeselde ulanylýar. Miweleri sowuklama, garamükrä garşy, ýeňil iç sürüji, ýel çykaryjy, gany togtadyjy, peşew çykaryjy täsiri.

Türkmen halk lukmançylygynda (Baharly we Gökdepe etraplarynyň daglyk obalarynda) daragtyň miwelerini itburun we çitçiti bilen garyp toplumlaýyn peýdalanylýar; peti – aşgazan-ichege kesellerinde, jöwheri bu keselleriň gaýrüzülmelerinde, ganazlykda; iýmişiniň şiresi öýken inçekesinde, babasylda, aşgazan turşusynyň pesliginde, şeýle-de öt çykaryjy serişde hökmünde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda miweleri täze, gury görnüşinde garamükrini we beýleki awitaminozlary bejermekde poliwitamin serişde hökmünde haýyrlanylýar.

Özünde hoşboý tagamy saklaýanlygy üçin, kulinaryada mürepbe, jemleri, pastilleri, marmelad, şireleri taýýarlamakda peýdalanylýar.

Ýapraklary köp mukdarda fitonsidleri bölüp çykarýar we olar howany tämizleýär.

Bezeg, azyklyk, witamin saklaýjy, bal beriji, insektisid, boýag we topragy berkidiýi ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 200 gram gury gabygyny 0,5 litr gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 2 sagat gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli. Taýýar bolan peti günüň dowamynda 1 gezek 1–2 nahar çemçeden (15–30 ml) içmeli.

Gyzylagajyň 200 gram sütüniniň gabygyny 0,5 litr suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 30 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan peti günüň içinde 3 sapa nahardan 30 minut ön 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Daragtyň miweleri bilen güllerinden we süýji ýekeniň (airiň) kökünüň 3:1 gatnaşykda 1 nahar çemçe (15 g) garyndysyny, 1 bulgur (200 ml) sowuk suwa atyp, bir sagat goýmaly, soňra syrçaly pitide haýal ýanýan otda 5 minut

gaýnatmaly. Sowadyp, hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Gyzylagajyň 2 çay çemçe (10 g) miwelerini 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, bir sagat goýmaly. Süzüp, islegiňe görä şeker goşmaly. Häzir bolan jöwheri günüň dowamynda 3–4 ýola kabul etmeli.

Daragtyň 4 nahar çemçe (60 g) guradylyp majumlanan miwelerini 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwa atyp, 4 sagat goýmaly. Islegiňe görä, şeker ýa-da toşap goşmaly. Taýýar bolan jöwheri günüň dowamynda içmeli.

Gyzylagajyň täze iýmişiniň şiresini her gün 3 ýola nahardan ön 1 çay çemçeden (5 ml) kabul etmeli. Aşgazan şiresiniň turşulygy pes bolanda haýyrlanmaly.

Daragtyň täze şiresiniň uly bolmadyk 2 rýumkasyny, 1 bulgur (200 ml) suwa garyp, islegiňe görä, şeker goşup içmeli. Babasylda haýyryly serişde.

Daragtyň iýmişinden her gün 50-sini iýmeli.

## **EÝRAN PEÇEGI** **Вьюнок персидский** **Convolvulus persicus**



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Eýran peçegi – peçekler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 20–40 sm-e ýetýän köpylylyk otjumak wekili. Ösümlik ak keçe ýaly tüýlülje. Baldagy kütüleşen, gür agymtyl ýa-da goňrumtyrak sütünklije, gowşak şahalanan, ýaýraň. Ýapraklary iri (uzynlygy 20–50 mm we ini 10–30 mm), süýrümlik, gysga sapajykly, sähelçe etlek, ýokarsy tegelenen, ýumşak ak keçe ýaly tüýlülje, ýöne damarlary oňat görünyär (aralyk kütüleşen we gapdaly tas inçe per şekilli).

Gülleri ýapragyň goltugynda ýerleşýär, ýekeleşen, kütüleşen, has uzyn sapaklyja. Okara ýapraklary giň



ýumurtga şekilli, ýüňjümeç-ak keçe kysmy, uzynlygy 10–15 mm, ýokarsy kütäk. Gültäji ak reňkli, uzynlygy 30–40 mm we ini edil şonuň ýaly, gyralary gowşak baş kepjeli, içi 5 sany kese tüýlçe çyzykly. Gozajygy şar şekilli, ýalaňaç. Tohumy tüýsüz, burçlurak, gara reňkli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Eýran peçegi ölkämizde Hazarýaka kenarynyň balykgulakly çägeliginiň kenarynda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýulda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Hazarýaka çölünde: Garabogazköli bilen Çekişlere çenli aralykda duşýar.

**Tebigy gory.** Eýran peçegi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Käte haşal ösümliگی hökmünde duş gelyär. Ösümlik Hazar döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliگیň köki, oty we tohumy dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Peçegiň kökünü ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny we güllerini – gülleýän döwründe (maý–iýun), tohumyny – bişýän wagtynda (iýun–iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda aýyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Kökünden we otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, güllerini we miweleriniňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Kökleriň we tohumlaryň saklanýş möhleti – 2–3, otunyňky we gülleriniňki – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümliگیň düzümine alkaloidler, kumarinler, flavonoidler, glikozidler, saponinler, aýj maddalar, C, E witaminler, karotin girýär. Ösümliگیň porrugy we beýleki bölekleri konwolwulin glikozidini saklaýar. Otunda saklyzly glikozidler, aýj maddalar, E witamin bar. Ýapraklarynda askorbin turşusy, karotin we tohumynda alkaloidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümliگیň dermanlyk häsiýetleri irki wagtlardan bäri belli. Ol barasyndaky ilkinji maglumatlar gadymy grek akyldarlary Pliniý ulynyň (b.e. 23–79-njy ýyllary) we Siseronyň (b.e.öň 106–43-nji ýyllar), Katonyň (b.e.öň 234–149-njy ýyllar) nusgawy işlerinde beýan edilýär. Gadymy rimliler ösümliگیň şiresini iç sürüji serişde hökmünde ulanypdyrlar. Peçek güllerini dilinde nika razylygy, bir karara gelmezlik, eräp barýan umyt, mertebe diýmekligi aňladýar.

Orta asyrlarda Gündogaryň ajaýyp alym-ensiklopedistleri özüleriniň nusgawy işlerinde ösümliگیň şypaly häsiýetlerini görkezipdirler. Abu Aly ibn Sina «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly işinde ösümliگی garnyň ýellenmeginde, melanholiýada, garaguş

keselinde, demgysmada, öýkeniň, bagryň we dalagyň sökelliklerinde, hususan-da, ýetginjeklerde hem gartaşan adamlarda haýyrlanmaklygy maslahat beripdir. Abu Reýhan Biruny «Lukmançylykda farmakognoziýa» diýen diwanynda ösümliگی umumy berkidiji serişde hökmünde peýdalanmaklygy ündeýär. Seyit Ysmaýyl Gürgenli (Jürjany) özüniň «Horezm şanyň genji hazynasy» atly işinde peçegi infarktyň önüni almaklykda, garaguş sökelliginde, letargiýada peýdalanmaklygy tekrarlaýar. Muhammet Gaýmaz Türkmen «Pygamber tebibçiligi» eserinde ösümliگی öt çykaryjy hökmünde ulanmaklygy maslahat berýär.

Halk lukmançylygynda peçegiň oty içgätamada, gany togtadyjy serişde hökmünde; kökleriniň petidir jöwherleri – ukusyzlykda, iç sürüji, gülleriniň peti – ýokarky dem alyş ýollarynyň sowuklamasynda, bronh demgysmasynda; tohumynyň jöwheri – der çykaryjy; şerbedi – ýarany bitiriji hökmünde peýdalanýlar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Türkmenbaşy we Esenguly etraplarynda) otuny, onuň şiresini öýken keselleri bolan, bronhitde we inçekeselde, şeýle-de aterosklerozda, ysytmada ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda peçegiň peşew çykaryjy we iç sürüji täsiri ýüze çykaryldy.

Ösümliگی ulanmazyň ön ýanyndan hökman lukman bilen maslahatlaşmaly, çünki melhemlik häsiýetlerine garamazdan, ol zäherlidir.

Bal beriji hem ot-ýmlik ösümlik.

### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Peçegiň 1 çay çemçe (5 g) guradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Ösümliگیň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan otuny ýa-da güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan otda 10–15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, hasadan geçirmeli. Peti gün içinde 3 gezek 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli. Netijeli iç sürüji serişde.

Peçegiň 1 çay çemçe (5 g) owradylyp toz görnüşine çenli ýagdaýa ýetirilen köklerini bir litrlik termos demlemeli, 30 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan jöwheri her gün uka gitmeziň ön ýanynda 1/2 bulgurdan (100 ml) haýyrlanmaly.

Ösümliگیň 1 çay çemçe (5 g) gury tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp goýmaly. Yzsüre

hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 sapa nahardan ön 1/2 bulgur (100 ml) içmeli.

Peçegin 1 nahar çemçe (15 g) guradylan ownuk otuny we güllerini 1/2 bulgur (100 ml) 70%-li medisina spirtiniň içine atyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 10–15 gün goýmaly. Yzygiderli çäýkap durmaly. Soňra süzmeli. Şerbedi her gün 3 ýola bitmesi kyn ýaralara çalmaly, ön ýanyndan bir nahar çemçe (15 ml) şerbeti 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suw bilen garmaly.

## EÝRAN ÜÇGATY

### Жимолость монетолистная

### Lonicera nummulariifolia

106



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Daragtyň dünýäde 200-den gowrak, Türkmenistanda 4 görnüşi duş gelýär.

Eýran üçgaty – üçgatlar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 2–3 metre ýetýän gyrymsy agaç wekili. Daragt tutuş çal gabykly. Pyntyklary ýumurtga şekilli, birnäçe jübüt teňňelije, tüýlülje. Birýyllyk pudaklary açyk, çalymtyl-sary reňkli, tüýlülje, ikiýyllyklary tas ak. Ýapraklarynyň uzynlygy 2–4 sm, ini 1,5–2,5 sm, giň ýa-da süýrümlik-ýumurtga şekilli, ýokarsy gataňsy, çal-ýaşyl, seýrek per kysmy tüýjagazlar bilen örtülen, aşagy has açyk ýa-da gür tüýlülje, galanlary

kütek, seýrek oýuk, esasy pahna pisint. Okarajygy tüýlülje, uzynlygy 4–8 mm, gül saklaýjydan uzynrak, uzynlygy (1,0) 2,5–3,0 mm-den geçmeýär. Gülyanyň ýaprajyklary ujy çowly, düwünçekden gysga, ters ýumurtga şekilli, kütek, düwünçegini üç bölegini örtýär, esasyndan erkin.

Okarajygynyň ülüşleri ýumurtga şekilli-ujy çowly, kirkiklije, düwünçegi bitişmedik. Gültäji açylanda sary, soňra gülgünräk, uzynlygy 17–23 mm, iki dodakly, daşy tüýlülje, trubkanyň ortasy бүкүлен, epilen yerinden 1,5–2,0 esse gysga, ýokarky dodagy 1/3-si 4 giň ters ýumurtga şekilli kütek ülüşlere dilimlenen. Tyçinkalary gültäjinden iki esse gysga, sütünjigi tüýlülje, tyçinkadan sähelçe uzyn ýa-da deň. Iýmişi agymtyl, içi görnup duran (gury halynda käte goňur) 2–3 uly gara-syýa reňkli tohumjagazly.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Eýran üçgaty ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol eňňitlerde, derelerdäki agaçdyr gyrymsy agaçlaryň jeňňelliklerinde, derýalaryň gaýaly kenarlarynda ösüp boý almany halayar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär, iýul–sentýabrda miweleýär. Ol tohumy we kök çykyntylary arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda: Başmogurda, Atýolda; Kürendagda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Hojagalada; Merkezi Köpetdagda: Bamyda, Garaýalçyda, Ypaýda, Eşekmeýdanda, Arwazda, Almajykda, Degirmenlide, Sülüklide, Müsünewde, Mergenölende, Gylgylawda, Germapda, Çäyekte, Semansurda, Arçabilde, Garaňkyda, Neftanowskide, Gökderede, Duşakerekdagda, Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Babazawda, Dagysda, Damjada, Daştöýda, Dogryderede, Asylmada, Howdanda, Gularda; Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Eýran üçgaty ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän yerlerinde bol, top-top bolup duş gelýär. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin ýapraklary we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Ýapraklaryny ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun), miwelerini – bişen wagtynda (awgust–sentýabr) ýyg-namaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklaryndan taýýar bolan çig maly mata haltalara, miweleriniňkini – kagyz haltalara, gutujyklara ýa-da agzy berk ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Çig mallary gury hem salkyn ýerde saklamaly. Ýapraklaryň saklanyş möhleti – 1–2, miweleriňki – 2–3 ýyl.



**Himiki düzümi.** Üçgatyň düzümine efir ýagy, flavonoidler girýär. Onuň tohumynda siklitollar we olaryň ugurdaşlary: fitin; ýag (onuň düzüminde turşular: kaprin, laurin, miristin (n-tetradekan), palmitin (n-geksadekan), palmitolein, stearin (n-oktadekan), olein, linol); trigliseridler, fosfolipidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda, ösümligiň owradylan ýapraklaryny trofik başlarda, bitmesi kyn ýaralarda peýdalanylýar. Üçgatyň ýapraklarynyň jöwheri galkan şekilli mäsleriň, böwregiň, peşew haltasynyň kesellerinde, şeýle-de içgeçmede we ýanykda ulanylýar. Miweleriniň petidir jöwheri gipertoniki kesellerde, gastritde, içgeçmeli kolitlerde, ganazlykda, gipowitaminozda, diň agyryda sedatiw, dürli gan akmalary togtadyjy serişde hökmünde haýyrlanylýar. Şiresini ekzemada, psoriazda, trofik başlarda içilýär we ýapgy edilýär.

Daragtyň şireli, ajymtygrak kakuwly süýji miweleri iýilýär, şeýle-de ondan kisel, žele, mürepbe we çakyr taýýarlanylýar.

Bezeg, azyklyk we bal beriji ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Daragtyň 2 çay çemçe (10 g) gury ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 4 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli. Melhemi ýapgydyr çalgıda hem haýyrlanylýar.

Üçgatyň 4 çay çemçe (20 g) guradylan miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 4 sagat goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 sapar 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

## **GALYŇ ÝAPRAKLY GARATIKEN**

**Жостер кожистолитный  
Rhamnus coriacea**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Daragtyň dünýäde 110-dan gowrak, Türkmenistanda 2 görnüşi duş gelýär.

Galyň ýaprakly garatiken — garatikenler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 0,5–2,5 metre ýetýän gyrymsy agaç wekili. Daragt tikenli, gara-goňur-çal ýa-da tas gara gabykly. Pyntyklary görünmeýär. Ýapraklary dykyz, tas ýalaňaç ýa-da örän inçe tüýlülje, esasan, esasy we sapagy ýaşyl ýa-da goýy ýaşyl, aşagy agymtyl, şahajyklarynda çogdamlayyn ýerleşýär we ýaşajyk pudaklarynda nobatlaýyn ýerleşýär, kepjeli ýa-da uýy çowly, uzynlygy 15–20 mm we ini 4–5 mm, süýrümlik-kepjeliden, giň uýy çowla çenli ýa-da elliptik (kölegeli pudaklarda), uzynlygy 3,5 sm-e çenli ini 1,3 sm, adaty, kütäk, togalak, gysga ýitileşen, köp böleginiň esasy inçe pahna kysmy, guralary ownuk gaty-byçgyly.

Gülleri giň jaňjagaz şekilli, okarajygy üçburçly-ýumurtga şekilli, ülüşli gabarasy, takmynan, 2 mm, ýalaňaç, çogdamda 10–20-den ýerleşýär, gysgajyk sapakly. Miweleri guragrak ýa-da şireli, gara-goňur ýa-da tas gara reňkli, uzynlygy, takmynan, 4 mm, 2–3-«şänikli», 2–5-den ýerleşýär. Tohumy süýrümlik-ýumurtga şekilli, togalak-üç gyraňly, uzynlygy, takmynan, 3 mm, açyk-sary ýa-da açyk-goňur reňkli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Galyň ýaprakly garatiken ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol jülgelerde, daňlaşan gury eňňitlerde, gaýalarda, çüňklerde, uçutlarda ösüp boý almany halaýar. Daragt aprel–iýunda gülleýär, iýul–awgustda miweleýär. Ol ösüntgileri arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Daragt diýarymyzda Uly we Kiçi Balkanda; Kùrendagda; Gùnorta-Günbatar Köpetdagda: Parhaýda, Magtymguluda, Aýyderede, Galalygözde, Goçdemirde, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Garaýalçyda, Arwazda, Sülüklide, Müsünewde, Mergenölende, Germapda, Arçabilde, Gökderede, Babazawda, Dagysda, Daştoýda, Dogryderede, Asylmada, Howdanda; Gündogar Köpetdagda; Bathyzda; Hazarýaka çölünde: Garabogazköle, Türkmenbaşyda; Üstýurtda duşýar.

**Tebigy gory.** Galyň ýaprakly garatiken ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär.

**Dermanlyk çig maly.** Daragtyň gabygy we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Gabygyny ir baharda (şire herekete gelmänkä), miwelerini – güýzüň ahrynda, haçanda ýapraklar saralanda ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mal gara-sýýa reňke, gowşak ysa, süýjümtik-ajy tagama eýe. Gabykdan taýýar bolan çig maly mata haltalara, miweleriňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Olary gury, gün şöhlesi göni düşmeýän ýerde, oňat ýel çekerli jaýda saklamaly. Möhleti – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Garatikenin düzümine reňkler, flawonoidler, şeker, pektinler, nem, eý hem ötgür ajy maddalar girýär. Onuň gabygynda eý maddalar, antraglikozidler saklanýar. Ýapraklarynda C witamin bar. Miwelerinde 0,8%-e çenli antraglikozidler, flawonoidler, pektin maddalar, uglewodlar we pigmentler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň peti we jöwheri babasylda, dowamly içgatamada, artbu-jagyň jaýrylmasynda ýumşadyjy serişde hökmünde ulanylýar. Guradylan we maýdalanan miwelerinden taýýarlanylýan çäýi iç sürüji, gusduryjy serişde hökmünde, şeýle-de sarygetirmede, demigmede, tultuklykda, deri kesellerinde, gaýtalanyp durýan bogun agyryda, babasylda

peýdalanylýar. Garatikenin miwelerinden, çopantelpegin güllerinden, saglygotunyň köklerinden, mekgejöweniň gulpagyndan taýýarlanylýan garnuwyň peti içgeleriň işleyşini ýokarlandyrýar, ajamak we çüýremek ahwallary peseldýär, şeýle-de dezinfisirleýji, sowuklamanyň garşysyna, agyryny aýryjy serişde bolup hyzmat edýär. Ony dowamly we adaty içgatamada peýdalanmak maslahat berilýär.

Daragtyň şahalarynyň petini Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda halk lukmançylygynda aşgazanyň baş kesellerinde peýdalanylýar. Gabygynyň melhemlik jöwherini aşgazanyň we içgeleriň katarynda, mädäniň turşulygynyň pesliginde ulanylýar. Melhemiň iç sürüji we gusduryjy häsiýeti hem bardyr. Daragtyň miweleri içgatamada peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň miweleriniň iç sürüji täsiri ýüze çykaryldy.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) gury miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. 2 sagadyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti 1/2 bulgurdan (100 ml) aqşam içmeli.

Garatikenin 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 2 sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri 1/2 bulgurdan (100 ml) gije kabul etmeli. Jöwheriň has konsentirlenenini: 2 nahar çemçesini (30 g) 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa garyp, 4 sagat goýmaly. Melhemi günde 3–4 gezekden 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Daragtyň 2 çäý çemçe (10 g) guradylyp owradylan miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 8 sagat goýmaly. Hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jöwheri 2 gezekde (irden hem aqşam) kabul etmeli.

Garatikenin ýokardaky beýan edilen jöwherini toşap görnüşinde haýyrlansa bolýar. Şeker ýa-da ary baly bilen deň gatnaşykda garmaly. Häzir bolan toşaby ýatmazyn ön ýanynda 3–4 nahar çemçeden (45–60 ml) içmeli.



# GARADENNAN

Каччиния крупнопыльниковая

*Caccinia macranthera*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Täsin gurluşly derman ösümligiň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Garadennan – buraçnikler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 25–80 sm-e ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ösümlik çalymtyl reňkli, has şireli. Porrugy göni, topragyň çuňluklaryna aralaşýar, ýogynlygy 1–10 sm. Baldagy küti, dik, esasyndan şahalanan. Şahalary has uzyn. Ýapraklary süýrümlik ýa-da süýrümlik-ujy çowly ýa-da ujy çowly, uzynlygy 10–15 sm we ini 1,2–5,0 sm.

Sahalarynyň ujunda gülleri gür bolmadyk salkymy emele getirýär. Gül toplumu ýaýraň, ýumşak sübse şekilli. Gül saklaýjy şahalary baldagyň yokarky we ortaky ýapraklarynyň goltugyndan çykýar. Gültäji syýa-gülün reňkli, okarajykdan 1,5–2 esse uzyn. Tozgajyklaryň uzynlygy birmeňzeş däl, yzky tyçinkalaryň tozanjyklary iň uzyny (takmynan, 6 mm). Hozjagazy ýumurtga şekilli, uzynlygy 8–10 mm.

**Yaşaýyş aýratynlygy.** Garadennan ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly we daşly eňňitlerde, çägeli çöllerde ösüp boý

almany halaýar. Ösümlik aprel–maýda gülleýär, maý–ijulda miweleýär. Ol tohumy we porrugy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kiçi Balkanda: Çalsuwda; Kürendagda: Temenderede, Torgaýda, Margyzda, Jelilede, Soňudagda, Isgenderde, Serdarda; Günorta–Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda, Altybaýda, Hojagalada; Merkezi Köpetdagda: Bamyda, Nohurda, Garaýalçyda, Arwazda, Tagarawda, Müsünewde, Mergenölende, Heýrabatda, Çäyekde, Çopandagda, Arçabilde, Uly Garaňkyda, Neftanowskide, Bagyrda, Gökderede, Wanowskide, Gurtlusuwda, Dagysda, Asylmada, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Kelteçynarda, Guruhowdanda, Çyrlakda, Şamlyda; Bathyzda: Pulhatynda, Akarçeşmede, Serhetabatda, Serhetçide; Merkezi Garagumda: Başkakda; Gündogar Garagumda: Üçajyda; Günorta–Gündogar Garagumda: Ýolguýyda, Ýalangaçda; Tejen–Murgap medeni oturumynda: Ymambabada, Tejende, Dörtguýyda, Saryýazyda duşýar.

**Tebigy gory.** Garadennan ýurdumyzdaky seýrek ot–çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Her ýylda takmynan, 55–60 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümigiň kökleri we oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güzde (sentýabr), otlaryny – ösümlik gülleýän döwründe (aprel–maý) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Gazylyp alnan köki arassalamaly, ýuwmaly we guratmaly, deslapky ülüşlere bölüşdirmeli. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Kökleriniň saklanyş möhleti – 3, otlarynyňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Garadennanyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümligiň kökleri düzüminde nemleri, saponinleri, eý maddalaryny we ýelimleýji maddalary saklaýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň kökleriniň şepbiginden we otlaryndan taýýarlanylýan peti yokarky dem alyş ýollarynyň keselleri bolan demgysmada we inçekeselde ýumşadyjy serişde hökmünde peýdalanylýar.

Bezeg, bal beriji we boýag ösümlik.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) kökünüň şepbigini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 20

minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.

Garadennanyň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan alawda 10 minut gaýnatmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan peti gün içinde 3 sapa nahardan ön-1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

## GELŞIKLI EŞEKSELME

Хрозофора изящная  
*Chrozophora gracilis*



**Häsiýeti.** Çöl-düzlük derman ösümligi. Türkmenistanda 4 görnüşi duş gelýär.

Gelşikli eşekselme – seudekler maşgalasynyň eşekselmeler urugynyň boýy 5–30 sm-e ýetýän birýyllyk otjumaq wekili. Tutuş ösümlik çalymtyl reňkli, gür ýyldyz şekilli tüýjagazlar bilen örtülen. Baldagy ýaýraň, şahalanar. Ýapraklarynyň uzynlygy 1,5–4,0 (7,0) sm we ini 0,8–3,5 (6,0) sm, ýumurtga şekilli ýa-da pişme kysmy-ýumurtga şekilli, kütäk ýa-da ýitiräk, togalak ýürek şekilli ýa-da esasy pahna kysmy. Olaryň gýralary abat ýa-da burçly, köplenç, dişlije, käte tolkunly, ýokarsy gür gysga tüýjagazlar bilen örtülen (käte ýaşylymtyl), aşagy çal gür bulam-bujar tüýlülje. Sapajygynyň uzynlygy 3–9 (17) sm, goltugasty ýapraklarynda birneme uzyn.

Gül toplumy ýokarky ýapraklaryň goltugynda ýerleşýär, uzynlygy 1,0–1,5 sm. Atalyk gülleri gül toplumyň ýokarky böleginde ýerleşýär, tas sapaksyz. Enelik gülleri onuň aşagynda ýerleşýär, sapaklyja (käte 2–3-güllülje), uzynlygy 3–6 mm, soňra miwelerde uzalýar, 3–4 sm-e ýetýär. Okara ýaprajyklarynyň we gül ýapraklarynyň sany –

5. Tyçinkaly güllerde okara ýaprajyklary uýy çowly, daşy gür ak keçe ýaly ýyldyz şekillije tüýlülje, içki tarapy ýalaňaç, gül ýapraklary çyzykly ýa-da inçe kepjeli, syýa reňkli, açyk-sary çykyntgylly, olar uzynlygyna okara ýaprajyklardan geçýär, içinde ýalpyldawuk köp şöhlili teňňejikler ýerleşýär, içi ýönekeý kütüräk tüýlülje. Tyçinkasynyň sany – 5, sapakly 1/3 ýa-da tas 1/2 erkin. Pestikli gülleriniň okara ýaprajyklary we gül ýapraklary inçe çyzykly, içi, düwünçegi ak keçe ýaly tüýlülje. Tumsujagy gülgün reňkli, esasynda çenli iki bölünen. Miweleri uzyn sapaklyja, ýyldyz şekilli-ak keçe ýaly tüýlülje, üsti ýylmanak, dügürsiz. Bişen tohumynyň uzynlygy 3,5 mm we ini 2,5 mm, ýumurtga şekilli, gara-goňur reňkli, nokatly oýuk, ýöne olaryň köp bölegi ösüntgili perde bilen örtülen (endokarpiýanyň içki gatlagy) we olar çal-goňur reňkli ownuk dügürlilje.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Gelşikli eşekselme ölkämizde düzlüklerde, deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol gum depelerinde we ernegi tümmek çägeliklerde, çägesow depelerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–oktyabrda güllýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda: Darjada, Baleýşemde, Mollagarada; Kürendagda: Jebelde; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Sumbar derýasynyň boýundaky Duzlydepede, Magtymguluda; Bathyzda: Agaçlyda, Çemçede, Serhetabatda, Tagtabazarda; Köýtendagda: Deňizkök kölünde; Hazaryaka çölünde: Mihaýlowskiý postunda, Hazarda, Akjaguýma stansiýasynda; Merkezi Garagumda; Gündogar Garagumda: Repetekde, Üçajyda, Garawulguýuda, Jýura goýysynda; Günorta-Gündogar Garagumda: Almyrat bilen Gataý guýularynyň arasynda, Zäklide, Gyzylaýak çägeliginde; Sandykly çölünde; Köpetdagetäk medeni oturymynda: Köşüde, Aşgabatda, Änewde, Gäwersde; Tejen-Murgap medeni oturymynda: Ymambabada, Sarahsda, Saryýazyda, Gurbangalada, Türkmenalada; Amyderýa medeni oturymynda: Farapda, Saýatda duşýar.

**Tebigy gory.** Gelşikli eşekselme ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşýar. Her ýylda 50–60 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny ösümlik güllýän döwründe (maý–iyul), tohumyny – bişen wagtynda (sentýabr–oktyabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da



kagyzyň üstüne ýaýradyp, oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, tohumynyňkyny – kagyz gutujyklara ýa-da agyz berk ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury hem garaňky ýerde saklamaly. Otuň saklanyş möhleti – 1–2, tohumyňky – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Eşekselmäniň düzümine reňkleýji maddalar, aşgarly we tursy gurşawda reňkini üýtgedýän turnezol girýär. Ösümligiň ýerüsti böleginde alkaloidler, fenolkarbon turşusy we onuň ugurdaşlary: kofe, hlorogen; flavonoidler: 3-kempferol galaktozid, 7-kempferol galaktozid saklanýar. Ýapraklarynda karotin bar. Tohumynda 28%-e çenli ýag saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň otunyň peti we jöwheri icgatamada ýeňil iç sürüji serişde hökmünde peýdalanylýar.

Irki wagtlardan bäri ýapraklary we miweleri nah, ýüpek matalary gülgün, sary we gök reňklere boýamakda ulanylyp gelinýär.

Miweleri boýag berýär, azyk, parfýumer, kosmetik, kagyz senagatynda süýji-köke önümlerini, çakry, peýniri, kosmetik önümleri, kagyzlary boýamakda peýdalanylýar.

Ot-iymlik we boýag ösümlük.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan otda 5–10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Eşekselmäniň 2 çay çemçe (10 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, bir sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 gezek 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

## GÖGÜMTIL DÄNEGERÇEK Дурман фиолетовый Datura tatula



**Häsiyeti.** Haşal derman ösümligi. Täsir häsiýetli ösümligiň dünýäde, takmynan, 20, Türkmenistanda 2 görnüşi duş gelýär.

Gögümtil dänegerçek — itüzümler maşgalasynyň dänegerçekler urugynyň boýy 40–150 sm-e ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlük has berdaşly, has şahalanan. Şahajyklary burçly, kütäk ýa-da gönä ýakyn. Baldagy, sapagy syýa reňkli, ýapraklaryň damarlary we bölekleyin okarajyggy goýy gyrgyzy reňkli. Ýapraklarynyň ülşi güýçli dilimlenen, elmydama çuň dilnen, ýitileşen, öz gezeginde dişjagazlara bölünýär, köplenç, tas kepjeli. Ýapragynyň köp böleginiň esasy giň pahna kysmy, käte sähelçe ýürek şekilli.

Gültäji gögümtil reňkden başlap, benewşe-goýy gyrgyzy reňke çenli. Gozajyggy ýumurtga şekilli, süýnmek, elmydama has we endigan çiteneكلي. Ýokarky çiteneكلي ululygy boýunça aşakydan tapawutlanmaýar.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Gögümtil dänegerçek ülkämizde ýollaryň gyrasynda, zir-zibilli ýerlerde, medeni oturymlarynda topbak bolup ösmäni halaýar. Ösümlük awgust–oktyabrda gülleýär, awgust–noýabrda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük Türkmenistanyň hemme medeni oturumlarynda duşýar.

**Tebigy gory.** Göğümtil dänegerçek ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ujypsyzja. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Haşal ösümligi hökmünde duşýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň ýapraklary, gülleri we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Ýapraklaryny we güllerini ösümlük gülläýän döwründe (awgust–sentýabr), miwelerini – bişen wagtynda (oktyabr–noýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýygňalan ýapraklary we gülleri açyk howada kölegede olary ýuka gatlakda ýaýradyp, haýal etmän çalykdyrmaly. Miwelerini – üçeklerde ýa-da gyzgynlygy 40°C-den ýokary bolmadyk guradyjy abzallarda guratmaly. Ýapraklardan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleri we miweleri – kagyz gutujyklara ýa-da agzy kjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Çig mallary gury hem salkyn ýerde saklamaly. Ýapraklaryň we gülleriniň saklanyş möhleti – 1–2, miweleriniňki – 3 ýyla çenli.

**Himiki düzümi.** Dänegerçeğiň düzümine tropan hatarly alkaloidler: giosiamin, skopolamin, atropin, kuskigirin, atropamin, metelaydin, digloilmeteloidin, ditigloil-digidroksitropan, nikotin girýär. Onuň köklerinde giosiamin we skopolamin alkaloidleri saklanýar. Ösümligiň ýerüsti böleginde kumarinler bar. Baldaklarynda 0,25–0,31% alkaloidler: 0,02–0,07% skopolamin, 0,18–0,21% atropin we giosiamin saklanýar. Ýapraklarynda 0,25–0,61% alkaloidler: (–)-giosiamin, atropin, 0,10–0,31% skopolamin, 2,7%-e çenli flavonoidler: kwersetin, kempferol, rutin, kwersitrin, efir ýagy, 1,7% eý maddasy, 0,1% karotin bar. Güllerinde efir ýagy, eý maddalar, tohumynda – alkaloidler: 0,08% skopolamin, 0,17% atropin we ýag saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümligiň dermanlyk häsiýetleri irki wagtlardan bäri belli. Ol barasyndaky ilkinji maglumatlar Gippokratyň (b.e. ön 460–377-nji ýyllar), Feofrastyň (b.e.ön 372–287-nji ýyllar), Dioskoridiň (b.e. I asyry) işlerinde duş gelýär. Dänegerçeği Gadymy Müsürde ekip yetiştiripdirler.

Orta asyrlarda Gündogaryň parlak ýyldyzlary Abu Aly ibn Sinanyň «Lukmançylyk ylmyň kanunlary», Abu Reýhan Birunyň «Lukmançylykda farmakognoziýa», Seýit Ysmaýyl Gürgenliniň (Jürjany) «Horezm şanyň genjihazynasy», Muhammet Huseýniň «Melhemler hazynasy» we köp sanly beýleki nusgawy işlerde dänegerçeğiň şypaly häsiýetleri ýatlanyp geçilýär.

Halk lukmançylygynda ösümligiň peti garaguş keselinde we kükrek näsazlyklarynda ulanylýar. Ýapraklarynyň şerbeti rewmatizmde, radikultde çalynýar. Gülleriniň tozlary yüzde düwürtik çykanda sepgi hökmünde haýýrlanylýar. Mundan başga-da, dänegerçek agyryny aýryjy we rahatlandyryjy häsiýete eýedir.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň ýapraklarynyň gysylmalaryň garşysyna täsirliligi ýüze çykaryldy. Ol demgysmanyň garşysyna ulanylýan ýyggyndynyň düzümine girýär. Melhemlik bronh demgysmasynda, bronhitde, tutgayly üsgülewükde peýdalanylýar.

Ösümlükde skopolaminiň köp saklanýanlygy sebäpli, birnäçe awtorlar *D. tatula* geljekde dermanlyk serişdeleri taýýarlamakda çig mal bolup hyzmat eger diýip hasaplaýarlar.

Dänegerçeğiň ýapraklaryndan taýýarlanýan «astmatin» we «astmatol» derman serişdeleri, bilelikde beýleki alkaloid saklaýan ösümlükler ýaly demgysmanyň garşysyna täsire eýe. Dänegerçekden şu maşgala degişli beýleki ösümlüklerdäki skopolamin alkaloidleriň esasynda taýýarlanýan aeron gerdejikleri giňden bellidir. Ol dermanlyk serişdesi asman we deňiz kesellerinde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň dermanlyk serişdelerini bronh demgysmasynda spazmatik serişde hökmünde, aşgazan we on iki barmak içegäniň baş kesellerinde, holesistitde, ýürek-damar sökelliklerinde, güýçli üsgülewükde peýdalanylýar. Newralgiýada we radikultde dänegerçek ýagyny yzaly yerleriňe çalmaly.

Gomeopatiýada ösümlükden taýýarlanýan spirtli şerbedi ruhy kesellerde we elmydama uky tutmada ulanylýar.

Dänegerçek zäherli ösümlük, şonuň üçin ulanmazyň önýanynda hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Bezeg ösümlük.

### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessay otda 10–15 minut gaýnatmaly. Otag temperaturasyna çenli sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti günüň dowamynda 2 gezek (irden hem agşam) 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Dänegerçeğiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan alawda 5–8 minut gaýnatmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Peti her gün 3 wagtyna nahardan ön 2 çay çemçeden (10 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) medisina spirtine atyp,



agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 10–15 gün goýmaly. Birsyhly çaykap durmaly. Hasadan geçirmeli. Taýýar bolan şerbedi agyryly ýerleriňe çalmaly.

## GÖGÜMTIL JIGERGÜL

Володушка полусложная

*Bupleurum semicompositum*



**Häsiýeti.** Çöl-düzlük derman ösümligi. Gögümtil jigergül – saýawanlylar maşgalasynyň jigergüller urugynyň boýy 10–20 sm-e ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümligiň baldagy, beýleki bölekleri çalymtly reňkli, esasyndan ikileýin şahalanan. Ýapraklary çyzykly, seýrek uýy çowly-çyzykly, ýitiräk, 3–5-den parallel, aşaky tarapy relýef damarly; aşaklary – örän gysga sapaklyja, ýokarkylary – sapaksyz.

Saýawanlary gysga sapaklyja, gapdaldakylary – sapaksyz, birmeme şöhleli, köplenç, şöhleleri birmenleş däl. Gyny uýy çowly-çyzykly, 3 damarly uzyn ýaprajyklardan ybarat. Saýawanjyklary 3–5-güljagazly, gynly, çyzykly ýa-da giň uýy çowly, ýiti, saýawanjyklara deň bolan ýaprajykly. Gülleri gysga, birmenleş däl sapajykly. Gül ýapraklarynyň uzynlygy 0,5 mm, daşy emzijekler bilen örtülen, sary ýa-da gyzylmytyl reňkli. Miweleri ýumurtga şekilli, uzynlygy 1,5 mm-e çenli, sähelçe sallanyp duran gapyrgaly, üsti ownuk emzijekli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Gögümtil jigergül ölkämizde Hazarýaka çölünde, düzlüklerdeki toýunly we toýunly-çagylyly topraklarda, uly bolmadyk depelerdir baýyrlarda we wagtlaýyn akýan akar suwlaryň boýunda ösüp boý almany halaýar. Ösümlük maýda gülleýär, iýunda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Hazarýaka çölünde: Çekişlerde, Çatda, Küküde, Keltegeýde, Şakyrda, Gulturanda, Bugdaýlyda, Etrekde duşýar.

**Tebigy gory.** Gögümtil jigergül ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ujypsyzja. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ol Hazar döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty we ýapragy dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlük gülleýän döwri (maý) ýygnamaly, olary umumy kabul edilen usulyýet boýunça teläriň aşagynda açyk howada guratmaly hem taýýarlamaly. Ösümligiň otundan we ýapragyndan taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky ýerde saklamaly. Çig malyň saklanýş möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümligiň baldagynda, ýapragynda flavonoidler: 3-glýukozid we 3-rutinozid kwersetin, 3-glýukozid we 3-rutinozid izoramnetin saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň ýapragynyň peti bilen jöwheri ýokary dem alyş ýollarynyň katarlynda, bronh demgysmasynda, bagyr we öt haltasynyň kesellerinde, öt çykaryjy hökmünde peýdalanylýar.

Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda, jigergülüň otuny plastyr görnüşinde iriňli çykuwlarda, başlarda we ýaralarda ulanylýar.

Bezeg we bal beriji ösümlük.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan otuny ýa-da ýapragyny 1 bulgur (200 ml) gaýnan suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–6 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Jigergülüň 2 nahar çemçe (30 g) owradylan otuny ýa-da ýapragyny 0,5-litrlik termosda demlemeli, 30 minit goýmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Jöwheri gün içinde 3 ýola nahardan ön ýarym bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

# GREK GYZYLAGAJY

Рябина греческая

*Sorbus graeca*



114

**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Grek gyzylagajy – bägüller maşgalasynyň gyzylagaçlar urugynyň boýy 3–4 metre ýetýän agaç wekili. Pyntyklary sähelçe tüýlüje ýa-da tas ýalaňaç. Ýapraklary dykyz, derjimek, ters ýumurtga şekilli ýa-da süýrüntik-ýumurtga kysmy, esasynyň köp bölegi pahna şekilli gysylan, käte kepjeli, ýokarsynyň köp bölegi kütäk, seýrek küteträk ýitileşen, uzynlygy 5–10 sm we ini 3–6 sm, gapdal damarlary 6–7 jübüt, ýokarsy ýalaňaç, diňe esasy damary, seýrek tüýlüje, aşagy ak keçe ýaly tüýlüje, iri dişlije. Ikenji dişleri ownuk, ýiti. Ýapraklarynyň sapagynyň uzynlygy 1–2 sm, ak keçe ýaly tüýjagaz bilen örtülen. Okarajygy we sapajyklary ak keçe ýaly tüýlüje, ýiti üçburçly dişlije, gülländen soňra azda-käne gysylyşýarlar. Gül ýapraklary togalak-ýumurtga şekilli. Miweleri togalak, gyzyl reňkli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Grek gyzylagajy deňiz derejesinden 1200–1600 metr belentlikde bitýär. Ol daşly-ownuk topurly demirgazyk eňňitlerde we daşly eňňitlerde, örän seýrek, ýek-tük düýp bolup ösmäni halaýar. Daragt gurakçylyga durnukly, ýagtny halaýar. Ösümlik maý–iýulda gülleýär, awgust–sentýabrda miweleýär. Ol tohumy we kökleriniň cykntgylary arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymgulyň golaýynda, Hatynagada, Hozlydagda, Könekesirde, Kürüdeýde, Daynada (Şeýtanköpi jülgesinde), Hasardagda (Mezitlide); Merkezi Köpetdagda: Tagarawda duşýar.

**Tebigy gory.** Grek gyzylagajy ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary

üçin gory ýabygorly. Soňky maglumatlara görä, agajyň 100-den gowrak düýbi bar (A.Akmyradow, 2011 ý.). Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Daragt Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Daragtyň sütüniň gabygy we miweleri dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Gabygyny ir baharda (mart), miwelerini – bişen wagtynda (sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde oňat ýel çekerli ýajda guratmaly hem taýýarlamaý. Taýýar bolan çig mala özboluşly, hoşboý ys häsiýetli. Gabykdan taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara, miweleriňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, garaňky ýerde saklamaly. Möhleti – 2 ýyldan köp bolmaly däl.

**Himiki düzümi.** Ösümligiň miwelerinde 10%-e çenli şeker (şol sanda glýukoza, fruktoza, sahara), organiki turşular: alma, pektin; eý maddalar, glikozidler, flavonoidler, riboflawin, foliý, nikotin turşusy, B, P, PP toparynyň witaminleri, askorbin turşusy, karotin, dürli görnüşli mikroelementler: demir, mis, marganes, molibden, bor, ýod we başgalar saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Gyzylagaç eýýäm gadymky döwürden başlap halkyň durmuşyna we medeniýetine aralaşyp ugrapdyr. Daragtyň ylmy ady – «sorbus», «gyzyl» ýa-da «gyrmyzy» diýen manylary aňladýar. Adamlar onuň gudratly düýjüne ynanyndyrlar. Göz degmekden goramak maksady bilen agajyň şahajyklaryndan tumar ýasap, ony gyzyl sapak bilen egin-eşiklerine tikipdirler.

Daragtyň dermanlyk häsiýetleri barasynda Abu Reýhan Birunyň «Lukmançylykda farmakognoziýa», Muhammet Huseýniň «Melhemler hazynasy» nusgawy eserlerinde maglumatlar berilýär. Ol eserlerde «... gyzylagaç bedeni berkidýär, onuň tonusyny ýokarlandyryr... Ondan taýýarlanýan dermanlyk serişdeler kellagyryda we bedeniň beýleki agzalaryndaky sökelliklerde peýdalanylýar».

Halk lukmançylygynda gyzylagajyň şiresi gipertoniki kesellerde, ateroskleroza, anasid gastritinde, şeýle hem gany togtadyjy we rahatlandyryjy serişde hökmünde ulanylýar. Ýýmişi we şiresi ganazlykda, bazed hem şöhle kesellerinde, gan basyşy ýokarlananda peýdalanylýar. Miwesinde ýod bar, ol galkan şekilli mäsleriň hyzmatyny kadalaşdyrýar. Ýöne olary turşulygy ýokary bolan gastritlilere, aşgazanyň we on iki barmak içegäniň başly kesellilerine haýyrlanmak maslahat berilmeýär.



Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly etra-bynyň daglyk obalarynda) ösümligi ýürek-damar kesel-lerinde, şeýle-de damarlaryň diwarjyklaryny berkitmekde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda daragtyň miwesiniň gipotenziw häsiýeti ýüze çykarylýdy. Şu häsiýeti ony gipertoniýada, gepatitde, deri sökelliklerinde, allergiýada, zäherlenmede peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Täze iýmişlerini we şiresini awitaminozy bejermekde we onuň öňüni almakda ulanmak maslahat berilýär.

Özünde şypaly häsiýeti we hoşboý tagamy saklaýanlygy üçin, kulinariýada žele, marmelad, mürepbe, şireleri we çaýlary taýýarlamakda haýyrlanylýar.

Bezeg, azyklyk, witamin saklaýjy, bal beriji, insektisid, boýag we topragy berkidiji ösümlük.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) miwesini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, doly sowaýança goýmaly. Yzysüre süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 2–3 gezek nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Gyzylagajyň miwesiniň täze şiresini gün içinde 3 ýola nahardan 30 minut öň 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli. Dowamlylygy – 2–3 hepden 1 aýa çenli. Netijeli bejergi bolar ýaly birwagtda itburnuň jöwherini ýa-da C witamin ulanmaly.

Daragtyň 1 kg miwesini deň gatnaşykda şeker bilen garmaly. Taýýar bolan garyndyny gün içinde 3 ýola 1 çay çemçeden (5 g) kabul etmeli. Galkan şekilli mäze haýyrlý serişde.

Gyzylagajyň iýmişinden her günde 50-ä çenlisini iýmeli.

## **GRUZIÝA NARPYZAGY**

**Лаллеманция грузинская**

**Lallemantia iberica**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Gruziýa narpyzagy – boýy 20–40 sm-e ýetýän dodakgüllülär maşgalasynyň narpyzaklar urugynyň birýyllyk otjumak wekili. Baldagy-nyň köp bölegi şahalanan, esasy inçe tüýlüje, çalymtyl. Aşaky ýapraklary sapakly, tas üşüne deň, süýrümlik, düwürli oýuk, edil ösümlik ýaly tas ýalaňaç, örän ujypsyz, ýöne saýgaryp bolýan tüýlüje.

Gül toplumu süýnen, baş şekilli, ýumşak, köp sanly, tas baldagyň ähli ýerlerinde ýalan çogdamy emele getirýär. Gülyanyň ýaprajyklary süýrümlik ýa-da ters ýumurtga şekilli, güllerinden uzynrak, esasy baş şekilli, sapakly, gyralary dişlije, onlarça uzyn çitenekli dişlije. Okarajygynyň uzynlygy 15–18 mm, damarlarynyň arasy ownuk ýumşak tüýlüje, damarlaryndan бүдүр-сүдүр, has uzynrak tüýjagazlar aşaklygyna gönügýär, ýokarky dişleri ýumurtga şekilli we aşaklary ujy ýiti neşder kysmy, miwelerinde çişen. Gültäjiniň uzynlygy 18–20 mm, symgylyt-sary reňkli, aşaky dodagy benewşe reňkli, damarly, birneme okarajygundan uzynrak. Hozjagazy ýylmanak, ýalaňaç, gara reňkli, süýrümlik, uzynlygy, takmynan, 3,5 mm, ini 1,8 mm, esasy kütäk ýitileşen, ýokarsy dilimlenen, arkasy sähelçe бүкүлөн, üç sany дүшнүксиз damarlyja, arka tarapy kil görnüşli, iki gyraňly, esasy ak digir-digirli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Gruziýa narpyzagy ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly, ownuk topurly-çagylyly, daşly, çagylyly we toýunly eňnitlerde, ownan daşlykda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik aprel–maýda gülleýär, maý–ijunda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Magtymguluda, Sumbarda, Ýolderede, Çendirde; Merkezi Köpetdagda: Hyzderede, Degirmenlide, Arçabilde, Duşakerekdagda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide duşýar.

**Tebigy gory.** Gruzıya narpyzagy ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik güllýän döwründe (aprel–maý) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky ýerde saklamaly. Çig malyň ýaramlylyk möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Gruzıya narpyzagyň düzümine efir ýagy, alkaloidler, kumarinler, flavonoidler girýär. Onuň miwelerinde efir ýagy saklanýar. Tohumynda 8,5–37,0% ýag; ýod sanlary 195,2–202,8 (onuň düzüminde turşular: olein, linolew, linolen, 9-olein, 9,12-linol, 9,12,15-linolen) bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda, ösümliğin peti we jöwheri sowuklama kesellerinde, aşgazandan gan gitmede, peşew çykaryjy, aşgazan-ıçegäni, mädäni berkidiji serişde hökmünde peýdalanylýar.

Tohumynyň ýagy lak-boýag önümçiliginde olifleri, laklary, reňkleri taýýarlamakda ulanylýar.

Bezeg, azyklyk, bal beriji we boýag ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti 3 gezek nahardan öň 1 bulgurdan (15 ml) içmeli.

Narpyzagyň 1 çay çemçe (5 g) guradylyp owradylan otuny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 15–20 minut goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapar 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

# GUGUŇ ÇIGILDEMI

Тюльпан Гуга

Tulipa hoogiana



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliği. Örän owadan gülli nepisje ösümliğin dünýäde, takmynan, 100, Türkmenistanda 16 görnüşi duş gelyär.

Guguň çigildemi – sowsanlar maşgalasynyň çigildemler urugynyň boýy 15–45 sm-e ýetýän köpyýlyk otjumak wekili. Toprakdaky soganylygy süýrümтік-ýumurtga şekilli, ýokarsy gysylan, uzynlygy 48–60 mm, ini 32–40 mm. Soganylygynyň gabygy symgylyt-goňur reňkli, perdeli, içi örän gür çal ýa-da agymtyl-çal ak keçe ýaly tüýjagazlar bilen örtülen, ýokarsynda ýumşak ak keçe ýaly dessejik emele gelyär. Baldagy güli bilen bilelikde, uzynlygy 15–45 sm, 4–6-ýaprakly, tas ýalaňaç ýa-da gysga tüýljuje. Ýapraklary tas garşylyklaýyn ýerleşýär, birneme orak şekilli süýnen, ýalaňaç, çalymtyl-ýaşyl, gyalary örän inçe-ak jäheklenen, käte örän gysga kirpiklije, 2 aşaky ýapraklary giň uýy çowly, uzynlygy 20–35 sm, ini 1–2 sm, iň ýokardakysy örän inçe, çyzykly. Gül sapajygy bir güllüje, ýalaňaç.

Güli jaňjagaz şekilli, iri, açyk-gyzyl. Gülýanynyň ýaprajyklary süýrümтік ýa-da süýrümтік-ujy çowly, ýokarlygyna gysylan, goýy gülgün reňk, daşynyň esasy sary-ýaşylymtyl, içiniňki gara menekli, sary reňkli jäheklenen: daşky ýaprajyklarynyň uzynlygy 55–75 mm, ini 25–28 mm, olar ýokarlygyna süýnüp, ýitileşen, gülýanynyň içki ýaprajyklary birneme gysgarak, uzynlygy 50–70 mm we ini 28–40 mm, ýokarlygyna gysylan ýa-da tegelenen, uzynlygy 35–40 mm, ini 21–23 mm. Tyçinkalarynyň uzynlygy tas düwünçeginiňki bilen birmeňzeş. Tyçinkalarynyň sapagy çyzykly-ujy çowly, gara-syýa reňkli. Tozanlygy süýrümтік,



garamtyl reňkli. Döwünçeği süýrüntik. Tumşujagy sapaksyz, döwünçekden giň, tozanlygyndan uzyn. Gozajygy çyzykly-süýrüntik.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Guguň çigildemi ölkämizde deňiz derejesinden 600–1600 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly, ownuk topurly-çagylyly, toýunly, käte çagylyly eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Örän ir (ýanwar) gögerip çykýanlygy bilen tapawutlanýar. Ösümlik aprel–iýunda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy we soganlyklary arkaly köpeliýär. Ösümlik tohumyndan gögerip çykanda, ömrüniň 4–6-njy, soganlygyndan gögerip çykanda 3–4-nji ýylynda gülläp başlaýar.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günüorta-Günbatar Köpetdagda: Ysakda, Magtymguluda, Süntde, Hozarda; Merkezi Köpetdagda: Hyzderede, Arwazda, Tagarawda, Degirmenlide, Müsünewde, Mergenölende, Çopandagda, Duşakerekdagda duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Guguň çigildemi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ol Aşgabadyň botanika bagynda ekip ýetişdirilýär. Ösümlik Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabynda (1999, 2011) we TGHB-niň Gyzyl sanawyna (1998) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin soganlygy we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Soganlygyny ir baharda (mart), güllerini – ösümlik gülleýän döwründe (mart–aprel) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Soganlykdan taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara, gülleriniňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Olary gury, gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Soganlygyň saklanyş möhleti – 2–3, gülleriňki – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Guguň çigildeminiň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine tyulipin alkaloidi, salisil turşusy, C witamin, uglewodlar: polisaharidler girýär.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyryda Gündogaryň parlak ýyldyzlarynyň biri meşhur alym Abu Reýhan Birunyň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly nusgawy işinde çigildemiň dermanlyk häsiýetleri barasynda söz açýlar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplary) ösümliğin soganlygy gany togtadyjy, umumy berkidiji, immuniteti ýokarlandyryjy serişde hökmünde, awitaminozda peýdalanylýar. Täze ýapraklaryndan alnan şiresi ýaralardan gan gidende, ary baly

bilen garylan garnuwy göze ak düşmede, görejiň peselende, göz almasyna zeper ýetende ulanylýar.

Bezeg, azyklyk, bal beriji we boýag ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 soganlygyny 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 5–10 minut gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek 1/3 bulgurdan (75 ml) içmeli.

Çigildemiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) suwa atyp, 15 minut goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 sapar nahardan 30 minut ön 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

## GÜLÝANLY ÜÇGAT

Жимолость прицветничковая  
*Lonicera bracteolaris*

117



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliği. Gülýanly üçgat – üçgatlar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 1,0–2,5 metre ýetýän gyrymsy agaç wekili. Daragt iri we deň sapaklyja. Pyntyklary ýiti, gapajyk bilen örtülen, 2 bitişen daşky teňňejikleri emele getirýär. Adatça, ýaşajyk pudaklary inçe tüylüje we mundan başga-da, gaty çitenekli hem mälize,

seýrek tas ýalaňaç. Ýapraklarynyň uzynlygy 1,5–3,0 sm, ini 1,6–1,8 sm, dykyz, köp bölegi süýrümlik-ýumurtga şekilli ýa-da süýrümlik-elliptik, kütäk ýa-da ýitiräk, esasy tegelek dilimlenen ýa-da pahna şekilli, iki tarapy hem ýalaňaç ýa-da aşagy damarly, tüýlülje, gyralary gaty kirpiklije, steril pudaklarda ýapraklary has iri (5,3 sm-e çenli) we giň. Sapajygynyň uzynlygy 2–5 mm.

Gül saklaýjysynyň uzynlygy (3) 5–10 mm, tüýlülje we azda-kände gür, tas sapaksyz mählije, adaty, çitene bilen garnuwly. Güňanyň ýapraýyklary ýaprak şekilli, uzynlygy 7–13 mm, ujy çowly ýa-da ujy çowly-çyzykly, düwünçekden 3–4,5 esse uzyn, adaty, gaty we gyralary çitene. Gültäjiniň uzynlygy 13–19 mm, sarymtyl, daşy seýrek mähjagazlar we tühjagazlar bilen örtülen, trubkasy bilen bilelikde iki dodagyň epilen ýerine deň. Ýokarky dodagyň 1/3-si dilimlenen we 4-si giň kütäk üleşli, aşaky dodagy ýokarka deň. 2 öňki tyçinkalary gültäje deň, 2 yzky ýokarky dodagyň üleşine ýetýär. Sütünjigiň tas depesine çenli tüýlülje. Düwünçegi erkin, bitişmedik, ýalaňaç ýa-da sähelçe mählije. Lymişy gymyzy reňkli, sähelçe çal örtüklü.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Güňany üçgat ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol daşly eňňitlerde, arçalyklaryň we gymysy agaçlaryň jeňňellikleriniň arasynda ösüp boý almany halaýar. Daragt may–iýunda gülleýär, iýul–sentýabrda miweleýär. Ol tohumy we kök çykyntylary arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Tutlybilde, Çohagaçda, Hasardagda, Süntde; Merkezi Köpetdagda: Nohurda, Garaýalçyda, Arwazda, Degirmenlide, Sülüklide, Müsünewde, Hyrsderede, Mergenölende, Heýratatda, Çayekde, Çopandagda, Arçabilde, Duşakerekdagda, Dagysda, Damjada, Daştoýda, Asylmada, Howdanda, Nomalyzawda duşýar.

**Tebigy gory.** Güňany üçgat ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşup, topbajyklary emele getirýär. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär.

**Dermanlyk çig maly.** Daragtyň şahalarynyň gabygy we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Gabygyny şire herekete gelnäkä (mart–aprel), miwelerini – bişen wagtynda (iýul–sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Gabyklardan taýýar bolan çig maly mata haltalara, miweleriňkini – kagyz haltalara ýa-da agzy berk ýapylan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 3 ýyla çenli.

**Himiki düzümi.** Güňany üçgatyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine efir ýaglary we ýag hem-de flawonoidler girýär.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda daragtyň şahajyklarynyň gabygyny artritde, kellagyryda, rewmatizmde, asitde, analgezirleýji we antioksidant serişde hökmünde peýdalanylýar. Gabygynyň we şahajyklarynyň peti gastralgijada, içgeçmeli kolitlerde, işdä kesilende, awitaminozlarda, höwürtgeli we total alopesiýalarda, saçy berkitmekde hem ösdürmekde ulanylýar. Miwelerini gany togtadyjy, hususan-da, burundan gan gitmede, gipertoniki kesellerde, gastritde, kolitlerde, ganazykda, gipowitaminozlarda haýyrlanylýar. Şiresini ekzemada, psoriazda we trofik başlarynda ýapgy edilýär.

Bezeg, azyklyk we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Daragtyň 4 çay çemçe (20 g) gury gabygyny we şahajyklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 15 minut gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan öň 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Üçgatyň 4 çay çemçe (20 g) gury miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 4 sagat goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 gezek 1/4 bulgur-dan (50 ml) kabul etmeli.



# GÜNDOGAR Zozimasy

Зозима восточная

*Zosima orientalis*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Owadan hem syratly dermanlyk ösümligiň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Gündogar zozimasy – saýawanlylar maşgalasynyň zozimalar urugynyň boýy 30–40 sm-e ýetýän ikiýyllyk otjumak wekili. Baldagy ýekeleşýän, gaty, gapyrgaly, tüýlüşe, esasyndan ýa-da ortasyndan şahalanan. Aşaky şahalary nobatlaýyn, ýokarkylary – çogdamda ýerleşýär. Ýapraklary köplenç, kökýanly, gür çal tüýjagazlar bilen örtülen, olaryň ülüşleriniň sudury ýumurtga şekilli, üçleşýän per kysmy dilimlenen, sapajygy ülüşden gysga, gaty. Baldakdaky ýapraklary sapaksyz, ululygy kiçi we berk.

Saýawanlary dürli: baldagyň ujunda ýerleşýär, iri köp sanly gapyrgaly şöhleli, uzynlygy 12 sm; gapdaldakylary – iki esse kiçi. Saýawanjyklary 20 güllüşe. Gapdaldaky saýawanlarda atalyk güller ýerleşýär, okdakylary – iki jynsly. Okarajygy dişsiz. Gül ýapraklary ýumurtga şekilli, ýekeleşýän, sargylyt reňkli, daşy tüýlüşe, depesi gysga, uzynlygy 1,5 mm. Miweleri ters ýumurtga şekilli, tüýlüşe, uzynlygy 6–12

mm, olaryň gýralary agymtyl, çişen. Merikarpiýeleriniň gapyrgajygy sapak şekilli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Gündogar zozimasy ölkämizde deňiz derejesinden 800–1600 metr belentlikde bitýär. Ol düzlüklerde, toýunly-çagylyly, ownuk topurly, çägeleşen, daşly topraklarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik mart–maýda güleşýär, aprel–ijunda miwelenýär. Ol tohumy arkaly köpelenýär. Ömründe birnäçe gezek tohum berýär (polikarpik).

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda: Gurbannepesde, Daşlyderede, Gamyşlyjada; Kiçi Balkanda; Kürendagda; Günorta-Günbatar Köpetdagda; Merkezi Köpetdagda: Garaýalçyda, Arwazda, Sülükli, Mergenölende, Germapda, Heýratbada, Çopandagda, Arçabilde, Magtymgalada, Gökderede, Duşakerekdagda, Wanowskide, Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Babazawda, Dagysda, Daştoýda, Dogryderede, Birinjimaýda, Asylmada, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide, Guruhowdanda, Çyrlakda, Şamlyda, Mänede; Bathyzda: Serhetabatda; Hazarýaka çölünde; Üstýurtda; Demirgazyk-Günbatar, Üňüzaňyrsy, Günorta-Gündogar Garagumda; Köpetdagetäk medeni oturymynda: Kakada duşýar.

**Tebigy gory.** Gündogar zozimasy ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Her ýylda 30–50 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty, gülleri we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Otlaryny we güllerini ösümlik güleşýän döwründe (mart–maý), miwelerini – bişen wagtynda (aprel–ijun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleridir miweleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, garaňky ýerde saklamaly. Otunyň we gülleriniň saklanýş möhleti – 1–2, miweleriniňkini – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Gündogar zozimasynyň ýerüsti böleginde 0,26% efir ýagy, kumarinler, flavonoidler saklanýar. Ösümliğin baldagynda 0,04%, ýapraklarynda 0,08% efir ýaglar, flavonoidler: kwersetin, kempferol, 3-glýukozid, 7-glýukozid we 3-kwersetin poliglýukozid bar. Güllerinde 0,11%, miwelerinde 0,9–1,8% efir ýagy (onuň düzüminde kapril turşusy, okatanol, oktilasetat, oktilbutirat), kumarinler: zozimin, deltoin, bergapten, imperatorin, izobergapten, izopimpinellin, pimpinellin,

sfondin, umbelliferon, 20,1% ýag (onuň düzüminde 45,5% petrozelin turşusy) saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň otunyň we gülleriniň peti bilen jöwheri deri kesellerinde, sowuklama ahwallarynda, bagryň, böwrekleriň, aşgazyň hem-de içegeleriň dykyn almasynda peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň miwelerindäki kumalrleriň jeminiň, çişleriň garşysyna täsiri ýüze çykarylýdy.

Miwelerinde has köp saklanýan efir ýaglary parfýumer-kosmetik senagatynda ulanmaklyga ýaramly.

Bezeg, bal beriji we tehniki ösümlük.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1–2 nahar çemçe (15–30 g) guradylan güllerini 2 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessay otda 15 minut gaýnatmaly. 30 minutyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek 3–4 nahar çemçeden (45–60 ml) içmeli.

Zozimanyň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 0,5-litrlik termosada demlemeli, bir sagat goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapa nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) guradylp owardylan miwelerini 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suwa atyp, 15 minut goýmaly. Hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 ýola 1/3 bulgurdan (75 ml) içmeli.

## **GYRGY ÝAPRAK**

## **SARYJAOT**

### **Желтушник**

### **ястребинколистный**

### **Erysimum hieracifolium**

**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Gyrgyýaprak saryjaot – atanakgüllüler maşgalasynyň saryjaotlar urugynyň boýy 20–70 sm-e ýetýän ikiýyllyk otjumak wekili. Köki ok kök bolup, az şahalanan. Baldagy ýönekeý ýa-da şahalanan, uýy iki tujagazly. Ýapraklary süýrümlik ýa-da uýy çowly (uzynlygy 2–6 sm we ini 0,4–1,2 sm), uýy iki-baş tüylüje, gýalary abat ýa-da birmeňzeş ýiti dişlije.

Gül tpolumy – köp güllüje salkym. Gülleri sary reňkli. Kuregi göni, dört gyraňly (uzynlygy 1,5–5,0 sm), teňne

şekilli, üç-baş uçly tüylüje. Tohumy süýrümlik, uzynlygy 1,15 mm, goňur reňkli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Gyrgyýaprak saryjaot ölkä-mizde jülgelerde, deňiz derejesinden 400–600 metr belentlikde bitýär. Ösümlük iýun–awgustda güllýär hem miwelerýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda diňe Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Gyrgy ýaprak saryjaot ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeliýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Haşal ösümligi hökmünde duş gelyär. Her ýylda 5–10 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlük güllýän döwründe (iýun) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata ýa-da kagyza haltalara gaplamaly. Olary gury, gün şöhesiniň göni düşmeýän ýerinde saklamaly. Möhleti – 1 ýyl.

**Himiki düzümi.** Saryjaotun düzümine ýürek glikozidleri: erizimin, erizimozid; bufedienolidler we kardenolidler: kannogenol, dezglýukoerikordin, allionin, strofantidin we korhozid girýär. Onuň ýerüsti böleginde 0,16–0,55% kardenolidler: erizimin (gelwetikozid), korhozid A; 0,01% alkaloidler, C, P witaminler, flavonoidler: kwersetiniň we izoramnetiniň glikozidleri saklanýar. Baldaklarynda 0,12–0,14% kardenolidler, ýapraklarynda triterpen saponinler, 0,16–0,26% kardenolidler: erizimin bar. Ösümligiň güllerinde 0,26–0,95% kardenolidler saklanýar. Tohumynda steroidler:  $\beta$ -sitosterin, kampesterin, holesterin; 0,98–2,55% kardenolidler: erizimozid, erizimin, korhozid, sinapoil-glýukoerizimozid; 27,0–38,7% ýag (onuň düzümine turşular: 32,2% linolen, 12,3% erukow, 20,16% linolew, 3,9% olein, 4,55% eýkozen, 3,9% palmatin, 1,4% eýkozadien, 1,1% dokozadien, 0,4% lignoserin, 0,5% begenow, 1,2% stearin, 0,13% margarin, 0,5% palmitolein, kapril, miristin, pentedekan girýär); glýukozinolatlar: 3-karbometoksipropilglýukozinolat; 3,8% izotiosianatlar: allil-, 3-metiltiopropil-, 3-metilsulfinilpropil-, 3-metilsulfonylpropil we 3-oksipropilizotiosianatlar bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda saryjaot ýürek zerarly döreýän tutgaýlarda, şeýle-de ýüreğiň beýleki kesellerinde diuretik we ýürek-damar serişdesi hökmünde peýdalanylýar.



Ylmy lukmançylykda ösümligiň täze şiresinden alynýan «kardiowalen» derman serişdesini, ýüregiň rewmatik çat atmasynda, ýüregiň kardiosklerozynda, gan aýlanyşyň I we II A döwrüniň bozulmalarynda, stenokardiýada (ýüregiň damarlarynyň organiki däl üýtgemelerinde), wegetatiw newrozlarda ulanylýar. Öňler bu maksatlar üçin erizimin, korezid we ýürek toplumlary haýyrlanylýar.

Ösümligiň zäherli bolanlygy sebäpli, onuň derman serişdelerini ulanmazdan öň hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Bezeg we bal beriji ösümlük.

### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümligiň 2 çay çemçe (20 g) gury otuny 1,5 bulgur (300 ml) sowuk suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 20–25 minut gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Saryjaotuň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanyan alawda 10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Peti gün içinde 3 sapa nahardan 30 minut öň 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 30 minut goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 ýola nahardan 20–30 minut öň 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

## **GYRYMSY HEMEŞE**

**Жасмин кустарниковый**

**Jasminum fruticans**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Hoşboý ysly daragtň dünýäde, takmynan, 300, Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Gyrymsy hemeşe (žasmin) – boýy 1,0–1,5 metre ýetýän zeýtunlar maşgalasynyň hemeşeler urugynyň gyrymsyja wekili. Ösümlük göni ýa-da ýaýraň pudakly. Köne şahajyklarynyň gabygy açyk-çal-goňur reňkli, uzaboýuna gara zolakly. Ýaşajyk pudaklarynda gabygy tomsuna ýaşyl, gysyna – gara-ýaşyl, örän ownuk, köp sanly çal merjimekler bilen örtülen. Ýaşajyk pudaklary baş gyraňly. Pyntyklary ownuk, çal reňkli, ýalaňaç. Ýapraklary üçleýin, seýrek ýönekeý, nobatlaýyn, derjimek, dykyz, gyalary abat. Ýaşajyk ýapraklary – ýekeleýin ak tüýlülje, ululary – ýalaňaç. Ýaprajygynyň uzynlygy 10–15 mm we ini 4–7 mm. Ýapraklarynyň sapaklary guýguçly, olaryň gyalary tüýlülje.

Gülleri açyk-sary reňkli, gabarasy 10–15 mm. okarajygy 4–5 inçe dişlije. Gültäji, trubka 4–5-ýaprap egilmesi bilen birigen, agzynda bol guýguçlar bilen örtülen. Tyçinkalarynyň sany – 2 (seýrek 3), gültäjiň trubkasýndan ösüp çykýar. Miwesi – şar şekilli, ýalpyldawuk, gara, gury iýmiş, gabarasy 4–6 mm, 1–2 tohumly.

**Ýaşajyş aýratynlygy.** Gyrymsy hemeşe deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol daşly, çagylyly we ownuk topurly eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlük aprel–maýda gülleýär, sentýabr–oktyabrda miweleýär. Ol tohumy arkaly we wegetatiw usuly bilen köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Kürendagda: Soňudagda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Tutluda, Guratyda, Tämilde, Magtymguluda, Hasardagda, Süntde, Ýolderede, Çendirde duşýar.

**Tebigy gory.** Gyrymsy hemeşe ýurdumyzdaky seýrek ösümlükleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlük Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň şahalary, ýapraklary we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Şahalaryny we ýapraklaryny ösümlük gülleýän döwründe (aprel–maý), miwelerini – bişen wagtynda (oktyabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Şahalardyr ýapraklardan taýýar bolan çig mallary mata haltalara, miweleriňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Olary gury, gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Şahalaryň we ýapraklaryň saklanýş möhleti – 1–2, miweleriňki – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Hemeşäniň düzümine flawonoidler girýär. Onuň gabygy fenollary we onuň ugurdaşlaryny: siringozid; alkaloidleri saklaýar. Ösümligiň ýapraklarynda

triterpenoidler: ursolow turşusy; alkaloidler bar. Güllerinde alkaloidler we tohumynda ýag saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyrlarda Gündogaryň beýik almy we tebigaty synag edijisi Abu Reýhan Biruny özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly meşhur nusgawy eserinde ösümligiň melhemlik häsiýetlerini açyp görkezýär.

Halk lukmançylygynda ösümligiň petini we jöwherini şeker bilen ýokarky dem alyş ýollarynyň kesellerinde, hususan-da, dowamly bronhitde we bronh demgysmasynda peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümlikden taýýarlanylýan jöwheriniň protistosid işjeňligi, ýaşajyk şahajyklarynyň, ýapraklarynyň we miweleriniň antibakterial häsiýetleri ýüze çykaryldy.

Bezeg, bal beriji we toprak berkidiji ösümlük.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Daragtyň 2 nahar çemçe (30 g) guradylan miwelerini 1 bulgur (200 ml) gyzgyn suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli. Islegiňe görä şeker goşmaly.

Hemeşäniň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan şahajyklaryny 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwa atyp, bir sagat goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3–4 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

## GÜLTAGT

Бутень клубневой

*Chaerophyllum bulbosum*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Dünýäde, takmynan, 40, Türkmenistanda 3 görnüşi duşýar.

Gültagt – saýawanlylar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 40–60 sm-e ýetýän köpýylyk ýa-da ikiýylyk otjumak wekili. Toprakdaky klubeni şar şekilli ýa-da süýrümlik-şar kysmy, gabarasy 1,0–1,5 sm. Baldagy ýekeleşýän, göni, togalak, aşagy gür tüylüje, aşaklygyna gönügen agymtyl reňkli çitenekli, uzynlygy 2 mm, birneme şahalanan. Kökanyndaky we aşaky baldak ýapraklary ir solýar, olar uzyn sapakly, yzygiderlikde süýrümlik-ujy çowly gyna öwrülýär. Baldagyň ortaky ýapraklary gysga sapakly, dessine giňelen gyna öwrülýär, olaryň ülüşleri tas üçleşýän per şekilli. Ilkinji üleş sapakly, ikilenjisi – gysga sapajykly ýa-da tas sapaksyz, çuň per şekilli bölünen, ýumurtga şekilli üleşleriniň uzynlygy 7–10 mm we ini 3–5 mm. Ýokarky ýapraklary çylşyrymly, üçleşýän, gysga ýaýbaň gynda oturan, ahyrky üleş ýumurtga şekilli ýa-da süýrümlik, uzynlygy 0,5–1,5 sm we ini 2–5 mm, kütegräk.

Ýokarky saýawanlary näbelli, gapdal saýawanlary 5–7-şöhleli, ýalaňaç, uzynlygyna deň bolmadyk şöhleli. Gyny ýok. Saýawanjyklary 8–10-güllüje, seýrek tas hemme güljagazlary hasyl berýän saýawanjykda, köplenç, hasyl berýän güljagazlary saýawanjykda ýerleşip, sany – 1–4-e çenli. Gynjagazlarynyň sany – 5, ujy çowly-çyzykly, dik, ýalaňaç, gyalary inçe perdeli ýaprajyklardan ybarat. Gül ýaprajyklary ak reňkli, uzynlygy, takmynan, 1 mm. Miweleri süýrümlik-silindrik, uzynlygy 5 mm we ini 1,0–1,5 mm. Sütünýanjygy gysga koniki. Sütünjikleri sütünýanyndak uzynrak, egreden, keseligine ýaýraň. Miwe-jikleriniň köpüsi 5 küti gapyrgajykly we gara reňkli, oýuk.



**Ýaşajyk aýratynlygy.** Gültagt ölkämizde deňiz derejesinden 1200–1600 metr belentlikde bitýär. Ol jülgelerdäki ýapragyny düşürýän agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň arasynda boý alyp ösmäni halaýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär, iýun–iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär, ömründe bir gezek tohum berýär (momokarpik).

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Porderede, Deştda, Saýwanda (Keseyoluň demirgazyk eňňitleri), Hatynagada duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Gültagt ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetşdirmek maslahat berilýär. Ol Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri, oty we tohumy çig mal bolup hyzmat edýär. Gültagtyň kökünü ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny – gülleýän döwründe (maý–iýun), tohumyny – bişýän wagtynda (iýun–iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Kökünden we otundan taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara, tohumynyňkyny – kagyz gutujyklara ýa-da agzy ykjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, garaňky, salkyn ýerde saklamaly. Kökleriň we tohumyň saklanyş möhleti – 2–3, otunyňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümliğin düzümine 0,44–0,48% efir ýagy, C witamin, 0,54–1,58% kumarinler, 0,12–0,14% flawonoidler girýär. Onuň köki düzüminde efir ýagyny (onuň düzüminde 27,3% sis-osimen, 17,6% trns-osimen, 13,5% limonen, 12,4% α-pinen, 10% γ-terpinen, 8,2% n-simol) saklaýar. Ýerüsti böleginde 0,15% efir ýagy bar. Baldaklarynda ýokary alifatiki uglewodorodlar: n-nonakozan bar. Ýapraklarynda, güllerinde kwersetin, kempferol wlawonoidler saklanýar. Bişen miwelerinde efir ýagy (onuň düzüminde 85,2% trans-osimen, 5,4% sis-osimen, 2,4% γ-terpinen, 1,8% β-pinen, 0,7% terpinolen, 0,6% α-pinen, 0,5% mirsen, 0,2% limonen, 0,1% sabinen, kamfora, Δ3-karen, α-fellandren, β-fellandren) saklanýar. Bişmedik miwelerinde 0,81% efir ýagy, flawonoidler: 3-rutinozid kwersiten, 7-glýukozid we 7-diglýukozid lüteolin, 15,2% ýag bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin kökleri, oty we tohumy ýara bitiriji, gany togtadyjy, umumy berkidiji serişde hökmünde peýdalanylýar. Mundan başga-da awitaminozda, deri kesellerinde, nerw bozulmalarynda, dykyn almalary açmakda ulanylýar.

Azyklyk hökmünde ösümliğin klublenlerini çig, gaý-nadylan we gowrulan görmüşinde haýyrlanylýar. Ýaşajyk ýapraklarynyň hoşboý tagamynyň bolanlygy sebäpli, ony jaz hökmünde aşlara we işdäaçarlara goşulýar.

Bezeg, iýmitlik we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) mäjumlanan tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3–4 gezek 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.

Gültagtyň 2 nahar çemçe (30 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 2 sagat goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapar nahardan ön 1/3 bulgurdan (75 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 30 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 ýola 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

## HAZAR AKARGÜLI

Девясил каспийский

Inula caspica



**Häsiýeti.** Giň ýaýran derman ösümliği. Hazar akargülü – çylşyrymgüllüler maşgalasynyň akargüller urugynyň boýy 30–60 sm-e ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Bir baldakly, seýrek köp baldakly, göni, ortasyndan we ýokarsyndan şahalanan, ýühjüme düwürli-tüýlülje ýa-da ýalaňaç. Baldagynyň aşaky bölegi käte tas ýalaňaç ýa-da köplenç seýrek gysgajyk çitenekler bilen örtülen, tüýjagzlary ýokarlygyna gönügen, mämşi baş şekillije

sapaksyz mäjzajagzly, şeýle-de has uzyn seýrek ýarym gysylan tüýljuje. Baldagynyň orta we yokarky bölegi, esasan, gül toplumynyň şahajyklary, uzyn, ak gürr tüýljuje, gysga çitenek kysmy tüýjagazlar we mämişi reňkli mäjzajagzlar bilen örtülen. Ýapraklary inçe, çyzykly ýa-da çyzykly-ujy çowly, uzynlygy 10–15 (20) sm we ini 0,5–1,0 (2,0) sm, ýokarsy ýiti; aşaklary – esasy uzyn gysylan, başgalary – sapaksyz, baldaga ýarym çolaşan, iki tarapyndan, edil baldak ýaly, tüýljuje ýa-da бүдүр-сүдүр, tas ýylanak.

Sebetjikleri aramlyk ululykda, gabarasy 1–2 sm, köp sanly, ýumşak (2–8-güllüje) galkan şekilli gül toplumynda ýerleşýär. Ýaprajyklarynyň gyny köp hatarly, gapakly, inçe çyzykly, ýiti, gaty kirpikli mäjlije we gysga çitenek kysmy tüýljuje; daşyklarynyň uzynlygy – 2–3 (4) mm we ini 1,0–1,5 mm, içkileri – inçe çyzykly, uzynlygy 5–6 mm we ini 0,5–1,0 mm. Gapdaldaky dil kysmyja gülleri pestikli, uzynlygy 7–8 mm-e çenli (käte uzynrak), inçe dillije, ini takmynan, 1 mm. Trubkaly gülleri iki jynsly, uzynlygy 5–6 mm. Tozanjyklarynyň uzynlygy 2,5 mm, esasy çykyntgyly. Çigitgagazy tüýljuje, uzynlygy, takmynan, 1,0 mm we ini 0,25 mm, tüýjigi bilen uzynlygy 5 mm-e çenli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Hazar akargüli ölkämizde düzlüklerde, deňiz derejesinden 800–1600 metr belentlikde bitýär. Ol medeni oturymlarynda, derýalaryň arnasyň çygly yerlerinde, batgalaşan çemenzarlyklarda, ýaplaryň boýunda, köplenç, grunt suwlaryna ýakyn bolan has şorlaşan topraklarda, seýrek – ýorunjalyk we galla ekilen meýdanlarda haşal ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–awgustda gülleýär, iýul–sentýabrda miweleýär. Ol tohumy hem porrugy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Daýnada, Ýokarky Sumbarda; Bathyzda: Serhetabatda, Serhetçide; Murgap medeni oturymynda: Maryda, Baýramalyda; Amyderýa medeni oturymynda: Farapda, Türkmenabatda; Daşoguz medeni oturymynda (ähli etraplaryna bol) duşýar.

**Tebigy gory.** Hazar akargüli ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Her ýylda 15 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri, ýapraklary we gül toplumlary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), ýapraklarynyň we gül toplumlaryny – ösümlik gülleýän döwründe (iýun–awgust) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet

boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerden taýýar bolan çig maly kagyz haltalara, ýapraklarynyňkyny – mata haltalara, gül toplumlarynyňkyny – kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, garaňky, gün şöhesi göni düşmeyän yerde saklamaly. Kökleriniň saklanýş möhleti – 2–3, ýapraklarynyňkyny we gül toplumlarynyňkyny – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Akargülüň köklerinde we porrugynda uglewodlar, onuň ugurdaşlary: 43% inulin; 2,3% efir ýagy (onuň düzüminde seskwiterpen laktonlar we beýleki birleşmeler), 0,1% alkaloidler, E witamin, saponinler, sakyzlar, nemler saklanýar. Ösümliğin ýerüsti böleginde kauçuk, 0,16% alkaloidler bar. Ýapraklarynda we gül toplumlarynda inkaspin, britanin seskwiterpenoidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümliğin dermanlyk häsiýetleri irki wagtlardan belli bolupdyr. Ol barasyndaky ilkinji maglumatlar Pliniý ulyň (b.e. 23–79-njy ýyllary), Lukresiýa Karyň (b.e. ön 98–55-nji ýyllar), Gorasiýanyň (b.e. ön 65-nji–b.e. 8-nji ýyllary), Wergiliýanyň (b.e. ön 70-nji–b.e. 19-njy ýyllary) işlerinde duş gelýär.

Orta asyrlarda tebigaty synag ediji alym Abu Reýhan Biruny özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly meşhur işinde ösümliğin melhemlik häsiýetleri barasynda durup geçýär.

Ezber alym we lukman Muhammet Huseýn özüniň «Melhemler hazynasy» atly nusgawy eserinde akargülüň melhemlik häsiýetlerini şeýle tekdarlaýar: «...akargül keýpiňi gowulandyryr, zäheriň garşysyna täsirli, ýüregi pugtalandyryr, şeýle-de mädäniň agyzjygyny berkidýär, iýmitleriň siňmekligine ýardam berýär we jynsy gowşaklyga nepli, peşew haltasyna oňat täsirli, melanholiýa haýyryly, gorka, biynjalyga we gamgynlyga nepli».

Halk lukmançylygynda ösümliğin otunyň peti peşew-jyns ulgamynyň kesellerinde, hususan-da, peşewiň damjalap akmasynda, ukuda özüňe bagly bolmazdan ýeriňe siýmekde peýdalanylýar. Ony çakyr bilen garyp, garyndyny zäherli haýwanlar çakanda, beýleki awular bilen zäherlenende, bedene has agram düşende, wagtyndan ön garramada ulanylýar. Melhemlik jöwherini aşgazanyň we içegeleriň başly kesellerinde neplenýär. Ösümliğin petleri we jöwhwerleri çakyzada, kellagyryda, garaguş keselinde, limfatik bogunlaryň sökelliklerinde, işiasda ýapgy görnüşinde haýyrlanylýar.

Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda ösümliğin kökleriniň petini halk lukmançylygynda yokarky dem alyş ýollarynyň kesellerinde gakylyk goparyjy serişde hökmünde giňden ulanylýar.



Ylmy lukmançylykda ösümligiň düzümindäki seskwiterpenoidleriň jeminiň antibakterial häsiýetleri we britaniniň (54–60%) Plissanyň limfosarkomasynyň ösüp boý alşyna ingibirleýji işjeňligi ýüze çykarylady.

Ösümlükdäki laktonlardan bölünip çykarylan «alanton» derman serişdesi aşgazanyň we on iki barmak içegäniň başly keselleriniň ýitileşen döwründe peýdalanylýar.

Bezeg, bal beriji we boýag ösümlük.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10–15 minut gaýnatmaly. Otag temperaturasyna çenli sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti günüň dowamynda her 2 sagatdan ýyly görnüşinde 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Hazar akargülünüň 12 gram owradylan täze porrugyny 0,5 litr «Kagor» gyzyl çakyrnyň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan peti günüň dowamynda 2 gezek 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli. Kuwwaty pes bolan adamlar we sagdynlygyny dikeldýänler üçin netijeli umumy berkidişi serişde.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) täze köklerini we şolar ýaly ary balyny 0,5 litr «Kagor» gyzyl çakyrnyň ýa-da portweýniň içine atyp, syrçaly pitide haýal ýanyan alawda 10 minut gaýnatmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan peti gün içinde 3 ýola nahardan soň 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli. Melhemi gakylyk goparyjy, sowuklamanyň garşysyna, peşew we öt çykaryjy, gany togtadyjy, bakterisid, soguljanyň garşysyna we umumy berkidişi serişde hökmünde neplenýär.

Akargülüň 2 çay çemçe (10 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gyzygyn suwuň içine atyp, suw hammamynda 30 minut gyzdymaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan jöwheri günde 2–3 sapar nahardan bir sagat ön 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli. Şeýle-de melhemi ýaralary we ekzemy bejermek üçin ulanylýar.

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 10 minut goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri bir gije-gündiziň dowamynda kabul etmeli.

Akargülüň porrugynyň we kökleriniň şiresini 1:1 gatnaşykdaaky ary baly bilen garyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 2–3 gün goýmaly. Birsyhly garyp durmaly. Häzir bolan garyndyny bronh demgysmasynda we üsgülewükde haýyrlanmaly.

Her günde akargülü 6,5 grama çenli peýdalanmaly.

## **IBERIÝA DAŞKEKRESI**

**Василек иберийский**  
**Centaurea iberica**



**Häsiýeti.** Dagetek derman ösümligi. Iberiýa daşkekresi – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň daşkekrelorugynyň boýy 20–80 sm-e ýetýän birýyllyk, seýrek ikiýyllyk otjumak wekili. Ösümligiň baldagy ýekeleşýin, göni, ortasyndan ýa-da aşagyrakda, köplenç, esasyndan has ýaýraň şahalanan, gapyrgaly, sähelçe tüýlşe, süýri tas ýalaňaç, gül sebedine çenli ýaprakly. Ýapraklary çalymtyl-ýaşyl reňkli ýa-da ýaşyl, köp sanly gysga, gaty, bulam-bujar tüýjagazly, käte ýaýbaň tüýlşe. Kökýanynyň ýapraklary gysga sapakly, per şekilli bölünen, süýrümlik, uýy çowly ýa-da uýy çowly-çyzykly, ýitiräk, dik-dişlije, köplenç, gyralary tas abat, kähalatlarda iri dişlije ýa-da hatda esasyndan gysga kepjeli, 1–2 (3) segmentli, gysga, ak, inçe ýiti, seýrek liroşekilli bölünen, iri ýokarsy segment bilen gutarýar. Baldakdaky ýapraklary sapaksyz, per şekilli bölünen; ýokarkysy – abat, uýy ýiti, diş-diş, adatça, sebetjige ýakynlaşan.

Sebetjigi şahalaryň depesinde ýerleşýär we has gysgalan, uzynlygy 1–5 sm, şahajygy ýekeleşýin, seýrek gapdaldakylary tas sapaksyz, ösümlükde köp mukdarda saklanýar. Gyny ýumurtga şekilli ýa-da togalak-ýumurtga kysmy, ýalaňaç, uzynlygy 13–16 mm (perdeli çykyntgyl), ini 10–14 mm. Onuň ortaky ýaprajyklary ýumurtga kysmy, gatamaklyk bilen dowam edýär, sarymtyl-saman reňkli, ýokarsy sähelçe guýguç kysmy, tikene öwürülmeklige güýçli ýygyn edýär, olaryň uzynlygy (10) 15–30 mm, barmak şekilli ýaýraň, gysga (uzynlygy 3 mm çenli), inçe tikenekli, her tarapynda (1) 2–3-si bar. Daşky ýaprajyklary togalak-ýumurtga şekilli, has gysgajyk tikenlije. Içki ýaprajyklary

süýrüntik-ýumurtga kysmy we süýrüntik, perdeli, togalak ýa-da ýaybaň elliptik, birneme deň däl dişlije, köplenç, goňur reňkli, kiçi çykyntgaly. Gülleri gülgün-syýa reňkli; gapdaldakylary – örän gowşak ulalan, çuň baş-alty bölünen, uýj çowly ýa-da uýj çowly-çyzkyly, seýrek ülüşleri çyzkyly egrenen. Çigitgajalary elliptik ýa-da goňrumtyl menekli, başda tas tüýlűje, bişende ýalaňaç, ýylmanak, sähelçe gysylan, ýalpyldawuk, uzynlygy 3–4 mm we ini 1,2–1,5 (1,7) mm. Üpűjigi ak reňkli, galýan, ikileýin, çitenekli; daşkysy – uzynlygy 2–2,5 (3) mm; içkisi – örän gysga.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Iberiýa daşkekresi ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol jűlgelerde, dag derýajyklaryň kenarynda, meýdanlarda, seýrek dag öňüniň düzlüklerinde haşal ösűp boý almany halaýar. Iberiýa daşkekresi maý–awgustda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösűmlik diýarymyzda Kűrendagda: Dăneatada, Tersakanda; Gűnorta-Gűnbatar Kűpetdagda: Magtymguluda, Bagandyrda, Parhaýda, Hojagalada, Sumbat we Çendir derýalarynyň kenarynda; Merkezi Kűpetdagda: Deştda, Garawulda, Nohurda, Degirmenlide, Mergenölende, Gylgylawda, Germapda, Heýratbatda, Çopandagda, Arçabilde, Gökderede, Duşakerekdagda, Wanowskide, Ýablonowskide; Gűndogar Kűpetdagda: Robergowskide, Guruhowdanda, Şamlyda, Gadamgada, Çorlohda; Bathyzda: Çemenabatda, Serhetabatda; Kűytendagda: Hojapilatada; Hazaryka çölünde: Çekişlerde, Üçekeler depesinde, Etrekde; Etrek medeni oturymynda; Kűpetdagetok medeni oturymynda: Serdarda, Baharlyda, Aşgabatda, Bagyrda; Murgap medeni oturymynda: Murgapda duşýar.

**Tebigy gory.** Iberiýa daşkekresi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Her ýylda 3–5 tonnadan gowrak çig maly ýygnamklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösűmligiň köki, oty, ýapraklarydyr miweleri çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da gűyűde (sentýabr), otuny we ýapraklaryny – gülleýän döwrűnde (maý–iýun), miwelerini – yetiűşýän wagtynda (iýul–awgust) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda aýyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Kökűnden taýýarlanan çig maly kagyz haltalara, otunyňkyny we ýapraklarynyňkyny – mata haltalara, miwesiniňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury hem salkyn ýerde saklamaly. Kökleriň saklanýş möhleti – 2–3, otlaryňky we ýapraklaryňky – 1–2, miweleriňki – 3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösűmligiň düzümine triterpenoidler: ursol turşusy, steroidler, alkaloidler, flawonoidler: 5-gidroksi-6,7,3',4'-tetremetoksiflawon, apigenin, kwersetin, rutin, skutellifrein, skutellarin girýär. Onuň ýerűsti bölegi düzüminde 0,16% knisinkauçuk, 0,47% alkaloidler saklanýar. Ýapragynda 0,1% seskwiterpenoidleri, fenolkarbon turşusy we olaryň ugurdaşlary: 0,65% kofe, 0,51% hlorigen hem 0,09–0,25% flawonoidler bar. Ýapraklarydyr güllerinde kwersetin, apigenin, lyuteolin flawonoidler; gül toplumynda – 0,8% saponinler, 1,28% eý maddalar, 0,42% kumarinler, 0,11–0,41% antosian flawonoidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösűmligiň kökleriniň petidir jűwheri asitde, aşgazan gan akmasynda peýdalanylýar. Ýapraklary – gyzzymada, bulardan başga-da, kökleri, ýapraklary we miweleri diuretik häsiýete eýedir. Tohumyndan owradylyp ýasalan tozy siňňiliň we bitmesi kyn ýaralaryň üstűne sepiliýär.

Ylmy lukmançylykda daşkekriň sowuklamanyň garşysyna we dezinfisirleýji häsiýeti ýűze çykaryldy. Şeýlede konýunktiwitleri, blefaritleri, gűze agram düşmesini, bagyr we öt ýollarynyň kesellerini bejermeklige gönűkdirildi. Bulardan başga-da ösűmligiň ýerűsti böleginiň antibakterial işjeňligi ýűze çykaryldy.

Ösűmlikden taýýarlanylýan dermanlyk seriűdeleri toplumlaýyn terapiýa hökműnde bűwregiň we peşew çykaryjy ýollaryň dowamly sowuklama kesellerini bejermek üçin ulanylýar. Mundan başga-da daşkekri aşgazan-ičege kesellerinde peýdalanylýan garyndylaryň düzümine girýär.

Bezeg, bal beriji we ot-iymlık ösűmlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Daşkekriň guradylan kökleriniň, boýbodranyň we atguýrugyň otunuň 2 nahar çemçe (30 g) garyndysyny, 0,5 litr gaýnag suwa atyp, içi syrçaly haýal ýanýan otda suwuklygyň gűwrűmi 300 ml bolýança gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli. Taýýar bolan peti gűnűň dowamynda her sagatdan 2 nahar çemçeden (30 ml) içmeli. Gan akması tamamlanandan soň, ýene 2 gűn 2 nahar çemçeden (30 ml) kabul etmeli.

Ösűmligiň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, syrçaly pitide ýerleşdirmeli, gapagyny ýapmaly we gaýnap duran suwda suw hammamynda 15 minut gyzdymaly. 45 minutyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli, galan massany sykmaly. Jűwhere başlangyç gűwrűmine (200 ml) yetiűnçä gaýnag suw goşmaly. Melhemi her gűn 3 wagtyna ýyly gűrűűşinde 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.



Zygyryň 4 çay çemçe (20 g) otuny, daşkekräniň we lüşiniň güllerini garyp, 2 bulgur (400) gaýnag suwa atyp, 8 sagat goýmaly. Hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günün dowamynda birnäçe gezek 1–2 damjadan kabul etmeli. Şeýle-de ýapgy ýapmaly. Serişde sowuklamany ýenilleşdirýär, iriňi dep edýär we görşüňi gowulandyrýar.

Ösümligiň 100 gram otuny 2 bulgur (400 ml) zeýtun ýa-da günebakar ýagynyň içine atyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, günün düşýän ýerinde 20 gün goýmaly. Yzygiderli çaykap durmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan garyndyny irden ajöze 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli. Melhemi infarkty geçireniňden soň ýüregiň işjeňligini kadalaşdyrmak üçin ulanmak maslahat berilýär.

## IBERIÝA ZIRKI

Барбарис иберийский  
*Berberis iberica*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Iberiýa zirki – zirkler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 1,0–1,5 metre ýetýän şahalanan tikenli gyrymsy wekili. Ösümligiň şahalary goňrumtyl reňkli. Ýapraklary uýj çowly, süýrümlik-elliptik görnüşli, adatça, ýylpyldaýan, uýj ýitileşen, seýregräk kütäk.

Gülýanlary ýönekeý ýa-da üç bölünen, käte köp bölünen, tiken şekilli.

Gül toplumy – salkym şekilli, uzynlygy 3–5 sm. Gülleri sary reňkli. Okara ýapraýyklarynyň, tyçinkalarynyň we gül ýapraklarynyň sany – 6. Miwe sapajygynyň uzynlygy 7–9 mm. Miwesi – örtüklü iýmiş. Tohumy inçe gasyňly, gara-goňur reňkli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Gyrymsy agaç ölkämizde deňiz derejesinden 1200–1600 metr belentlikde bitýär. Ol gury daşly eňňitlerde, gyrymsy agaçlaryň jeňňelliklerinde ösüp boý almany halaýar. Ýagtyny halaýan ösümlüklere degişli, ýöne garaňkylyga hem döz gelýär; açyk, ýagty ýerlerde topbaklygy emele getirýär. Kölege ýa-da garaňky ýerde miwe getirmeyär. Zirk aprel–iýulda gülleýär we miweleýär. Ol tohumy, kök çykyntgylary arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Uly Balkanda; Merkezi Köpetdagda: Ypaýgalada, Sarymsaklyda, Mergenölende, Çopandagda, Arçabilde duşýar.

**Tebigy gory.** Iberiýa zirki ýurdumyzdaky seýrek ösümlükleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory çäklü. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ol Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Zirkiň dermanlyk maksatlary üçin köküniň gabygy, ýapragy we miweleri çig mal bolup hyzmat edýär. Köküni ir baharda (mart) pyntygyny ýarmanka ýa-da güýzde (sentýabr), ýapraklaryny – ösümligiň gülleýän döwründe (aprel–may), miwelerini – bişip ýetişýän wagtynda (iýul) ýygnamaly. Olary umumy kabul edilen usulyýet boýunça teläriň aşagynda açyk howada ýa-da oňat ýel çekerli jaýda galyň syk matanyň ýa-da kagyzyň üstünde 3–4 sm galyňlykda ýaýradyp, arasynda agdaryp durmak arkaly guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerdeki topragy silkip aýyrmaly, ýöne ýuwmaly däl. Köküň gabygyndan taýýar bolan çig malyň abat bölejikleriniň uzynlygy 20 sm-e çenli, galyňlygy 6 sm-e çenli bolmaly, çalymtyk-goňur, kese kesimi limon-sarymtyl reňkli, özboluşly ysly we ajymtyk tagamly. Ýapraklary we miweleri hem özboluşly ysly we turşumtyk tagamly. Köküň gabygyndan taýýar bolan çig maly kagyzt haltalara ýa-da gutujyklara, ýapragynyňkylary – mata halta, miweleriniňkini – kagyzt gutujyklara ýa-da agzy mäkäm ýapylýan aýna gaplara salmaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Kökleriň gabygynyň saklanyş möhleti – 2–3, ýapraklaryňky – 1–2, miweleriňki – 3–4 ýyl. Bir düýbünüň hasyllylygy 5–7 kilogram.

**Himiki düzümi.** Ösümligiň düzümine alkaloidler girýär, takmynan, 10 dürli alkaloidler: berberin, oksiberberin, palmatin, barbamin we beýlekileri mälüm edildi. Onuň

kökünde berberin, palmatin, kolumbamin, ýatrorrisin, oksiakantin alkalodleri saklanýar. Esasy berberin hasaplanýar (1–1,5%-e çenli). Ýapraklarynda – berberin, C, E we K1 witaminler, karotinoidler, organiki turşulyklar: alma, limon we başgalar bar. Miwesinde – 6–7% şeker, organiki turşulyklar: alma, çakyr, 6%-e çenli limon, pektin, ey maddalary, flavonoidler; askorbin turşusy (25 mg %) we K1 vitamini, rutin, köp kaliý (37 mg/100 g çenli) saklanýar. Bişen miwelerinde alkaloidleriň saklaýjylygy birneme peselýär.

**Peýdalanylyşy.** Zirk gülleriň dilinde ötgür, gyjyndyryjylyk, gödeklik, ýaramaz keýp, gazaply diýmekligi aňladýar.

Ösümligiň dermanlyk häsiýetleri Gadymy Wawilonda we Hindistanda baryp-ha irki döwürlerden bäri mälum bolupdyr. Assiriýa patyşasy Aşşurbanipalyň kitaphanasynda biziň eýýamymyzdan 650 ýyl ön taýýarlanylýan toýun tagtadygynda, zirkiň iýmişleri bedeni ýaşartmaga we gany arassalamaga serişde hökmünde peýdalanylýanlygy ýatlanyp geçilýär.

Orta asyrlaryň alym lukmany Abu Aly ibn Sinanyň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly meşur işinde ösümligi bagyr we aşgazan keselleriniň önüni almakda peýdalanmaklygy maslahat berilýär, öt çykaryjy, teşneligiňi gandyrýjy, gan togtadyjy serişde hökmünde; daşky – çişleriň we örgünleriň gaýnaglamasynda ulanmaklygy tekrarlaýar.

Abu Reýhan Biruny özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly ensiklopediýasynda gyrymsynyň melhemlikdigi ýatlap geçýär.

Öz wagtynda has meşhurlyga eýe bolan Muhammet Gaýmaz Türkmeniň «Pygamber tebiçiligi» atly kitabynda zirkiň melhemlik häsiýetleri giňişleýin beýan edilýär. Zirkiň miwesiniň täze şiresini ýüzüne çalsaň reňkiňi durlaýar. Ösümligiň özi bolsa, bagyr kesellerinde we teşneligiňi gandyrýjy serişde hökmünde peýdalanylýar.

Gündogaryň belli lukmany we alymy Muhammet Huseýniň «Melhemler hazynasy» atly düýpleýin diwanynda «...zirk teşgeligiňi gandyrýar, aşgazanyň we bagryň gyzgynyny dep edýär, mädäni berkidýär, gyjynyjylygy we ganyň çalt akýşyny haýalladýar, babasylda haýyrly, bagry, ýüregi oňat berkidýär» diýip ýazýar.

Halk lukmançylygynda gaty çişlerde ösümligiň ýapgyssy peýdalanylýar. Petleri – süýjükeselde; jöwheri – ýürek bulanmada we gusmada ulanylýar, miweleri işdäni açýar, ysytmaly näsaglaryň suwsuzlygyny gandyrýar, peşew çykaryjylyga eýe, rahatlandyryjy, sowuklamanyň garşysyna täsirli, öt çykaryjy, sklerotigiň garşysyna we

antitoksiki häsiýetli. Iýmişiniň şiresi ysytma, pnemoniýa, üsgülewüge we süýjükesele haýyrly. Mundan başga-da zirk bagyr, öt ýollarynyň kesellerinde (holesistitlerde, gepatitlerde, öt-daş kesellerinde we beýlekilerde) öt çykaryjy serişde hökmünde, ýatgy gan akmasynda ulanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Baharly we Gökdepe etraplarynda) köküniň ekstrakty göz kesellerinde, köküniň özi – zäherli ýylanlar we mör-möjekler çakanda ulanylýar. Iýmişleri – turşy içgileri taýýarlamak üçin haýyrlanylýar. Ösümligiň melhemlik garyndysyny ary baly, dalçyn we beýleki hoşboý tagamlar bilen garyp tultuklyk, bagryň dykyn almasy, içgeçme, bagryň gowşaklylygy bejerilýär. Zirke balkan ýowşanynyň jöwheri goşulanda, iýmit siňmekliginiň güýjüni ýokarlandyrýar; zagpyranlyssy – bagryň gatamasynda we peşew çykaryjy serişde hökmünde peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda «holelitin» derman serişdesi öt-daş kesellerini, holesistitleri, sarygetirmäni bejermekde peýdalanylýar. Şeýle-de «berberin bisulfat» dermany – gan basyşy ýokary bolanda, dowamly gepatitde, rahatlandyryjy, peşewdir öt çykaryjy we sowuklamanyň garşysyna serişde hökmünde ulanylýar.

Ösümligi ulanmagyň ön ýanynda hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Bezeg, iýmitlik, bal beriji we boýag ösümlük.

### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) owradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Zirkiň 2 nahar çemçe (30 g) guradylan miwelerini 1,5 bulgur (300 ml) gaýnagynyň içine atyp, bir litrlik termosada demlemeli, 2 sagat saklamaly. Soňra hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri gün içinde 3 sapar 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 4 çay çemçe (20 g) gury miwelerini 0,5 litr gaýnaga atyp, bir giije-gündiz goýmaly. Soňra süzmeli. Jöwheri günün dowamynda içmeli.

Zirkiň 1 çay çemçe (5 g) owradylan gabygyny ýa-da köküni 2 bulgur (400 ml) sowuk suwa atyp, 4 sagat goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Jöwheri her gün 4 ýola ýarym bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň guradylan ýapragyny 1:20 gatnaşykda gaýnag suwa atmaly, 15 minutyň dowamynda suw hammamasynda gyzdyrmaly. Soňra hasa bilen süzmeli.



Melhemlik jöwheri gün içinde 1 nahar çemçeden (15 ml) 3–4 gezek içmeli.

Zirkiň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan ýapragyny ýarym bulgur (100 ml) 70%-li spirtiň içine atyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda 2 hepde garaňky ýerde saklamaly. Arasynda bulap durmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan şerbedi her gün 3 ýola 30 damjadan kabul etmeli.

Ösümligiň guradylan ýapraklarynyň üstüne 1:5 gatnaşykda 40%-li spirti guýmaly, agzy mäkäm ýapylýan aýna gapda 10 gün garaňky ýerde goýmaly. Aram-arap bulap durmaly. Häzir bolan şerbedi gün içinde 2–3 sapar 30–40 damjadan içmeli. Melhemlik akuşer-ginekologik amalyýetinde gan togtadyjy serişde hökmünde, şeýle-de bagyr we öt ýollarynyň kesellerinde peýdalanylýar. Dermanlyk serişdäni hamyla zenanlar ulanmaly däldir.

Zirkiň içmek için sykylp alnan şiresiniň bir günlük mukdary 90 grama, tohumсыз etiniňki – 70 grama çenli bolmaly.

## ILINIŇ DAŞKEKRESI

Василек Ильина

*Centaurea iljinii*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Iliniň daşkekresi – çylşyrymylgüllüler maşgalasynyň daşkekrekler urugynyň boýy 15–25 sm-e ýetýän köpyýlyk otjumak wekili. Ösümlük tutuş çal reňkli, gysylan ak keçe ýaly tüýlülje. Baldagy köp sanly, esasy ýokarlygyna galyp duran ýönekeý, ownuk joýaly, ýokarsyna çenli ýaprakly, sebediň aşagyna çenli ýognas. Ýapraklary dykyz, süýrümlik-elliptik, süýrümlik ýa-da süýrümlik-ujy çowly, ýiti ýa-da ýitiräk, käte ujy örän gysga gara tikenli, adatça, gyra-

lary abat, seýrek aşaky bölegi we her tarapy 1–2 gysga dişjagazly, yzygiderlilikde gysgajyk sapajyga çekilýär. Kökanyňnyň ýapraklary – köp sanly, birnäçe has uzyn sapakly, ortakysy – uzynlygy 3,0–6,5 sm (sapagy bilen), ini 0,5–1,5 sm. Sebetjikleri baldagyň depesinde ýekeleşýän ýerleşýär. Gyny ýumurtga şekilli, sähelçe kereplije, orta ululykda, uzynlygy 15–18 mm, ini 10–15 mm. Onuň ýaprajyklary derijimek, kütüräk, ýaşylymtyl-sarymtyl reňkli, örän gysga, gysylan ýüňjümeç, daşkysy – ýumurtga kysmy, ortakysy – süýrümlik-ýumurtga görnüşli ýa-da süýrümlik-ujy çowly, şolaryň we beýlekileriň gynynyň ýaprajyklary gaçmaýar, germewli, uzyn kekeç şekilli, kirpikli, ýokarlygyna bölünen gysga tüýlülje, ýaybaň üçburçly, ujy ýiti, azda-kände bir reňkli, garamtyl-goňur çykyntyly. Çykyntylarynyň kirpijekleri gysga, byçgy-çitenekli, deň, köplenç, birneme merkezi meýdanyňnyň garasyndan uzynrak, ýaprajyklaryň gyrasynda ýerleşýär (daşkysynyň tas esasynda we ortakysynyň ortasynda çenli), görnegin gysga we symgylt reňkli. Gynyň içki ýaprajyklarynyň ujy çowly-çyzykly. Olaryň çykyntylary germewli, ýumşak-kirpikli ýa-da deň bolmadyk kesilen diş-dişli, inçe üçburçly ýa-da süýrümlik-ujy çowly, ýokarsy uzyn tikenli, aşaky bölegi garamtyl-goňur, çal reňke çenli, ýokarsy agymtyl reňkli.

Gülleri symgylt-sary-gülün reňkli, uzynlygy 17–20 mm, gyradakylary – ulalmadyk, symgylt staminodijaly, gültäji trubkasynda gizlenýär, çuň baş-alty bölünen, üli çyzykly egrelen. Çigitjagazy süýrümlik-elliptik, gysylan, sarymtyl reňkli ýa-da symgylt-sarymtyl, ýylmanak, sähelçe tüýlülje, bişende tas ýalaňaç, birneme ýalpyldawuk, uzynlygy 7–8 mm, ini 3,0–3,7 mm. Üpjiği az-owlak çypar, galýan, ikileýin, daşkysy – çigitjige deň, uzynlygy 7–8 mm, köp sanly inçe bardaly, içkisi – 12 bardaly, has gysga, tas iki esse we takmynan üç esse inli, byçgy-büdüür-südüür.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Iliniň daşkekresi ölkämizde deňiz derejesinden 1200–1600 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly we ownuk topurly-çagyly eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlük maý–iýulda gülleýär hem miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýdere bilen Deňiň arasyndaky tarazda; Merkezi Köpetdagda: Saýwanda, Nohurda duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Iliniň daşkekresi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetisdirmek maslahat berilýär. Ösümlük Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna (1999, 2011) girizildi.



**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (maý) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Olary gury, gün şöhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Otlaryň we gülleriň saklanyş möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Iliniň daşkekresiniň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümligiň düzümine alkaloidler, flavonoidler we saponinler girýär.

**Peýdalanylyşy.** Halk we ylmy lukmançylygynda ösümligiň jöwheri we şerbedi ýiti respirator we sowuklama kesellerinde gyzgyny peseldiji, kellagyryda, bagyr bilen öt ýollarynyň kesellerinde öt çykaryjy, böwregiň we peşew çykaryjy ýollaryň dowamly sowuklama ahwallarynda peşew çykaryjy serişde hökmünde ulanylýar. Şeýle-de pielit, sözenek, uretrit kesellerine nepli.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Daşkekräniň 2 nahar çemçe (30 g) güllerinden, tozganyň 1 nahar çemçe (15 g) köklerinden, dynaklyjanyň 4 nahar çemçe (60 g) güllerinden, çitçitiniň 1 nahar çemçe (15 g) köklerinden, eşekýorunjanyň 1 çay çemçesinden (5 g) taýýarlanylýan 1 nahar çemçe garyndyny, bir litrlik termosada demlemeli, islegiňe görä, şeker goşmaly, garyşdyrmaly, bir sagat goýmaly. Jöwheri her gün 4–5 gezek 1 nahar çemçeden (200 ml) içmeli.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3–4 sapa 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Daşkekräniň 1 çay çemçe (5 g) guradylyp owradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 20 minut goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Ösümligiň 4 çay çemçe (20 g) guradylan gül ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) medisina spirtiniň içine atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün goýmaly. Yzygiderli çaykamaly. Şerbedi gün içinde nahardan ön 3–4 gezek ýyly görnüşinde 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

## **INÇEJIK KEÝIGOT**

**Зизифора тонкая**

**Ziziphora tenuior**



**Häsiýeti.** Dagetek derman ösümligi. Inçejik keýigoty – dodakgüllüler maşgalasynyň keýigotular urugynyň boýy 5–15 sm-e ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Baldagynyň köp bölegi esasynda şahalanan, ýapraklary ýaly gysga kirpik şekillije tüýjagazly. Ýapraklary inçe çyzykly–ujy çowly ýa-da ujy çowly damarlary çykyp duran.

Gülleri gür süýrümlik baş görüşli gül toplumyna ýygananan, tutuş ösümlikde ýerleşýär. Adatça, gülýanynyň ýapraklary güllerinden 2–3 esse uly, inçe çyzykly, baldakdakydan az tapawutlanýar. Okarajygy silindrik, üçburçly–ýumurtga şekilli ýitije dişjagazly, gaty we çiteneikli, çykyp duran damarly. Gültäji sowsany reňkli, okarajygynadan uly, uzynlygy 10 mm, trubkaly. Tyçinkasynyň sany – 2, ösmedik iki sany tohumсыз tozanjykly, ýokarky dodagyň esasynda birigen. Hozjagazynyň uzynlygy 1,5–1,8 mm, ini 0,5–0,6 mm, arka tarapy oýuk, garny kütäk iki gyraňly, esasynda gysylan, ýalaňaç, torly–öýjükli suratly, sarymtly ýa-da goňur reňkli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Inçejik keýigoty ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol gury eňňitlerde, efemerleriň toparlanmalarynyň arasynda, seýrek – toýunly-çagyly çöllerde we günorta medeni oturymlarynda ösüp boý almany halaýar, esasan, dageteklerinde bol duşýar. Ösümlik aprel–iýunda gülleýär, iýun–iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpelýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik Türkmenistanyň çägelik we çöllük ýerlerinden başga, hemme çäklerinde duşýar.

**Tebigy gory.** Inçejik keýigoty ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin



gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Her ýylda 70–80 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlik güllýän döwründe (aprel–iýun), miwelerini – bişen wagtynda (iýul) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, miweleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Olary gury, gün şöhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Otunyň saklanyş möhleti – 1–2, miweleriniňkini – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Keýigotunyň ýerüsti böleginde 0,14–1,0% efir ýagy (onuň düzüminde  $\alpha$ -pinen,  $\beta$ -pinen, kamfen,  $\beta$ -mirsen, tepinolen, piperiton, izomenton, 60–78% pulegon, 1,8-sineol, sitral, piperitenon), flavonoidler, kumarinler saklanylýar. Ösümligiň ýapraklarynda we güllerinde C witamin bar. Tohumynda 20% ýag, gidrolizatly turşular: 3,7% palmitin, 0,9% stearin, 5,3% olein, 11,9% linol, 78,2% linolen bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň oty jynsy gowşaklykda, meteorizmde, aşgazan-ichege ulgamynyň kesellerinde, işdä kesilende, mäde, kardiotonik, gakylyk goparyjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Ösümligiň otunyň jöwheri çagalarda umumy pugtalandyryjy dermanlyk serişde üçin ulanylýar. Miweleri ganly içgeçme we ysytma nepli.

Keýigotunyň melhemlik peti, jöwheri we şerbedi Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda halk lukmançylygynda newrasteniýada, diareýada, içegeleriň sanjysynda, ýürek-damar, aşgazan-ichege ulgamlarynyň kesellerinde haýyrlanylýar. Şiresi gastrite we öýken inçekeseline peýdaly.

Ösümligiň efir ýagy kosmetik senagatynda peýdalanylýar. Ol sabynlara we diş pastasyňa hoşboý ys bermek üçin goşulýar.

Durmuşda balyklary gaýtadan işlemekde, olara hoşboý tagam, ikinji naharlara hoşboýluklary bermekde ulanylýar. Bezeg, azyklyk we bal beriji ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10–15 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Keýigotunyň 1 nahar çemçe (15 g) otuny bir litrlik termosda demlemeli, birsalym goýmaly. Yzsüre hasadan

geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 gezek nahardan öň 1 bulgurdan (200 ml) kabul etmeli. Dowamlylygy – 30 gün.

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) owardylan otuny 1/2 bulgur (100 ml) medisina spirtine atyp, agzy berk ýapylyan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün goýmaly. Yzygiderli çäpkap durmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan şerbedi günde 3 ýola 5–7 damjadan içmeli.

## **IRIO KERTIKLI**

**Гулявник Ирио**

**Sisymbrium irio**



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Irio kertikli – atanakgüllüler maşgalasynyň kertikliler urugynyň boýy 30–50 sm-e ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik bulambujar tüýlülje, esasan, onuň ýokarky bölegi görnetin, ýalaňaç. Adatça, baldagy ýönekeý. Aşaky ýapraklary ýonguç görnüşli, per şekilli bölünen, süňmek uýy çowly, iri dişlije gapdaly ülüşlije we ýokarky ülüşleri has iri (dişlije we kepjeli). Ýokarky ýapraklary per şekilli bölünen, inçe süýrümtil-uýy çowly ülüşli.

Salkymy güllemeziniň öň ýanynda gür we gysga – tas galkan kysmy, soňra uzalan görnüşinde. Okara ýaprajyklarynyň uzynlygy 2–3 mm. Gül ýapraklary cyzykly-

kepjeli, uzynlygy takmynan, 3 mm, sarymytyl reňkli. Kürejiginiň uzynlygy 50–60 mm we ini 0,75–1,0 mm, ýalaňaç, birneme бүкүлөн, bişmedikleri – ýokarygyna gönügen, gül salkymyndan uly, sähelçe tohumyň garşysyna бүкүлөн. Kürejekleriniň sapajygy inçe, uzynlygy 6–8 (12) mm, gür ownuk tüýjagazlar bilen örtülen. Sütünjigi örän gysga, etlek, tumşujagy iki kepjeli. Tohumynyň uzynlygy, takmynan, 1 mm we ini 0,5 mm, sary-goňrumtyl reňkli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Irio kertikli ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol jülgelerde, dag derýajyklarynyň kenarynda, medeni oturymlarynda haşal ösüp boý almany halaýar. Ösümlik mart–maýda gülleýär, maý–iýunda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda; Kürendagda: Serdarda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda; Merkezi Köpetdagda: Mergenölende, Sekizýapda, Arçabilde, Gökderede, Wanowskide; Gündogar Köpetdagda; Bathyza: Serhetabatda; Köýtendagda; Hazarýaka çölünde: Türkmenbaşyda; Köpetdagetok medeni oturymynda: Aşgabatda duşýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny ösümlik gülleýän döwründe (mart–maý), tohumyny – bişýän wagtynda (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, tohumynyňkyny – kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, garaňky ýerde saklamaly. Otunyň saklanyş möhleti – 1–2, tohumynyňky – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Kertikliniň düzümine glikozidler, gyzzyrgyç ýagy hem adaty ýaglar, karotin girýär. Onuň ýerüsti böleginde steroidler:  $\beta$ -sitosterin, 3- $\beta$ -D-glykuzid  $\beta$ -sitosterin, flavonoidler: kwersetin, izoramnetin saklanýar. Ýapraklarynda C witamin we karotin bar. Tohumynda ýag (onuň düzüminde 25% erukow turşusy, 0,5% glykuzinler), 122 ýod sany, izoramnetin flavonoidler saklanaýr.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin otunyň jöwheri bokurdak we döş kapasasynyň organlarynda peýdalanylýar. Tohumy süýt mäsleriniň we ýumurgajyklaryň infiltratlarynda, howply täze döremelerde, bronh demgysmasynda, gakylyk goparyjy, stimilirleýji, umumy berkidiji we gyjyndyryjy serişde hökmünde peýdalanylýar.

Durmuşda ony ajyteräni çalşyjy hökmünde ulanylýar.

Bezeg, azyklyk, bal beriji, ot-iymlik we boýag ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Kertikliniň 1–2 nahar çemçe (15–30 g) guradylan tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly

pitide haýal ýanyan otda ýarym sagat gaýnatmaly. Sowadyp, hasadan geçirmeli. Melhemlik peti her gün 3 wagtyna 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Ösümliğin 1 çay çemçe (5 g) guradylyp owradylan otuny 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwa atyp, sowa-ýanča goýmaly, soňra süzmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapar 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

## IRI ÝAPRAKLY AKARGÜL

Девясил крупнолистный  
*Inula macrophylla*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliği. Iri ýaprakly akargül – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň akargüller urugynyň boýy 50–200 sm-e ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ösümliğin toprakda iri, ýognas, şahalanan kökleri ýerleşýär. Baldagy göni, ýokarsy şahalanan, joýaly. Ýapraklary derjimek, ýalpyldawuk, ýokarsy ýalaňaç, aşagy nokatly mäslije, gyalary dişli-byçgyly. Kökanynyň ýapraklary giň elliptik (uzynlygy 25–85 sm we ini 18–32 sm), sapakly (uzynlygy 10–20 sm); baldakdakysy – süýrümlik-elliptik (uzynlygy 20–37 sm we ini 8–15 sm), sapakly; ýokarkylary – ujy çowly (uzynlygy 3–10 sm we ini 1,0–4,5 sm).

Sebetjigi (gabarasy 4,5–6,5 sm) galkan görnüşli gül toplumyna ýyganan. Gülleri sary reňkli (uzynlygy 1–3 sm). Miwesi – goňur reňkli silindrik çigitjagaz, uzynlygy 3–4 sm, üpüklije.



**Ýaşayyş aýratynlygy.** Iri ýaprakly akargül ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol jülgelerde, ownuk topurly eňňitlerde, daşly jyglymlarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär, iýun–awgustda miweleýär. Ol tohumy we porrugy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda diňe Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Iri ýaprakly akargül ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetışdirmek maslahat berilýär. Her ýylda 5 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri, porruklyry we gül toplumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini we porruklyryny ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), ýapraklaryny we gül toplumlaryny – ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerden we porruklardan taýýar bolan çig mallary kagyz haltalara, ýapraklarynyňkyny – mata haltalara, gül toplumlarynyňkyny – kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Kökleriň we porruklyryň saklanýş möhleti – 2, ýaprakdyr gül toplumlarynyňkyny – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Akargülüň kökleri düzüminde 3,77–4,31% eý maddalary, 2–20% şeker, 12–40% inulin, 5,68–13,71% sakyz, 2,20–3,17% efir ýagy, igan we igan laktonlary saklaýar. Ösümliğin ýapragynda 2,21% eý maddalar, 6–9% şeker, iwalin, granilin, karabon laktonlar bar. Güllerinde 1,77% eý maddalar, 6–10% şeker saklanýar. Ondaky sakzyň düzüminde 20,4–30,1% efir ýagy tapyldy, esasy düzümi bölegini alantolakton tutýar.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyrlarda Gündogaryň beýik alymy Abu Reýhan Biruny özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly meşhur nusgawy işinde ösümliğin melhemlik alamatlary barasynda söz açýar.

Meşhur alym hem tebib Muhammet Huseýn «Melhemler hazynasy» atly nusgawy diwanynda akargülüň melhemlik häsiýetleri barasynda şeýle ýazýar: «Akargülüň peti peşewiň damjalap gelende, sowuk zerarly döreýän nogsanlyklarda, hususan-da, peşewiňi saklap bilmezlikde we ukuda ýeriňe siýmekde haýyrlý, şeýle-de aýbaşyň saklananda ony açmakda, melanholiýada, gorkmaklykda, biynjalyksyzlykda, gaýgyda nepli».

Halk lukmançylygynda ösümliğin täze şiresini sanjylarda, bronh demgysmasynda, reumatizmde, üsgü-

lewükde, iriňli ýaralarda, garamükrüde ulanylyar. Ösümliğin ýapragyndan taýýarlanylýan tozyny ary baly bilen garyp, aşgazan başlarynda haýyrlanylýar. Akargülüň guradylan gül sebetjiklerini diň etiniň sowuklamasynda (agyz boşlugyňy çäykamak) peýdalanylýar. Ösümliğin täze ýaşajyk baldaklaryny işdäni açmakda peýdalanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Köýtendag etrabynyň daglyk obalary) akargülüň kökleriniň petini inçesekelde, aşgazan-ichege sökelliklerinde, şeýle-de peşew we soguljan çykyryjy serişde hökmünde ulanylyar. Mundan başga-da onuň jowheri kynlyk bilen dem alnanda, dem alyş ýollarynyň sowuklamasynda, bronhitde gakylyk goparyjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Ösümliğin şerbedi öýken inçesekesinde, aşgazanyň we içegeleriň baş kesellerinde haýyrlanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümliğin kökleriniň esasynda taýýarlanylýan derman serişdeleri aşgazanyň baş kesellerinde we katarynda, on iki barmak içegäniň baş sökelliklerinde peýdalanylýar. Ol melhemlikler şeýle-de gastroenteritlerde we infeksiýa gelip çykmasyz ganly içgeçmede peýdalanylýan netijeli serişde hasaplanýar.

Bezeg, bal beriji we boýag ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Akargülüň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 15 minut gaýnatmaly. Sowadyp hasadan geçirmeli. Taýýar bolan peti günün dowamynda her 3 sagatdan 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin 100 gram täze köklerini 1 litr suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 15 minut gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli, ýyly suw goşup garmaly. Taýýar bolan peti wannajyk görnüşinde ujaklaryň (el we aýak) bogunlarynyň dürlü agyryly näsazlyklarynda peýdalanmaly.

Akargülüň 2 çay çemçe (10 g) owradylan köklerini 3 bulgur (600 ml) sowuk gaýnan suwa atyp, 8 sagat goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jowheri her gün 4 gezek nahardan 15 minut ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Ösümliğin 1 çay çemçe (5 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 10 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jowheri günün dowamynda kabul etmeli.

Akargülüň 1/2 bulgur (100 g) gyrgyzdan geçirilen täze köklerini 0,5 litr araga atyp, agzy mäkäm ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 9 gün goýmaly. Yzygiderli çäýkap durmaly. Şerbedi gün içinde 2–3 ýola nahardan ön 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli. Dowamlylygy – 2–3 aý.

Ösümligiň şiresini we ary balyny 1:1 gatnaşykda garmaly. Garyndyny has güýçli üsgülewükde kabul etmeli.

Her günde akargüli 6,5 grama çenli haýyrlanmaly.

## IRI ÝAPRAKLY ÝYLGAY

Кизильник монетовидный  
*Cotoneaster nummularioides*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Iri ýaprakly ýylgay – bägüller maşgalasynyň ýylgaylar urugynyň boýy 1,5–2,0 metre ýetýän gurymsy agaç wekili. Daragt çybyk şekilli galgap durýan, pudagy gara, gyzylymtyl reňkli, ýapraklary seýrek ýerleşen. Ýapraklary giň, togalak ýa-da giň elliptik, adatça, gysga ýitileşen, käte oyuk, gysga uçluja, ýokarsy düwürli, adatça, tüýlüje, aşagy ýumşak tüýlüje, sarymtyl, ownuk, adatça, gysga pudaklarda uzynlygy 5–10 mm we ini 4–8 mm, sterillerde – uzynlygy we ini 2 sm-e çenli.

Gül toplumy 2–4-güljagazly. Oky gysga. Gül sapajygynyň uzynlygy 1–2 mm, tüýlüje, miweleri ýalaňaç. Gülleri açyk, ak, ownuk. Gül sapajyklarynyň uzynlygy 2–3 mm. Adatça, miweleri ýekeleyin ýa-da 2–3, bişmedikleri – goňrumtyl-gyzyl reňkli, bişenleri – gara, çal örtükli, etlek däl, yöne şireli, ownuk, uzynlygy 5–6 (7) mm. Okara ýaprajygynyň depesi gury, gysylan. Şänijeginiň sany – 2.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Iri ýaprakly ýylgay ölkämizde deňiz derejesinden 800–1600 metr belentlikde bitýär. Ol jülgelerde, daşly, daşlaşan-çaýylly demirgazyk eňňitlerde, gurymsy agaçlaryň arasynda ösüp boý almany halaýar. Daragt aprel–iýunda gülleýär, sentýabr–oktyabrda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda: Möwlämde, Külejede; Kürendagda: Jebelde, Soňudagda,

Serdaryň golaýyndaky daglarda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Äýyderede, Hozly we Güýen jülgesinde, Ysak dagynyň günorta eňňidinde, Sünt dagynda, Ýoldere jülgesinde; Merkezi Köpetdagda: Sülükli, Germapda, Sandyklyda, Arçabilde, Arçabil derýajygynyň yokarsynda, Giňdiwar jülgesinde, Aşgabadynyň golaýyndaky daglarda, Duşakerekdagda, Ogyrlyda; Köýtendagda; Hazaryka çölünde: Daşratbatgala daşýar.

**Tebigy gory.** Iri ýaprakly ýylgay ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär.

**Dermanlyk çig maly.** Daragtyň kökleri, sütüniniň gabygy, pyntyklary, ýapraklary, gülleri we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini, sütüniniň gabygyny we pyntyklaryny ir baharda – martda (pyntykdan özgesi) ýa-da güýzde – sentýabrda (sütüniniň gabygyndan başgasy), ýapraklary we gülleri – ösümligiň gülleýän döwründe (aprel–iýun), miwelerini – bişen wagtynda (sentýabr–oktyabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerinden, agajyň gabygyndan, pyntyklaryndan, ýapraklaryndan taýýar bolan çig mallary mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da agzy ykjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Çig mallary gury, salkyn ýerde saklamaly. Kökleriň, agajyň gabygynyň, pyntyklaryň we miweleriň saklanyş möhleti – 2–3, ýapraklaryňky we gülleriniňki – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ýylgaýyň düzümine azotly birleşmeler, sinil turşusy, C witamin, flavonoidler, antosianlar, fenolkarbon turşusy, katehinler girýär. Onuň ýapraklarynda poliiizoprenoidler saklanýar. Miwelerinde azot saklaýan birleşmeler: sinilin turşusy bar.

**Peýdalanylyşy.** Gündogaryň meşhur alymlary Abu Aly ibn Sina «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» we Abu Reýhan Biruny «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly nusgawy işlerinde ösümligiň reumatizmde we içgatmada peýdasynyň bardygynyň hakda söz açýarlar.

Halk lukmançylygynda ösümligiň kökleriniň jöwheri reumatizmde peýdalanylýar. Agajynyň şepbige ekzematada, ownuk örgünlerde, gijilewükde, meteorizmde, diareýada, sibir başynda, ganly içgeçmede we beýleki ýokanç kesellerinde, gany arassalaýjy serişde hökmünde ulanylýar. Şahajyklarynda emele gelyän «manna» diýlip atlandyrylýan şekerjimek madda iç sürüji serişde hökmünde haýyrlanylýar.



Kökleriniň jöwheri we şerbedi Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda halk lukmançylygynda rewtizmde, şahajyklarynyň jöwheri garyn garahassalygynda peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň dermanlyk serişdeleriniň antibakterial we protistosid häsiýetleri ýüze çykaryldy, şeýle-de howply çişleriň ösmegine fenol birleşmeleri bilen şöhläniň täsir etdirilmeginde ingibirleýji netje berýär.

Gündogar aşhanasynda ösümligiň miwelerini mürepbe, toşap we kompot taýýarlamakda ulanylýar.

Bezeg, azyklyk we bal beriji ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Daragtyň 1 çay çemçe (5 g) guradylyp owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 20–30 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3 wagtyna 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Ýylgaýyň 1 çay çemçe (5 g) mäjumlanan köklerini 1 bulgur (200 ml) medisina spirtiniň içine atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 10–15 gün goýmaly. Birsyhly çaykap durmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Şerbedi gün içinde 3 gezek 10–15 damjadan kabul etmeli. Şeýle-de günün dowamynda 2 ýola (irden hem agşam) agyryly ýerlerine çalmaly.

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) şepbigini 1 nahar çemçe (200 ml) zeýtun ýa-da günebakar ýagyna garyp, mäjumlamaly. Taýýar bolan garyndyny ýyly görnüşinde ýapgy etmeli.

## **JUNGAR GOTUROTÝ**

**Скабиоза джунгарская**  
**Scabiosa songarica**



135

**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Jungar goturoty – guşokaralar maşgalasynyň goturotular urugynyň boýy 25–60 sm-e ýetýän köpýylyk otjumak wekili. Toprakdaky kökleri agaçlaşan, köp kelleli. Tutuş ösümlik gysga ýumşak tüýjagazlar we çitenejikler bilen örtülen. Baldaklarynyň bogunarlary 5–7-den. Kökýanyň ýapraklarynyň uýy çowly, baldagyň aşagyndakylary gysga sapajykly, olar ýaprak ülüşlerinden sähelçe kiçi, baldakdakylary – esasy bitişen, per şekilli-dilnen, çyzykly gapdal üleşli, uýy çowly we iri. Başjagazyň gabarasy 3,5–6,0 sm, gülsaklaýjysy süýnen. Gynynyň ýaprajyklary uýy çowly, mahmal kysmy tüýlülje.

Gültäji sarymtyl-syýa reňkli, seýrek symgylt-goýy gülgün, gyraky gülleriniň uzynlygy 25 mm-e çenli, gynjagazy (daşky okarajgy) aşagy uzyn tüýlülje, inçe çukurlyja, uzynlygy 6 mm çenli, täjiniň uzynlygy 4–5 mm, 25–30 damarly. Okarajgyň içi gaty tüýlülje, olaryň çiteneikleri gysga tüýlülje, uzynlygy, takmynan, 10 mm, ýagny täjinden iki esse uzynrak.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Jungar goturoty ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly çagyly eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–iýunda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda diňe Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Jungar goturoty ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeýär. Dermanlyk maksatlary üçin

gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Köýtendag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri we oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Kökleri ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny – ösümlik gülläýän döwründe (iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Gazylýp alnan kökleri arassalamaly, ýuwup guratmaly, deslapky ülüşlere bölüşdirmeli. Çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky ýerde saklamaly. Kökleriň saklanyş möhleti – 3, otlaryňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Jungar goturotunyň köklerinde 0,13% organiki turşular; 9,4–17,9% triterpenoidler: zongorozidler A, B, C 0,015%, D, E, F, G 0,05%, H, I 0,06%, J, K, L, M 1, N, O 1,2%, P, R, gidrolizatde oleanol turşusy; steroidler; 0,08–0,29% alkaloidler; C witamin; 2,86% eý maddalar; 0,12% kumarinler; 0,77% flavonoidler saklanýar. Ýerüsti böleginde 0,16% organiki turşular; 5,5–8,4% titerpenoidler: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R zongorozidler; 0,03% alkaloidler; fenolkarbon turşusy we olaryň ugurdaşlary: kofe, hlorogen, izohlorogen; 0,12% kumarinler; 2,4% flavonoidler bar. Baldagynda we ýapraklarynda deňişlilikde 2,06%, 3,6% saponinler; 0,15% alkaloidleriň yzlary; C witamin; 1,3%, 3,7% eý maddalar saklanýar. Güllerinde 2,9% saponinler, alkaloidler, C witamin, 3,3% eý maddalar bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin kökleri ýürek-damar, göz, deri kesellerinde, diş agyryda, bitmesi kyn ýaralarda, siňnillerde peýdalanylýar. Otunyň peti we jöwheri ýiti respirator ýokançlarynda ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümlikdäki saponinleriň jeminiň sedatiw täsiri ýüze çykarylady. Mundan başga-da olaryň arterial gan basyşyny peseldýändigini mälim edildi.

Ösümlikden taýýarlanylýan «zongorozid» derman serişdesi, ýürek-damar ulgamynda oňatlyklary döredär, hususan-da, eritrositlerdäki natriniň saklanyşyny köpeldýär; ganyň plazmasynda we eritrositlerdäki kaliniň saklanyşyny peseldýär; ganyň geparine bolan tolerantlygyny, fibrinogeniň saklanyşyny ýokarlandyrýar.

Bezeg, bal beriji we ot-ýimlik ösümlik.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 2 nahar çemçe (30 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 5–10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli, şeýle-de ýapgy etmeli.

Goturotunyň 2 çay çemçe (10 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur gaýnag suwa atyp (200 ml), syrçaly pitide pessay otda 15–20 minut gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli. Peti gün içinde 3 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin 1 çay çemçe (5 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, birneme goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 sapar 2 nahar çemçeden (30 ml) içmeli.

## ŽERARYŇ JIGERGÜLI

Володушка Жерара  
*Bupleurum gerardii*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliği. Žeraryň jigergüli – saýawanlylar maşgalasynyň jigergüller urugynyň boýy 20–40 sm-e ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümliğin baldagy ýekeleşýän, esasyndan başlap çalymtyl reňkli ýa-da ortasyndan şahalanan, azda-kände gysarýan şahaly. Ýapragy çyzykly ýa-da çyzykly-ujy çowly. Aşaky ýapraklary örän gysga sapajykly, galanlary – sapaksyz, has irileri, esasyndan 5–7 damarlanan.

Saýawanlary 5–10 inçe uzyn sapaklyja, sähelçe egrelen şöhleli. Ýaprajyklarynyň gyny 2–5, biz kysmy, saýawanyň şöhlendinden birnäçe gezek gysga. Saýawanjyklary 4–8-güllüje, gynly, 5 çyzykly ýa-da tas biz görnüşli ýapraklyja, tas saýawana deň. Gül ýapraklary



ownuk, ýaşylymytyl-syýa ýa-da gyzlymytyl reňkli. Miweleri ýumurtga şekilli ýa-da elliptik, garamtyl reňkli, uzynlygy 2,0–2,5 mm, inçe gapyrgaly.

**Ýaşayşy aýratynlygy.** Žeraryň jigergüli ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol otlukly eňňitlerde, gyrymsy agaçlaryň arasynda, jülgelerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär, iýun–iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Jelilede; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda; Merkezi Köpetdagda: Gökderede; Gündogar Köpetdagda: Arçynýanda duşýar.

**Tebigy gory.** Žeraryň jigergüli ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetisdirmek maslahat berilýär. Ösümligi Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky ýerde saklamaly. Çig malyň saklanýş möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümligiň düzümine flavonoidler: kwersetin, izoramnetin, rutin, 3-rutinozid izoramnetin girýär. Onuň köki düzüminde poliasetilen birleşmesini: pentadekadein-2,9-diin-4,6-al-1, giptadekadien-8,10-diin-4,6-ol-1, geptadekatrien-2,8,10-diin-4,6-ol-1 saklaýar. Ýerüsti böleginde – saponinler; poliasetilen birleşmeler: pentadekatrien-2,8,10-diin-4,6-il-1-asetat, geptadekatrien-2,8,10-diin-4,6-il-1-asetat bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň peti we jöwheri bagyr we öt haltasynyň kesellerinde, ginekologiki we deri sökelliklerinde, iriňli çykywlarda, ýara bitiriji serişde hökmünde peýdalanylýar.

Türkmen milli tebigçiliginde hem halk lukmançylygynda (Bereket, Magtymguly we Gökdepe etraplarynda) ösümligiň oty öt we nerw kesellerinde ulanylýar.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnan suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–6 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Jigergüliň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 30 minut goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 ýola nahardan 20–30 minut öň 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

## KELLE KÖKLI AKARGÜL Девясил корнеглавый Inula rhizcephala



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Kelle kökli akargül – çylşyrymygüllülür maşgalasynyň akargüller urugynyň boýy 8–25 sm ýetýän köpýylyk otjmak wekili. Ösümlik köp baldakly, köp sanly kökýanly ýaprakly. Ýaprak ülüşleri süýrüntik ýa-da süýrüntik-ýumurtga şekilli, uzynlygy (1,5) 3,0–12,0 sm we ini 0,7–3,0 sm, küteträk, esasyna gysylan, ganatlyja sapakly, ýönekeý, beýleki ýerlerinde – has seýrek, tüýjagazlar we gysgajyk mäjagazlar ýerleşýär.

Sebetjiginde 8–20 gür baş gül toplumy ýerleşýär. Gynlarynyň gabarasy 0,5–1,5 sm. Onuň daşky ýaprajyklary uýy çowly-çyzykly, gaty tüýljuje; içkileri – çyzykly, inçe ýitileşen, içi ownuk, gaty tüýljuje, gyalary perdeli we ownuk kirpiklije, iň uýy syýa reňkli. Dillije gülleri pestikli. Çigitjagazlary inçe gapyrgaly, tüýljuje, uzynlygy 1,5–2,0 mm.

**Ýaşayşy aýratynlygy.** Kelle kökli akargül ölkämizde deňiz derejesinden 1600–2800 metr belentlikde bitýär. Ol dag eňňitlerinde we tekiz meýdanlyklarynda, çygly ýerlerde, subalpik çemenzarlyklarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–iýulda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy we porrugy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Çopandagyň depesindeki çeşmede duşýar. Bu ýer onuň Türkmenistandaky belli ýeke-täk mesgenidir.

**Tebigy gory.** Kelle kökli akargül yurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory çäkli. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ol Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri, ýapraklary we gül toplumlary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), ýapraklaryny we gül toplumlaryny – ösümlik gülleýän döwründe (iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerden we ýapraklaryndan taýýar bolan çig mallary mata haltalara, gül toplumlarynyňkyny – kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Kökleriň saklanyş möhleti – 2–3, ýaprakdyr gül toplumlarynyňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Akargülüň düzümine seskwiterpenoidler, 67% kumarinler girýär. Onuň kökleri düzüminde uglewodlary we olaryň ugurdaşlaryny: 52% inulin; 2,7% efir ýagyny, 0,05% alkaloidleri saklaýar. Ösümliğin ýapraklarynda fenolkarbon turşusy we onuň ugurdaşlary: hlorogen; flavonoidler: 3-β-D-glýukopiranozol-6`-L-raminopiranozid kwersetin bar.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyrlarda Gündogaryň beýik alymy hem tebigaty synag edijisi Abu Reyhan Biruny özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly meşhur ensiklopediýasynda akargülüň dermanlyk häsiýetleri barasynda maglumatlar berýär.

Öz wagtynda meşhur alym hem tebib Muhammet Huseýn «Melhemler hazynasy» atly nusgawy eserinde ösümliğin şypaly almatlaryny şeýle tekrarlaýar: «... akargül bagyrdaky, daladaky dykyn almalary açýar, gazlary dargydýar we bugardýar, jigerdäki agyryny köşeşdirýär, sowukdan dörän bogunlaryň, arkaň, gaýtalanyp durýan bogun agyryda, artritde, iňişde we beýleki kesellerde haýyrlý».

Halk lukmançylygynda ösümliğin mäjumlanany ary baly bilen garylyp, şypaly garyndyny dem alyş ýollarynyň kesellerinde, hususan-da üsgülewükde, kynlyk bilen dem alnanda, demgysmada peýdalanylýar. Ol kükregi limfaldan we cyglylykdan arassalaýar. Akargülüň ýapraklarynyň we kökleriniň peti muskullaryň jaýrylmasynda ýapgy görnüşinde ulanylýar, şeýle-de çişleri sorýar. Ösümliğin şerbeti atero we garrylyk sklerozynda haýyrlanylýar.

Akargülü Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda halk lukmançylygynda bagryň, peşew haltasynyň we peşew çykaryjy ýollarynyň kesellerinde peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümliğin öt çykaryjy häsiýetleri ýüze çykaryldy. Akargülüň dermanlyk şerişdelerini dem alyş ýollarynyň kesellerinde, hususan-da, bronhitde, traheitde, grippde gakylyk goparyjy serişde hökmünde, şeýle-de aşgazan-ichege sökelliklerinde, sowuklama bilen baglanyşykly ahwallarda ulanylýar.

Özüniň hoşboý tagamynyň bolanlygy sebäpli, ösümliği jaz görnüşinde kulinariýada haýyrlanylýar. Taze görnüşinde aşlara jaz hökmünde goşulýar.

Bezeg, bal beriji, ot-iýmlik we boýag ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti günüň dowamynda her 3 sagatdan 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Akargülüň 2 çay çemçe (10 g) owradylan köklerini 3 bulgur (600 ml) sowuk gaýnag suwa atyp, 8 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan jowheri gün içinde 4 gezek nahardan 15 minut ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) owradylan porrugyny 1 bulgur (200 ml) sowuk suwa atyp, sowadyjyda aqşamsy bilen goýmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jowheri irden içmeli. Galan porrugy 1 bulgur (200 ml) sowuk suw, 2 çay çemçe (10 ml) arak ýa-da konjak guýmaly, sowadyjyda 8 sagat goýmaly. Ikenleni jowheri indiki gün içmeli. Işdäni peseltmek üçin haýyrlanmaly.

Akargülüň şiresini we ary balyny 1:1 gatnaşykda garmaly. Häzir bolan garyndyny has güýçli üsgülewükde kabul etmeli.

Ösümliğin 4 çay çemçe (20 g) guradylýp owradylan köklerini 1/2 bulgur (100 ml) medisina spirtiniň içine atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 20 gün goýmaly. Yzygiderli çaykamaly. Süzmeli, propolisiň 20%-li şerbetiniň deň ýarysyny guýmaly. Taýýar bolan şerbeti her gün 2–3 ýola 25–30 damjadan içmeli.

Akargülüň 2 nahar çemçe (30 g) owradylan köklerini 0,5 litr araga atyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 40 gün goýmaly. Birsyhyly çaykap durmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan şerbeti gün içinde 3 sapar nahardan ön 20–25 damjadan kabul etmeli.

Her günde akargülü 6,5 grama çenli peýdalanmaly.



# KENAROT

Жеруха лекарственная  
*Nasturtium officinale*



**Häsiyeti.** Dag derman ösümligi. Otjumagyň dünýäde 6, Türkmenistanda 1 görnüşü duş gelyär.

Kenarot – atanagüllülere maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 15–50 sm ýetýän köpýylyk otjumak wekili. Baldagy ýalaňaç, küti, içi boş, ýokarlygyna galýan we bogunlaryndan kökleýär. Ýapraklary per şekilli dilinen-çylşyrymly, gapdal ýaprajyklary 2–7 jübüt süýrümlik ýa-da süýnen-ýumurtga şekilli, gýralary azda-kände dişlije, esasy asimmetrik (gapdaly deň bolmadyk) we has iri togalak ýa-da ýokarky ýumurtga şekilli ýaprajykly. Okara ýaprajyklarynyň uzynlygy 2–3 mm.

Gül ýapragynyň uzynlygy 4–6 mm, ak reňkli. Küregi çyzykly-silindrik, sähelçe dügürlü we süýnen, uzynlygy 10–25 mm we ini 1,5–2,5 mm, ýokarsynda gysga etleşen sütünjikli, sapagynyň uzynlygy 10–20 mm. Tohumy ownuk öýjükli, ýasy, maýda.

**Ýaşaýyş aýratynlygy.** Kenarot ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol suwda, dag derýajyklaryň kenarynda ösüp boý almany halaýar. Ösümlük aprel–iýunda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Germapda, Sekizýapda, Arçabilde, Gökderede, Wanowskide; Köýtendagda; Köpetdagetok medeni oturymynda: Aşgabatda, Bagyrda duşýar.

**Tebigy gory.** Kenarot ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek üçin maslahat berilýär. Her ýylda takmynan, 5 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlük gülleýän döwründe (aprel–maý) ýygnamaly, teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1 ýyl.

**Himiki düzümi.** Kenarotuň düzümine efir ýagy, allilgyzzyrgyç maddalar: feniletilizosianat we onuň glýukonastursin glikozid; glýukonasrur turşusynyň kaliý duzy (115H2009K2); karotin, C witamin, D prowitamin, B1, B2, E we K witaminler, kaliniň, demriň, fasforyň, myşýagyň we ýoduň mineral duzlary, taninler, şeker, kaliniň nitraty, sulfoazotly ýag, sulfosianly alil girýär. Onuň ýerüsti böleginde saponinler, alkaloidler, 0,06% gyzyrgyç ýagy, tioglikozidler: glýukonastursin, glýukobrassisin saklanýar. Ösümligiň ýapraklarynda C, E witaminler, takmynan 10% bar. Tohumynda 22–24% ýag (onuň düzüminde turşular: 34% olein, 23% linol, 18% erukow, 11% eýkozen, 9% palmitin, 2% stearin, 0,5% linolen), fermentatiw gidrolizde alynýan gyzyrgyç ýagy bolan sinigrin glikozidi saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň otuny ýokary dem alyş ýollarynyň dowamly katarynda, süýjükeselde, öt we böwrek-daş sökelliklerinde, gastritde, gaýtalanyp durýan bogun agyryda, galkan şekilli mälzeriň, peşew we öt haltasynyň kesellerinde, nefritlerde, ýatgydan gan gitmede, gan gusmada, tutgaýly özüňden gitmede, ganazlykda, awitaminozda, gingiwitde, rewmatizmde, asitde, dispepsiýada, garamükrüniň garşysyna, diuretik, sowuklamanyň garşysyna, soguljany çykaryjy, gowşak iç süriji, işdäni açýan serişde hökmünde peýdalanylýar.

Kenaroty mundan başga-da, gijeläp agyryan ekzemada we dermatozlarda, örgünlerde, lipomalarda, siňnillerde, ýanyklarda, agyz boşlugynyň nemli bardasynyň sowuklamasynda ulanylýar. Ösümligiň ýapraklarynyň jöwheri we şiresi howply täze döremelerde, ganazlykda, pielonefritlerde, böwrekde we peşew haltasynda daş emele gelende, bagyr hem deri kesellerinde, ýanyklarda haýyrlanylýar. Olar abortiw we gowşak iç süriji häsiýete eýedir.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly, Gökdepe we Köýtendag etraplary) ösümligiň otunyň jöwheri

ýüregiň işjeňliginiň gowşamagy bilen baglanyşykly arterial gan basyşyny peseltmekde, onkologik kesellerde, çişlerde, poliplerde, gany togtadyjy, ýarany bitiriji, soguljanlary çykaryjy, gyzgyny peseldiji serişde hökmünde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň düzüminden çykarylan ýoduň duzlaryny, galkan şekilli mázleriň hyzmatlarynyň bozulmalarynda peýdalanylýar. Onuň otunyň madda alyş-çalşygyny gowulandyryandygy, garamükrüniň garşysyna, witamin saklaýjy, tonizirleýji, ysytmanyň garşysyna, gany arassalaýjy, gakylyk goparyjy, peşew çykaryjy serişdedigi ýüze çykarylady. Şonuň üçin bu ösümligi göwreli aýallara ulanmak maslahat berilmeyär.

Gomeopatiýada kenarotuň ýerüsti bölegi peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda Wenesuelada kenarotuň kökleri derman ösümlikleriň sanawyna girizildi, onuň çig mallary: ýerüsti bölegini Fransiýada, Italiýada, Paragwaýda, Wenesuelada, Braziliýada we Şweýsariýada resmi taýdan ykrar edildi.

Özüniň hoşboý ysy we aýymtyk tagamynyň bolanlygy sebäpli, otuny aşlara, işdäaçarlara, ysmanaga we gök önümlere jaz görnüşinde peýdalanylýar. Tohumy gyzyrgyýň surrogaty hasaplanýar, ýag almak üçin ýaramly, gyzyrgyý çalşyjy.

Bezeg, azyklyk, bal we pergana beriji we ot-iymlik ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümligiň 1–2 nahar çemçe (15–30 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessay otda 30 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Kenarotunyň 1 çay çemçe (5 g) guradylyp owradylan otuny 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwa atyp, otag temperaturasyna çenli sowaýança goýmaly. Hasadan geçirmeli. Häzir bolan jowheri gün içinde 3 gezek nahardan öň 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 2 nahar çemçe (30 g) gury otuny bir litrlik termosda demlemeli, 30 minut goýmaly. Taýýar bolan jowheri günde 3 ýola 1 bulgurdan (200 ml) içmeli. Deri kesellerinde netijeli serişde.

Kenarotunyň 1–2 nahar çemçe (15–30 ml) mäjumlanan otuny 50 gram mesge bilen garmaly, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde bir hepde goýmaly. Birsyhly bulap durmaly. Häzir bolan merhemi günün dowamynda 2 gezek (irden hem aşşam) deriniň zeperlenen ýerlerine çalmaly. Ýanyklary bejermek üçin haýyryly serişde.

Ösümligiň şiresini her gün 3 sapar 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli. Öt-daş kesellerinde we gastritde kabul edilýär.

## **KENEPLI ÇERBIÝE**

**Алтей коноплевидный**

**Althaea cannabina**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Kenepli çerbiýe – mamamçörekler maşgalasynyň çerbiýeler urugynyň boýy 0,5–2,0 metre ýetýän köpýylyk otjumak wekili. Baldagy göni, cybyk şekilli güýçli şahalanan, gysylan, gysga şöhlelei, ýyldyzlyja tüýjagazlar bilen örtülen. Ýapraklary sapakly, barmak şekilli üç-baş bölünen, uly bölegi esasyna çenli uly barmak şekilli ülüşli, kenep görnüşli.

Ösümligiň gülleri ýapraklaryň goltugynda ýekeleşin ýa-da köp bolmadyk ýagdaýda ýerleşýär, örän uzyn gül sapaklyja, 10 sm çenli, adatça, ýapragyna laýyklykda uly. Okarasynyň uzynlygy 5–10 mm çenli, 7–9 çyzykly-ujy çowly, ýitileşen ýaprajykly. Okara ýaprajyklary süýrümlik uzynlygy 8–12 mm, 2/3 çenli bölünen, ýokarsy ýiti uçly-süýndürilen ülüşli. Gültäji gyzylymytl-sowsana reňkli. Gül ýaprajyklary okarajyklardan 2–3 esse uzyn, onuň uzynlygy 10–20 mm, ini 10–15 mm, ýokarsy çuň bolmadyk бүкүлөн. Miwesiniň gabarasy 7–9 mm, miwejikleriniň sany – 12–15, uzaboýuna ýalaňaç, kese kesimi gasynly, uzynlygy 3,0–3,5 mm we ini 2,5–3,0 mm, arkasynyň ini 1–2 mm. Tohumy böwrek şekilli, uzynlygy 2,5–3,0 mm we ini 2,0–2,5 mm, ýalaňaç, ownuk açyk reňkli siňňilikler bilen örtülen.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Kenepli çerbiýe ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol çygly ýerlerde, derýajyklaryň we ýaplaryň kenarynda, derelerdir jülgelerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlük



iýun—awgustda gülleýär, iýul—oktyabrda miweleýär. Ol tohumy, seýrek vegetatiw we şitileri arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Tämilde, Garagaçderede; Merkezi Köpetdagda: Mergenölende, Gylgylawda, Germapda, Arçabilde, Gökderede, Wanowskide duşýar.

**Tebigy gory.** Kenepli çerbiýe ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeliýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ony ekip ýetişdirmek maslahat berilýär.

**Dermanlyk çig maly.** Çerbiýäniň köki we porrugy dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr) ýerüsti bölegi guranda ýygnamaly, olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly we taýýarlamaly. Onuň agaçaşan bölegini aýyrmaly, kökleriň gumdur tozanlaryny arassalamaly, howada ýelejiretmeli, pyçak bilen gabygyny sypymaly we saralmaz ýaly 40°C-den ýokary bolmadyk temperaturada haýal guratmaly. Taýýar bolan çig mal silindrik görnüşli bölejikli ýa-da ortasyndan ikä bölünen ýaýbaň 2–4 bölekli, uýy ýeňil gysylan. Kökden we porrukdan taýýarlanan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara gaplamaly. Olary gury, oňat ýel çekerli jaýlarda saklamaly. Kökler gigroskopik we ýeňil nemlenýär. Çig mallaryň saklanş möhleti — 3 ýyla çenli.

**Himiki düzümi.** Ösümliğin düzümine nem girýär. Onuň kökleri boýag maddalaryny saklaýar; 35%-e çenli nem, esasan polisaharidlerden ybarat — pentozanlar we geksozanlar, gidrolizde dargaýan galaktoza, dekstroza we pentoz; 37%-e çenli krahmal; 2% asparagin, takmynan, 10% şeker; 4% betainler; 16%-e çenli pektin maddalar; 1,7% ýag; fitosterin; eý maddalar; eýr ýagy saklanýar. Çerbiýäniň ýapraklarynda we güllerinde — takmynan 0,02% gaty eýr ýagy; nem; askorbin turşusy; karotin bar.

**Peýdalanylyşy.** Çerbiýäniň dermanlyk häsiýetleri irki wagtlardan belli bolupdyr. Ilkinji maglumatlar Pliniý uly ady bilen belli bolan Gaýa Pliniýa Sekundanyň (b.e. 23–79-njy ýyllary), Wergiliýanyň (b.e. öň 70–b.e.19-njy ýyllary), Korneliýa Selsanyň (b.e.I asyry) ylmy işlerinde berilýär. Gadymy grek almy Feofrast (b.e. öň 370–285-nji ýyllar) özüniň «Ösümlikler hakyndaky barlaglar» atly meşhur işinde, ýagny «...köki döwürde we üsgülewükde süýji çakyr bilen berilýär we zeytun ýagy bilen çykuwlara ýapgy edilýär» diýip ýazýar.

Çerbiýe otunyň melhemlik güýjüni gadymy wagtdaky tebipler oňat bilipdirler, ruguň ady «althos» diýen grek sözünden gelip çykan, ol derman diýmekligi aňladýar. Onuň güli özüniň süýji ysy bilen ilkinji bal arylaryny bendi

edýär. Gülleriň dilinde ösümlik ynamlylygy, ynandyryjylygy aňladýar.

Gündogarda meşhur beýik lukman we ensiklopedist Abu Aly ibn Sina özüniň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly düýpleýin işinde ösümliğin howply çişleriň garşysyna täsirini, onuň öňüni almakdaky tärleriň beýan edýär. Alymyň sözlerine görä, çerbiýe çykuwlaryň çalt bişmekligine ukyply, bogunlardaky agyrlary we ujaklardaky sandyramany aýyryar; gulak mälzeriniň sowuklamasynda ulanylýar, ýüzdäki çişleri we gözün aşagynda emele gelýän haltajyklary dep edýär (ýapgy ýa-da çalgý). Ösümliğin ýapraklaryny göwüs çişmesinde (mastopatiýada) we öýken sowuklamasynda peýdalanmaklygy maslahat berýär; tohumy — üsgülewükde, gakylyk goparyjy serişde hökmünde, şepbigi — suwsuzlygyny gandyryjy.

Öz wagtynda belli ensiklopedist Abu Reýhan Biruny hem bu ösümlige üns beripdir. Ol özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly belli işinde çerbiýäniň birnäçe kesellere täsirli dermanlyk häsiýetlerini beýan edipdir.

Muhammet Gaymaz Türkmeniň «Pygamber tebiçiligi» kitabynda, lukman çerbiýe kökünüň petini içgeçmede, hususan-da ganly içgeçmede (dizenteriyada), gamaşdyryjy serişde hökmünde ulanmaklygy maslahat berýär.

Halk lukmançylygynda çerbiýäni ýokarky dem alyş ýollarynyň sowuklama kesellerini (bronhitde, traheitde) bejermekde, şeýle-de gökbogmada, bronh demgysmasynda, pnemoniýada, aşgazan-ägege ulgamynyň kesellerinde — gastritde, enterokolitde we beýlekilerde, peşew haltasynda, psoriazda, şeýle hem gakylyk goparyjy we sowuklamanyň garşysyna serişde hökmünde peýdalanylýar. Ösümliğin kökünden taýýarlanýan peti aşgazan bozulmalarynda, içegelerdäki yzalarda, aşgazanyň we on iki barmak içegäniň başly kesellerinde, esasan aşgazan şiresiniň ýokary turşulygynda, sarygetirmede, sözenekde; bokurdagyňy çäykamakda, gözünü ýuwmakda, ginekologik amalyýetinde, deri kesellerini buga tutmakda we ýuwmakda, diş etiniň sowuklamasynda ulanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplarynda) ösümliğin kökünden we porrugyndan taýýarlanýan peti we jöwheri gakylyk goparyjy serişde hökmünde, aşgazan-ägege kesellerinde, olardan häzirlenen merhemleri (mazlary) dermatologiki sökelliklerde ulanylýar. Şeýle-de çerbiýe dürli melhemlik ýygyndylaryň, esasan dürotunyň ýapraklary, ýakymlyjanyň oty we deregiň pyntyklary bilen kükrek çäýynyň düzümine girýär.

Ylmy lukmançylykda çerbiýäniň dermanlyk serişdeleri (tozlary, jöwherleri, ekstraktlary, toşaplary) goraýjy, ýumşadyjy, sowuklamanyň garşysyna, gakylyk goparyjy we agyryny köşeşdiriji häsiýetleri bilen bellidir. Şeýle hem olary dowamly bronhitde, traheitde, laringitde, bronhopnewmoniyada we bronh demgysmasynda bejermek üçin bellenilýär. Mundan başga-da, çerbiýe kökünüň jöwherleri (çaýkamak, buga tutmak we klizm görnüşinde), çerbiýe kökünüň suwuk ekstraktlary we çerbiýäniň toşaby, ekstraktyň düzümi çerbiýäniň gury kökünden (2 bölegi) we şeker toşabyndan (98 bölegi) durýar. Soňky derman serişde miksturalarda tagam alyjylygyň gowulanmagynda we ýylmaýjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Çerbiýe köki kürek çäýynyň (ýygynyndysynyň) düzümine girýär.

Çerbiýäniň tohumyndan ýag, baldagyndan – süýüm alynýar.

Bezeg, iýmitlik, bal beriji we tehniki ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Çerbiýäniň 2 çäý çemçe (10 g) guradylyp maýdalanan kökünü 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine guýmaly, ony içi syrçaly gaba salyp, gapagyňy ýapmaly we gaýnag suwy suw hammamynda gyzdymaly. Otag temperaturasynda 10 minut sowatmaly, hasa bilen süzmeli. Galan çig maly sykmaly. Taýýar bolan pete başlangyç göwrümdäki ýaly (200 ml) gaýnag suw garmaly. Melhemi her gün 3–4 gezek nahardan soň gyzgyn görnüşinde bulguryň 1/2–1/3 (100–75 ml) içmeli. Islegiňe görä şeker goşsa bolýar.

Deň gatnaşykdaaky kenepli çerbiýäniň, akargülün we buýanyň maýdalanan köklerinden taýýarlanylýan 2 çäý çemçe (10 g) garyndyny 0,5 litr sowuk suwuň içine atyp, 8 sagadyň dowamynda saklamaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jöwheri gün içinde 3 sapa bulguryň 1/2 (100 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň owradylan kökünüň üstüne 1:20 gatnaşykda sowuk suw guýmaly, 8 sagadyň dowamynda saklamaly. Soňra hasadan süzmeli. Emele gelen jöwheri her gün 4–5 ýola 2 nahar çemçeden (30 ml) içmeli.

Çerbiýe kökünüň tozunyň 100 gramny 100 g guýruk ýagyna ýa-da düýäniň örküç ýagyna garyp, agzy ykjam ýapylyan aýna gaba ýerleşdirip, 10 günün dowamynda garaňky ýerde goýmaly. Aram-aram bulap durmaly. Taýýar bolan merhemi günde 2 gezek (irden we aňşam) zeperlenen yerleriňe çalmaly.

## **KIÇI MAŇYRSAK**

**Белена маленькая**

**Hyoscyamus pusillus**



**Häsiýeti.** Çöl derman ösümligi. Kiçi maňyrsak – itüzümler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 10–45 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik ýönekeý ýa-da aşaky bölegi şahalanan baldakly, ýokarky bölegi gür bolmadyk bulam-bujar ýa-da kerep kysmy tüýjagazlar bilen örtülen. Ýapragy süýrümlik-elliptik ýa-da tas uý çowly, ýiti, gyralary abat ýa-da egrelen diş-dişi, örän seýrek ýagdaýlarda perjimek-kepjeli, baldakdakylary we gülýanyndakylary, hemmesi sapakly, ýagny 1,5 esse üşünden gysga, ýöne aşaklary kä ýagdaýlarda ondan uzynrak, ýokarkylary has gysgarak. Sapaklary bulam-bujar ýelimli tüylüje.

Gülleri tas sapaksyz, çogdamly, gülländen soňra uzalýar. Okarasy konik, ýumşak, uzynlygy 9–10 mm, miwesinde uzynlygy 20 sm çenli, gataýan, trubkaly-jaňlyja, ýitileşen üçburçly dişlije, trubkadan 4–5 esse gysga. Gültäji agymtyl, agzy kähalatlarda melewşe, sähelçe baş kepjeli gysyk бүкүлен, kepjeleri tas birmeňzeş, tegelenen, uzynlygy takmynan 2 mm. Gozajygy silindrik-süýrümlik, okarajykdan 1,5–2 esse gysga. Tohumy tegelek-böwrek şekilli, ownuk dügürlü.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Kiçi maňyrsak ölkämizde çägeli çöllerde, dageteklerinde, sazak tokaýlygynda, gury ownuk topurly, çägeli we ownuk topurly-çağyly eňňitlerde, käte düme ekinlerinde haşal ösüp boý almany halaýar. Ösümlik aprel–maýda gülläýär, maý–iýunda miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda: Garaburunda, Sekidagda, Gurbanepesde, Daşlyderede, Garajaçeşme jülgesinde, Oglanlyda, Ümbülmezde; Kiçi



Balkanda; Kürendagda: Temenderede, Sekizhanda, Margyza, Ýaşyl jülgesinde; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda; Merkezi Köpetdagda: Mergenölende, Gylgylawda, Sekizýapda, Arçabilde, Gökderede, Duşakerekdagda, Wanowskide; Kyötendagda; Hazarýaka çölünde: Daşrabatgalada, Türkmenbaşyda; Üstýurtda; Demirgazyk-Günbatar, Üňüzaňyrsy, Merkezi; Gündogar: Repetekde, Garawulguýuda, Işanrabatda; Günorta-Gündogar Garagumda; Etrek medeni oturymynda: Jebelde, Mollagarada; Köpetdagetäk medeni oturymynda: Baharlyda, Gökdepede, Aşgabatda, Kakada, Tejen-Murgap medeni oturymynda: Tejende, Maryda, Wekilbazarda; Amyderýa medeni oturymynda duşýar.

**Tebigy gory.** Kiçi maňyrsak ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Käte haşal ösümligi hökmünde duşýar.

**Dermanlyk çig maly.** Maňyrsagyň dermanlyk maksatlary üçin ýapragy we gülleri çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary ösümlük gülleýän döwründe (aprel) gury howada ýygnamaly, olary ýörite guradyjy enjamlarda 40°C temperaturada ýa-da oňat ýel çekerli üçeklerde, ýuka gatlaklarda ýerleşdirip guratmaly hem taýýarlamaly. Zeperlenen, şeýle-de ýagyşdan ýa-da nemden çyglan ýapraklary ýygnamaly däl, çünki olar guradylanda çüýreyär. Taýýar bolan çig malyň özboluşly narkotik, gowşak ysly bolup, çyglananda ýokarlanýar. Ýapraklardan taýýarlanan çig mallar mata ýa-da kagyz halta, gülleriniňki – kagyz gutujyklara gaplanýar. Olary gury, oňat ýel çekýän jaýlarda saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümligiň düzüminde tropan hataryna degişli alkaloidler (olara giossiamin, tropin, 1-skopolamin (giossin), apoatropin, apogiossin,  $\alpha$  we  $\beta$ -belladonin degişli) 0,1%-e çenli; giossopikrin glikozidler, giosserin, giossirezin, metileksulin saklanýar. Ýerüsti böleginde 0,09% alkaloidler: giossin, giossiamin, apoatropin, tropin, apogiossin, skopolamin bar. Ýapragynda – fenolkarbon turşusy we onuň ugurdaşlary: hlorogen turşusy; flavonoidler, esasan, rutin saklanýar. Tohumynda – 34%-e çenli ýag (onuň düzüminde olein, linolen we beýleki turşular) bar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümligiň dermanlyk häsiýetleri gadymy döwürlerden bäri belli bolupdyr. Maňyrsak barasynda ilkinji maglumatlar Korneliýa Selsiň (b. e. I a.), Pliniý ulunyň (b.e. 23–79-njy ýyllary), Apuleýanyň (b. e. II a.), Awreliamyň (b. e. ön V asyry) nusgawy işlerinde mälim edilýär.

Gülleriň dilinde maňyrsak kämilleşmedik diýen manyny aňladýar. Baryp gadymy ot hakyndaky kitaplarda, ýagny adam maňyrsagyň tohumynyň tüssesinden dem alanda, güýçli başaýlanma bolup geçýär we ol tutgaýyny ýitirýär diýlip ýazylypdyr.

Orta asyrlarda Gündogaryň alym-ensiklopedistleri Abu Aly ibn Sina we Abu Reýhan Biruny özläriniň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» we «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly işlerinde maňyrsagyň birnäçe kesellere em bolýandygy barasynda melhemlik häsiýetlerini ýazypdyrlar.

Halk lukmançylygynda ösümlük agyryny aýryjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Çykuwlarda onuň buglanan ýapragyny agyryly ýerlere ýapylýar, ýöne zäherli ösümlük bolanlygy sebäpli, ony içmek üçin ulanlymýar.

Ylmy lukmançylykda lukmanyň gözegçiligi astynda gaýtalanyp durýan bogun agyryda, bagyr we diş kesellerinde, gysylmanyň garşysyna, agyryny dep ediji serişde hökmünde aşgazanyň we içegeleriň gysylma bilen baglanyşykly kesellerinde peýdalanylýar.

Bronh demgysmasynda, düzümine maňyrsagyň ýapragy girýän «astmatin» we «astmatol» derman serişdeleri ulanylýar. Atropini agyryny dep ediji serişde hökmünde aşgazanyň we on iki barmak içegäniň başly kesellerinde, ot ýollarynyň sökelliklerinde, bronh demgysmasynda ulanylýar. Maňyrsagyň ýagy – ýapragyndan taýýarlanylan merhemi – mioztlerde, newralgiýalarda sürtmek arkaly, sedatiw serişde hökmünde reumatik we newralgik yzalarda peýdalanylýar.

Ösümligiň ähli bölekleri, şeýle-de onuň derman serişdeleri zäherlidir, şonuň üçin ony peýdalanmaklygyň ön ýanynda hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Bezeg ösümligi.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan ýapragyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pes ýanýan otda 5–10 minut gaýnatmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 ýola 1 çay çemçeden kabul etmeli.

Maňyrsagyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) medisina spirtiniň içine atyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün saklamaly. Yzygiderli-de çaykapy durmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan şerbeti agyryly ýerleriňe çalmaly.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) gury ýapraklaryny we güllerini 1 bulgur (200 ml) ösümlük ýagynyň içine atyp, agzy mäkäm ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün goýmaly. Yzygiderli bulamaly. Taýýar bolan merhemi (mazy) süzüp, gün içinde 2 gezek (irden hem agşam) yzaly ýerleriňi suwamaly.

# KIÇIJIK ZIBERA

Зибера карликовая

Siebera nana

**Häsiýeti.** Dagetek derman ösümligi. Nepisje ösümligiň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelyär.

Kiçijik zibera – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň ziberalar urugynyň boýy 3–10 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Baldagy gysylan ak tüýjagazlar bilen örtülen, ýönekeý ýa-da köplenç esasyndan şahalanan. Ýapraklary sapaksyz, elliptik ýa-da çyzykly, gýralary aşaklygyna gönügen.

Sebetjigi pudagynyň ýokarsynda, sapaksyz, ýekeleşýän ýa-da ýapraýyklaryň gynynyň iň ýokarsynda 12–20-güljagazlardan ýerleşýär. Gynynyň ýapraýyklary gysga tüýlçe, gysylan, esasy giň ujy çowly, ýokarsy ýitileşen, içkileri – gülgün reňkli, has uzyn, ujy iňňe şekilli.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Kiçijik zibera ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol gury ownuk topurly çagylyly we çagylyly eňňitlerde, dürli reňkli toýunlaryň ýüz açylmalarynda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik aprel–maýda gülleýär hem miweleşýär. Gurak ýyllarynda gögermeýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Torgaýda, Jelilede; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Şyhymerede; Gündogar Köpetdagda: Şamlyda; Bathyzda: Pulhatynda duşýar. Türkmenistanyň endemigi.

**Tebigy gory.** Kiçijik zibera ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ol Aşgabadyň botanika bagynda ekip ýetişdirilýär, her ýylda öz-özünden köpeliýär. Ösümlik Sünt-Hasardag, Köpetdag we Bathyz döwlet goraghanalarynda goralýar. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (aprel) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ziberanyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümligiň düzümine alkaloidler we saponinler girýär.

**Peýdalanylyşy.** Türkmen milli tebigçiliginde hem halk lukmançylygynda (Bereket, Magtymguly, Ak bugdaý,

Sarahs etraplarynyň daglyk obalarynda) ösümligiň otundan taýýarlanylýan petidir jöwherini reumatizmde, bogun agyryda, deri kesellerinde ulanylýar.

Bezeg ösümlik.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owardylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli. Melhemi günün dowamynda 2 ýola (irden hem agşam) calgy we ýapgy etseň hem bolýar.

Ziberanyň 2 nahar çemçe (30 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 30–40 minut goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri agyryly ýerleriňe çalmaly.

## KOMAROWYŇ

### AKTIKENI

Селитрянга Комарова

Nitraria komarovii



**Häsiýeti.** Çöl derman ösümligi. Komarowyň aktikeni – aktikenekler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 1–2 metre ýetýän gyrymsy agaç wekili. Adatça, daragt ýalaňaç pudakly we ýaprakly. Diňe ýaşajyk şahajyklary we ýokarky ýapraklary görnetin çykyşyp duran gysga tüýlçe. Ýapraklary inçe ters ujy çowly, tas çyzykly, yzygiderli esasyna gysylýar.

Gülleri 3–4-den pudagyň ujunda ýerleşýär, köp güllüje burumy emele getirýär. Okarajygy gür tüýlçe. Miwesi – süýnmek-ýumurtga şekilli şänijek, ol konik şekilli, ýokarsy



ýitileşen we esasy tegelenen, çuň çukurjykly. Tutuş ösümlük gerdemli we gelşikli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Komarowyň aktikeni ölkämizde şorlaşan çägesow we toýunly topraklarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlük aprel–iýunda gülleýär, maý–awgustda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Hazaryaka çölünde: Garabogazköl aýlagynyň günortasynda, Aýdyňda, Türkmenbaşyda, Tarta, Ufra burnunda, Uzynadada, Hazarda, Çekişlerde; Etrek medeni oturymynda: Mollagarada duşýar.

**Tebigy gory.** Komarowyň aktikeni ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeliýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümlügiň oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlük gülleýän döwründe (aprel–iýun) ýygnamaly. Çig maly teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Aktikeniň köklerinde 0,036% alkaloidler saklanýar. Ösümlügiň ýerüsti böleginde 0,25% alkaloidler: komaroin, komarowidin, nitramarin, nitrarain, tetragidronitramarin, tetragidrokomarowinin, digidroizokomarowin, tetragidroizokowarowin, izokomarowin, komarowoidinin, komarowinin saklanýar. Baldagyn-da 0,2% alkaloidler bar. Ýapraklarynda 0,5% alkaloidler: nitrarin, izonitrarin, nitramidin, şoberidin, tetrametilen-tetragidro-β-karbolin saklanýar. Gunçalarynda 0,57% alkaloidler bar. Miwelerinde nitrarin, izonitrarin, şoberidin alkaloidler saklanýar. Tohumynda 0,11% alkaloidler bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda ösümlügiň otunyň petini we jöwherini gaýtalanyp durýan bogun agyryda we deri keselerinde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümlükdäki nitrarin alkaloidiniň antiaritmiki we koronar giňeldiji täsirleri ýüze çykaryldy.

Bal beriji we ot-ijmlik ösümlük.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümlügiň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gyzgyn suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan jöwheri bedeniň zeperlenen ýerlerine çalmaly.

Aktikeniň 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp owradylan otuny 0,5-litrlik termos demlemeli, 30 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan jöwheri ýapgy etmeli.

## KOMAROWYŇ MELEGI

### Красавка Комарова

### Atropa komarovii



**Häsiýeti.** Dagetek derman ösümlügi. Täsin owadan ösümlügiň dünýäde 5, Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Komarowyň melegi – itüzümler maşgalasynyň melekler urugynyň boýy 1,0–1,5 metre ýetýän köpýylyk otjumak wekili. Ösümiň toprakda gysga agaçlaşan porrugy ýerleşýär. Baldagy göni, togalak, ýokarsy çarşak şekilli şahalanar. Ýapraklary iri, gyalary abat, ýalaňaç, has açyk näzik, uzynlygy 20 sm çenli, süýrümlik-ýumurtga şekilli ýa-da süýrümlik-elliptik, ýokarsy yzygiderli ýitelýär, esasy pahna kysmy, sapaga birigýär, ülsünden 5–7 esse gysga. Adatça, ýapraklary jübüt, olar biri-birinden 2,5–3 esse kiçi.

Gül sapajyklary goltukly, ýekeleşýän, 1-güllüje, uzynlygy 2,0–2,5 sm, ýalaňaç. Okarajygy seýrek gaty tüýlçüje, onuň kepjeleri ýumurtga şekilli-üçburçly, ýitileşen. Gültäji sary reňkli, trubkaly-jaňjagaz kysmy, uzynlygy 2,5 sm çenli, 5 togalak kepjeli. Tyçinkalarynyň sapagy tüýsüz, esasyndan giňeýär. Iýmişi ýylmanak, gara reňkli, ýalpyldawuk, gögümtil öwüşginli, şar şekilli we sähelçe ýepbeşik köp sanly ownuk gara-goňur böwrek şekilli, ýasy tohumlyja.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Komarowyň melegi ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol derelerdäki dag derýajyklarynyň kenarynda, agaçlaryň aşagynda, agaçlaryňdyr gyrymsy agaçlaryň kölegesinde, oňat cygyl meýdançalarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlük maý–iýulda gülleýär, awgustda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär, onuň hasyllylygy ýokary.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Hozly jülgesinde, Garaňkyda, Tazetaplada, Sünt-Hasardag ulgamynda duşýar. Endemik.

**Tebigygory.** Komarowyň melegi ýurdumyzydaký seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ösümlik Magtymgulyňnyň ylmy-önümçilik synag merkezinde ekip ýetişdirilýär. Aşgabadyň botanika bagynda introduksiya edildi. Ösümlik Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri we ýapraklary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Kökleri ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentyabr), ýapraklaryny – ösümlik gülläýän döwründe (may–ijul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Çig mallary gury, salkyn ýerde saklamaly. Kökleriň saklanyş möhleti – 2–3, ýapraklaryňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Melegiň düzümine tropan hatarynyň alkaloidleri: atropin, giosiamin, belladonnin, skopolamin, apotropin we başgalar, kumarinler: eskuletin, skopoletin, umbeliferon girýär. Ösümliğin organlarynda alkaloidleriň saklanyşy (%) üýtgap durýar: köklerinde 0,21-den 1,10-a çenli; baldagynda 0,11-den 1,15-e çenli; ýapraklarynda 0,31-den 1,10-a çenli; güllerinde 0,28-den 0,53-e çenli; miwelerinde 0,16-dan 0,35-e çenli.

**Peýdalanylyşy.** Melek gülleriň dilinde dymmaklygy aňladýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly etra-byňnyň daglyk obalarynda) ösümliğin ýapraklarynyň petini awuly kömeleklerden zäherlenilende zäheriň garşysyna serişde hökmünde peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda parasimpatik nerwlere blokirleýji netijeliligi ýüze çykaryldy. Şeýle-de aşgazanýň we on iki barmak içegäniň başly kesellerinde spazmolitik we agyryny dep ediji häsiýetleri mälüm edildi. Ösümlik tükülik, aşgazan we der çykaryjy mázleriň (esasan, inçekeselli näsaglarda gijesine derlemekde) sekresiýasyny peseldýär, ýüregiň işjeňligini ýokarlandyrýar, gözüň görejini giňeldýär.

Melekden taýýarlanylýan «atropin» derman serişdesi, aşgazan-ichege, ýürek-damar kesellerinde, aşgazanýň we on iki barmak içegäniň başly sökelliklerinde, gastritde, bronh demgysmasynda, öt we peşew-daş kesellerinde, böwrek, bagyr sanjysynda, stenokardiýada, öýkenden gan gitmede, tutgaýly üsgülewükde, şeýle-de içki organlaryň ýylmanak muskullarynyň gysylmasynda agyryny aýryjy serişde hökmünde ulanylýar. Göz amalyýetinde göreji giňeltmekde haýyrlanylýar.

Ýapraklarynyň dermanlyk serişdeleri birnäçe gymmat bahaly kombinirlenen derman serişdeleriniň düzümine girýär: şerbeti – Zeleniniň damjasynyň düzümine; tozlary – astmatol; goýy we gury ekstrakty – bekarbon, bepasal, bellalgin we beýleki gerdejikleriň, babasyl ahwalynda haýyrlanylýan betiol, anuzol şemjagazy.

Melek örän zäherli ösümlikleriň hataryna girýär. Peýdalanmazýň ön ýanynda hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Bezeg ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 çay çemçe (5 g) guradylp owradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, birsalym goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jowheri her gün 3 wagtyna 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.

Melegiň 2 çay çemçe (10 g) gury otuny we ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) medisina spirtiniň içine atyp, agzy ykjam ýapylyan aýna gapda, garaňky ýerde bir hepde goýmaly. Yzygiderli çaykap durmaly. Hasadan geçirmeli. Häzir bolan şerbeti bedeniň zeperlenen ýerlerine çalmaly.

## KÖLEGELI PAKYR

Кузиния теневая

Cousinia umbrosa



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümliگی. Kölegeli pakyr – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň pakyrlar urugynyň boýy 60–120 sm ýetýän köpylylyk otjmak wekili. Baldagy göni, joýaly, kerep kysmy tüýlülje, yokarsy ýalaňaç, şahalan, şahalarynyň köp bölegi gysga. Ýapraklary ýumşak, iri uzyn sapakly, giň süýri-ýürek şekilli, gyralary oýuk, sähelçe inňe kysmy dişlije, yokarsy ýalaňaç, öçügsi-ýaşyl, aşagy kerep pisint ak keçe ýaly tüýlülje. Aşaky ýapraklarynyň uzynlygy



15–20 sm we köp, uzyn sapakly. Sapagynyň uzynlygy takmynan 6 sm. Ýokarky ýapraklary sapaksyz, oýuk-iri dişlije, dişjagazlary süýri-üçburçly, gýralary ownuk dişlije; iň ýokarkylary – uýy çowly, abat, ýitileşen, uýy inçe ýumşak iňňelije.

Sebetjiginiň uzynlygy 10–12 mm, şahalaryň we şahajyklaryň ujunda 3-den ýerleşýär. Gynynyň ýaprajkylarynyň sany – 40–60, esasynda gysylan, süýri-uzalan, ýalaňaç, gýralary бүдүр-сүдүр; daşkylary we ortakylary – uýy inçe biz şekilli, iňňejikleri daşyna gaýşan, ýokarsy ildirgiç şekilli egrenen; içkileri – has uzyn, uýy çowly, ýaşylymytyl, ýokarsy kirpiklije, uýy göni, ýiti. Gülyatagynyň tüýjagazlary ýylmanak. Sebetjikde güller 8–9-dan ýerleşýär, gültäji goýy gülgün reňkli, uzynlygy 10 mm, tozanjykly trubkasy goýy gülgün, guýruk şekilli ösüntgili, köp bolmadyk tüylüje. Çigitiği ýalaňaç, ýylmanak, gysylan, gapyrgasyz we dişsizje, ters süýri. Üpüjiginiň tüýjagazlary ýylmanak, gaçýan.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Kölegeli pakyr ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol çygly we kölegeli ýerlerde, çeşmeleriň golaýynda, dag derýajyklaryň kenarynda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–iýulda gülläýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Soňudagda, Serdarda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Hojagalada, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Deşitde, Arwazda, Mergenölende, Çopandagda, Arçabilde, Hanýaýlada, Giňdiwarda, Uly Garaňkyda, Neftanowskide, Gökderede, Babazawda, Dagyşda, Daştoýda, Dogryderede, Asylmada, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide, Çyrlakda, Şamlyda, Arçynýanda; Bathyzda: Akarçeşmede; Köýtendagda: Hojaçilikde duşýar.

**Tebigy gory.** Kölegeli pakyr ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde haşal ösümliگی hökmünde bol duşýar. Her ýylda takmynan, 40–55 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliگیň kökleri we oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny – ösümlik gülläýän döwründe (iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk

howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary kagyz ýa-da mata haltalara gaplamaly. Çig mallary gury, salkyn ýerde saklamaly. Kökleriniň ýaramlylyk möhleti – 2–3, otunyňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Kölegeli pakryň düzümine uglewodlar: inulin kysmy glýukofruktan girýär. Onuň köklerinde uglewodlar: 0,79–1,63% monosaharidler, 2,07–3,05% oligosaharidler, 13,18–25,0% polisaharidler; kauçuk, γ-laktonlar saklanýar. Ýapraklarynda, baldagynda, gül toplumynda degişlilikde uglewodlar: monosaharidler 0,52–0,15%, 5,50–8,45% we 3,80% bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda, ösümliگیň kökleri we oty süýjükeselde, bagyr sökelliklerinde peýdalanylyar.

Ylmy lukmançylykda ösümliگیň ýerasty we ýerüsti bölegi polisaharid-glýukofruktany – inulin kysmy uglewodyň ätiýaçlyk görnüşini almak üçin hyzmat etjek çeşme boljakdygy mälim edildi.

Bezeg, ot-iýmlik ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliگیň 2 nahar çemçe (30 g) guradylan köklerini 1 litr gaýnag suwuň içine atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan otda 15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1/2 bulgur (100 ml) içmeli.

Pakryň 4 çay çemçe (20 g) gury otuny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessay otda 10 minut gaýnatmaly. Ýarym sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan peti gün içinde 3–4 gezek nahardan soň 1/4 bulgur (50 ml) kabul etmeli.

Ösümliگیň 2 çay çemçe (10 g) ovradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 2 sagat goýmaly. Hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jowheri günde 4 sapa nahardan 30 minut ön 1/4 bulgur (50 ml) içmeli.

Pakryň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 0,5-litrlik termos demlemeli, birneme demini aldyrmaly. Yzsüre süzmeli. Häzir bolan jowheri her gün 4 gezek 1/4 bulgur (50 ml) kabul etmeli.

# KÖPETDAG

## BIDENEGI

Шалфей копетдагский

*Salvia kopetdaghensis*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Köpetdag bidenegi – dodagüllüler maşgalasynyň bidenekler urugynyň boýy 40–50 sm ýetýän ikiýyllyk ýa-da köpyýllyk otjumak wekili. Baldagy dört gyraňly, joýaly, gaty tüýjagazly, ýokarlygyna tarap has şahalanan sübsejigi gönügýär. Kökýanynyň ýapraklary pişme şekilli-süýrümlik, käte ýumurtga kysmysüýrümlik ýa-da giň ujy çowly, sapajygynyň uzynlygy 3–6 sm, esasy sähelçe ýürek şekilli, ak keçe ýaly tüýlülje, gyalary kepjeli we dügürlü dişlije, gysga ak keçe ýaly tüýlülje, gasyňly, бүдүр-сүдүр. Aşaky baldagyň ýapraklary sapaksyz, bol ak keçe ýaly tüýjagazlar bilen örtülen, kepjeli. Gülýanyndaky ýapraklary giň ujy çowly, ýokarsy ýitileşen, çuň kepjeli, baldaga çolaşýan.

Gülleri 4–6-dan dykyz ýerleşýär, ýalan çogdama ýygnan, ýokarkylary ösmedik. Okarajygy güllerinde ýaýbaň jaňjagaz şekilli, uzynlygy 12–14 mm, gaty tüýlülje, köplenç gapyrgaly. Dişleri üçburçly, tüýlek, ýokarsy gysga sähelçe

tüýjagazlar bilen örtülen okly. Ýokarky dodagynyň ortadaky dişjagazy uly bolmadyk depejik görnüşinde. Miwelerinde okarajyklary has ulalan, guýguş şekilli giňän. Gültäji iri, uzynlygy 4 sm çenli, okarajykdan 2,5–3 esse uly, ak, diňe ýokarky dodagynda gysgajyk syýa reňkli tüýjagazlar bar. Ýokarky dodagy ýaýbaň, orak şekilli gysylan. Aşaky dodagy süýrümlik gapdal kepjeli. Gültäjiniň trubkasy okarajygyndan gysga.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Köpetdag bidenegi ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly eňňitlerde, derelerdir jülgelerde, sähralyklardaky däneli ösümlikleriň arasynda ösüp boý almany halayar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär, iýun–iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Nohurda, Tagarawda, Sarymsaklyda, Sülüklide, Müsünewde, Germapda, Heýrabatda, Bozykýamowda, Gökderede, Duşakerekdagda duşýar. Endemik.

**Tebigygory.** Köpetdag bidenegi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip yetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (maý) ýygnamaly. Olary mallary teläriň aşagynda aýyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky ýerde saklamaly. Möhleti – 1,5 ýyldan artyk bolmaly däl.

**Himiki düzümi.** Köpetdag bideneginiň düzümine flavonoidler: apigenin, luteolin, 7-O-β-D-hrizeol glükuronid, sinarozid, efir ýagy girýär. Onuň köklerinde hinonlar: tanşinoidler, diterpinod hinonlar saklanýar. Ösümligiň ýerüsti böleginde 0,15% efir ýagy (onuň düzüminde: 63% sineol, α-pinen, β-pinen, limonen, n-simol, terpinolen, linalool) bar. Ýapraklarynda efir ýagy, eý maddalar, organiki turşular: ursol we oleanol; flavonoidler, fitonsidler, B, P, PP toparynyň witaminleri, alkaloidleriň yzlary saklanýar. Güllerinde salwin monometil efiri bar.

**Peýdalanylyşy.** Gündogaryň tebigaty synag ediji alymy Abu Reýhan Biruny özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly ensiklopediýasynda ösümligiň şypaly häsiýetleri barasynda söz açýar.

Halk lukmançylygynda bidenegiň otunyň petini deri örtügiňiň sowuklama kesellerinde, ýaralarda, ýanyklarda, sowuk almada, stomatitde, ýokarky dem alyş ýollarynyň



katarynda, ingalyásiýada, gamaşdyryjy, zyýansyzlandyryjy we sowuklamanyň garşysyna serişde hökmünde peýdalanylýar. Mundan başga-da, deriniň sowuklama kesellerinde, iriňleşän ýarlarda, başlarda (hasa bilen ýapgy, suwa düşünmek) peýdalanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Baharly we Gökdepe etraplary) bidenek gastritlerde, kolitlerde, bronhitlerde, bagryň we böwregiň kesellerinde, peşew haltasynyň sowuklamasynda, gakylyk goparyjy, iç sürüji we peşew çykaryjy serişde hökmünde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň ýapraklaryny dürli garyndylaryň düzümine goşýarlar. Gülleri antibakterial salwin derman serişdesiniň düzümine girýär.

Ösümligiň efir ýagy parfümer-kosmetik senagatynda, hususan-da diň tozlaryna hoşboýlyklary bermekde peýdalanylýar.

Bezeg, bal beriji we tehniki ösümlük.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylýşy:**

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gaba ýerleşdirmeli, gapagyny ýapyp, gaýnap duran suwda suw hammamýnda 15 minut gaýnatmaly. 45 minutyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli, galan massany sykmary. Taýýar bolan jöwheri başlangyç göwrümine (200 ml) gelinçä üstüne gaýnag suw guýmaly. Melhemi günün dowamynda peýdalanmaly.

Bidenegiň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 30 minut goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri her gün 3 wagtyna nahardan 20–30 minut ön 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

## **KÖPETDAG BÜRELIJESI**

**Блошница сушеницевидная  
Pulicaria gnaphalodes**

**Häsiýeti.** Dagetek derman ösümligi. Köpetdag büreljisi – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň büreljiler urugynyň boýy 20–40 (50) sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlük esasyndan köpgezek has we gür şahalanan, ykjam, tas şar şekilli görnüşe eýe. Baldagy gür ak tüylüje. Ýapraklary süýrümlik-kepjeli, kütäk, esasy gulaklyja,

baldaga bitişen, uzynlygy 1,0–1,5 sm we ini 3–4 mm, gyralary aglaba tolkunly-küdür, çal-ýaşyl reňkli. Iki tarapy hem gysga sapaklyja gür gaty başly tüýjagazlar bilen örtülen we uzyn ak, bir-birine çolaşyp duran tüýjagazly, esasan, ýaşajyk döwründe oňat bildirýär; ýokarky tarapy deň bolmadyk dügürler bilen örtülen, aşakysynda – göz-görtele damarlar çykyar. Ýokarky ýapraklary birneme ownuk, uzynlygy 5–7 mm we ini 2–3 mm. Gül saklaýan pudaklaryň iň ýokarky ýapraklary örän ownuk, uzynlygy 2 mm çenli we ini 0,5 mm.

Gülsaklaýjylary gür mämishi-sary reňkli, gysga sapakly, başly tüýjagazlar bilen örtülen. Gül sebetleri sübseli-galkan görnüşli gül toplumyna ýygananan, örän köp sanly (ýüzlerçä çenli), has şahalanan ýokarky pudaklarda ýekeleşýn ýerleşen, tas sebetiň esasynda çenli ýaprakly. Miwedäki gynlaryň boýy 4–5 mm, kese kesiminde 7–8 mm, onuň ýaprajyklary gür başly we uzyn ak, bulam-bujar tüýjagazlar bilen örtülen, ahyrynda gaçýar. Üç-dört hatarly, onuň içindäki ýaprajyklaryň uzynlygy 2,0 mm we ini 0,5 mm, iň içindäkisiniňki – uzynlygy 4,0 mm çenli we ini 0,5 mm. Dil şekilli güljagazlary sähelçe görünýär, azsanly, gültäji bilen uzynlygy 2,0–2,5 mm, diljagazynyň uzynlygy 1,5 mm, trubkasynyňky – 1 mm. Trubkaly güljagazlaryň diskasy iki jynsly, onuň gültäjiniň uzynlygy 3–4 mm, gysga ýa-da üpüjegiň çitenegine deň, gültäjiň dişjagazlarynyň uzynlygy 0,75 mm, trubkasynyň daşy seýrek gaty tüýjagazlar bilen örtülen, sütünjigiň uzynlygy 5 mm çenli, 1 mm gültäjiň çäginde çykyar, tumsujagyň kepjesiniň uzynlygy 0,5 mm. Çigitjagazyň uzynlygy 2,0 mm we ini 0,5 mm, burunjagazsyz, ýokaryk galyp duran gür tüylüje. Üpüjegi iki hatarly: daşkysynyň çitenekleri gysga, uzynlygy 0,2–0,3 mm, içkisiniňki (15–20 sany) – uzynlygy 4 mm çenli, kirpikli, miwelerde galýar.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Köpetdag büreljisi ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol jülgeriň ýylçyr daşlyklarynda ösüp boý almany halaýar. Ösümlük awgust–noýabrda gülleýär hem miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Uly Balkanda: Deşiklidaş jülgesinde, Gamyşlyjyda, Külejede; Kiçi Balkanda; Kürendagda: Temenderde, Torgaýda, Ýylmanguýyda, Porsyýamanda, Isgenderde, Serdaryň günortasynda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Nohurda, Arwazda, Tagarawda, Mergenölende, Gylgylawda, Germapda, Arçabilde, Garaňkyda, Gökderede, Duşakerekdagda, Gurtlusuwda, Daştoýda; Bathyzda: Serhetabatda duşýar.

**Tebigy gory.** Köpetdag bürelijesi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Her ýylda takmynan 15–20 tonna çig maly ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň dermanlyk maksatlary üçin oty çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly gülleýän döwründe (awgust–sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada ýa-da oňat ýel çekerli jaýda galyň matanyň ýa-da kagyzyň üstünde umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky, Gün şöhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Otjumagyň ýerüsti böleginde 0,47% efir ýagy, seskwiterpenoidler: sis-izogeran turşusy, kardinadien-1 (10), 4-ol-8α, kardinadien-4, 10 (14)-ol-8β, muuroladien-4, 10 (14)-ol-8β, kadinadien-4, 10 (14)-ol-8α, muuroladien-4, 10 (14)-ol-8α, α-kopaenol-8α, 1,8-oksido kadinen-4, 10-epi-1,8-oksido kadinen-4, sis-γ-kurkumenol-12, sis-γ-kurkumenil-12-li efirler, metil efir 2-(izobutiriloksi) timol, β-selinolenol-2α (yatamol A) saklanýar. Şeýle-de flavonoidler: kwersetin, 3-metil efir kwersetini, 6,7-dimetil efir, 3,6,7-trimetil efir, 3,6,3'-trimetil efir we 3,6,7,3'-tetrametil efir kwersetagetin, eriodiktiol, 7-metil efir eriodiktiol, alifatik turşular, diterpenoidler: salwin, salwinin, 6,3% uglewodlar, 3,7% organiki turşular, 0,07% alkaloidler, C witamin, 5% eý maddalar bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň otundan taýýarlanylýan petidir jöwherini, şerbetini we merhemini antibakterial, diuretik hem ýarany bitiriji serişde hökmünde peýdalanylýar.

Türkmen milli tebigçiliginde hem halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly, Gökdepe we Ruhabat etraplarynda) bürelijäni insektisid we antifungal täsiri bolanlygy sebapli ulanylýar.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanyan otda 5 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan pet bilen her günde 2 gezek (irden we agşam) bedeniň zeperlenen ýerlerini ýuwmaly.

Otjumagyň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 4 sagat saklamaly. Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3–4 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) medisina spirtiniň içine atyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda 10–15 gün garaňky ýerde goýmaly. Yzygiderli çaykap durmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan şerbeti günde 3 sapar 1 çay çemçeden (5 ml) kabul etmeli.

Bürelijäniň 1 nahar çemçe (15 g) mäjumlanyp toz kysmyna ýetirilen otuny 100 gram guýruk ýa-da düýäniň örküş ýagy bilen garmaly. Ony agzy berk ýapylýan aýna gapda 10 gün garaňky ýerde saklamaly. Yzygiderli bulap durmaly. Taýýar bolan merhem bilen her gün 2 ýola (irden hem agşam) zeperlenen ýerleriňe çalmaly.

## KÖPETDAG ÇYRŞY

### Эремурус копетдагский

### Eremurus kopetdaghensis



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Köpetdag çyrşy – sowсанlar maşgalasynyň çyrşlar urugynyň boýy 40–66 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ýapraklarynyň esasy we baldaklarynyň ýokarysy inçe bardaly gyn bilen gaplanan. Baldagy togalak, ýalaňaç, boýy 60 sm töweregi. Ýapraklaryndan 2 esse uzyn. Ýapraklary ýylmanak, ýalpyldawuk, inçe çyzykly, ini 3–4 mm.



Salkymy ýumşak, esasan güllände. Gülyanyndaky ýapraýyklarynyň gyralary burum-burum, kirpiklije, ujy çowly-çyzkly, miwe sapajygyndan gysga. Miwe sapajyklary miwelerde tas kese, depesi ýokarlygyna egreden, uzynlygy güli bilen uzynlygy 2–3 sm. Gülleri ýaýbaň açyk, gülgün reňkli, iri. Gülyanynyň ýapraýyklarynyň uzynlygy 15–17 mm, arkasynda gara reňkli damar bar, guranda içine tovlanmaýar. Gozajygy süýri, uzynlygy takmynan 15 mm.

**Ýaşajyş aýratynlygy.** Köpetdag çyrşy ölkämizde deňiz derejesinden 800–1200 metr belentlikde bitýär. Ol dürli reňkli çykyntygy şorlaşan jynsly topraklarda, Sumbar derýasynyň toýunly aşaky kemerinde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik aprel–maýda gülleýär, maý–iýunda miweleýär. Ol tohumy arkaly we wegetatiw ýoly bilen köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Temenderede, Margyzda, Torgaýyň demirgazyk-günbatarynda, Ajydere duzly derýajygyň gury hanasynda, Ýaşyl jülgesinde duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Köpetdag çyrşy ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ol Aşgabadýň botanika bagynda introduksiýa edilen. Ösümlik Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyt kitabyna (1999, 2011) we TGHB-niň Gyzyt sanawyna (1998) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri, oty, gülleri we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otlaryny we gülleri – ösümlik gülleýän döwründe (aprel–maý), miwelerini – bişen wagtynda (iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda, galyň matanyň ýa-da kagyzyň üstünde ýaýradyp guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerden taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara, gülleriniňkini we miweleriniňkini – kagyz gutujyklara ýa-da agzy berk ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Kökleriniň we miweleriniň saklanş möhleti – 2–3, otlarynyňky hem gülleriniňki – 2 ýyla çenli.

**Himiki düzümi.** Köpetdag çyrşynyň himiki düzüminiň doly derňewi geçirilmedik. Onuň ýapraklarydyr ýaşajyk pudaklarynyň düzüminde C witamin we karotin saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyrlada Gündogaryň ajaýyp alym-lukmany Abu Aly ibn Sinanyň «Lukmançylyk ylmyňny kanunlary» atly meşhur işinde çyrşyň melhemlik häsiýetleri giňişleýin açylyp görkezilýär. Lukman ony bogunlaryň yzasynda, artritde, göz kesellerinde, üsgülewükde, mastopatiýada, zäherli mör-möjekler çakanda, umumy berkidiji we tonizirleýji serişde hökmünde, dykn almalary açmakda, çişleri sorup almakda we jynsy hyjuwy ýokarlandyrmakda peýdalanmaklygy maslahat berýär. Infisirlenen sowuklan başlarda, açyk ýaralarda, başly çykuwlarda, iriňli ýanyklarda, ol ýapgy edilip ulanylýar; Onuň küli tozgalap duran örgünlere sepilýär. Şiresi gula-gagyryda damdyrylýar. Gülleriniň we miweleriniň çakyryda taýýarlanylan şerbetini içýanlar çakanda ulanylýar.

Türkmen halk lukmançylyghynda (Bereket et-rabynyň daglyk obalarynda) ösümliğin kökleriniň petini dümew sökelliklerinde tonizirleýji hem rahatlandyryjy, otunyň petidir jowherini ýel çykaryjy, bokurdagyň howply täze döremelerinde çişniň garşysyna serişde hökmünde ulanylýar.

Ylmy lukmançylygynda ösümliğin kökleri eremurini almak üçin çesme bolup hyzmat edýär.

Bezeg, azyklyk, krahmal beriji we boýag ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 20–30 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 ýola nahardan 20–30 minut ön 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Çyrşyň 1 çay çemçe (5 g) mäjumlanyp toz görnüşine getirilen otuny bir litrlik termosda demlemeli, goýmaly. Hasadan geçirmeli. Häzir bolan jowheri gün içinde 2 gezekden (irden we agşam) 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin 2 nahar çemçe (30 g) gury güllerini we miwelerini 1 bulgur (200 ml) çakyryň içine atyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 7–10 gün saklamaly. Birsyhly çaykap durmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Melhemlik şerbeti günde 3 sapa 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.



# KÖPETDAG

## DAŞKEKRESI

Василек копетдагский

*Centaurea kopetdaghensis*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Köpetdag daşkekresi – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň daşkekrelere urugynyň boýy 25–40 sm ýetýän köpylyk otjumak wekili. Ösümlik tutuş çalymltyl-ýaşyl reňkli, kerepli, soňra bölekleyin, ýokarky böleginiň tüýjümeçligi aýrýlýar. Baldagy, adatça, köp sanly, dik, gowşak şahalanar, seýregräk ýönekeý, gapyrgaly, ýokarsyna çenli ýaprakly, käte sebediň aşagy kütüleşen. Ýapraklary dykyz, süýrümlik-elliptik, köplenç süýrümlik ýa-da uýy çowly, ýiti, köp bölegi gyralary abat, yzygiderlikde gysga sapajyga çekilýär, ortaklary – uzynlygy 4–8 sm (sapagy bilen), ini 0,5–2,0 (3,0) sm, ýokarkylary – sapaksyz, has ownuk. Sebetleri baldagyň we ýekeleyin uzyn şahajyklaryň depesinde ýerleşýär. Gyny süýrümlik-elliptik ýa-da süýri, diňe esasy sähelçe kerepli, ýokarsy ýalaňaç, orta möçberde, uzynlygy 18–20 mm, ini 8–10 (12) mm. Onuň ýaprajyklary derijimek, kütüräk, ýaşylymltyl-sary reňkli, ýalaňaç (iň daşkysyndan başgasy). Daşkysy – ownuk, togalak-ýumurtga şekilli, ortakysy – ýumurtga kysmy we süýrümlik-ýumurtga kimin, şolar we beýlekileri gaçmaýar, ýaprajyklarynyň gyny germewli, kekeç kysmy, kirpikli, ýalaňaç, üçburçly ýa-da uýy çowly-üçburçly, ýokarsy ýiti, merkezi bölegi garamtyl-goňur reňkli, esasy tas gara, gyralary ak reňkli, miwe getirmelik ýagdaýy sähelçe çykyntylara ýykgyň edýär. Çykyntylaryň kirpiklikleri ak reňkli, gysga byçgy-çitenekli, adatça, diametri merkezi böleginden gysgarak. Içki ýaprajyklary çyzykly, germewli, ýumşak kirpiklije ýa-da deň bolmadyk kesilen

diş-dişli, elliptik ýa-da süýrümlik-elliptik, uýy ýiti, orta bölegi garamtyl-goňur reňkli ýa-da goňur, gyralary ak reňkli çykyntyly.

Güljagzalary sary reňkli, uzynlygy 15–20 mm; gapdaldakylary – ulalmadyk, ak asaminodiýaly, gültäjiň trubkasynda gizlenýär, çuň (baş)-alty (ýedi) bölünen, ülşi çyzykly egreden. Çigitjagzalary süýrümlik-elliptik, sarymltyl reňkli, ýylmanak, sähelçe tüýlülje, bişende ýayraň tüýlülje ýa-da tas ýalaňaç, sähelçe ýalpyldawuk, uzynlygy 7–8 mm, ini 3,2–4,0 mm. Üpüjigi agymtyl reňkli, galýar, ikileýin, daşkysy – jigitjagazdan gysga, uzynlygy 3–4 mm, köp sanly inçe çitenekli, içkisi – 12–14 barda şekilli, iki esse gysga we iki-üç esse has ýaybaň byçgyly bütür-südüň çiteneklerden ybarat.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Köpetdag daşkekresi ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly eňňitlerde, arçalyklarda, sähra ösümlik örtüginde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik (maý) iýün–iýulda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda we Merkezi Köpetdagda: Magtymguly bilen Narlynyň aralygynda, Hasardagda, Arwazda, Tagarawda, Ypaýa galynýan ýerden tä Sumbaryň tarazyna çenli aralykda duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Köpetdag daşkekresi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Ösümlik Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly gülleýän döwründe (maý–iýün) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlama. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Saklanýş möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Köpetdag daşkekresiniň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümligiň düzümine alkaloidler, saponinler, flavonoidler, C witamini girýär.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda daşkekresiniň jöwheri dümewde, ysytmada, sowuklamada, işdän kesilende, aşgazan-ičege ulgamynyň hyzmatyny we iýmit siňdirişi gowulandyrmakda, gyzgyny peseldiji hökmünde, tonizirleýji, sedatiw, aşgazana haýyrlý, peşew we öt



çykaryjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Şeýle-de ýapgy görnüşinde göz kesellerinde haýyrlanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplary) ösümligiň mäjumlanan tohumyny siňňilleri ýok etmek üçin ýapgy edilýär.

Bezeg we bal beriji ösümlük.

### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) guradylyp owradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 20 minut goýmaly. Yzsüre süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3 gezek nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Daşkekräniň 1 nahar çemçe (15 g) garyndysyny, onuň gatnaşygy şeýle: 2 nahar çemçe (30 g) daşkekräniň gülleri, 1 nahar çemçe (15 g) tozganyň kökleri, 4 dyrnaklyjanyň (60 g) gülleri, 1 nahar çemçe (15 g) çitçitiniň kökleri, 1 çay çemçe (5 g) eşekýorunjany, bir litrlik termos demlemeli, islegiňe görä, şeker goşmaly, garyşdyrmaly, bir sagat goýmaly. Häzir bolan jöwheri gün içinde 4–5 sapa 1 bulgurdan (200 ml) kabul etmeli.

Zygyryň 4 çay çemçe (20 g) otuny, daşkekräniň güllerini we lüşüniň güllerini garyşdyryp, 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 8 sagat goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günün dowamynda 1–2 damjadan birnäçe gezekden peýdalanmaly, şeýle-de ýapgy etmeli. Melhemlik serişde sowuklama, iriňleri dep etmeklige we gözün gowy görmegine haýyrlý.

## **KÖPETDAG GYZGANY**

**Дере́за ко́петдагская**

**Lycium kopetdaghi**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Köpetdag gyzgany – itüzümler maşgalasynyň gyzganlar urugynyň boýy 1–1,5

metre ýetýän gyrymsy agaç wekili. Daragt pes ýaýraň şahaly, olar çal ýa-da goňrumtyl-çal reňkli gabyk bilen örtülen, bogunly, köp sanly gysgajyk (uzynlygy 2,5 mm) gapdal pudakly. Ýyllyk we ýaşajyk pudaklary saman-sary reňkli, inçe, käte egri. Tikenleri köplenç gysga, uzynlygy 0,8–1,5 sm we adatça, ýapraksyz, bölegi uzyn, pyntykly, ondan ýapraklar we güller emele gelýär. Ýapraklary köplenç nobatlaýyn, ýekeleýin, garry şahalarda çogdama ýyganan (adatça, güli bilen bilelikde), gapdal pudaklary has gysgalan (uzynlygy 2,5 mm), inçe elliptiki ýa-da süýrümlik-ujy cowlý, ýokarsy ýitileşen, seýrek kütäk, sapagy yzygiderli esasynda gysylýar, ýaprak ülsünden 2,0–3,5 (5) esse gysga, ol açyk ýaşyl reňkli, inçe ýa-da seýrek birnäçe kepjeli, gapdal damarlary oňat görünýär.

Gülleriniň köp bölegi ýaşajyk pudaklarynyň ýokarky ýapraklarynyň goltugynda 3–7-den kemala gelýär, depesinde bogun aralarynyň ýakynlygy sebäpli, 20–40-dan ösýär, olaryň bölegi gysga gapdal pyntyklaryndan, has garry şahalardan ýüze cykýar. Gül sapajygynyň uzynlygy 3–8 (15) mm. Okarajygy jaňjagaz şekilli, uzynlygy 3–4 mm, ini 2–3, köp bölegi dört-(baş-) dişlije, seýrek iki-üç bölünen, gyralary seýrek kirpiklije, dişjagazlarynyň uçlary ak keçe ýaly tüýlçe. Gültäjiniň uzynlygy 10–12 (13) mm, syýa reňkli, onuň trubkasy silindrik, aşaky bölegi birden giňelýär, içi we daşy ýalaňaç, egreden ýeri, adatça, dört bölünen, seýrek baş bölünen, üli ýumurtga şekilli, trubkadan iki esse gysga, gyrasy gysylan gür gysga kirpiklije, tyçinkalaryň sany gültäjiniň ülüşlerine deňdir, azda-kände birmeňzeş uzynlykda, ýalaňaç sapakly. Sütünjigi başly tumşujakly, tyçinkanyň uzynlygyna deň. lýmişi gyrgyzy reňkli, gabarasy 8 mm, şar şekilli we süýri-şar kysmy, tohumynyň sany – 6–14, goňur reňkli, togalak-böwrek şekilli.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Köpetdag gyzgany ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol derelerdir jülgerlerde, derýajyklaryň kenarynda, çagyly eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Daragt maý–iýunda gülleýär, iýul–sentýabrda miweleýär. Ol tohumy we kök çykyngylary arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda, Sumbarda, Arpeklende; Merkezi Köpetdagda: Nohurda, Üçguýuda, Degirmenlide, Sülüklide, Hyrsderede, Mergenölenide, Gylgylawda, Germapda, Arçabilde, Gökderede, Wanowskide; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide, Guruhowdanda, Şamlyda duşýar. Köpetdagyň endemigi.

**Tebigy gory.** Köpetdag gyzgany ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary

üçin gory ýeterlik. Ol Sünt-Hasar we Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Daragtyň ýapraklary we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Ýapraklaryny ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun), miwelerini – bişen wagtynda (iýul–sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklaryndan taýýar bolan çig maly mata haltalara, miweleriniňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Ýapraklarynyň saklanyş möhleti – 1–2, miweleriniňkini – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Köpetdag gyzganynyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine alkaloidler girýär.

**Peýdalanylyşy.** Türkmen milli tebigçiliginde hem halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplary) ösümliğin ýapraklary we miweleri kynlyk bilen dem alnanda, ýokarky dem alyş ýollarynyň, aşgazan-içege ulgamynyň kesellerinde, sarygetirmede, öt çykaryjy serişde hökmünde ulanylýar.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) mäjumlanan miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessay otda 5 minut gaynatmaly. Soňra süzmeli. Otag temperaturasyna çenli sowatmaly. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan 20–30 minut öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli. Dowamlylygy – 10–15 gün.

Gyzganyň 1 çay çemçe (5 g) guradylyp owradylan ýapraklaryny 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suwa atyp, 30 minut goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 gezek 1 çay çemçeden (5 ml) kabul etmeli.

Daragtyň 2 nahar çemçe (30 g) guradylan miwelerini bir litrlik termos demlemeli, 1–2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

## KÖP ŞAHALY ÝYLGYN Гребенщик многоветвистый *Tamarix ramosissima*



**Häsiýeti.** Giň ýaýran dermanlyk ösümlik. Köp şahaly ýylgyn – ýylgynlar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 2–3 (4) metre ýetýän gyrymsy agaç wekili. Daragtyň sütüniň gabygy gyzlymytyl-goňur ýa-da gyzlymytyl reňkli. Ýapraklary ýaý kysmy-ýürek şekilli, uzynlygy 2–5 mm we ini 1–2 mm, ýiti, tas baldaga dolanyp duran. Salkymynyň uzynlygy 3–5 sm ýa-da gysgalan – 0,5–1,5 sm, inçe, ini 3–5 mm, gül palajynyň uzynlygy 0,2–1,0 mm, ýokarky belgili sübsejikde. Gülüňlary süýrüntik-ýumurtga şekilli ýa-da ýumurtga kysmy, uzynlygy 1,5–2,0 mm, ýiti, köp bölegi okarajykdan uzynrak (gül sapajygy bilen bilelikde).

Güljagazlary baş agzaly. Okarajygy ýumurtga şekilli, ýitileşen ülüşli, gyralary perdeli. Gül ýapraklary gülgün ýa-da syýa, ýa-da açyk gülgün reňkli, ters ýumurtga şekilli, uzynlygy 1,0–1,5 mm we ini 0,7–1,0 mm, okarajykdan 1/3 uzynrak, sähelçe egrenen, çykýan, gaçmaýan. Tyçinkalarynyň sany – 5. Diski baş kepjeli, olar egrenen. Sapajygy inçe, gültäjine deň ýa-da köp bölegi 1,5 esse uly, diskiň kepjeleriniň arasynda ýerleşýär. Tozanjyklary kütegräk. Sütünjikleriniň sany – 3, şeşper görnüşli, düwünçeginde köp bölegi 3–5 esse gysga.



Gozajygy okarajygyndan 3–4 esse uzynrak, uzynlygy 3–4 mm we ini 0,7–1,0 mm.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Köp şahaly ýylgyn ölkämizde düzlüklerde we dagetekleriň jülgerinde, derýalaryň, derýajyklaryň, kölleriň, deňiň kenarynda, sorluklarda, şorlaşan ýerlerde, çägelerde, takyrlarda ösüp boý almany halaýar. Daragt maý–sentýabrda gülleýär, maý–oktýabrda miweleýär. Ol wegetatiw ýoly bilen köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzyň hemme etraplarynda duşýar.

**Tebigy gory.** Köp şahaly ýylgyn ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň sütüniniň gabygy, inçe baldaklary, ýapraklary we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Gabygyny ir baharda (mart), baldagyny, ýapraklaryny we gülleri – ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Gabykdyr baldakdan we ýapraklardan taýýar bolan çig mallary mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Gabygyň saklanş möhleti – 2–3, baldakdyr ýapraklaryňky hem gülleriňki – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ýylgynyň düzümine alkaloidler girýär. Onuň kökleri 4,5% eý maddalaryny saklaýar. Ýerüsti böleginde 27,3% steroidler: 24-metilholesanol, 24-etilholesanol, holesterin, 24-metilholesanol, 24-etil-22-degidroholesanol, 24-etilholesanol, 24-etillanosterol, 24-etil-22-degidroholesanol, awenasterol bar. Baldaklarynda 3% eý maddalar saklanýar. Gabygynda 0,16% kumarinler, 4,1–9,0% eý maddalar, flawonoidler, antosianlar saklanýar. Gök şahajyklarynda 0,18 kumarinler, 1,64–6,75% eý maddalar, 1,66% flawonoidler: kwersetin, izokwersitin, tamariksetin, tamariksin, kempferol bar. Ýapraklarynda fenolkarbon turşular: n-kumar; kumarinler: eskuletin, ellagow turşusy; 8–9% eý maddalar, flawonoidler: kwersetin, kempferol; antosianlar: sianidiniň yzlary saklanýar. Ýapraklaryndaky ykryklarda (çişlerde) 50%-e çenli eý maddalar, güllerinde 0,1% kumarinler, 12,67% eý maddalar, 2,4% flawonoidler: kwersetin, kempferol,

izokwersitrin, tamariksetin, tamariksin, 2,6% antosianlar bar. Miwelerinde 0,15 kumarinler, 14,42% eý maddalary, 1,64% flawonoidler, 2,3% antosianlar saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda daragtyň gabygy aşgazan-içege kesellerinde, dürli gan akmalarynda gamaşdyryjy serişde hökmünde ulanylýar. Ösümligiň gülleri aşgazan sökelliklerinde, miweleri önelgesizlikde peýdalanylýar. Baldaklarynyň peti rewmatizmi we merezýeli bejermede neplenýär.

Ýylgynyň ýapraklaryndan taýýarlanylýan peti halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda dalak kesellerinde, deri dermatitlerde, düwürtikdir örgünlerde, allergiýada ulanylýar. Mundan başga-da, ony bogunlaryň yzasynda, artritde we rewmatizmde ýapgy etmek arkaly haýýrlanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň gülleriniň antibakterial işjeňligi we ýokary diuretik netijeliligi ýüze çykarylýdy. Ykryklary medisina taninini almak üçin dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär.

Gyrymsynyň gök şahajyklary we gabygy boýag senagatynda peýdalanylýar. Ondan sary, gara-açyk gyzyly, we gülgün reňk alynýar.

Ösümligiň ýapragyny gündogar aşhanasynda naharlar üçin jaz hökmünde ulanylýar.

Bezeg, iýmitlik, bal we nektar beriji, eýleýji hem çäge berkidişi ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Daragtyň 3 nahar çemçe (45 g) owradylan baldagyny 0,5 litr gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 20 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti günün dowamynda 2 gezek (irden hem agşam) agyryly yerlerine çalmaly.

Ýylgynyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan alawda 10–15 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli. Şeýle-de bedeniň agyryly yerlerine ýapgy etmeli.

Daragtyň 2 çay çemçe (10 g) guradylan güllerini 1/2 bulgur (100 ml) gaýnaga atyp, birsalym goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jowheri gün içinde 3 ýola 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

# KÖPETDAG TÜMMÜLJESI

Иорениовидка жабрицевидная  
*Johreniopsis seselioides*

**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Täsin derman ösümligiň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelyär.

Köpetdag tümmüljesi – saýawanlylar maşgalasynyň tümmüljeler urugynyň boýy 70–115 sm ýetýän köpylyk otjumak wekili. Ösümlik çalymtyl reňkli, düýbünden ýalaňaç. Baldaklary birnäçe, orta bölegi ýaýraň şahalanan, togalak, inçe joýaly, aşagy ýaprakly. Kökýanynyň we baldagyň aşaky ýapraklary uzyn, togalak, gaty sapajykly. Kökýanynyň ýapraklarynyň ülsi giň üçburçly, ýaýraň, üçleýin dilimlenen, uzynlygy 20 sm çenli, göni, silindrik, gaty.

Saýawany 11–19-şöhleli, dürli uzynlykda (1,5–5,0 sm). Gyny üç ýaprakly. Ýaprajyklary uýj çowlanan, 3 damarly. Saýawanjyklary 12–20-güllüje, gysga, uýj çowly, ýitileşen ýapraklyja. Okarajygyň dişleri üçburçly. Gül ýapraklary ýaşylymtyl-sary reňkli, tas togalak, gysga, depesi içine eglen. Miweleri süýrütik, miwe sapajyklaryndan iki esse uzyn, uzynlygy 7 mm. Merikarpiýasy çykyp duran gapyrgaly we gyrasy inçe.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Köpetdag tümmüljesi ölkämizde deňiz derejesinden 1200–1600 metr belentlikde bitýär. Ol otlukly eňňitlerde, mezofil (çyglylygy halaýan) agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň arasynda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–iýulda gülleýär, iýul–sentýabrda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär. Ömründe bir gezek tohum berýär (monokarpik).

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Porderede duşar.

**Tebigy gory.** Köpetdag tümmüljesi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary

üçin gory çäklil. Ekip ýetşirmek maslahat berilýär. Ol Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň kökleri we oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde, otlaryny – ösümlik gülleýän döwründe (iýun–iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda galyň matanyň üstünde guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün söhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Kökleriniň saklanyş möhleti – 2–3, otunyňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Köpetdag tümmüljesiniň himiki derňewi doly geçirilmedik. Ösümligiň kökleri düzüminde kumarinleri saklaýar. Ýapraklarynda – kempferol, kwersetin, rutin flavonoidleri bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň kökleri we otlary deri, ýürek-damar, gipertoniki kesellerde, ýokarky dem alyş ýollarynyň katarynda, bronh demgysmasynda peýdalanylýar.

Ýerli halk tarapyndan ösümligiň ýaşajyk pudaklary we baldaklary ulanylýar.

Bezeg, azyklyk we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 8 çay çemçe (40 g) guradylan köklerini 1 litr gaýnaga atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 7–8 minut gaýnatmaly. 20 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti günün dowamynda 4 gezekde kabul etmeli.

Tümmüljäniň 1 çay çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Hasadan geçirmeli. Häzir bolan peti her gün 3 sapa 2 nahar çemçeden (30 ml) nahardan ön içmeli.

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, bir sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jowheri gün içinde 3 ýola nahardan ýarym sagat ön 1/3 bulgurdan (65 ml) kabul etmeli. Ýapgy görnüşinde hem ulanmaly.



# KÖPETDAG ÜLJESI

Вишня ложнопростертая

*Cerasus pseudoprostrata*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Köpetdag üljesi – bägüller maşgalasynyň üljeler urugynyň boýy 10–40 sm ýetýän gyrymsyja wekili. Ösümlik pes boýly, has şahalanan, ýaýraň bogunly şahaly we gysga gür gysga tüýlüje sarymtyl pudakly. Birýyllyk pudaklary sarymtyl-çal reňkli, garrylarynyňky kül-çal reňkli. Ýaprakýanjyklary sapajygyndan uzynrak, uýy çowly biz kysmy, ýa-da gyralary azda-kände gaty dişlije. Sapajyklary örän gysga, uzynlygy 0,5–1,5 mm. Ýapragynyň ýokarsy gysga tüýlüje, aşagy ak keçe ýaly tüýlüje, giň ýumurtga şekilli ýa-da ýumurtga kysmy elliptik, uýy kütäk ýa-da ýiti, gyralarynyň köp bölegi deň däl dişlije, gysga pudagynyň uzynlygy 3,5–10,0 mm we ini 2,5–7,0 mm, uzyn sterilleriniň uzynlygy we ini – 25 mm çenli, adatça, has inçe we deň dişlije, kâte aşaky dişjagazlary mäjlije.

Adatça, güljagazlary 1–2-den bolýar. Gül sapajyklary örän gysga, uzynlygy 1,0–2,5 mm, tüýlüje, gipantisi esasyň ýanyndan giň çişen, uzynlygy 5,0–6,5 mm, daşy tüýlüje, içi esasyň ýokarsyndan tüýlüje, gülgün reňkli. Okara ýaprajyklarynyň uzynlygy 1–3 mm (adatça 1,0–1,5), ini 0,80–1,25 mm, süňnen üçburçly-uýy çowly, ýitileşen, gyralary abat, içi ak keçe ýaly tüýlüje, gipantiýadan 2–3 esse gysga. Sütünjigi ortasynyň aşagyndan we tutuş düwünçek gür ak keçe kysmy bulam-bujar tüýjagazlar bilen örtülen. Gül ýapraklary gülgün reňkli, giň ters ýumurtga şekilli, oslanmaýan gysylan gysga dyrnaklyja. Şänişegi gyzyly reňkli, turşy, takmynan 8–9 mm, ýumurtga şekilli-şar görnüşli, ýalaňaç ýa-da ýokarsy tüýlüje. Şänişegi ýumurtga şekilli-şar kysmy, yzygiderlikde uýy ýitelyär, seýrek joýaly, gapdal

tarapynyň tikini içine girip duran we bu ýerde örän seýrek tory emele getirýär.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Köpetdag üljesi ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol daşly eňňitlerde, jülgelerde ösüp boý almany halaýar. Gyrymsyja aprel–iýunda gülleýär, iýul–awgustda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär..

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly we Kiçi Balkanda: Başmogurda, Sekidagynyň eteginde, Balady guýusynyň golaýynda; Kürendagda: Jebel stansiýasynyň golaýynda, Torgaý dagynda, Soňudagynda, Isgenderde, Serdarda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Tazetapylan dagyna çykylyan ýerinde, Hojagalada; Merkezi Köpetdagda: Bamyda, Nohurda, Monaman dagynda, Garaýalçyda, Arçman – Degirmenderede, Eýşek dagynyň gündogar eňnidinde, Arwazda, Keletede, Sarymsaklyda, Degirmenlide, Sülüklide, Müsünewde, Mergenölen bilen Gylgylawynyň aralygynda, Heýratbatda, Çopandagda, Arçabil şäherjigi bilen Semansur dagynyň aralygynda, Wetelki we Garaňky jülgelerinde, Gökdere bilen Çayeginiň aralygynda, Duşakerekdag dagynda, Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Babazaw, Dagys, Daştöý jülgelerinde, 2-nji Hunçanyň eňnidinde, Asylmanyň demirgazyk ýapgydynda, Howdanda, Nagdawda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskiý şäherjiginiň ýokarsyndaky jülgede duşýar.

**Tebigy gory.** Köpetdag üljesi ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Her ýylda takmynan 3–5 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin gabygy, ýapraklary we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Gabygyny ir baharda (şiräniň herekete gelmezinden ön), ýapraklaryny – ösümlik gülleýän döwründe (aprel–iýun), miwelerini – bişýän wagtynda (iýul–awgust) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda ýa-da galyň matanyň üstünde umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Gabygydyr ýapraklaryndan taýýar bolan çig maly mata haltalara, miweleriniňkini – kagyz gutujyklara ýa-da agzy berk ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Gabygynyň saklanyş möhleti – 2–3, ýapraklarynyňky – 1–2, miweleriniňki – 3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümliğin sütüniniň gabygyna eý maddal we glikozidler girýär. Ýapraklarynda – limon turşusy, eý maddalar, kumarin, amigdalın we beýlekiler bar. Miwelerinde (şireli etlek şänişek) – 15% çenli şeker, fruktoza

157

we başgalar, 11% deňiş pektin maddalar, B, PP (foliý turşusy), C toparynyň witaminleri, karotin, organiki turşular: limon, alma, eý maddalar, karotinoidler, mineral maddalar: kaliniň, demriň, magniniň, misiň duzlary, mikroelementler saklanýar. Tohumynda – takmynan 25–30% ýag, amigdalin glikozidi bar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümligiň dermanlyk häsiýetleri has gadymy wagtlardan bäri belli bolupdyr. Ol baradaky ilkinji maglumatlar Korneliýa Selsiň (b.e. I asyry), Pliniý ulunyň (b.e. 23–79-njy ýyllary) işlerinde duş gelýär.

Ülje gülçüleriň dilinde oňat başlangyç diýen manyny aňladýar.

Gündogaryň meşhur alym-ensiklopedisti Abu Reýhan Biruny özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» diýen ylmy işine bu agajyň şypaly häsiýetleri barada ýazýar.

Orta asyrlaryň ezber lukmany Muhammet Huseýn «Melhemler hazynasy» atly belli eserinde daragtyň melhemlik alamatlaryny ýatlap geçýär, ýagny «...ülje teşneligiňi gandyrýar, ýürekbulanmany we gaýtarmany rahatlandyrýar, içgeçmäni kesýär, aşgazany we bagry pugtalandyrýar... Guradylan üljäniň pugtalandyryjy alamaty, täzesine garanda güýçlüdir».

Halk lukmançylygynda ösümligiň täze ýapraklary gan akmasynda gany togtadyjy serişde hökmünde ulanylýar. Onuň miwe sapajyklarynyň jöwherini dem tutulmada, etiniň şiresini sowuklamanyň garşysyna, ýokarky dem alyş ýollarynyň kesellerinde gakylyk goparyjy, ganazlykda umumy berkidiji, sowuklama kesellerinde şähdiňi açyjy we gyzgyny peseldiji hökmünde, artritde hem plewritde peýdalanylýar.

Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda, üljäni tultuklykda we peşew-daş kesellerinde peşew çykaryjy, içgeçmede pugtalandyryjy serişde hökmünde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda daragtyň iýmişleri awitaminozda witamin çeşmesi bolup hyzmat edýär, şeýle-de merkezi nerw ulgamyna oňyn täsir edýär, rahatlandyryjy serişde hasaplanýar, ganazlyga we spirtli içgilerden güýçi zäherlenmä häýyrlý.

Ülje gymmatbahaly azyklyk, tagamly we häýyrlý ösümlük. Ondan gaýtadan işläp hoşboý tagamly mürepbe, kompotlar, toşaplar, şerbetler we marinadlar taýýarlanylýar.

Bezeg, iýmitlik, witamin saklaýjy we bal beriji ösümlük.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Daragtyň 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp owradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 20 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3–4 gezek nahardan 30 minut ön 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli. Netijeli berkidiji serişde.

Üljäniň 2 nahar çemçe (30 g) miwe sapaklaryny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda, suw hammamynda 15 minut gaýnatmaly, bir sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 sapar 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan iýmişini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri ýatmazyň ön ýanynda ulanmaly.

Daragtyň şiresini we miwesiniň ýumşak etini günde nahardan soň 1/4 bulgurdan (50 ml) peýdalanmaly.

Owradylan täze ýapraklaryny tampon görnüşinde ulanmaly. Esasan, burundan gan gitmede ulanylýar.

Üljäniň iýmişiniň her günki iýmeli mukdary 20-ä çenli.



# LITWINOWYŇ ANISY

Бедренец Литвинова

*Pimpinella litvinovii*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Litwinowyn anisi – saýawanlylar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 35–65 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ösümligiň köki ýogyn, kök oýmajygy guran ýapraklaryň sapajyklarynyň gara-göňür reňkli galyndylary bilen örtülen. Baldaklarynyň sany birnäçe, dik, ortasyndan ýa-da tas esasyndan şahalanan, aşaky bölegi ýapragy bilen bilelikde gysga tüýlüne, ýokarsy ýalaňaç. Kökanyynyň ýapraklary köp sanly, ýönekeý per şekilli, süýrümlik, sapaklyja, ülüşlerine deň ýa-da uzynrak, uzynlygy 10–15 sm we ini 1–2 sm, 3–5 jübüt ýaýbaň ýumurtga şekilli ýa-da tas togalak ýapraklyja, uzynlygy 0,8–1,5 sm we tas şolar ýaly inli, olaryň gyalary çuň deň bolmadyk diş-dişli. Baldakdaky ýapraklary has ownuk, köp bolmadyk mukdarda, ýokarkylary ülüşleri redusirlenip, süýrümlik gynda ýerleşýär.

Saýawanlary tas 4–6 şöhleli, kese kesiminde gülleýän döwründe, takmynan, 1,5 sm. Gyny we gynjagazlary ýok. Saýawanjyklary 6–8 güllüje. Gül ýapraklary ak reňkli, arkasy ýalaňaç, ýokarsy birneme bükülen. Miweleri ýumurtga şekilli, uzynlygy 2,0 mm we ini 1,2 mm, inçe tüýlüne, yzyna

ýakyn ýeri tas ýalaňaç. Aşaky sütünjigi ýassyk şekilli, gülläp gutarandan soňra sütünjikleriniň uzynlygy takmynan 0,8 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Litwinowyn anisi ölkämizde deňiz derejesinden 1600–2800 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly we ownuk çagylyly demirgazyk eňňitlerde, ýapragyny düşürýän mezofil agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň arasynda, arçalyklarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–iýulda gülleýär, iýul–awgustda miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär, polikarpik.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Müsünewde, Hyrsderede, Heýrabatda, Çäyekde, Sibir guýusynda duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Litwinowyn anisi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ol Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Anisiň dermanlyk maksatlary üçin köki, oty we miweleri çig mal bolup hyzmat edýär. Ösümligiň kökünü ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny – gülleýän döwründe (iýun–iýul), miwelerini – hasylyň ýetişýän wagtynda ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerden taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz halta, otunyňkyny – mata halta, miwesiniňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Olary gury, garaňky, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Kökleriň we miweleriň saklanýş möhleti – 2–3, otlaryňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümligiň kökünde 0,6% efir ýagy; terpenoidler: 1,5-dimetilsiklodekatrien-1,5,7; kumarinler saklanýar. Ýerüsti böleginde – efir ýagy bar. Ýapraklarynda – 0,16% efir ýagy, kumarinler, 27% ýag (onuň düzüminde 52,8% petrozelin turşusy bar) saklanýar. Miwelerinde – 2–3% efir ýagy (6%-e çenli) (onuň düzüminiň takmynan 80–90% anetol, 10% metilhawikol, anis aldegid, anis ketony, anis turşusy we 8–28% ýag) bar.

**Peýdalanylyşy.** Anisiň dermanlyk häsiýetleri gadymy akyldarlar Feofrasta (b. e. öň 370–285-nji ýyllar), Dioskoride (b. e. I a.) we Kolumella (b. e. I a.) mälim bolupdyr. Ösümligiň ýakymly usly tohumyny gadymy wagtlarda hoşboýlyklary taýýarlamak üçin, iýmite jaz hökmünde goşulypdyr.

Orta asyrlaryň görnükli lukmany hem alymy Abu Aly inb Sinanyň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» eserinde ösümligiň melhemlik alamatlary barada söz açýlýar. Ol anisiň der çykarmaklygyny peseldýändigini, bagryň, dalagyň, böwrekleriň we ýatgynyň dykyn almasyny açýandygyny,

dem alyş ahwalyny ýeňilleşdirýändigini, jynsy işjeňligini ýokarlandyryandygyny belleýär. Meşhur tebib ony gulak we göz kesellerinde, ysytmada, kellagyryda, başaýlanmada, ujaklaryň (el-ayak) çişlerinde, şeýle-de sedatiw, süýt we peşew çykaryjy, awular bilen zäherlenilende hem zäherli mör-möjekler çakanda intoksikasion serişde hökmünde peýdalanmaklygy maslahat berýär.

Abu Reýhan Biruny hem özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly işinde bu otuň bagyr, böwrek, dalak, öt we peşew haltasynyň kesellerinde şypaly häsiýetlerini tassyklaýar.

Orta asyr tebib Muhammet Gaymaz Türkmeniň «Pygamber tebibçiligi» atly belli işinde anisiň dermanlyk häsiýetleri beýan edilýär. Ösümlik içdäki agyryny köşeşdirýär, ýellenmäni aýyrýar, aýbaşynyň we süýdň bol akmagyna täsir edýär, zyýanly zäherleri aýyrýar. Onuň gülünden taýýarlanylýan petini göze çalsaň görejiňi ýiteldýär.

Öz wagtynda meşhur lukman hem alym Muhammet Huseýniň «Melhemler hazynasy» atly düýpleýin diwanynda anisiň dermanlyk häsiýetleri ýatlanyp geçilýär «...anisi goýy materiýany ýakýar, gazlary sorup alýar we bugardýar, arassalaýar, agyryny köşeşdirýär, zäheriň garşysyna täsirli, berkidýär, peşewi, aýbaşyňy we çaga emdirýän enäniň süýdünü köpeldýär, derlediji täsir edýär, ýüzüň reňkini nurlandyrýar... Ony ysmaz, garaguş, ýüz nerwiniň ysmazy kesellileriň iýmitine jaz hökmünde goşulyp taýýarlanylýar».

Halk lukmançylygynda ösümliğin peti, esasan hem buýanyň köki bilen bilelikde gaýnadylany, kükrek kesellerinde, dem gysmada, bagryň, dalagyň, böwrekleriň, peşew haltasynyň we ýatgynyň dykyn almasynda, tultuklykda, dowamly ysytmada, melanholiýada we basyrganmada, aşgazandaky we bedeniň beýleki yerlerindäki gazlary aýyrmakda, jynsy işjeňligini we böwregi berkitmekde, şeýle-de der we peşew çykaryjy serişde hökmünde peýdalanlyýar. Ösümliğin tohumyndan taýýarlanylýan peti we jöwheri anasid gastritinde iç sürüji, der çykaryjy we gyzgyny peseldiji serişde hökmünde ulanylýar. Ol melhemlikler çaga emdirýän enäniň süýdünüň bölünip çykmasyňy güýçlendirýär.

Ösümliğin jöwherleri we şerbetleri dem alyş agzalarynyň kesellerinde – laringitlerde, traheitlerde, bronhitlerde, pnemoniýada, bronh demgysmasynda gakylyk goparyjy serişde hökmünde, şeýle-de, gastritde, böwrek-

daş kesellerinde, sözenekde, gaýtalanyň durýan bogun agyryda, reumatizmde, enurezde, iýmit siňdirişini, bagryň we aşgazanasty mäsleriň işini gowulandyrmak üçin peýdalanlyýar. Olar bokurdagyňy çaykamak arkaly anginada we çalmak bilen witaligoda (pisde) ulanylýar. Bulardan başga-da, diuretik, der çykaryjy, agyryny depediji, antiseptik we laktogen serişde hökmünde ulanylýar. Ol melhemlikler gipotenziv we damarlary giňeldiji häsiýetlere hem eýedir.

Türkmen halk lukmançylygynda (Gökdepe etrapynda) ösümliğin petine şeker goşup täze bolan çaganyň ýüzündäki sary reňkini aýyrmak üçin, täze şiresini – pigment meneklerini öçürmek üçin ulanylýar. Ösümliği çeynemek kellagyra, çakyza haýyryly, ol dem alyş ýollaryny arassalaýar we kükrekdäki yzany, üsgülewigi, demgysmany köşeşdirýär.

Ylmy lukmançylykda ösümliğin efir ýagynyň antibakterial we fungisid işjeňligi ýüze çykaryldy. Şeýle-de böwregi, mindalini, demgysmany, göz kesellerini, üsgülewügi, ýatgynyň boýunjagazynyň jaýrygyny berjemekde, respirator we dowamly laringitlerde gakylyk goparyjy serişde hökmünde peýdalanlyýar.

Ösümliğin hoşboý tagamynyň bolanlygy sebäpli, ony çöregе, süýji-köke önümlerine, souslara we jazlara goşýarlar..

Bezeg, iýmitlik we bal beriji ösümlik.

### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylan ownuk otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 15 minut gaýnatmaly. Otag temperaturasyna çenli sowatmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.

Anisiň 1 çay çemçe (5 g) guradylan tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda onuň agzyny ýapyp, gaýnag suwda suw hammamynda 15 minut gaýnatmaly. 45 minutyň dowamynda sowatmaly. Süzmeli, galan massany gysmaly. Jöwhere başlangyç göwrümindäki ýaly (200 ml) gaýnag suw goşmaly. Melhemi gün içinde nahardan 30 minut ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin 1 çay çemçe (5 g) guradylan tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 10 minut saklamaly. Hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan çayy iki gezekde içmeli. Ol çaga emdirýän eneler üçin peýdaly.

Anisiň tohumyny peýdalanmaklygyň gündelik mukdary 6,5-den 15,5 grama çenli.



# LITWINOWYŇ SÜMMÜLI

Гиацинт Литвинова  
*Hyacinthus litwinowii*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Litwinowýň sümmüli – sowsanlar maşgalasynyň sümmüller urugynyň boýy 15–25 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Soganlygy ýumurtga şekilli, gabarasy 2–4 sm, içi syýa reňkli perdeli, daşy çal-goňur kagyz kysmy bardajyk bilen örtülen. Baldagy 1–(2) bir soganlykly, tas 1/2-ne çenli toprakda ýerleşýär. Ýapraklarynyň sany – 3–(4), çyzykly-ujy çowlydan, süýrümtege çenli, tas elliptik, ini 1–4 sm, köplenç ujy çowly, ýiti ýa-da ýitiräk, tas gül toplumyndan geçýär, esasy yzygiderlilikde gysylýar, baldagynyň ýerüsti bölegi gurşap alýar, gyralary ownuk бүдүр-сүдүр kirpikli ýa-da tas ýylmanak.

Salkym şekilli gül toplumy 3–15-güllüje, birneme ýumşak. Gül sapajyklary kütüräk, gülyanyndan birnäçe gezek gysga, ýokarlygyna gönügen, miwede aşak egrelen. Gülyanjagazlary, gül sapajyklarynyň esasy jübüt, perdeli, reňkli, tas gül sapajyklaryna deň ýa-da ondan 2–3 esse gysga. Gülyany açyk-benewşe-mawy reňkli, uzynlygy

20–25 mm, inçe uzyn trubkaly, yzyna çyzykly-ujy çowly ýitiräk egrelen ülüşli towlanan, tas trubka deň. Tyçinkalary 1/2 trubkalara birigen, tozanjygy çyzykly-süýrümlik, tas gülyanynyň agzyna ýetýär. Her höwürtgede düwünçeği 3–4 tohum pyntyjakly. Gozajygynyň (örän ýaş) gabarasy, takmynan, 7 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Litwinowýň sümmüli ölkämizde deňiz derejesinden 800–1600 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly-çagyly, çagyly we daşly-çagyly eňňitlerde, hek daşlarynda, dürli reňkli topraklarda, gaýalaryň jaýryklarynda, agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň kölegelerinde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik mart–aprelde gülleýär, maýda miweleýär. Soganlykly polikarpik (ömründe birnäçe gezek tohum berýär). Sümmül tohumy we soganlyklary arkaly köpeliýär. Ol iýunyň ahyryndan fewral aralygynda dynçlyk ýagdaýynda bolýar.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Soňudagda, Bereketde, Serdarda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Parhaýda, Aýyderede, Tutlybilde, Ysakda, Garaolumda, Hozarda, Bartyňgädiği geçidinde; Merkezi Köpetdagda: Nohurda, Arwazda, Degirmenlide, Sülüklide, Mergenölende, Mürzedagda, Gylgylawda, Heýrabatda duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Litwinowýň sümmüli ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ony ekip ýetişdirmek ýola goýuldy. Aşgabadyň botanika bagynda ekilip ýetişdirilýär. Ol Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar. Ösümlik Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Sümmüliň soganlygy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Soganlygy ir baharda (mart) ýygnamaly, umumy kabul edilen usulyýet boýunça açyk howada teläriň aşagynda guratmaly hem taýýarlamaly. Çig maly mata haltalara gaplamaly. Ony gury, salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümliğin himiki düzümi barada maglumat yok.

**Peýdalanylyşy.** Türkmen milli tebipçiliginde hem halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplarynda) ösümliğin melhemlik çig maly ýa-da guwrunan soganlygy çykuwlarda, dokuzdonluda, başlarda, iriňli ýaralarda peýdalanylýar. Şiresi tüýüň ösmegine päsgel berýär, jynsy kämmillige haýyrlý, ýumurtgajyklaryň çişini dep edýär.

Bezeg, bal beriji we boýag ösümlik.

### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan soganlygyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 10 minut gaýnatmaly. 5 minutyň dowamynda sowatmaly, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 2 gezek (irden we agşam) ýapgy etmeli we zeperlenen ýerlerini ýuwmaly.

Sümmüliň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan soganlygyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 15 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan jowheri gün içinde 3 sapar nahardan 30 minut ön 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli. Şeýle-de ony ýapgydyr çalgý görnüşinde haýyrlansaň hem bolýar.

Täze şiresi deriniň sowuklamasyna we dokuzdonla ýapgy edilýär.

ownuk tüýjagazlar bilen örtülen, lupada görünýär, aşagy sakyzjymak-nokatly we köplenç damarlary ýumşak.

Gül toplumy baldagyň depesinde ýerleşýär, olaryň sany – 8–12, ýumşak, ýalan çogdam. Gülýanynyň ýapraklary tas sapaksyz, okarajygy giň, togalak, ini uzynlygyndan artyk, gysga depeli, uzynlygy 8–10 mm. Okarajygy miwelerinde ulalýar, gabarasy 10 mm çenli. Gültäji iri, uzynlygy 25–30 mm, egri tüýlçe, birneme gataňsy, sarymtyl, aşaky dodaklary gara-gyzyl reňkli, egri trubkaly, zygider giňelýär we soňra бүкүлýär, gabarasy 10 mm.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Litwinowyň tuwulgalyjasy ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol çagylyly we daşly eňňitlerde, seýrek topbajyklary emele getirip boý almagy halaýar. Ösümlik aprel–iýunda gülleýär, maý–awgustda miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Torgaýda, Margyzda, Oboýda, Jelilede; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Ysakda, Magtymguluda, Hasardagda, Süntde, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Sülükli deňizde. Endemik.

**Tebigy gory.** Litwinowyň tuwulgalyjasy ýurdu-myzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ujypsyzja. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Ösümlik Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň kökleri, oty, ýapraklary we gülleri dermanlyk çig maly bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny, ýapraklaryny we güllerini – ösümlik gülleýän döwründe (aprel–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde oňat ýel çekerli ýajda guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerden, otdan we ýapraklardan taýýar bolan çig mallary mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Olary gury hem garaňky ýerde saklamaly. Kökleriň saklanş möhleti – 2–3, otlaryňky, ýapraklaryňky we gülleriniňki – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Tuwulgalyjanyň köklerinde flavonoidler: 8% baýkalein, oroksilin A, oroksilozid, skutellarein, skutellarin, gispidulin, gispidulozid saklanýar. Ýapraklarynda efir ýagy (onuň düzüminde α-pinen, β-pinen, kamfen, sabein, osimen-χ, terpinolen, β-elemen, mentol, linalool), 7%-ine çenli skutellarin flavonoidler bar. Güllerinde efir ýagy (onuň düzüminde α-pinen, β-pinen, kamfen, sabinen, osimen-χ, terpinolen, β-elemen, mentol, linalool) saklanýar.

## **LITWINOWYŇ TUWULGALYJASY Шлемник Литвинова Scutellaria litwinowii**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Litwinowyň tuwulgalyjasy – dodakgüllüler maşgalasynyň tuwulgalyjalar urugynyň boýy 20–30 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Esasy agaçlaşan we şahalanan, dik köne ölmedik şahajykly. Gül saklaýan baldagy otjumak, ýönekeý, çal, örän köp ownuk gaty bolmadyk tüýlçe (gül toplumynyň ýokarsy egrelen, gaty tüýjagazly). Ýapraklary ýumurtga şekilli, bogun aralaryndan 2–4 esse gysga, çalymtyl-ýaşyl reňkli, gysga sapaklyja, ýokarkylary tas sapaksyz, esasy dilinen we gysga pahna şekilli, küteträk, kütäk dişlije, ýokarsy gaty bolmadyk



**Peýdalanylyşy.** Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly we Baharly etraplary) ösümligiň köklerini ysytmanyň, gyzyrmanyň garşysyna, sedatiw, diuretik, gamaşdyryjy, gemostatik, gakylyk goparyjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Kökleriniň peti tahikardiýada, ýürek kesellerinde, ganazlykda, garaguş keselinde ulanylýar. Oty garaguş keselinde, ysytmada, gyzyrmada, laringitde, ýürekbulanmada, dispepsiýada, aşgazan-içege bozulmalarynda; petleri — agyryny köşeşdiriji serişde; jöwheri — gipertoniki kesellerde, asitde, ýiti respirator ýokançlarynda, gany togtadyjy serişde hökmünde ulanylýar; şerbeti — ýokary arterial gan basyşynda, ýüregiň ritmini haýalladýar, az mukdarda ýüregiň ýygrylmasynyň amplitudasyny ýokarlandyrýar, köp mukdarda — peseldýär. Ösümligiň ýapraklarynyň we gülleriniň jöwheri, çäýlary burundan gan gitmede, dümewde, aşgazan-içege kesellerinde, ýiti rewmatizmde, gökbogmada, ýürek çalt uranda, ukusyzlykda, damar çekmede, umumy pugtalandyryjy we gyzgyny peseldiji serişde hökmünde neplenilýär.

Ylmy lukmançylykda ösümlikdäki flavonoidleriň jeminiň ekzemyň, sowuklamanyň garşysyna, gamaşdyryjy, antibakterial häsiýetleri ýüze çykarylady. Mundan başga-da, ösümligiň petiniň gipotenziv netijesi mälim edildi.

Bezeg, bal we perga beriji, ot-iymlik, boýag ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3—4 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Tuwulgalyjanyň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, az-kem goýmaly. Yzysüre süzmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 sapa nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan ýapraklaryny we güllerini 0,5-litrlik termos demlemeli, bir ýarym sagat goýmaly. Hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3—4 ýola nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Tuwulgalyjanyň 2 çäý çemçe (10 g) owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) 70%-li medisina spirtiniň içine atyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde bir hepde goýmaly. Yzygiderli çäýkamaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan şerbeti her gün 3 gezek 20—30 damjadan içmeli.

## **ЛÝОZЕЛИЊ KЕRTIKЛИСИ**

**Гулявник Лёзеля**

***Sisymbrium loeselii***



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Lýozeliň kertiklisi — atanakgüllüler maşgalasynyň kertikliler urugynyň boýy 30—100 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik göni, gödeňsi şahаланan baldakly, gaty we uzyn bulam-bujar tüýlüje (esasan aşaky bölegi), seýrek tas ýalaýaç. Ýapraklary lirogörnüşli we sürgüç şekilli per kysmy bölünen, örän uly, üçburçly-naýza pisint, deň bolmadyk, oýuk-iri dişlije, ýokarky üňşi gaty tüýlüje (esasan aşagy). Ýapraklary iri (uzynlygy 6—12 sm). Okara ýaprajyklarynyň uzynlygy 3—4 mm, sarymtyl reňkli.

Gül ýapraklary zyzykly-kepjeli, uzynlygy 5—7 mm, sary reňkli. Kürejigi ýalaňaç (seýrek tüýlüje), uzynlygy 20—30 (40) mm we ini takmynan 0,75 mm, tohumynyň garşysyna sähelçe бүкүлен, inçe egrenen sapaklyja, uzynlygy 7—8 (10) mm, ýokarlygyna kese gönügen. Tohumy sary-goňur reňkli, süýrүmtik, bir tarapy oýuk, uzynlygy takmynan 0,75—1,0 mm we ini 0,5 mm.

**Ýaşaýuş aýratynlygy.** Lýozeliň kertiklisi ölkämizde deňiz derejesinden 400—1600 metr belentlikde bitýär. Ol dag önüniň düzlüklerinde, jülgelerde, dag derýajyklaryň

kenarynda, ekinlerde we medeni oturymlardaky ekinzarlyklarda haşal ösüp boý almany halayar. Ösümlik aprel–iýunda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda; Kùrendagda: Serdarda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Ayydere jülgesi, Sumbar derýasynyň boýunda, Tãmil jülgesinde, Çendir derýasynyň boýunda; Merkezi Köpetdagda: Garaýalçyda, Arwazda, Sarymsaklyda, Degirmenlide, Sülüklide, Müsünewde, Mergenölende, Gylgylawda, Germapda, Heýrabatda, Çäýekde, Arçabilde, Uly Garaňkyda, Gökderede, Duşakerekdagda, Wanowskide, Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Babazawda, Dagyşda, Daştoýda, Birinjimaýda, Asylmada, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide, Guruhowdanda, Çyrlakda; Bathyzda: Serhetabatda; Köýtendagda; Etrek medeni oturymynda; Köpetdagetrek medeni oturymynda: Aşgabatda duşýar.

**Tebigy gory.** Lýozeliň kertiklisi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeliýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde haşal ösümliki hökmünde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Her ýylda 100 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyk mümkinçiligi bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny ösümlik gülleýän döwründe (aprel–maý), tohumyny – bişen wagtynda (iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, tohumynyňkyny – kagyz gutujyklara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Otunyň saklanyş möhleti – 1–2, tohumynyňky – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Kertikliniň düzümine gyzyrgyç we adaty ýaglar, glikozidler girýär. Onuň kökleri 0,42% organiki turşulary, 0,11% kardenolidleri; 0,02% alkaloidleri, C witamini, 4,5% eý maddalary, 0,28% tioglikozidleri saklaýar. Ösümliğin ýerüsti böleginde gelwetikozid kardenolidler, 0,01% alkaloidler bar. Baldaklarynda 0,03% alkaloidler, C witamin, ýapraklarynda 0,03% alkaloid-

ler, C witamin, karotin, 7,3% eý maddalar, flavonoidler: kwersetiniň glikozidleri, kempferol we izoramnetin, 0,04% gyzyrgyç ýagy saklanýar. Güllerinde 0,14% alkaloidler, C witamin, tohumynda steroidler:  $\beta$ -sitosterin; 0,17% kardenolidler, 0,003% alkaloidler, C witamin, 30,0–40,3% ýag, 130,5–143 ýod sany (onuň düzüminde turşular: 42,1–43,8% linolew, 12,1–14,1% erukow, 12,2–13,4% arahin, 6,2–7,4% olein, 5,9–6,1% tetrakozen, 5,1–5,7% eýkosen, 4,4–5,3% palmitin, 2,2–2,6% palmitolein, 2,0–2,3% eýkozadien, 0,9–1,2% stearin, 0,5–1,0% begenow), 0,25% tioglikozidler bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin otunyň peti we jöwheri ýürek-damar kesellerinde, garamükrüde, skrofulýozda peýdalanylýar. Tohumynyň peti, jöwheri we şerbeti gipotenziw hem-de ýylmajyý serişde hökmünde ulanylýar.

Tohumy ýag almak üçin çeşme bolup hyzmat etmegi mümkin, ol sabyn üçin hem ýaramly.

Durmuşda ösümliğin ýaşajyk pudaklary salaty we ysmanagy çalşyýjy, ýapraklary ajyterä surrogat hökmünde peýdalanylýar. Tohumy jaz we gyzyrgyç kysmy üçin ulanylýar.

Bezeg, azyklyk, mal beriji, ot-iýmlik we boýag ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1–2 nahar çemçe (15–30 g) guradylan tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 30 minut gaýnatmaly. Sowadyp, hasadan geçirmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Kertikliniň 1 çay çemçe (5 g) guradylyp owradylan otuny 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwa atyp, sowaýança goýmaly, yzysüre süzmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 gezek nahardan ön 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin owradylyp toz ýagdaýyna çenli getirilen tohumynyň 2 çay çemçesini (10 g) 1/2 bulgur (100 ml) medisina spirtiniň içine atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde bir hepde goýmaly. Birsyhly çäýkap durmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan şerbeti günde 3 ýola nahardan ýarym sagat ön 10 damjadan içmeli.



# MAMAMÇÖREK

## TEMENLIK

Журавельник мальвовидный

*Erodium malacoides*



**Häsiýeti.** Haýal derman ösümligi. Mamamçörek temenlik – geranlar maşgalasynyň temenlikler urugynyň boýy 20–45 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik ýumşak buýrally tüýlüne, ýokarsy gaty tüýlüne, käte baldagynda aýry-aýry çitenekli. Baldagy ýokaryk galýan. Ýapragynyň sudury ýumurtga şekilli, esasy ýürek kysmy, ýokarsy togalak, aşaklary uzyn sapakly, adaty, per şekilli iki-üç kepjeli, iri dişlije, seýrek gyralary abat.

Gül sapajyklarynyň uzynlygy okara ýaprajyklarynyňkydan 2–2,5 esse uzyn. Güllänyň ýaprajyklary köp sanly. Okarajygynyň uzynlygy 4–5 mm, miwelerde – 6 mm çenli, gysga uýy ýiti, gür mählije. Gül ýapraklary gülgünsowsany reňkli, uzynlygy 6–7 mm. Gynynyň uzynlygy takmynan 4 mm. Burunjygynyň uzynlygy 20–25 mm.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Mamamçörek temenlik ilkäimizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol gury ownuk topurly çagyly eňňitlerde, jülgelerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik aprel–maýda gülläýär, maý–iýunda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda duşýar.

**Tebigy gory.** Mamamçörek temenlik ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip etşdirmek maslahat berilýär. Haşal ösümlik hökmünde duş gelýär. Ösümlik Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty we ýapraklary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlik gülläýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Temenligiň düzümine flavonoidler: 3-ritinozido-4'-kempferol glikozid, 3-glýukozid, 3-rutinozid, 7-glýukozid, 4'-glýukozid we 3-rutinozido-4'-kwersetin glýukozid girýär. Onuň güllerinde antosianlar: 3-glýukozid we 3,5-malwidin diglýukozidi saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň peti we jöwheri içki gan gitmelerde, metrorragiýada, damar çekmede, dümew kesellerinde, pnemoniýada, plewritde peýdalanylýar. Mundan başga-da, diatezde, deri örgünlerinde ýuwmak arkaly ulanylýar. Ösümligiň ýapraklaryny gemostatiki serişde (tozy) hökmünde, çykwularda (haýwan ýagynda taýýarlanylýan merhemini) ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda temenligiň ýerüsti böleginden taýýarlanylýan şerbetiniň gemostatiki we merkezi nerw ulgamy we rahatlandyryjy täsirleri ýüze çykarylady. K witaminiň derman serişdeleri gemorragiýada ulanylýar.

Ýapraklarynyň tozy weterinariýada dürli mör-möjekleriň içinkalary tarapyndan emele gelýän ýaralarda sepgi hökmünde peýdalanylýar.

Bezeg ösümlik.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gyzgyn suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–6 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 watyna nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Temenligiň 2 çay çemçe (10 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 7–8 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3–4 gezek 3–4 nahar çemçeden (45–60 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) guradylyp owradylan ýapraklaryny 100 gram guýruk ýa-da örküç ýagy bilen garmaly, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 8 gün goýmaly. Yzygiderli bulap durmaly. Taýýar bolan merhemi günün dowamynda 2 sapar (irden hem agşam) deriniň zeperlenen ýerlerine çalmaly.

# МАÝМЫН ОРHИСИ

Ятрышник обезьяний

*Orchis simia*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Dadymy, owadan nepisje ösümligiň dünýäde 100, Türkmenistanda 4 görnüşi duşýar.

Maýmyn orhisi – orhideýalar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 20–30 sm ýetýän köpyýlyk otjumak wekili. Toprakdaky klubeni süýri, uzynlygy 2,0–2,5 sm, gabarasy 1,0–1,5 sm barabar. Ösümligiň baldagy beýik, aşaky bölegi ýaprakly, ýokarsy ýalaňaç. Ýapragy süýrümlik ýa-da ýumurtga şekilli-süýrümlik, uzynlygy 10–11 sm, ini 3,0–3,5 sm, ýitileşen ýa-da tas kütek.

Gülyany has gür, süýri ýa-da süýrümlik, uzynlygy 5 (8) sm. Güljanjagazlary perdeli, dik durup gysarylan, uýy çowly, uzyn-ince ýitileşen, düwünçeginden görnetin gysga. Gülleri symgylt-mämişi reňkli. Güljanynyň ýaprajyklary esasynda bitişen, ýumurtga şekilli-uýy çowly, ýiti ýa-da ýitileşen, tuwulga kysmy-çylşyrymlaşan, uzynlygy 12 mm, içki çyzykly, ýalaňaç. Dodaklary tuwulgasyndan uzynrak, uzynlygy 1,8 sm, esasyynyň ýany açyk-goýy gyrgyzy reňkli, owunjak goýy gyrgyzy reňkli gatyja emzijekli, çuň üç bölünen. Gapdal kepjeleri inçe çyzykly, egrelen, çykyp

duran, gara-gyzyl reňkli. Ortakylary süýrümlik-çyzykly, kepjeleri çuň iki bölünen, uzyn inçe çyzykly, goýy gyrgyzy ülüşli, gapdal kepjelerine deň, özaralarynda şine görnüşli dişjagazly. Ösüntgisi ak reňkli, gysga silindrik, kütek, sähelçe halta görnüşli-çişik, düwünçeginden iki esse gysga.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Maýmyn orhisi ölkämizde deňiz derejesinden 800–1600 metr belentlikde bitýär. Ol guzaý (garaňky) we çygly eňňitlerde, agaç we gyrgyzy ağaçlaryň arasynda ösüp boý almany halaýar. Çygý halaýan kserofit. Ösümlik aprel–maýda gülleýär hem miweleýär. Mör-möjekler arkaly tozanlanýar. Ol tohumy bilen köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda, Altybaýda, Süntde, Porderede; Merkezi Köpetdagda: Garawulda duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Maýmyn orhisi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümligi Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň dermanlyk maksatlary üçin klubenkökleri çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada ýa-da oňat ýel çekýän jaýda galyň matanyň üstünde umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Gazylp alnan klubenkökleri arassalamaly, ýuwmaly we guratmaly. Taýýar bolan çig mallary mata ýa-da kagyz haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Klubenkökleriň saklanyş möhleti – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Maýmyn orhisiniň himiki düzüminiň derňewi doly geçirilmedik. Onuň klubenkökleri köp mukdarda nem maddalaryny, takmynan 50%; 30%-e çenli krahmal; uglewodlary, pektin maddalaryny, mineral duzlary, efir ýagyny saklaýar.

**Peýdalanylyşy.** Görnükli ensiklopedist alym Abu Reýhan Biruny özüniň meşhur «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly işinde ösümligiň melhemlik häsiýetlerini beýan edýär. Ony bagyr, aşgazanyň we on iki barmak içegäniň başly kesellerini we ganly içgeçmäni bejermek üçin peýdalanmaklygy maslahat berýär.

Halk lukmançylygynda ösümligiň guradylan klubenini aşgazan-ičege kesellerinde, zäherlenmede, gastritde, kolitde, aşgazanýň we on iki barmak içegäniň başlarynda, şeýlede ýylmaýjy, ýumşadyjy, umumy berkidiji, sowuklamanyň garşysyna serişde hökmünde peýdalanylýar.

Türkmen milli tibbiýetinde hem halk lukmançylygyny (Magtymguly etrabynyň daglyk obalarynda) ösümligiň



klunenköklerini nemlerini ÝRK-da, dümew kesellerinde, birnäçe zäherlenmelerde; içini ýuwm (klizm) görnüşinde – babasylda ulanylýar.

Ösümligiň guradylan klublenlerini (salep) şeýle hem weterinariýada haýwanlaryň içegesiniň katarynda peýdalanylýar.

Bezeg, krahmal saklaýjy we boýag ösümligi.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) guradylyp owradylan klubenköklerini 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 10 minut gaýnatmaly, yzygiderli bulap durmaly. Soňra sowadyp süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyňa 1 nahar çemçeden içmeli.

Maýmyn orhisiniň 1 çay çemçe (5 g) guradylyp maýdalanan köklerini ýarym bulgur (100 ml) sowuk suwa atyp bulamaly, soňra birsydyrgyn goýy suwuklyk bolýança onuň üstüne 2 bulgur (400 ml) gaýnag suw guýmaly. Häzir bolan nemi gün içinde nahardan ön 3 ýola 1–2 nahar çemçeden (15–30 ml) kabul etmeli. İçini ýuwmak üçin nemiň 1/4 bulgury (50 ml) ýeterlik, ýöne ony peýdalanyljak wagtyň ön ýanynda taýýarlamaly.

## **MEÝDAN GYZYRGYJY**

**Горчица полевая**

**Sinapis arvensis**



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Giň ýaýran ösümligiň dänýäde 10, Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Meýdan gyzzyrgyjy – atanakgüllüler maşgalasynyň gyzzyrgyjylar urugynyň boýy 30–60 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Baldagy şahalanan, gödeňsi, bol gaty bulam-bujar tüýjagazly, esasy köplenç gögümtil reňkli. Aşaky ýapraklary lirogörnüşli per şekilli bölünen, ýokarky

ülşi kütek, süýri, gyalary deň bolmadyk, kepjesine çenli oýuk dişlije, gapdal ülüşleri ululygy boýunça kiçi, ujy çowly, her tarapynda 3–4-den ýerleşýär. Ýokarky ýapraklary süýrümlik, sapaksyz, dişlije.

Okara ýapraklarynyň uzynlygy 4–5 mm, süýrümlik. Gül ýapraklarynyň uzynlygy 7,5–9,5 mm, sarymtyl reňkli, ýokarsy ters ýumurtga şekilli, aşaklygyna gysylan dýrnaklyja. Kürejigi silindrik, gysylan gysga gaty tüýlçe, uzynlygy 25–40 mm we ini 2,5–3,5 mm, gowşak dügürlü, ýokarlygyna gönügen gysylan konik burunjygynyň uzynlygy 10–15 mm, ahyrynda özüniň esasynda 1–2 tohumy emele getirýär, sapaklyja, has ýognan, ýokaryk gapdallygyna gönügen, uzynlygy 3–5 mm. Gabsasy 3–5 damarly. Tohumy şar şekilli, ululygy 2,0–1,5 mm, gara ýa-da goňur reňkli, ownuk, çukurly.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Haşal ösmäni halaýar, medeni oturumlarda, dagöňüniň we dageteginiň düzlüklerinde seýrek duşýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär hem miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda; Kürendagda; Soňudagda, Isgenderde, Serdarda; Merkezi Köpetdagda; Duşakerekdagda; Gündogar Köpetdagda; Guruhowdanda, Şamlyda; Bathyzda; Serhetabatda; Köytendagda; Köpetdagetek medeni oturymynda; Akdepede; Amyderýa medeni oturymynda; Daşoguz medeni oturymynda: Daşoguzda duşýar.

**Tebigy gory.** Meýdan gyzzyrgyjy ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Haşal ösümligi hökmünde duşýar. Her ýylda takmynan 5–10 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň bişen tohumlary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly bişen wagtynda (iýun) ýygnamaly, onuň üçin ýokarky miwe getirýän bölegini gyrkyp almaly. Olary günüň aşagynda ýa-da oňat ýel çekerli jaýda umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Häzir bolan çig mal yssyz, otgür we gyzzyrgyjy tagamly. Ony mata haltalara, kagyz gutujyklara we agzy ykjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Çig maly gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde, oňat ýel çekerli jaýda saklamaly. Möhleti – 3–4 ýyl.

**Himiki düzümi.** Gyzzyrgyjyň ýapraklarynda 1,69 mg% karotin, 16 mg% askorbin turşusy, kalsiniň we demiriň duzlary saklanýar. Ösümligiň tohumynda gara-sary reňkli ýakymly ysly we özboluşly ajymtyk tagamly häsiýete eýe bolan, (onuň düzüminde 52,5% erukow, 28% olenin, 14,5% linolew, 2% palmetin, 1% arahin, 1% linolen turşulary)

gyzzyrgyç ýagy; 0,5–1,7% efir ýagy, 20% belok maddalar, 20% nemler, mirozininiň enzimatiki toplumu, sinallbin we çinigrin glikozidler bar. Şeýle-de allilgyzzyrgyç ýagyny we turşy kükürt turşy kalini saklaýar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümliğin dermanlyk häsiýetleri irki wagtlardan mälüm bolupdyr. Ol baradaky ilkinji maglumatlar Warronyň (b.e.öň 116–27-nji ýylar), Kolumellanyň (b.e. I asyry), Korneliýa Selsiň (b.e. I asyry) işlerinde duş gelýär. Gadymy grekler gyzzyrgyç otuny, göz ýaşyny çykarýan, hasrata eltýän, ýakýan ösümlik diýip hasaplapdyrlar. Gyzzyrgyjyň tohumyny hindiler we grekler hem-de Gadymy sümerler gadymyýetden bäri naharlara hoşboý tagam berýän serişde hökmünde ulanypdyrlar.

Gülleriň dilinde ösümliğin ady parhy ýok diýen manyny aňladýar.

Öz wagtynda belli alym-lukman Seyit Ysmaýyl Gürgenli (Jürjany) özüniň «Horezm şanyň genji-hazynasy» diýen düýpleýin diwanynda, ösümlik ýadyňy dikeldýär diýip ýazýar.

Orta asyrlarda ýaşap geçen görnükli lukman Muhammet Gaýmaz Türkmen özüniň «Pygamber tebigçiligi» atly belli eserinde, ony beýnidäki dykyn alan ýerleri açmakda peýdalanmaklygy ündeyär.

Meşhur lukman Muhammet Huseýn «Melhemler hazynasy» atly işinde gyzzyrgyjyň melhemlik häsiýetlerini şeýle alamatlandyrýar: «...gyzzyrgyç bedeni arassalaýar, organizmden ýaramaz galyndylary kowýar, iýmitiň özleşmegine ýardam berýär, işdäni we dykyn almalary açýar, kellagyr, beýnä we dümewe haýyrlý, toplanan gazlary çykarmaga we bugartmaga nepli, ysmaza peýdaly. Ol huşy we akly ýitileşdirýär. Gyzzyrgyjyň ýaramaz täsirlerini aýyrmak üçin oňa az-kem sirke goşmaly».

Halk lukmançylygynda gyzzyrgyjy damarlaryň sklerozynda, gipertoniýada, bagryň we öt haltasynyň kesellerinde, iýmit siňdiriş bozulmalarynda, meteorizmde, reumatizmde, ekzemada, agyryny dep ediji serişde hökmünde (hususan-da güýçli diş agyryda) peýdalanylýar. Onuň ary baly bilen garylan garyndysy öt sanjysynda we bronhitlerde ulanylýar.

Ösümliğin tohumyndan taýýarlanylýan tozy gyzzyrgyjy serişde hökmünde bellidir, ol ganyň akmaklygyny güýçlendirýär. Ol suwa düşmekde we gyzzyrgyçlar taýýarlamakda peýdalanylýar. Gyzzyrgyjy kükrege we ýeňsä ýapylýar, bu gipertoniki krizisde, stenokardiýada nepli. Ony döş kapasasyna öýkeniň sowuklamasynda, newralgiýada we myşsa yzalarynda agyryly ýerlere ýapmaly. Ýöne gyzzyrgyçlary böwrek sowuklamasy, öýken inçekeseli,

wenalaryň warikoz giňelmesi bolanlara peýdalanmak maslahat berilmeýär.

Türkmen halk lukmançylygynda (Baharly we Gökdepe etraplary) ösümliğin mäjumlanan tohumyny ysytmada, ary baly bilen garylan garyndysyny ýokarky dem alyş ýollarynyň kesellerinde, bronh demgysmasynda, üsgülewükde peýdalanylýar. Gyzzyrgyç bilen injir garylan garyndyny limfatik gelip çykyşly könelişen gaty çişleri sorup aýyrmak üçin ýapgy edilýär. Gaýtalap durýan bogun agyryda, işiasda, saçyň düşmesinde oňa suwa düşülýär. Gyzzyrgyç şeýle-de plastyrlaryň düzümine girýär, ol döwlen ýerlere we deriniň yzyna ýapylýar. Iýmite goşulanda has agyr we kynlyk bilen siňýän iýmitleri özleşdirmäge ýardam berýär.

Ylmy lukmançylykda gyzzyrgyç ýa-da gyzzyrgyjyň efir ýagy bilen çalyň, ýerli gyjyndyryjy we ünsüni sowujy serişde hökmünde sowuklama kesellerini, bronhitleri, plewritleri, bronhopnewmoniyany, miozitetleri, newritleri, reumatizmi, radikulitleri bejermekde giňden ulanylýar.

Gyzzyrgyç künjarasy düzüminde 3–5% fitini saklaýar. Fitin damarly gipertoniýada, newrasteniýada, işdä kesilende, rahatde, diatezde, skrofulyozda, jynsy gowşaklykda haýyrlanylýar.

Gomeopatiýada ösümliğin ýerüsti bölegi peýdalanylýar.

Gyzzyrgyjyň efir ýagy çörek, köke-süýji, guta basmak, parfümer-kosmetik, sabyn çykarmak, dokma we farmasewtiki senagatlarynda ulanylýar.

Ösümlikde örän ýokary tagamlygynyň häsiýeti bolanlygy sebäpli, ol jaz görnüşinde kulinariýada peýdalanylýar. Gündogar aşhanasynda ol işdäaçarlar, gaýnatmalara, nohutly, kösükli, noýbaly we etli tagamlara goşulýan serişdedir.

Bezeg, azyklyk, bal beriji we tehniki ösümlik.

### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylýşy:**

Ösümliğin 2 gram gury owradylan tohumyny 1/2 bulgur (100 ml) medisina spirtiniň içine atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün goýmaly. Yzygiderli çaykyp durmaly. Taýýar bolan şerbeti her gün 2–3 damjadan kabul etmeli.

Gyzzyrgyjyň 1 çay çemçe (5 g) gury mäjumlanan tohumyny 100 gram ary baly bilen garyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde bir hepde goýmaly. Birsyhly bulap durmaly. Häzir bolan garyndyny gün içinde 3 gezek nahardan soň 1 çay çemçeden (5 g) peýdalanmaly. Aşgazanyň nemli bardasynyň gyjynylygyny çäklendirmäge haýyrlý.



Ösümligiň tohumynyň tozunyň we kamforanyň 50 gramyny 2 çay çemçe (10 ml) medisina spirtine atmaly, soňra oňa 1 çig ýumurtganyň agyny garmaly. Olary bilelikde garyşdyrmaly, taýýar bolan merhemi agyryly ýerleriňe ýapmaly, ýöne çalmaly däl. Ýarym sagatdan, öl ýumşak kagyz bilen süpürp aýrmaly.

Gyzzyrgyjyň 1 çay çemçe (5 g) tozuny 2 nahar çemçe (30 g) ary baly bilen garmaly, soňra onuň üstüne sowsanyň güllerinden taýýarlanylýan 1/2 bulgur (100 ml) peti guýmaly. Häzir bolan garyndy örgünleri aýrmak üçin çalynýar.

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) tozuny 1,5 bulgur (300 ml) ýyly suwa atyp garyşdyrmaly. Emele gelen gyzzyrgyç kompressoryny 10–15 minut agyryly ýerleriňe goýmaly. Çagalar üçin 5–10 minut (gatnaşygy: 5 gram toz we 200 ml suw).

400 gram toza kaşa şekilli massa bolýança gaýnag suw guýmaly. Garyndy wannada ýyly suwda ereýär, ony 5 minutdan artyk ulanmaly däl.

Her günde gyzzyrgyjyň 5 grama çenli mäjumlanan tohumyny iýmeli, abadyndan, mäjumlanmadygyndan – 10 grama çenlisini haýyrlanmaly.

## MEÝDAN ÝEMŞIK

### Ярутка полевая

### *Thlaspi arvense*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Dünýäde 60-dan gowrak, Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelyär.

Meýdan ýemşik – atanakgüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 15–30 sm ýetýän birýyllyk otumak wekili. Ösümligiň baldagy ýalaňaç. Kökanyňnyň ýapraklary süňmek-ters ýumurtga şekilli, aşaky baldakdakylary süýrümlik, sapakly. Ýokarky baldakdakylary ýapraklary süýrümlik-ujy çowly, esasy peýkan kysmy (ýiti gulaklyja), sapaksyz.

Gül salkymy gysga, saýawan şekilli. Okara ýaprajyklary ýalaňaç, süýrümlik, uzynlygy 4–5 mm. Gül ýapraklary ak reňkli, süýrümlik-ters ýumurtga şekilli, uzynlygy 5–7 mm. Kürejikleriniň ululygy 10–15 mm, gysga we ýaybaň süýri, gapdalyndan gysylan, gyalary giň radial-inçe damarly ganatlyja, ýokarsynda çuň inçe oýukda gysga sütünjik ýerleşýär, köp tohumly, sapajygynyň uzynlygy 8–10 mm, tas keseligine eglen. Tohumy gysga süýrümlik, gysylan, gapdallary deň däl, gara-açyk gülgün reňkli, has gara çenli, ýag şekilli konsentrik gasyňlyja.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Meýdan ýemşik ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol çeşmeli jülgerlerde, çagyly ownuk topurly-çemenzarlyk topraklarda, seýrek haşal ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýulda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Hyzderede, Tagarawda, Çäyekte, Semansurda, Çopandagda, Arçabilde, Uly Garaňkyda, Lujüde; Gündogar Köpetdagda; Bathyzda; Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Meýdan ýemşik ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ujypsyzja. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Ol Köpetdag, Bathyz we Köýtendag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun), tohumyny – bişen wagtynda (iýul) ygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, tohumynyňkyny – kagyz gutujyklara ýa-da agzy ykjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Otuň saklanyş möhleti – 1–2, tohumynyňky – 3–4 ýyl.

**Himiki düzümi.** Meýdan ýemşigiň köklerinde C witamin saklanýar. Ösümligiň ýerüsti böleginde C witamin, flavonoidler: kwersetiniň we kempferolyň glikozidleri, allilizotiosianat gyzzyrgyç ýag, tioglikozidler: sinigrin, glükokapparin bar. Baldaklarynda saponinler, C witamini saklanýar. Ýapraklarynda saponinler, alkaloidler, C witamin,

flawonoidler saklanýar. Güllerinde saponinler, flawonopidler, miwelerinde alkaloidler, C witamin, karotin bar. Tohumynda 20–33% ýag, 111,5–148,0 ýod sanlary (onuň düzüminde: 28,6–29,3% erukow, 18,76% linolew, 11,8–12,9% tetrakozen, 11,1–11,2% linolen, 7,6–8,5% eýkozen, 8,0–8,1% olein, 4,0–4,5% arahin, 3,9–4,0% eýkoadien, 1,5–1,9% palmitin, 0,8–1,1% palmitolein, 0,1–0,2% stearin); 0,84–1,04% gyzzyrgyç ýagy; tioglukozidler: 1,4% sinigrin turşular, glýukokapparin, allilizotiosiant izotiosiantlar bar.

**Peýdalanylyşy.** Gündogaryň meşhur alymy hem tebigaty synag edijisi Abu Reýhan Biruny «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly düýpleýin ensiklopediýasynda ösümligiň dermanlyk häsiýetleri barasynda mälim edýär.

Halk lukmançylygynda meýdan ýemşigini otuny garamükrüniň garşysyna, diuretik, jynsy hyjuwy güýçlendiriji, abortiw, gamaşdyryjy, gemostatik, antibakterial serişde hökmünde ulanylýar. Mundan başga-da, skarlatinede bokurdagyňy çätkamakda, iriňli başlary ýuwmakda haýyrlanylýar. Ýerüsti böleginiň şiresi siňňilde, uretitde ulanylýar. Tohumy ýokanç kesellerinde, hususan-da mergide, sibir başynda, şeýle-de ysytmada, meteorizmde, guragyryda, işiasda, intoksiýasiýa, gyzyndyryjy we gemostatiki serişde hökmünde peýdalanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Baharly, Gökdepe we Köýtendag etraplary) ösümligiň oty zenan kesellerinde, hususan-da ýumurtgajyklaryň sowuklamasynda, ýatgynyň howply täze döremelerinde haýyrlanylýar. Ýapraklary garamükrüniň garşysyna we gamaşdyryjy serişde hökmünde neplenilýär. Olar iriňli ýaralarda hem peýdalanylýar.

Tohumynyň ýagy tehniki we azyklyk maksatlary üçin peýdalanylýar. Durmuşda ýapragy aşlary we işdäçarlary taýýarlamaklyga ýaramly.

Bezeg, azyklyk, bal beriji we tehniki ösümlik.

**Derman taýýarlanlyşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owardylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 5–7 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 sapa nahardan öň 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Ýemşigini 2 nahar çemçe (30 g) gury otuny 0,5-litrlik termosda demlemeli, birneme goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3–4 gezek nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli. Şeýle-de oňa agyz boşlugyňy we bokurdagyňy çätkamaly.

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) mäjumlanan tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 30–40 minut

goýmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 wagtyna 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

## MEÝDAN ÝYLANÇÖPI

Воробейник полевой

*Lithospermum arvense*



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Meýdan ýylançöpi – buraçnikler maşgalasynyň ýylançöpler urugynyň boýy 15–30 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik gür gysylan gaty çitenecli tüýjagazlar bilen örtülen. Baldagy göni, köp bölegi ýekeleşýin, adatyça, ýokarlygyna ýaýraň şahalanan. Kökýanyň ýapraklary gysga kepjeli, sapakly. Sapagynyň uzynlygy 2–5 (10) mm. Üşüniň uzynlygy 10–15 mm we ini 2–3 mm. Baldakdaky ýapraklary ujy çowly ýa-da süýrümlik-çyzykly, uzynlygy 15–30 mm we ini 2–4 (6) mm. Ýokarky ýapraklary sapaksyz, sähelçe irimçik.

Gülleriniň çogdamlary gysga, miwelerinde has süýnen, güçli hereket edýän okarajykly. Güňanjyklary, köplenç, okarajykdan uzynrak. Sapajyklary miwede örän gysga, kütüleşmedik ýa-da tas ýognamadyk, käte koniki kütüleşen. Gültäji agymtyl-sary reňkli, köplenç gök-syýa ýa-da mawumtyl reňkli, onuň trubkasy gaty tüýlüne, okarajykdan gysga, uzynlygy 5–6 mm, agzy kese gasynly. Hozjagazy



göni, gasyňly-iri joýaly, görünýän, gapdaly ýepbeşik, gysga depeli, çal reňkli, boýy 2–4 mm, gapdalyndan sähelçe görünýän kebzelije.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Meýdan ýylançöpi ölkämizde hapa-haşal ýerlerde we medeni oturumlarda, daglaryň daşy eňňitlerinde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik aprel–maýda gülleýär, maý–iýunda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Süntde, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Degirmenlide, Sülüklide, Arçabilde, Giňdiwarda, Newtonowskide, Howdanda; Bathyzda; Köýtendagda; Hazarýaka çölünde: Türkmenbaşyda; Köpetdagetäk medeni oturymynda: Aşgabatda duşýar.

**Dermanlyk çig maly.** Meýdan ýylançöpi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Her ýylda çig maldan 4–6 tonnadan gowrak ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny ösümlik gülleýän döwründe (aprel–maý), miwelerini – bişýän wagtynda (maý–iýun) ýygnamaly, olary teläriň aşagynda galyň matanyň ýa-da kagyzyň üstünde oňat ýel çekerli ýajda umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýarlanylýan çig maly mata haltalara, miwesiniňkini – kagyz haltalara we gutujyklara ýa-da agzy mäkäm ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, garaňky ýerde saklamaly. Otunyň saklanyş möhleti – 1–2, miwesiniňkini – 3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Meýdan ýylançöpüň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine mineral maddalar (50% çenli) girýär, olaryň içinde kalsiý duzlary we kremniý turşusy adgyklyk edýär.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin peti we jowheri böwrek, peşew haltasynyň we peşew çykaryjy ýollarynyň, peşew-daş kesellerinde, peşew çykaryjy, sedativ serişde hökmünde peýdalanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly, Gökdepe we Köýtendag etraplarynda) ösümliğin miwelerini böwrekdäki, öt we peşew haltasyndaky daşlary dep etmekde ulanylýar.

Bezeg, azyklyk we boýag ösümlik.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–7 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli.

Taýýar bolan peti her gün 3 gezek nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Ýylançöpüň 2 çay çemçe (10 g) guradylan oty bilen tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan jowheri gün içinde 3–4 sapa 2 nahar çemçeden (30 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) gury miwelerini 0,5-litrlik termosda demlemeli, 30 minut goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jowheri günde 3 ýola nahardan öň 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

## MEÝERIŇ ÝYLGYNY

Гребенщик Мейера

Tamarix meyeri



**Häsiyeti.** Etek şorluk derman ösümliği. Meýeriň ýylgyny – ýylgynlar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 3–4 metre ýetýän gyrymsy agaç wekili. Daragtyň sütüniň gabygy goňrumtyl-çal ýa-da çal reňkli. Ýapragy uýy çowly-çyzykly ýa-da çyzykly, kütegräk, uzynlygy 1,0–4,5 mm we ini 0,2–1,0 mm, esasy tas ýürek şekilli, giňelen, baldaga ýarysy birleşen. Salkymy gapdallaýyn, uzyn, uzynlygy 5–13 (15) sm we ini 4–8 mm, gür. Gül palajy uzyn – 0,5–4,0 sm, esasy süýrüntik, kütek teňňejikler bilen örtülen.

171

Gülýanjagazlary giň zyzykly, ýitiräk, uzynlygy 3–5 mm we ini 0,5–0,7 mm, esasy sähelçe giňän, gültäjäne deň ýa-da käte ondan uzynrak, egreden.

Güljagazlary dört-(seýrek baş-) agzaly. Okarajygy ýumurtga şekilli-ujy çowly, gyralary perdeli, kütegräk ülüşli. Gül ýapraklary gülgün ýa-da symgylt-gülgün (seýrek ak) reňkli, süýrümlik, uzynlygy 3–4 mm we ini 1,5 mm, okarajykdan 1/3 uzynrak, kütek, gýşaran, tas gaçýan. Tyçinkasynyň sany – 4 (seýrek 5–6). Diski dört-(seýrek baş-alty-) burçly, özüniň burçlaryny giň esasy sapajyklara berkleşdiren, gültäji deň ýa-da birneme ulurak. Tozanjyklary ýiti. Sütünjikleriniň sany – 4, gültäjinden 2,5–3 esse gysga. Gozajygynyň uzynlygy 5–7 mm, okarajykdan 2,5 esse uzynrak.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Meýeriň ýylgyny ölkämizde derýalaryň, kölleriniň, suw howdanlaryň, deňizleriň kenarynda, şorluklarda we şorlaşan topraklarda, seýrek jülgeleriň dageteki düzlüklerinde ösüp boý almany halayar. Daragt aprel–maýda gülleýär, maý–iýunda miweleýär. Ol wegetatiw ýoly arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda: Mollagarda; Kürendagda: Torgaýda, Duzlyolumda; Gündogar Köpetdagda: Guruhowdanda, Çyrlakda; Bathyzda: Pulhatynda, Daşköprüde, Şeýhpransurda, Tereşekde, Serhetabatda, Serhetçide, Galaýmorda; Hazarýaka çölünde: Çatda, Etrekde; Merkezi Garagumda: Esendiňli guýusynda; Günorta-Gündogar Garagumda: Kelteşor guýusynda, Uzunsuwda, Gumçaý guýusynyň golaýynda, Kelif Uzboýynda, Peteli guýusynda; Sandykly çölünde; Köpetdageteki medeni oturymynda: Arçmanda, Gökdepede, Aşgabatda, Gäwersde; Tejen-Murgap medeni oturymynda: Ymambabada, Tejende, Maryda, Dörtguýuda, Sandykgaçyda, Saryýazyda, Ýölötende; Amyderýa medeni oturymynda: Türkmenabatda duşýar.

**Tebigy gory.** Meýeriň ýylgyny ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

**Dermanlyk çig maly.** Daragtyň ýapraklary, gülleri we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Ýapraklaryny we gülleriň ösümlik gülleýän döwründe (aprel–maý), miwelerini – bişen wagtynda (maý–iýun) ygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklaryndan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleridir miwelerini – kagyz haltalara, şeýle-de agzy berk ýapylýan aýna gaplar gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Ýapraklaryň we gülleriň saklanýş möhleti – 1–2, miweleriniňki – 3 ýyla çenli.

**Himiki düzümi.** Meýeriň ýylgynyň himiki düzüminiň derňewi doly geçirilmedik. Onuň ýaşyl şahajyklary 1,35–1,87% eý maddalaryny saklaýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin gabygy protistosid, dürli gan akmalarda gamaşdyryjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Onuň ýapraklaryny dalak kesellerinde rewmatizmde, merezýelde; gülleri – sarygetirmede, miwelerini – jynsy gowşaklykda, erkek we aýal önelgesizliginde ulanylýar.

Gyrymsynyň dürli bölekleri tokaý guruluşyk senagatynda (baldaklary), mebelde (agajy), boýagçylykda (gök şahajyklary) peýdalanylýar. Onuň gök şahajyklary bilen göni gara goýy we açyk gyzyl reňke boýaýarlar.

Bezeg, bal we nektar beriji, boýag, eýleýji hem çäganä berkidiji ösümlik.

### Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10–15 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Ýylgynyň 2 çay çemçe (10 g) guradylan gülleri 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suwa atyp, birsalym goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 sapa 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

## NARGYZ

### Штернбергия желтая Sternbergia lutea



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliki. Özboluşly aýratynlyga eýe bolan, owadan otjumagyň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Nargyz – nargyzgüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 10–20 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili.



Soganlygy ýumurtga şekilli, galyňlygy 4–5 sm, kagyz şekilli gara-goňur reňkli barda bilen örtülen, baldagyny ýokary derejede gurşap alýar. Baldagy gysylan, dogry däl üç gyraňly, esasy ýapragy bilen bilelikde ýapraksyz gyn bilen gaplanan. Ýapraklary ýaýbaň çyzykly, ini 8–10 mm, kütek, sähelçe garşy şekilli, güllemekligiň ahrynda ýüze çykýar. Gabygy perde şekilli, gülden 1,5 esse gysga. Gülýanyň uzynlygy takmynan 5 sm, ýaprajyklary bilen egrelen, kütek, trubkadan 1,5–2 esse gysga, içkileri ters süýrüntik-ýumurtga şekilli, 1,5 esse giň. Gülýanyň ýaprajyklaryndan içki hataryň tyçinkalary 1,5 esse, daşky hataryňky 2 esse gysga, tozanjyklary çyzykly-süýrüntik, uzynlygy 5–7 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Nargyz ölkämizde deňiz derejesinden 800–1600 metr belentlikde bitýär. Ol çagylyly we çagylyly-ownuk topurly eňňitlerde gyrymsy agaçlaryň arasynda, seýrek bolmadyk ýagdaýlarda, bitýän ýerlerinde topbajyklary emele getirip boý almagy halaýar. Soganlykly, birgüllü ösümlik. Gülleri açyk sary reňkli. Ösümlik sentýabr–oktyabrda gülleýär. Gülleriniň steriligi üçin tohum emele getirmeýär. Ol soganlygy arkaly köpeliýär. Bütün gys ýapraklary guraman göklüğine saklanýar.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Sumbardaky Duzlydepede, Ysakda we Parhaýdan Sünt-Hasardagyň germewünden tä Aýyderä çenli aralykda duşýar.

**Tebigy gory.** Nargyz ýurdumyzdaky seýrek ot-çöp-leriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ujypsyzja. Ösümlik Aşgabadyň botanika bagynda, Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynyň tejribe meýdançalarynda ekip ýetişdirilýär. Ösümlik Sünt-Hasardag goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin soganlygy we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Soganlygyny ir baharda (mart), güllerini – ösümlik gülleýän döwründe (sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da kagzyň üstünde oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Soganlykdan taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara, güllerini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Olary gury hem salkyn ýerde saklamaly. Soganlygyň saklanyş möhleti – 2–3, güllerini – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Nargzyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin soganlygy uglewodlary we C witamini saklaýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda (Magtymguly etrabynda) ösümliğin soganlygy we gülleri dowamly iç gatamada güýçli iç sürüji serişde hökmünde peýdalanylýar.

Bezeg, bal beriji we boýag ösümlik.

### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylan soganlygyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Nargzyň 2 nahar çemçe (30 g) guradylan güllerini 1 litr suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan otda 15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, hasadan geçirmeli. Häzir bolan peti gün içinde 3 gezek 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

## **NIKITINIŇ GÜLHATMASY Шток-роза Никитина Alcea nikitinii**



**Häsiýeti.** Dagetek derman ösümliki. Gülhatmanyň dünýäde takmynan, 60, Türkmenistanda 11 görnüşi duş gelýär.

Nikitiniň gülhatmasy – mamamçörekler maşgalasynyň gülhatmalar urugynyň boýy 120–140 sm ýetýän ikiýyllyk ýa-da köpýyllyk otjumak wekili. Baldagy beýik, birnäçe buruçlaşan, aşaky bölegi diňe silindrik, düýdünden ýalaňaç.

Ýapraklary baş-ýedi barmakly-kepjeli, ülüşleri süýri, ýumurtga şekilli ýa-da süýrüntik, köp bölegi kütäk, gyralary dügürlü diş-diş, esasy dilinen ýa-da oýuk, iň ýokarky bölegi üç kepjeli, esasy pahna şekilli. Hemmesi iki tarapyndan hem ýaşyl, ýokarsy tas ýalaňaç, aşagy, käte ýokarsy, örän ýazgyn tüylüje, beýleki ülüşleri, has ýaşajyklary, iki tarapyndan hem has gür ýyldyz şekilli tüýjagazlar bilen örtülen. Ortaky we aşagy ýaprajyklaryň sapajygy tas ülüş bilen deňdir, hemmesi ýalaňaç we diňe ortaky we içki çyzygy aýratyn ýyldyz şekilli tüýjagazly.

Güljagazlary salkyma ýygananan, sapajyklary azda-kände ýyldyz şekilli tüylüje, yzygiderlikde ýokarsy kütüleşýär. Kiçi okarajygy we okarajyk gür ýyldyz şekilli tüýjagazlar bilen örtülen, olaryň 5–8-si süýrüntik ýa-da edil okara ýaprajyklary ýaly ülüşleri ýitileşen, damarly, okarajygyň 1/2-ne ýa-da 2/3-ne deň. Adatça, gültäji gyzyl-sýa reňkli, yöne, köplenç, gülgünden gara-gülgüne çenli öwüşginli (gury ýagdaýynda). Miwejikleri ganatlyja, arkasy guýguçly, gür çiteneكلي, gapdalyndan ýokarlygyna gysylan tüýjagazly, miwejigiň ortaky böleginde ýarym aýlaw halda ýerleşýär. Oýugyň içki bölegi egreden, sähelçe torly, daşky böleginde görnetin radial gasyňlar görünýär, olar ganatjyklara geçýär.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Nikitiniň gülhatmasy ölkämizde dagöňüniň düzlüklerinde, dagetekleriniň jülgelerinde, haşal we owadan güllýän medeni ösümligi hökmünde suwarymly ýerlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlük (may) iýun–iýulda güllýär, iýul–awgustda miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Kürendagda: Jigirdekli jülgesinde; Merkezi Köpetdagda: Germapda, Arçabilde, Aşgabatda duşýar.

**Tebigy gory.** Nikitiniň gülhatmasy ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň kökleri bilen porrugy, seýrek ýapraklary we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini we porruklaryny ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), ýapraklaryny hem gülleri – ösümligiň güllýän döwründe (may–iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Gazylýp alnan kökleri arassalamaly, ýuwmaly hem guratmaly, deslapky ülüşlere bölüşdirmeli. Köklerden, porruklardan we ýapraklardan

taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde goýmaly. Kökleriň we porrugyň saklanyş möhleti – 2–3, ýapraklaryňky hem gülleriňki – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Gülhatmanyň düzümine nemler: polisaharidler, olaryň gidrolizatynda glýukuron we galakturon turşular, ksiloza, arabinoza, ramnoza, glýukoza girýär. Onuň köklerinde, baldagynda, ýapraklarynda, gunçalarynda, güllerinde we miwelerinde uglewodlar, polisaharidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda gülhatmanyň kökleriniň, ýapraklarynyň we gülleriniň petleridir jowherleri sowuklama kesellerinde, dermatitlerde, psoriazda, ekzema, içegeleriň, diş etiniň, mindalynyň we kentlewügiň sowuklamasynda peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň ýapraklarynyň we gülleriniň spirtli ekstraktynyň antibakterial işjenligi ýüze çykaryldy.

Bezeg, bal beriji, ot-iýmlik, tehniki we boýag ösümlük.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümligiň 2 nahar çemçe (30 g) gury köklerini, güllerini ýa-da ýapraklaryny 2,5 bulgur (500 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessay otda 5 minut gaýnatmaly. Bir sagadyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti içegeleriň sowuklama ahwallarynda klizm etmekde peýdalanylýar.

Gülhatmanyň 1 çay çemçe (5 g) owradylan köklerini 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suwuň içine atyp, bir sagat goýmaly. Hasadan geçirmeli. Jowheri gün içinde her 2 sagatdan 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli. Dermany deriniň zeperlenen ýerlerine çalmaly.

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) gury güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 1–2 sagat goýmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jowheri her gün 3 ýola nahardan 30 minut ön 2 nahar çemçeden (30 ml) kabul etmeli.

Gülhatmanyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, bir sagat goýmaly. Yzsüre süzmeli. Taýýar bolan jowheri günde 3–4 gezek ýyly görnüşinde 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.



# OWNUK MIWELI ÜLJE

Вишня мелкоплодная

*Cerasus microcarpa*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Ownuk miweli ülje – bāgüller maşgalasynyň üljeler urugynyň boýy 2,0–2,5 metre ýetýän gyrymsy aça wekili. Gyrymsynyň birýyllyk pudaklary inçe, ýalaňaç, goňur reňkli, sähelçe gyraňly we aglaba eplenýän. Şahasynyň gabygy çal reňkli. Ýapraklary açyk, çalymtyl-ýaşyl reňkli, iki tarapy hem ýalaňaç ýa-da ýokarsy seýrek gysgajyk tüýlűje, sudury elliptik, süýrűmtik-elliptik, ýumurtga şekilli ýa-da ters ýumurtga görnűşli, pahnaly, seýrek kesilen, aglaba deň dāl gapdal esasly, gysga pudaklarda gyralary kűtek ýa-da ýiti dişli, uzynlygy 0,8–3,0 sm, ini 0,5–1,8 sm, uzynlygyna 5,5 sm çenli we inine 4,5 sm, käte iri ýapraklary 1–4 mǎzlije, űlűşleriniň esasyndaky dişjagazlarda ýerleşýär. Sapajyklary űlűşünden 2,5–3 esse gysgarak, ýalaňaç ýa-da gysga tüýlűje. Ýaprakýanjyklary çyzkly-biz görnűşli, per şekilli kesilen. Ýapragyny çykarmazyndan űň ýa-da şol bir wagtda gűlleýär.

Gűl pyntyjaklary 2-den, käte 1-den ýerleşýär, kűp bűlegi 2-gűllűje, seýrek 1–3, ýalaňaç ýa-da gysga tüýlűje seýrek gűl sapajyklarynda tüýlűje, uzynlygy 3–10 mm. Gipantiýsi inçe koniki, aşagy sähelçe çişen, ýalaňaç (daşy we içi), uzynlygy 4–5 mm, gyzylymtyl-gűlgűn-goňur reňkli. Okara ýaprajyklary ýaýraň, gunçalary we açylan gűlleri (gűni durýan), gyzylymtyl reňkli, kűtek, gyralary seýrek tüýlűje, agzynyň içi tarapyndaky gipantiýa uzyn tüýlűje, uzynlygy 1,5–2,0 mm. Gűl ýapraklarynyň uzynlygy 4–6 mm, aşagy benewşe-gűlgűn reňkli, ýokarsy ak, gűlgűn ýa-da symgylt-gűlgűn reňkli, käte gűlgűn kese-kesimli tüýlűje, süýrűmtik-ters ýumurtga şekilli, dyrnaklyja. Miwedany ýalaňaç. Dűwűnűgegi ýaşyl, ýalaňaç. Tyçinkalarynyň boýy dűrli-dűrli,

ak, ýalaňaç. Gűltǎjiniň gabarasy 1,0–1,2 sm. Miweleri süýjűmtik tagamly, gamaşdyryjy, kűp bűlegi süýrűmtik uzynlygy 6,5–8,0 mm, gabarasy 5–6 mm. Şǎnijegi süýnen-sűýrgűlt, ýitirāk, gapdalyndan has inçe, ýylmanak.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Ownuk miweli ülje űlkǎmizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol jűlgelerde, çagylyly we ownuk topurly daşly eňňitlerde űsűp boý almany halaýar. űsűmlik (fewral) mart–aprelde gűlleýär, iýun–iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly kűpelýär.

**Ýaýrawy.** űsűmlik diýarymyzda Uly Balkanda: Başmogur çeşmesiniň golaýynda, Daşlyderede; Kiçi Balkanda; Kűrendagda: Dǎneata jűlgesinde, Jigirdeklide, Soňudagda, Bereket stansiýasynyň ýanynda, Isgenderde, Ýaşyl jűlgede, Serdar bilen Gamyşlynyň aralygynda; Gűnorta-Gűnbatar Kűpetdagda: Tutlybilde, Ýuwangalada, Magtymgulynyň gűnortasynda, Sumbar derýasynda, Sűnt dagynda, Ýoldere jűlgesinde, Batyňgǎdigi geçidinde; Merkezi Kűpetdagda: Nohurda, Garaýalçyda, Arwazda, Keletede, Sarymsaklyda, Degirmenlide, Sűlűklide, Műsűnewde, Mergenűlende, Gylgylawda, Germapda, Heýrabatda, Sandykly jűlgesinde, Arçabil serhet galasynyň ýokarsyndaky jűlgede, Giňdiwarda – Bagyr bilen Giňdiwaryň arasyndaky ýolda, Garaňkyda, Neftanowskiý şäherijiginiň golaýynda, Çäýek bilen Gűkderǎniň aralygynda, Duşakerekdag dagynda, Wanowskide, Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Babazaw, Dagys, Daştoý jűlgelerinde, Birinjimaýda, Asylmada, Howdanda; Gűndogar Kűpetdagda: Robergowskiý şäherijiginiň golaýyndaky jűlgede, Kelteçynar jűlgesinde, Guruhowdanda, Çyrlakda, Şamlyda, Keletçaýda, Hoja jűlgesinde duşýar.

**Tebigy gory.** Ownuk miweli ülje ýurdumyzdaky seýrek űsűmlikleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary űçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Her ýylda 10–15 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga műmkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** űsűmligiň gabygy we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. űljǎniň gabygyny baldakda şirǎniň hereket etmeginiň űň ýanynda, miwelerini – bişýǎn dűwrűnde (iýun–iýul) ýygnamaly. Olary telǎriň aşagynda ýa-da galyň matanyň űstűnde aýyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Gabygyndan taýýar bolan çig maly mata haltalara, miweleriniňkini – kagyzy gutujyklara ýa-da agzy ykjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, Gűn şűhlesi gűni dűşmeyǎn ýerde saklamaly. Gabygyň we miweleriň saklanys műhleti – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Daragtyň düzümine kumarinler, flavonoidler, uglewodlar we olaryň ugurdaşlary girýär. Onuň miwelerinde pektinler, organiki turşular: limon, alma; eý maddalar, C, PP, B, witaminler, karotin, mikroelementler, şeker, glýukoza saklanýar. Tohumynda – ýag bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň iýmişi dowamly içgatamada ýeňil iç sürüji serişde hökmünde, şeýle-de gakylyk goparyjy, şekerli peseldiji, antiseptik üçin ulanylýar. Miwe sapajyklaryny peşew çykaryjy we gany togtadyjy; ýapraklary we şahajyklary – rahatlandyryjy; şireleri we eti – artritde we plewritde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň umumy berkidiji, sowuklamanyň garşysyna, gakylyk goparyjy, şähtiňi açyjy, gyzgyny peseldiji, peşew çykaryjy, pugtalandyryjy, aşgazana haýyrly, witaminlik we ýarany bitiriji alamatlary ýüze çykaryldy.

Ülje – ýaşayyş işjeňligi üçin hökmany gerek bolan witaminleriň baý çeşmesidir. Ol gymmat bahaly azyklyk we tagamlylyk alamatlara eýedir, täze hem gaýtadan işlenen görnüşinde örän peýdaly.

Bezeg, azyklyk, witamin saklaýjy we bal beriji ösümlük.

#### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Üljäniň 2 nahar çemçe (30 g) guradylan miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 15 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyňa 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli. Oňat witamin serişdesi.

Daragtyň 1 çay çemçe (5 g) miwe sapajyklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 30 minut goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 ýola nahardan öň 2 nahar çemçeden (30 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan iýmişini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 2 sagat goýmaly. Hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri ýatmazýň öň ýanynda ulanmaly.

Daragtyň şiresini we miwesiniň etini günde 3 sapar nahardan soň 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli

Her günde üljäniň iýmişinden 20-sini iýmeli.

## **OWNUK TOHUMLY PAKYR**

**Кузиния мелкоплодная  
Cousinia microcarpa**



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Otjumagyny Türkmenistanda 74 görnüşü duş gelyär.

Ownuk tohumly pakyr – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň pakylar urugynyň boýy 30–50 sm ýetýän ikiýyllyk otjumak wekili. Baldagy kerep pisint tüýlçe, esasynyň ýokarsyndan şahalanan. Şahajyklary has eglen, ýekeleşin, iri sebetjikli. Yapraklary ýumşak (derjimek däl), kökanyndakylary – süýri-uzalan, azda-kände giň dilinen, üçburçly-süýri, gyralary we ýokarsy tikenli, ülüşli, iki tarapy hem inçe kerep kysmy tüýlçe; baldakdakylary – süýri-uzan, birneme eglen, kökanyňkylary bilen meňzeş, ganatjygy inçe, gyralary dişlije-tikenli.

Sebetjiginiň gabarasy 2,5 sm (tikensiz), şar şekilli, has tikenli, köp güllüje, ýumşak kerepjimek tüýlçe. Gynynyň yaprajyklary gaty, esasy süýri, giň, has eglen we pahna kysmy üçburçly ýiti, ýalaňaç, ýokarsy tikenli. Gynynyň ortaky yaprajyklarynyň uzynlygy takmynan 2,5 sm, içkileri – has gysga, giň çyzykly-ujy çowly, derjimek, ýokarlygyna giňän, gyralary dişlije ösüntgili, käte birneme iki bölünen we gysga inçe gowşak tikenjikler bilen örtülen, onuň özaralaryndaky oýuk ýeri iki kepjeli; in içkileri – çyzykly-ujy çowly, ýitileşen, gyralary bürür-sürür, oň ýanyndakydan uzynrak. Gülyatagynyň tüýjagazynyň ýokarsy dişlije. Sebetjikde güljagazlarynyň sany – 90–120. Gültäji gülgün ýa-da gymyzy reňkli, uzynlygy 1,5 sm, tozanjykly trubkasy gülgün. Çigitjigi kiçi, ters süýri, gysylan, ýokarsy dişsizje, gara-çal reňkli. Üpüjiginiň tüýjagazlary ýok.



**Ýaşayyş aýratynlygy.** Ownuk tohumly pakyr ülkämizde dagöňüniň düzlüklerinde, deňiz derjesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol jülgelerde we ownuk topurly topragyň eňňitlerinde, ruderal haşal bolup ösmäni halaýar. Ösümlik maý–iýulda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta–Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Magtymguluda; Merkezi Köpetdagda: Nohurda, Garaýalçy, Arwazda, Tagarawda, Sarymsaklyda, Müsünewde, Mergenölende, Gylgylawda, Germapda, Heýrabatda, Çäyekde, Semansurda, Çopandagda, Arçabilde, Hanýaýlada, Giňdiwarda, Garaňkyda, Komorowskide, Gökderede, Wanowskide, Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Dagysda, Daştoýda, Asylmada, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide, Guruhowdanda, Wahçada, Çyrlakda, Şamlyda, Tekeçengesinde; Bathyzda: Daşköprüde, Serhetabatda, Serhetçide; Köýtendagda: Bazarpede; Köpetdagetäk medeni oturymynda: Aşgabatda, Gäwersde duşýar.

**Tebigy gory.** Ownuk tohumly pakyr ýurdumyzdaky seýrek ot–çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde haşal ösümliگی hökmünde bol duşýar. Her ýylda 50 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliگیň kökleri we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), miwelerini – bişen wagtynda (iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerden taýýar bolan çig maly mata haltalara, miweleriňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Çig malyň ýaramlylyk möhleti – 3–4 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ownuk tohumly pakryň düzümine 4,59% uglewodlar girýär. Onuň köklerinde, ýerüsti böleginde uglewodlar we kowumdaş birleşmeleri, degişlilikde: monosaharidler 0,50–1,95% we 0,64–2,16%, ramnoza, arabinoza, glýukoza, ksiloza, galaktoza, oligosaharidler 0,74–2,20% we 2,6–4,8%, polisaharidler 0,64–46,25% we 0,24–0,90%, pectin 3,3% we 3,1%, gemisellýuloza 7,62% we 8,40%, glýukuron turşusy 1,4% we 1,0% saklanýar. Ýapraklarynda kauçuk we sakyz bar.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyrlarda Gündogaryň parlak ýyldyzlarynyň birisi lukman-alym Abu Aly ibn Sinanyň meşhur «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly eserinde ösümliگیň aşgazan we böwrek kesellerinde peýdasy barada

mälim edilýär. Ol iýmit siňdiriş ahwalyny, jynsy hyjuwynyň işjeňligini güýçlendirýär.

Halk lukmançylygynda ösümliگیň miweleriniň peti we jöwheri bagyr, peşew haltasynyň we peşew ýollarynyň kesellerinde peýdalanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly, Gökdepe we Köýtendag etraplary) ösümliگیň kökleri süýjükeselde we bagyr sökelliklerinde ulanylýar.

Bezeg ösümlik.

### Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:

Ösümliگیň 2 nahar çemçe (30 g) guradylan köklerini 1 litr gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Pakryň 2 çay çemçe (10 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Jöwheri gün içinde 4 sapar nahardan 30 minut ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Ösümliگیň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan miwelerini 0,5-litrlik termosda demlemeli, 20 minut goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 ýola nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

## PERGÜL Вяжечка голая Turritis glabra



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümliگی. Napisje täsin ösümliگیň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelyär.

Pergül – atanakgüllülür maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 30–80 (100) sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik çalymtyl-ýaşyl reňkli, göni baldakly, aşaky bölegi ýaýraň tüýlje, ýokarsy ýalaňaç. Kökýanynyň ýapraklary

süýrüntik, sapaklyja, egri dişlije; baldakdakylary – sapaksyz, ýumurtga şekilli, esasy ýumurtga kysmy-peýkam şekilli, baldaga bitişen, gyalary abat. Okara ýaprajyklarynyň uzynlygy 3–5 mm, gül ýaprajygynyň uzynlygy 5–8 mm. Kürejikleriniň uzynlygy 40–50 mm we ini takmynan 1,5 mm, gül toplumynyň okundan ýokarlygyna gysylan, dört gyraňly-ýepbeşik, ýokarsynda gysga sütünjik ýerleşýär. Kürejikleri ýokarlygyna gysylan. Tohumy burçlurak, ownuk, iki setirli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Pergül ölkämizde dag eňňitlerindäki gyrymsy agaçlaryň arasynda ösüp boý almany halayar. Ösümlik may–iýunda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Jebelde; Merkezi Köpetdagda: Çopandagda; Köpetdagetok medeni oturymynda: Aşgabatda duşýar.

**Tebigy gory.** Pergül ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Haşal ösümliki hökmünde duş gelyär. Her ýylda 10–15 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümlikiň oty dermanlyk çig maly bolup hyzmat edýär. Ony ösümlik gülleýän döwründe (may) ýygnamaly, umumy kabul edilen usulyýet boýunça teläriň aşagynda açyk howada guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Otuň saklanyş möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Pergülüň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümlik düzüminde 5,8%-e çenli glikozidleri (şol sanda, mümkin, we ýürek) saklayar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümlikiň otundan taýýarlanylýan jöwherini tultuklykda, reumatizmde, sowuklama ahwallarynda, böwrek, peşew haltasynyň we peşew çykaryjy ýollarynyň kesellerinde peýdalanylýar.

Bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümlikiň 5 çay çemçe (25 g) guradylan otuny 1–1,5 bulgur (200–300 ml) gaýnag suwa atyp, 1–2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3–5 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Pergülüň 2 nahar çemçe (30 g) guradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 3 sagadyň dowamynda demini aldyrmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 4 wagtyna nahardan soň 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

## ПОПОВЫЙ УРЮКЛИЕСИ Хохлатка Попова Corydalis popovii



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliki. Dünýäde, takmynan, 320, Türkmenistanda 5 görnüşü duş gelyär.

Popowyň üpükliesi – şaterneler maşgalasynyň üpükliesler urugynyň boýy 10–15 sm ýetýän köpýylyk otjumak wekili. Ösümlik tutuş çal reňkli. Ýapraklary tas üçleýin, sapaksyz, ters ýumurtga şekilli, käte tas togalak, kütäk aralyk ülüşli we has ownuk ýitileşen gapdally.

Gül saklaýjysynyň boýy 10 sm çenli, 2–6 güllüje, ýumşak salkymy emele getirýär, ýapraklaryndan ýokary galýar. Gül sapajyklary güliň ýanyndaky ýaprajyklardan uzyn, uzynlygy 25 mm, miwelerde aşak eglen. Güliňanyndaky ýaprajyklary ters ýumurtga şekilli, sähelçe ýitileşen, uzynlygy 15 mm. Okara ýaprajyklary tas görünmeýär, dilimlenen. Gültäji iri, uzynlygy 40–45 mm, syýa-gyrymyz reňkli, dodagy az-kem ýitileşen, gara syýa reňkli. Aşaky gül ýapragy aşaklygyna бүкүлөн. Onuň dodagy aşaklygyna egrelen. Ösüntgisi gül ýaprajyklaryndan iki esse uzyn, has küti, göni. Içki gül ýaprajyklarynyň ýokarsy örän ýaybaň, бүкүлөн, her tarapyndan ýiti dişjagazlar bilen çäklendirilen. Gozajygy gysylan, giň ýumurtga şekilli, uzynlygy 10–13 mm we ini 5–6 mm, gysga, ýitileşen. Sütünjigi uzyn hem inçe.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Popowyň üpükliesi ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol toýunsow, daşly eňňitlerde, dürli reňkli dag jynslarynyň ýüzünde, gaýalary we agaçlaryň kölegesinde ösüp boý almany halayar. Ösümlik mart–iýunda gülleýär, aprel–



ýýulda miweleýär. Käbir ýyllarda ýaramaz ösýär we gülläp hem ýetişmeýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Köýtendagda: Marguşyda, Hojapilatada, Şeremde duşýar.

**Tebigy gory.** Popowyň üpüklijesi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetşdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Köýtendag döwlet goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin klublenleri we oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Klublenleri ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny – ösümlik gülläýän döwründe (mart–maý) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün şöhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Klublenleriň saklanyş möhleti – 2, otlaryňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Üpüklijäniň düzümine alkaloidler: protopin, benzofenantridin girýär. Onuň klublenlerinde, ýerüsti böleginde koridalin we bulbokanin alkaloidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin klubeni gematuriyada, kellagyryda, asteniýada, gyzgynyň ýokarlanmasynda, damarlaryň süýnmesinde, myşsanyň şikeslenmesinde; oty – bronh demgysmasynda peýdalanylýar. Klublenleriniň peti soguljanlary çykaryjy serişde hökmünde; otunyň peti – möçükmelerde, ekzemada, iriňli ýaralarda; otunyň jöwheri – ukyny tutduryjy, rahatlandyryjy serişde hökmünde, ujaklaryň titremesinde, gipertoniýada, semizlikde, ruhy we ginekologiki kesellerde ulanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Köýtendag etrabyňyň daglyk obalarynda) klubleniniň petini we jöwherini aşgazan-ıçege gysylmalarynda, sanjylarda, ýiti we dowamly gastritde, reumatizmde, newralgiýada, newrasteniýada, tutgaýly özüňden gitmede, damar çekmede, dogrumdan soňky yzalarda, başaýlanmada, agyryny aýryjy serişde hökmünde ulanylýar. Otunyň peti möçükmelerde, süňk döwürleşmesinde, ekzemada, bitmesi kyn ýaralarda peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda klubleniniň tozunyň, spirtli we sirkeli ekstraktynyň analgezirleýiji täsiri ýüze çykarylýdy.

Protopin alkaloidiniň az mukdarda narkotik we rahatlandyryjy täsirli, ýüregiň işjeňligini haýalladýar, gan basyşyny peseldýär.

Ösümlik weterinariýada hem ulanylýar.

Bezeg, azyklyk we boýag ösümlik.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylýşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan pet bilen deriniň zeperlenen ýerlerini ýuwmaly.

Üpüklijäniň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan klublenlerini 0,5-litrlik termosda demlemeli, birsalym goýmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan jöwheri her gün 3 wagtyňa 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Ösümliğin 2 çay çemçe (10 g) gury otuny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, 8 sagat goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri gün içinde 3–4 gezek nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

## ПОПОВЫН ЗЫГЫРБАДАГЫ Льянка Попова *Linaria popovii*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliği. Täsin otjumagyň Türkmenistanda 4 görnüşi duş geliýär.

Popowyň zygyrbaldagy – norişnikler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 25–50 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Baldagynyň sany – 1–3, göni, köplenç, ýokarsy şahalanan, ýalaňaç, çalymtyl. Ýapraklary nobatlaýyn, sapaksyz, çyzykly ýa-da çyzykly-ujy çowly, uzynlygy 2,0–6,5 sm we ini 0,1–0,6 sm.

Gülleri sarymtyl, gysga, kütüräk sapaklyja (1–3 mm). Miwesi – şar şekilli, ýalaňaç gozajyk. Tohumy gara-goňur reňkli, böwrek kysmy, giň ganatlyja.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Popowyň zygyrbaldagy ölkämizde deňiz derejesinden 1600–2800 metr belentlikde bitýär. Ol daşly we ownuk topurly ýapgytlarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär, iýun–iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda diňe Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Popowyň zygyrbaldagy ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Ol Köýtendag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Otun ýaramlylyk möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Zygyrbaldagyň otunda alkaloidler: 0,3–0,7% peganin, flavonoid glikozidler: linarin, neolinarin we başgalar; flavonoidler, saponinler, 75–235 mg% C witamin, karotin, eý maddalar, sakyzjymak, reňkleýji we 2–5% pektin maddalar, organiki turşular we beýlekiler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Gündogaryň parlak ýyldyzlarynyň birisi ajaýyp alym-tebigaty synag edijisi Abu Reýhan Biruny özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly nusgawy işinde ösümliğin dermanlyk häsiýetleri barada söz açýar.

Halk lukmançylygynda zygyrbaldagy tultuklykda, sarygetirmede, kellagyryda, yzaly çaga örgünlerinde, soguljan kesellerinde, ingide peýdalanylýar. Otunyň suwda we süýtde taýýarlanýan petini düwürtiklerde (buguna tutmak), deri kesellerinde: demrewde, ekzemada, gijilewükde (suwa düşünmek); şiresini – konýunktiwitde (ýapgy etmek) ulanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Köýtendag etrabynyň daglyk obalarynda) ösümliğin otunyň petini dermatitlerde suwa düşünmek, içmek arkaly – antigelmint we soguljany çykaryjy serişde hökmünde haýyrlanylýar; jöwherini ýa-da «çaýyny» – öt, peşew, der çykaryjy we iç sürüji deregine neplenilýär.

Ylmy lukmançylykda peganin alkaloidiniň myşsa distrofiýada, miopatiýada, arterial gan basyşy ýokary bolanda oňyn täsiriniň barlygy ýüze çykaryldy, şeýle-de öt çykaryjy we iç sürüji işjeňligi (20–25 mg% çenli mukdarda) anyklanyldy.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan otuny 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwa atyp, 30–40 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli. Şeýle-de çalgı we ýapgy görnüşinde haýyrlanmaly.

Zygyrbaldagyň 4 çay çemçe (20 g) otuny, daşkekräniň güllerini we üşüniň güllerini garyp, 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, 8 sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri günün dowamynda 1–2 damjadan birnäçe gezek kabul etmeli, şeýle-de ýapgy edilýär. Melhem sowuklama nepli, iriňi aýyryr we görşüni gowulandyryr.

## PÜRLI ATGUÝRUK

Хвощ ветвистый

*Equisetum ramosissimum*



**Häsiýeti.** Giň ýaýran derman ösümlik. Pürli atguýruk – atguýruklar maşgalasyny adybir urugynyň boýy 20–50 sm ýetýän köpylylyk otjumak wekili. Baldagy göni, azda-kände şahalanan, seýrek ýönekeý, guýguçly, birneme büdür-südü, 6–25 gapyrgaly. Ýapragynyň gyny iri, dişlije, gyny galýar ýa-da gaçýar, onuň ýerinde uly bolmadyk üçburç yzlary galýar. Gynlary öz ininden (2–3 esse) uzyn. Şahajyklary baldakda köp bolmadyk mukdarda emele gelyär we gysga, beýleki ýagdaýlarda olar sapaksyz çogdamy emele getirip ikenji gezek şahalanýar. Başı ýumurtga şekilli ýa-da süýrümlik, ýitileşen, garamtyl ýa-da goňur reňkli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Pürli atguýruk ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol Türkmenistanyň düzlük böleginde, çygly ýerlerde, köplenç, şorlaşan topraklarda, dagetekleriň jülgelerinde, derýajyklaryň kenarynda, çygly çemenzarlyklarda, medeni oturumlardaky ýaplarda, suwarymly ýerlerde, köne ekin



meýdanlarynda, seýrek ekinlerde, şeýle-de tokaýlarda ösüp boý almany halaýar. Ösümligiň sporalary maý-oktyabrda ýetişýär. Ol spora arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik Türkmenistanyň hemme etraplarynda duşýar.

**Tebigy gory.** Pürli atguýruk ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Her ýylda 15–25 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň tomusky pudaklary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly spora emele gelýän döwründe (aprel–maý) ýygnamaly. Ösümligiň pudagyny pyçak bilen kesmeli ýa-da orak bilen ormaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da kagyzyň üstünde oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mal gowşak özboluşly ysa, turşumtyk tagama, çalymtyl-ýaşyl reňke eýe. Çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün söhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 3 ýyla çenli.

**Himiki düzümi.** Pürli atguýrugyň düzümine uglewodlar: glýukoza, fruktoza; destetilsterin steroidler; organiki turşular: alma, akonit, turşuja, kremniý; eý maddalar, C witamin, karotin, belok, ýag we efir ýagy, ötgür aý maddalar, sakyz, nikotin we palýustrin alkaloidler, flawonoidler: 3-soforozid we 3-soforozido-7-kempferol glýukozid; eý we aý maddalar, Ca we P duzlary girýär.

**Peýdalanylyşy.** Gündogaryň parlak ýyldyzlarynyň birisi Abu Aly ibn Sina «Lukmançylyk ylmyň kanunlary» atly işinde ösümligiň şypaly otunyň bagryň we aşgazanyň howply döremelerini bejermekde, ganly içgeçmede, çagalaryň ingisinde, ýaralarda we başlarda haýyrlý alamatlaryny mälim edýär. Awtor: «Bu ösümlik ýaralary we başlary örän oňat bitirýär... ganakmasyna, bagryň, aşgazanyň çişlerine, tultuklyga we ganly içgeçmä oňat täsir edýär. Ondan ingi üçin dermanlyk sargy taýýarlanylýar» diýip ýazýar.

Orta asyrlaryň alymy hem lukmany Muhammet Huseýniň «Melhemler hazynasy» atly nusgawy işinde şeýle taksatlanýar: «...atguýruk pugtalandyryýar, dowamly üsgülewükde, kürek yzasynda, kynlyk bilen dem alnanda, tultuklykda, bagryň çişinde, içgeçmäniň dürlü görnüşlerinde haýyrlý. İçegelerdäki we peşew haltasyndaky başlary bitiriji täsirli. Atguýrugyň peti dowamly içilen ýagdaýynda inginiň bitmesine we dep bolmagyna haýyrlý, şeýle-de kesilen içgeleriň bitmegine nepli. Melhemlik peti içmeli we onuň

bilen klizm etmeli... Atguýrugyň petine batyrylan matany uly ýaralary, kesilen ýerleri, nerwleriň üzülen ýerlerini bitirmek üçin ýapgy ediliýär».

Halk lukmançylygynda ösümligiň otunyň peti bagy kesellerinde, gaýtalanyp durýan bogun agyryda, tultuklykda, reumatizmde, peşew-daş sökelliklerinde, öýkeniň içkesesinde peýdalanylýar. Şeýle-de ol ýaralary we başly ýaralary bitirmekte ýapgy ediliýär. Atguýrugyň petidir jöwheri içkeselde, sowuklama ahwallarynda, gipertoniýada, ateroskleroza, bagryň, böwregiň, aşgazan-ıçege ulgamynyň kesellerinde, peşew haltasyndaky daşlary çykarmakda, sözenekde, uretritde, reumatizmde, gaýtalanyp durýan bogun agyryda, gurşun bilen ýiti we dowamly zäherlenmede, ýürek ýetmezçiligi zerarly döreýän çişlerde, diuretik, soguljanlaryň garşysyna, öýken, aşgazan, böwrek, içege, babasyl, ýatgy, burun gan akmalarynda saklaýy serişde hökmünde ulanylýar. Mundan başga-da, deri kesellerinde (ýapgy we ýuwmak), ýaralary, düwürtikleri, demrewi, ekzemy bejermekde ulanylýar. Melhemligi agyz boşlugynyň we bokurdagyň nemli bardasy sowuklanda neplenilýär.

Ösümligiň peti Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda halk lukmançylygynda ysytmada, diareýada, gonoreýada, gijilewükde, içgeçmede, deri kesellerinde ulanylýar. Jöwheri – diuretik we gamaşdyryjy serişde hökmünde haýyrlanylýar. Çayy – ganly içgeçmede, aşgazanyň başynda, gangusmada, üsgülewükde, öýkeniň sowuklamasynda ulanylýar. Şiresi gemostatik serişde hökmünde peýdalanylýar we içege ýokançlarynda neplenilýär.

Ylmy lukmançylykda atguýrugyň otunyň peşew çykaryjy we sowuklamanyň garşysyna täsiri ýüze çykaryldy. Derman serişdeleri ýürek-damar kesellerinde haýyrlanylýar. Ösümligiň melhemlikleri peýdalanylanda hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Atguýrugyň guradylan otundan taýýarlanylýan tozuny weterinariýada ýaralary we başlary bitirmekte ulanylýar.

Ot-ıymlik we boýag ösümlik.

### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 30 minut gaýnatmaly. 10 minutyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli, galan çig maly sykmaly. Taýýar bolan pete başlangyç göwrümüne (200 ml) gelinçä gaýnag suw goşmaly. Melhemi her gün 2–3 gezek nahardan bir sagat soň 1/4–1/3 bulgurdan (50–75 ml) içmeli.

Atguýrugyň otunyň, daşkekräniň guradylan kökleriniň, boýbodranyň otunyň 2 nahar çemçe garyndysyny (30 g) 0,5 litr suwa atyp, içi syrçaly pitide haýal ýanýan otda suwuklygyň göwrümi 300 ml bolýança gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Peti her sagatdan 2 nahar çemçeden (30 ml) kabul etmeli. Gan akması togtanson ýene 2 gün günün dowamynda 2 nahar çemçeden (30 ml) haýyrlanmaly.

Atguýrugyň 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 30 minut goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3–4 ýola 1/3 bulgurdan (75 ml) içmeli.

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, termosada demlemeli, 15–20 minut goýmaly. Yzsüre süzmeli. Häzir bolan jöwheri her gün 3 gezek 1 bulgurdan (200 ml) kabul etmeli.

Alyjyň miweleriniň we gülleriniň, sarymsagyň soganygynyň, atguýrugyň otunyň (hemme 3 bölegini) we boýbodranyň otunyň (4 bölegi) 1 nahar çemçe (15 g) garyndysyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, birsalym goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 4 ýola nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Atguýrugyň täze şiresini her gün 3–4 sapa 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli. Netijeli peşew kowujy serişde.

## REGELIŇ GERANY

Герань Регеля

*Geranium regelii*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Regeliň gerany – geranlar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 20–50 sm ýetýän köpyýlyk otumak wekili. Baldagy göni, köplenç, ýokarlygyna gysylan tüýjagazly, käte gaty, şahalanan.

Ýapraklarynyň ini 4–6 sm, sudury tegelek, göwrüminiň 3/4-den köpüsi bölünen; aşaklary 5–7, ýokarkylary – 3–5 üleşli. Üleşleri tas pişme şekilli we ol öz gezeginde 3–5 ýumurtga şekilli ýa-da ujy çowly üleşliklere ýa-da dişjagazlara bölünýär.

Gül palajy uzyn, uzynlygy 5–15 sm, ýapragyň goltugynda, miwede 2-den gyşaran gül sapajyklary ýerleşýär, uzynlygy 2–4 sm. Gül palajy we gül sapajyklary tüýljuje, käte gaty. Ýaprakýanjyklarynyň ujy çowly, perdeli. Okara ýapraklary süýrümlik-ýumurtga şekilli, 3–5 damarly, tüýljuje, uzynlygy 8 mm çenli, oky gysga. Gül ýapraklarynyň uzynlygy 12–17 mm, ýokarsy tegelek, esasy gysga tüýli dyrnaklyja, symgylt, gülün-syýa reňkli. Tyçinkalarynyň sapajygy ýaybaň, bölegi tas ýarsyna çenli kirkiklije. Miwesiniň gynlarynyň uzynlygy 3–4 mm, bişende aýrylmaýan burunjygy bilen bilelikde spiral şekilli towanýar, gysylan tüýjagazlar bilen örtülen. Burunjygynyň uzynlygy 3 sm çenli, içi gysga tüýljuje.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Regeliň gerany ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol demirgazyk eňňitde çeşmeleriň golaýynda, dag jülgerindäki çygly ýerlerde, derýajyklaryň kenarynda ösüp boý almany halayar. Ösümlik iýun–awgustda gülleýär, iýul–sentýabrda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Gylgylawda, Skobelewka bilen Germabyň aralygynda, Heyrabatda, Çopandagda, Arçabilde, Daştoýda; Köýtendagda: Köýtendag obasynda, Köýtendagderýa – Hojapilata duşýar.

**Tebigy gory.** Regeliň gerany ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümliki hökman goraga almaly. Ol Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty we ýapragy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (iýun–awgust) ýygnamaly, teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Çig mallara Gün şöhesi düşmeli däl. Otlaryň we ýapraklaryň saklanýş möhleti–1–2 ýyl. Tebigy şertlerde ösümliğin biologiki hasyllylygynyň ýerüsti massasy 5–44 s/ga deň. Bu görkezijiler tejribe-senagatda ekilende üçünji–başynji ýylynda – 50–75 s/ga, ýerasty massasy başynji ýylynda – 66 s/ga. Şunlukda eý maddalaryň umumy çykymy 15 s/ga deň bolýar.



**Himiki düzümi.** Geranyň ýerasty böleginde pirogallol, pirokatehin fenollar, 10,80–23,54% eý maddalar (gunçalaýan wagtynda aňryçäk) saklanýar. Ösümligiň ýerüsti böleginde saponinler, alkaloidler, 12,0–27,2% eý maddalar (ösüp başlaýan wagtynda aňryçäk) bar. Baldaklarynda 10,16% monosaharidler, 0,6% sahara, 3,34% krahmal, 11,64% gemisellýuloza uglewodlar, 2,9–16,1% eý maddalar saklanýar. Ösümligiň baldaklarynda we ýapraklarynda pirokatehin, pirogallol fenollar bar. Ýapraklarynda 6,42% monosaharidler, 0,62% sahara, 3,7% glýukoza, 0,18% fruktoza, 1,2% sorboza, ramnoza, arabinoza, ksiloza, riboza, maltoza, 3,26% krahmal, 6,48% gemisellýuloza uglewodlar, C witamin, fenolkarbon turşusy we olaryň ugurdaşlary: 0,42% gallow, 0,38% 4,5-digidroksi-3-metoksibenzoý, ellagow, 0,41% 2-galloil-β-D-glýukoza, 0,57% 3-galloil-D-glýukoza, 3,2% 2,3-digalloil-D-glýukoza, 4,95% kolinin, 13,5–18,5% eý maddalar, 0,22% awikulýarin, 0,12% gwaýawerin, 0,19% izokwersetin, 0,25% rutin, 0,084% geranin, 0,029% kwersetin, 0,012% kempferol, 0,018% 7,8,4'-trigidroksiflawonol flavonoidler saklanýar. Ýapraklarynyň ülüşlerinde we sapajyklarynda, gunçalarynda degişlilikde: 2,06–3,64%, 12,80–19,33%, 15,95% eý maddalar bar. Güllerinde C witamin, 13% eý maddalar, flavonoidler saklanýar. Miwelerinde, miweýanlarynda, tohumynda degişlilikde 6,3%, 5,45% we 10,93% eý maddalar bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň ýerüsti böleginiň petleridir jöwherleri içege kesellerinde, içgeçmede, ganly içgeçmede, gany togtadyjy, antiseptik, agyryny aýryjy, reumatoid, gamaşdyryjy serişde hökmünde peýdalanylýar.

Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda, ösümligiň petleri aşgazan kesellerinde, gamaşdyryjy, pugtalandyryjy, dogrum döwüründen soň we gangusmada gemostatik serişde hökmünde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň ýapraklarynda saklanýan ellagow turşusynyň we kolininiň çişlerde ingibirleýji täsiri ýüze çykarylýdy.

Ösümligiň oty boýag senagatynda ýüpek matalary dürli reňklere boýamak üçin peýdalanylýar.

Bezeg, bal beriji, ot-ýimlik, boýag we eýleýji ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 20 minut gaýnatmaly. Yzsüre süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek nahardan 30 minut ön 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Geranyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp mäjumlanan otuny 2 bulgur (400 ml) sowuk suwuň içine atyp, 8 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Jöwheri günde her 2 sagatdan 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

## **SAGLYGOTY**

**Валериана снеголюбивая**  
**Valeriana chionophila**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Dünyäde 200-den gowrak, Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Saglygoty – saglygotylar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 20–40 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Toprakda kluben şekilli ýognas, armyt kysmy köki ýerleşýär. Ösümligiň baldagy ýekeleşýän, ýalaňaç. Aşaky ýapraklary togalak-ters ýumurtga şekilli, käte tas ujy çowlanana çenli, esasyňa çekilen, gyalary abat, uzynlygy 5–9 sm we ini 1,5–2,5 sm. Baldakdaky ýapraklary düri-dürlü: süýrümlik-ters ýumurtga şekilli we gyalary abat ýa-da süýrümlik-çyzykly we deň bolmadyk egri diş-diş.



Gül toplumy – gysga, köpgüllüje sübsä gysylan, uzynlygy 2–3 sm, miwede onuň uzynlygy 5–10 sm çenli çykyp duran. Güľanjagazlary çyzykly, uýy ýitileşen, uzynlygy, takmynan, 5–6 mm. Gültäji gülgün reňkli, uzynlygy, takmynan, 10 mm. Miwesiniň uzynlygy, takmynan, 5–7 (8) mm, ýaýbaň ýumurtga şekilli, gysylan, iki tarapy hem süýnmegräk çuňlaşan, uzyn tüýjagazlar bilen örtülen. Okarajygy (bişen miwede) 15–20 sany per şekilli tüýjagazlardan durýar, aşaky bölegi bardaly bitişen, tüýjagazlarynyň uzynlygy, takmynan, 10 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Saglygoty ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly-çagylyly we ownuk topurly eňňitlerde, jülgelerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik mart–aprelde gülleýär, maý–ijunda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda diňe Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Saglygoty ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Ol Köýtendag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri, porrugy we oty çig mal bolup hyzmat edýär. Saglygotunyň köklerini we porrugyny güýzde (sentýabr), haçanda olar köp mukdarda biologiki işjeň maddalary saklaýan wagtynda, otuny – gülleýän döwründe (mart–aprel) ýygnamaly. Olary oňat ýel çekerli jaýlarda umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly we taýýarlamaly. Çig mallara Gün şöhlesi düşmeli däl. Gazylyp alnan kökleriň gumlarydyr topragyny aýyrmaly, sowuk suw bilen ýuwmaly. Porrukdan taýýar bolan çig maly kagyz haltalara ýa-da gutujyklara, otlary – mata haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky, salkyn ýerde saklamaly. Porrugynyň saklanyş möhleti – 2–3, otunyňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümliğin ýerasty bölegi düzüminde iridoidleri: waltrat, digidrowaltraty saklaýar. Porrugynda we köklerinde efir ýagy (onuň düzüminde waleriano-borneolow efir, izowalerian turşusy, borneol, pinen, spirtler, 1-mirtenol we onuň izowalerian efiri), alkaloidler: walerin, hatinin we başgalar, glikozidler (walerozidler), eý maddalar, şeker, organiki turşular: garynja, sirke, alma, stearin, palmitin we beýlekiler bar. Ýerasty böleginde waltrat we digidrowaltrat iridoidler, fenolkarbon turşusy, flavonoidler saklanylýar. Baldagynda, ýapraklarynda we gül toplumlarynda flavonoidler: 7-O-β-D-lýuteolin glýukozidi we diosmetin, akasetin, apigenin, diosmetin, lýuteolin, kwersetin bar.

**Peýdalanylyşy.** Saglygoty – möhüm derman ösümlikleriň biridir. Ösümliğin melhemlik häsiýetleri has gadymyýetden mälim bolupdyr. Ol we onuň dermanlykdygy hakynda şeýle aýdylypdyr, adamynyň pikirini «dolandyryr», oňat şähtiaçyklygy we ruhy durnuklylygy döredýär. Ösümliň ady «walere» diýen latyn sösünden gelip çykýar diýlip hasap edilýär, ol «sagdyn boluň» diýmekligi aňladýar.

Orta asyrlarda saglygoty gündogar ýurtlarynda has meşhurlyga eýe bolupdyr. Çünki, orta asyr alymy hem lukmany Muhammet Huseýniň «Melhemler hazynasy» atly nusgawy eserinde «...saglygoty dykyn almalary açýar, bugarmany sorup alýar... Köki guradylan görnüşinde (çeýnemek arkaly) ýa-da pet görnüşinde sowuklama häsiýetli kükrek kesellerinde, gapdal agyryda, garyn sanjysynda, dalagyň sökelliklerinde» ulanylýar diýip ýazýar.

Halk lukmançylygynda ösümlik peşew kowujy we aýbaşyny getiriji hökmünde, nerw ulgamynyň gyjynylygyny peseldiji, ýüregiň damarlaryny giňeldiji, ukyny kadalaşdyryjy we tutduryjy serişdeleriň täsirini güýçlendiriji, şeýle-de gaýtalanyp durýan bogun agyryny bejeriji serişde hökmünde peýdalanylýar. Saglygoty bellibir mukdarda zäherleriň garşysyna we sedatiw häsiýete, şeýle-de damar çekmäniň garşysyna işjeňlige eýedir. Saglygotunyň jöwheri ýasy gurçuklary kowýar. Mundan başga-da, klimaksda döreýän arterial dan basyşynda, menopauzede, ýüregiň töwereklerindäki yzalarda, sowuklama kesellerinde ulanylýar.

Ylmy lukmançylygynda ösümliki ukynyň bozulmagy bilen baglanyşykly we ýokary nerw gyjynylygy, newrozlary, kakynlary, çakyzany we ukusyzlygy bejermek üçin aýratyn derman görnüşinde hem toplumlaýyn derman serişdeleriniň düzüminde peýdalanylýar. Olar merkezi nerw ulgamyna rahatlandyryjy täsir edýär, ýüregiň we koronar gan aýlanyşynyň işjeňligini gowulandyryýar, aşgazan-ichege ulgamynyň mázleriniň sekretor işjeňligini güýçlendirýär, aşgazan-ichege ulgamynyň gysylmalaryny peseldýär, şeýle-de olar öt çykaryjy häsiýete eýedir.

Ösümlikden taýýarlanylýan derman serişdeler, şerbetler, saglygotunyň gerdejikleri, adonizidli injigül-saglygotuly damjalary, kamforly-saglygotuly we kardiowalena, walidol, walokordin, korwalol, walkormida, walosedan we beýlekiler newrasteniýanyň we psihasteniýanyň ýeňil görnüşlerinde, klimakterik bozulmalarda, wegeto-newrozlarda, ýürek-damar ulgamynyň newrozlarynda, stenokardiýada, gipertoniki kesellerde, aşgazan-ichege ulgamynyň sökelliklerinde ulanylýar. Şeýle-de beýleki sedatiw,



ýüregagyry we spazmolitik serişdeleriň toplumyna goşulyp bejergi berilýär.

Bezeg, bal beriji ösümlik.

### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň uly kesilen gury köklerini 1:20 gatnaşykda gyňag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 30 minut gaýnatmaly. 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3–4 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Saglygotunyň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gyňag suwuň içine atyp, syrçaly pitide haýal ýanyan otda 15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Häzir bolan peti gün içinde 2–3 sapar 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) guradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gyňag suwa atyp, içi syrçaly gapda ýerleşdirmeli, agzyny gapak bilen ýapmaly we suw hammamynda 15 minut gyzdymaly. Soňra 45 minutyň dowamynda sowatmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Galan massany sykmany. Taýýar bolan jöwheri 1 bulgur (200 ml) gyňag suw garmaly. Melhemi günde 3–4 ýola nahardan 30 minut soň 2–3 nahar çemçeden (30–45 ml) içmeli.

Saglygotunyň 2 çay çemçe (10 g) guradylyp owradylan porrugyny 1 bulgur (200 ml) sowuk suwuň içine atyp, 8–10 sagat goýmaly, soňra gyzgyn ýagdaýyna geçýänçä gyzdymaly. Hasa bilen süzmeli. Häzir bolan jöwheri ýatmazyn 30 minut ön ýanynda, edil çay ýaly içmeli.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan köklerini we porruklaryny 1 bulgur (200 ml) gyňag suwuň içine atyp, 8–12 sagat goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3–4 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Saglygotunyň 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp owradylan köklerini 0,5 litr suwuň içine atyp, içi syrçaly gapba ýerleşdirmeli, gapagyny ýapmaly, suw hammamynda 15 minut gaýnatmaly. Goýmaly, otat temperaturasyna çenli sowatmaly. Hasa bilen süzmeli. Galan massasynyň üstüne başlangyç göwürümdäki (200 ml) ýaly bolýança gyňag suw guýmaly. Häzir bolan jöwheri gün içinde 2–3 ýola nahardan 30 minut soň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Ösümligiň ownuk kesilen köklerini 1:5 gatnaşykda 70%-li medisina spirtiniň içine atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde bir hepde goýmaly. Yzygiderli çaykamaly. Taýýar bolan şerbeti her gün 2–3 wagtyna 20–30 damjadan kabul etmeli.

Her günde saglygotunyň kökünden 4,5 grama çenli, melhemlik petde 9 grama deňeç haýyrlanmaly.

## **SAÝAWANLY**

## **PSEWDOHANDELIÝA**

**Псевдоханделия зонтичная**

**Pseudohandelia umbellifera**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Syratly owadan gülli ösümligiň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Saýawanly pseudohandeliýa – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 35–80 sm ýetýän ikiýylyk otjumak wekili. Tutuş ösümlük gür ak kerep kysmy tüýjagazlar bilen örtülen, ösüşiniň ahyrynda olar bölekleyin gaçýarlar. Köki dik, inçe. Baldagy göni, galyňlygy 1 sm çenli, ýekeleyin, togalak, inçe joýajykly, saman-sary reňkli, ýönekeý, ýaprakly. Ýapraklary kökýanly we aşakdakylary baldakda ýerleşýär, sapakly, gysyk ýokarlygyna gönügen, uzynlygy 14–20 sm we ini 3–4 (5) sm, üç per şekilli dilinen, başlangyç ülüşleri gyşaran, adatça, uzynlygy 1–3 sm we ini 3–5 mm çenli, sudury çyzykly, iki gezek per şekilli dilinen, köp sanly, inçe çyzyklara ýakyn, ýasy, ýitileşen, adatça, üleşjileriniň uzynlygy 1–2 mm. Baldakdaky ortaky ýapraklary sapaksyz, birneme ulurak, ýokarky gülýanynyň ýapraklary kiçi, az-kem çylşyrymly, garşylyklaýyn ýerleşýär.

Sebetjigi köp sanly (olaryň sany 100-e ýetýär we hatda ondanam köp), sapaklyja, dykz, ykjam, saýawan kysmy galkany emele getirip, baldagyň ýokarsynda ýerleşýär. Gyny okara şekilli, ini 6–8 mm, iki ýa-da tas üç hatarly. Onuň ýaprajyklary ters süýrümlik, gaty, ýalaňaç, gyralary we ýokarsy giň perdeli, içine eglen. Gülýanynyň teňňejikleri güllerinden gysga, uýy çowly, gyralary perdeli, ýa-da olar ýok. Gülleri köp sanly, ownuk. Gültäji bulgur-trubka görnüşli, başy gaty, daşyna gaýsyp duran küteträk dişlije. Tyçinkalary

gültäjäne deň ýa-da birneme uzynrak. Tozanlygy çyzykly, ýokarky ösüntgisi ýiti burçly. Tumşujagynyň kepjesi çyzykly, ternawly, ýokarsy dilinen, gysga kirpiklige, çigitjagazy bişende tozanlyk trubkadan çykýar. Çigitjigi çyzykly, ýasy, esasy gysylan, sähelçe eglen, başy gaty. Üpüjigi ýok.

**Ýaşajyş aýratynlygy.** Saýawanly psewdohandeliýa ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol mele toprakly dagöňünde ösüp boý almany halayar. Ösümlik maý–iýulda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Semansurda, Arçabilde, Giňdiwarda, Uly Garaňkyda, Komorowskide, Gökderede, Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Dagyşda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide, Birinjimaýda, Guruhowdanda, Çyrlakda, Aksuwda, Kakada, Garatikende; Bathyzda: Rabatda, Gyzyljarda, Akarçeşmede, Serhetabatnyň golaýynda; Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Saýawanly psewdohandeliýa ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Käte bitýän yerlerinde bol duşýar. Her ýylda 15–20 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin ýapraklary, gülleri we gül toplumlary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Oly ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklaryndan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleriniňkini we gül toplumlarynyňkyny – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän yerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Psewdohandeliýanyň ýerasty böleginde seskwiterpenoidler saklanýar. Ýerüsti böleginde seskwiterpenoidler, 0,17–0,21% efir ýagy, flavonoidler, saponinler, az mukdarda laktonlar, eý maddalar, organiki turşular bar. Gül toplumynda hanfillin we artekalin seskwiterpenoidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin ýapraklarynyň we gülleriniň peti we jöwheri diuretik serişde, öt-daş kesellerinde, sarygetirmede ulanylýar. Gülleriniň jöwheri – bagyr, böwrek, ýürek-damar kesellerinde, tihikardiýada, garaguş sökelliklerinde, der çykaryjy, antigelmint serişde hökmünde haýyrlanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Baharly, Gökdepe we Köýtendag etraplary) ösümliğin ýapraklarynyň we gül toplumlarynyň petidir jöwheri öt-daş kesellerinde hem sarygetirmede; gülleriniň çayyny we jöwherini – bagyr we

böwrek, aşgazan-ıçege ulgamynyň kesellerinde, ýüregiň çala urmasynda, garaguşyň tutgaýly çaşmasynda, soguljan we peşew çykaryjy serişde hökmünde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda efir ýagynyň sowuklamanyň garşysyna, spirtli ekstraktynyň çişlere garşy täsiri ýüze çykaryldy.

Bezeg we boýag ösümlik.

### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 4 çay çemçe (20 g) guradylan ýapraklarydyr güllerini 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 30 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Psewdohandeliýanyň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan ýapraklary bilen sebetjiklerini 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwuň içine atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan otda 20 minut gaýnatmaly. 30 minut goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Peti gün içinde 3 gezek nahardan ön 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin 2 çay çemçe (10 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 40 minut goýmaly. Yzysüre süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 ýola nahardan 30 minut ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

## **SIBIR AKTIKENI**

**Селитрянка сибирская**  
**Nitraria sibirica**



**Häsiýeti.** Düzlük derman ösümliگی. Sibir aktikeni – aktikenekler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 40–80 sm ýetýän gyrymsyja wekili. Ösümliğin gabygy agymtyl-çal reňkli, bol şahalanan we köp tikenli. Ýapraklary ters ujy çowly, ak, kiçi, perdeli, gaçmaýan. Ýapraklary ters ujy çowly,



ownuk. Şäniýegi kiçi, ýumurtga şekilli, kütelen, gara gök şireli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Sibir aktikeni ölkämizde düzlüklerde, deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol şorluklarda, duzly toýunlarda, köplenç şor topraklarda, çagylyly, daşly-çagylyly we çägeleşen topraklarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik may–iýunda gülleýär, iýun–awgustda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda diňe Bathyzda duşýar.

**Tebigy gory.** Sibir aktikeni ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetşdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Bathyz döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliگیň miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary bişen wagtynda (iýul–awgust) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 3 ýyla çenli.

**Himiki düzümi.** Aktikeniň köklerinde 0,029–0,056% alkaloidler: sibirinin, deziksiwazision saklanýar. Ösümliگیň ýerüsti böleginde 0,25–0,28% alkaloidler: izonitramin, nitramin, (-)-wazisisinon, (±)-nitramin, şoberin, N-okis nitramin, sibirin, 0,0002% nitrabirin bar. Baldaklarynda, ýapraklarynda, guňçalarynda, güllerinde, miwelerinde, tohumynda degişlilikde – alkaloidler 0,10–0,16%, 0,30–0,67%, 0,31%, 0,35%, 0,29%, 0,12% saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliگیň miweleri reumatizmde, bogun yzalarynda, deri kesellerinde peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümliگیň dermanlyk serişdeleriniň gipotenziv täsiri ýüze çykarylýdy.

Özüniň hoşboý tagamy üçin, miweleri kulinariýada şireleri, mürepbeleri, jemleri we azyklyk boýaglary taýýarlamakda ulanylýar.

Bal beriji we ot–iýmlik ösümlik.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümliگیň 2 çay çemçe (10 g) guradylan miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 10 minut gaýnatmaly. Ony 20–30 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri agyryly yerlerine çalmaly.

Aktikeniň 2 nahar çemçe (30 g) guradylan miwelerini bir litrlik termos demlemeli, birneme goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri ýapgy etmeli.

## SIŇŇILOTY

### Жабник полевой

### Filago arvensis



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümliگی. Nepisje ösümliگیň Türkmenistanda 3 görnüşü duş gelýär.

Siňňiloty – çylyşyrymlygüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 5–30 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Baldagy göni, sübseli-şahalanan, seýrek yönekeý, gürr, çalymtly tüýlüje. Ýapraklary uýy çowly ýa-da çyzykly-uýy çowly, uzynlygy 5–15 mm we ini 1–3 mm, ýiti, ýumşak ýünjümeç tüýlüje.

Sebetjiginiň uzynlygy 2–3 mm, ýumurtga şekilli ýa-da piramida kysmy, 2–10-dan köp sanly başjagaza ýyganan, şahajyklaryň depesinde ýerleşýär, sübsse we salkym görnüşli gül toplumyny emele getirýär. Gülýanynyň ýaprajyklary gysga ýa-da sebetjiginiň uzynlygyna deň. Gyny iki hatarly ýa-da üç hatarly, onuň daşky ýaprajyklarynyň sany – 5–10, çyzykly ýa-da uýy çowly, gaýyk görnüşli, uzynlygy 2–3 mm, sähelçe ýitileşen ýa-da kütäk, garsasyz (kilsiz), ortaklary

ýaşyl, gyalary perdeli, ak, içi görnüp duran, arka tarapynda tutuşlaýyn, gür, ak, ýünjümeň tüýljuje, ýokarsy ýalaňaç, tohumy bişende ýyldyz şekillije. Içki ýapraýyklarynyň sany – 5, giň uýy çowly, birneme egrelen, uýy ýiti ýa-da kütegräk, perdeli, ortasy ýaşylymytyl, gyalary ak, arka tarapy sähelçe tüýljuje ýa-da ýalaňaç. Içki pestikli gülleriniň üpüjigi 12–14 ownuk dişjagazly çiteneklerden durýar. Çigitjagazy süýrümlik-ýumurtga şekilli, sähelçe gysylan, açyk-goňur renkli, ýalaňaç, seýrek, beýleki görnüşlere garanynda has iri, emzijekli, ownuk, uzynlygy 1 mm we ini 0,3 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Siňňiloty ölkämizde düzlüklerden başlap, deňiz derejesinden 400–600 metr belentlige çenli aralyklarda bitýär, medeni oturymlarynda haşal ösmäni, jülgelerde we dagetek eňňitlerinde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýulda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda, Sumbar jülgesinde, Süntde, Ýolderde; Merkezi Köpetdagda: Arwazda, Wanowskide; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide, Guruhowdanda, Şamlyda; Köpetdagetek medeni oturymynda: Serdarda duşýar.

**Tebigy gory.** Siňňiloty ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşýar, haşal ösümliki hökmünde gür otluklary emele getirýär. Her ýylda 10–15 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümlikiň oty, ýapraklary we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny we ýapraklaryny ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun), tohumyny – bişen wagtynda (iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklaryndan we otundan taýýar bolan çig mallary mata haltalara, tohumyňkyny – kagyzy gutujyklara gaplamaly. Gury hem salkyn ýerde saklamaly. Otuň we ýapraklaryň saklanýş möhleti – 1–2, tohumyňky – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Siňňilotunyň ýerüsti böleginde alkaloidler, C witamin, eý maddalar, kwersetin, lýtuteolin we sinarozid flavonoidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümlikiň otunyň peti we jöwheri ýürek-damar ulgamynyň kesellerinde: stenokardiýada, tahikardiýada, gipertoniki sökelliklerde, şeýle-de aşgazanyň başly kesellerinde, diareýada,

menorragiýada, ysytmada, newrozlarda, kakynda, başlarda, iriňli ýaralarda peýdalanylýar. Mundan başga-da, zenan kesellerinde, bokurdak we agyz boşlugynyň sökelliklerinde (çaykamak), çişlerde we bokurdakdaky yzalarda (buga tutmak), diatezde, gijilewükde, deriniň iriňli kesellerinde (suwa düşünmek), düwürtikleri guratmakda (tozlary ýa-da merhemleri) neplenýär.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplary) otunyň we ýapraklarynyň peti we jöwheri diareýada, ganly içgeçmede, anginada, diş agyryda haýyrlanylýar. Ol melhemleri gijilewükde, skrofulýozda (buguna tutmak), iriňli ýaralarda, ýanyklarda (jöwherini zygyr yagy bilen bilelikde) ulanylýar. Tohumy içegeleriň sanjysynda neplenýär.

Siňňiloty şeýle hem weterinariýada peýdalanylýar.

Bezeg ösümlik.

### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümlikiň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 20 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek nahardan ön 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Siňňilotunyň 4 çay çemçe (20 g) owradylan ýapraklaryny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanyan alawda 30 minut gaýnatmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan peti gün içinde 3 sapa 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Ösümlikiň 1 çay çemçe (5 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 20 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 ýola nahardan 30 minut ön 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Siňňilotunyň 2 çay çemçe (10 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 40 minut goýmaly. Hasa bilen süzmeli. Häzir bolan jöwheri her gün 3 wagtyna nahardan 30 minut ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Ösümlikiň 1 çay çemçe (5 g) mäjumlanan tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, bir sagat goýmaly. Yzsüre süzmeli. Taýýar bolan jöwheri gün içinde 3 sapa 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.

Siňňilotunyň 2 çay çemçe (10 g) owradylan otuny 1/2 bulgur (100 ml) ösümlik ýagyna atyp, garaňky ýerde bir gije-gündiz goýmaly. Yzygiderli çaykap durmaly. Häzir bolan merhemi süzüp, deridäki örgünlere çalmaly.



# SOWDAGAN

## Двучленник пузырьчатый *Diarthron vesiculosum*

**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Nepisje otjumagyň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Sowdagan – woliçnikler maşgalasynyň sowdaganlar urugynyň boýy 20–40 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik göni inçe şahalanan baldakly we şahalary ýokarlygyna ýaýbaň, ýaprakly. Ýapraklary çyzykly-süýrümlik ýa-da uýy çowly, uzynlygy 6–13 mm we ini 1,0–3,5 mm, iki uýy hem gysylan, ýokarsy küteträk ýa-da gysgajyk ýitileşen, ýalaňaç, çalymtyl, örän gysga sapaklyja.

Gülleri baldagyň we şahalaryň depesinde ýapraksyz salkymda ýerleşýär. Başda gysga (3–5 mm), miwesinde 30 mm çenli sürelen, gül sapajyklary gysga – uzynlygy 1 mm çenli, ýokarsy giňän, ýalaňaç, gül ýapraksyz. Gülüňlary ýaşylymtyl reňkli, ýalaňaç, trubkasynyň uzynlygy 3–4 mm, düwünçeginiň orta bölegi dik, agzaly, kepjeleri göni, bir-birine ýakyn, çyzykly-uýy çowly, gysga – uzynlygy 0,8 mm. Hozjagazy ýumurtga şekilli, gara reňkli, ýalpyldawuk, perde bilen örtülen, güľýanyň bölegi birneme çişen.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Sowdagan ölkämizde dagöňüniň düzlüklerinde, deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde, käte günorta medeni oturymlarynda we çöllerde bitýär. Ösümlik maý–iýulda gülleýär, iýun–oktyabrda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly we Kiçi Balkanda: Sekidagda, Çalsuwda, Şorjada, Toraňňalyda; Kürendagda: Jebelde, Temenderede, Torgaýda, Margyzda, Oboýda, Jelilede, Isgenderde, Ýaşyl jülgede; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Çohagaç dagynda, Magtymguluda, Bagandyr jülgesinde; Merkezi Köpetdagda: Sülüklide, Çopandagda, Arçabilde, Wanowskide, Gurtlusuwda, Asylmada, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Guruhowdanda, Çyrlakda, Tekeçengesinde, Hiwabatda; Bathyzda: Daşköprüde, Nowruzabatda, Ellibirde, Serhetabatda, Tagtabazarda; Köýtendagda: Çarşaňnyda, Marguşyda, Deňizgölde;

Hazarýaka çölünde: Etrekde; Demirgazyk-Günbatar Garagumda: Bereketde; Sandykly çölünde: Burguçyda; Köpetdagetäk medeni oturymynda: Serdarda, Bamyda, Aşgabatda, Bagyrda, Gäwersde, Kakada; Tejen-Murgap medeni oturymynda: Tejende, Sarahsda, Garrybentde; Amyderýa medeni oturymynda duşýar.

**Tebigy gory.** Sowdagan ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde haşal ösümligi hökmünde köp we käte bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Her ýylda, takmynan, 100 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Çig maly gury hem salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Sowdaganyň düzümine karotin karotinoidler, saponinler, kumarinler, flavonoidler, lipidler, ýag, palmitin, linol, geksadesen, linolen gidrolizatly turşular girýär. Onuň miwelerinde we tohumlarynda lipidler, gidrolizatly ýag we linol turşular saklanýar.

**Peýdalanlyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň otundan taýýarlanylýan petidir jöwherini ukusyzlykda, işdän kesilende az mukdarda peýdalanmaly. Ösümligiň zäherlidigi sebäpli, ulanmaznyň ön ýanynda hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Bal beriji ösümlik.

### Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) owradylan otuny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10–15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan 30 minut ön 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.

Sowdaganyň 1 çay çemçe (5 g) gury otuny 0,5-litrlik termosda demläp, bir sagat goýmaly. Mazaly demini alandan soň süzmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 ýola 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

# SPIRALLY GAÝRAÇ

Унгерния спиральная

*Ungernia spiralis*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Ýokary bezeg hem boýag häsiýetli otjumagyň Türkmenistanda 4 görnüşi duş gelýär.

Spirally gaýraç – nargyzgüllüler maşgalasynyň gaýraçlar urugynyň boýy 10–30 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Soganlygy ýumurtga şekilli. Baldagy ýaprakly ýa-da ýapraksyz gül palaçly. Ýapraklary iki hatarly, okunda towlanan, daşkysy içkisinden 2 esse giň.

Gülleri dogry, köp bolmadyk gülleri saýawana jemlenen, gülgün, açyk-goňur ýa-da gyzylmytyl ýa-da gyzylmytyl-goňur reňkli. Gülýanyň trubkasy бүкүлүян yerinden gysga. Onuň ýapraýyklarynyň iki hatary hem gültäç wekilli. Düwünçegi aşaky. Tyçinkasynyň sany – 6. Miwesi – gozajyk.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Spirally gaýraç ölkämizde deňiz derejesinden 800–1200 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly, ownuk topurly-çagyly, köplenç eroziýa ahwally eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlük awgust–oktyabrda gülleýär hem miweleýär. Ol soganlykly polikarpik. Ösümlük wegetatiw ýoly arkaly we tohumy bilen köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Güýende, Çendirde (Ýokarky Çendiriň hanasy), Bakjada duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Spirally gaýraç ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ol Aşgabadynyň botanika bagynda soganlygyndan we tohumyndan ekip ýetişdirilýär. Ösümlük Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) we TGHB-niň Gyzyl sanawyna (1998) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň soganlygy we ýapraklary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Soganlygyny ir baharda (mart), ýapraklaryny – ösümlük gülleýän döwründe (awgust–sentýabrda) ýygnamaly. Ýapragyny seresaply pyçak bilen kesmeli ýa-da orakda ormaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 2 ýyla çenli.

**Himiki düzümi.** Spirally gaýraýyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümligiň soganlygynda we ýapraklarynda alkaloidler: galantamin, likorin, pankreatin we beýlekiler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň ýapraklaryny dem alyş ýollarynyň kesellerinde, hususan-da ýiti we dowamly bronhitlerde, gusduryjy hem gakylyk goparyjy serişde hökmünde peýdalanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly etrabynyň daglyk obalarynda) soganlygynyň petini nerw bozulmalarynda rahatlandyryjy serişde hökmünde ulanylýar. Soganlygyndan we ýapraklaryndan taýýarlanýan şerbetini beýniň çäýkanmasynda, reumatizmde, nerw ulgamynyň, peşew we peşew ýollarynyň kesellerinde çalmak arkaly haýyrlanylýar.

Bezeg we boýag ösümlük.

**Derman taýýarlanlyşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň aralyk 2 soganlygyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti günün dowamynda 2 gezek (irden hem agşam) 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Gaýraýyň 2 nahar çemçe (30 g) guradylan ýapraklaryny 1 litr suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan otda 10–15 minut gaýnatmaly. Otag temperaturasyna çenli sowatmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan peti her gün 3 sapar nahardan soň 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.



Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owardylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 7–8 minut goýmaly. Yzsüre süzmeli. Taýýar bolan jöwheri gün içinde 3 ýola nahardan 20–30 minut öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Gaýraýjyň 1 çay çemçe (5 g) guradylan soganlygyny we ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) 40%-li medisina spirtiniň içine atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün goýmaly. Yzygiderli çaykap durmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan şerbeti günde 3 gezek nahardan 20–30 minut öň 5–10 damjadan kabul etmeli, şeýle-de bedeniň agyryly ýerlerine çalmaly.

## SÜÝRI ÝAPRAKLY KEÝIGOT

Зизифора клинолистная  
*Ziziphora clinopodioides*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Süýri ýaprakly keýigoty – dodakgüllüler maşgalasynyň keýygotular urugynyň boýy 20–50 sm ýetýän köpylyk otjumak ýa-da ýarymgrymsyja wekili. Ösümlik köp sanly baldakly, tüýlçe, esasan gül toplumu. Ýapragy uýy çowly, giň uýy çowly, ýumurtga şekilli ýa-da tegelenen (uzynlygy 0,4–1,8 sm).

Gülleri gülgün, gülgün-sowsany ýa-da gülgün-syýa reňkli, iki dodakly, sapaklyja, ýarym şar ýa-da süýrümlik baş gül toplumyna ýyganan (gabarys 1–2 sm), köp sanly çogdamdan durýar. Hozjagazy süýrümlik-ýumurtga şekilli (uzynlygy 1,5–1,7 mm we ini takmynan 0,5 mm), açyk-göňur reňkli, ýalaňaç, ýylmanak.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Süýri ýaprakly keýigoty ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde

bitýär. Ol ownuk topurly-çaýgylly eňňitlerde, jülgerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–awgustda gülleýär, iýul–awgustda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Soňudagda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Tutlygalada, Çohagaçda, Hasardagda, Süntde, Gyzdagda; Merkezi Köpetdagda: Garawulda, Nohurda, Arwazda, Tagarawda, Sarymsaklyda, Degirmenlide, Sülükilde, Müsünewde, Mergenölende, Germapda, Heýrabatda, Çäyekte, Semansurda, Çopandagda, Arçabilde, Garaňkyda, Sibirde, Gökderede, Duşakerekdagda, Babazawda, Dagysda, Daştoýda, Asylmada, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Çyrlakda; Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Süýri ýaprakly keýigoty ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşup, gürr otluklary emele getirýär. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Her ýylda azyndan 35–40 tonna ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty, ýapraklary we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli ýajda galyň matanyň üstünde guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan we ýapraklaryndan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Çig mallaryň saklanýş möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Keýigotunyň düzümine efir ýagy (onuň düzüminde pulegon, 1,8-sineol) girýär. Onuň köklerinde 0,39% organiki turşular, 0,35% efir ýagy, saponinler, 1,08% alkaloidler, C witamin, 0,005% eý maddalar, flavonoidler saklanýar. Ösümligiň ýerasty böleginde organiki turşular, 0,90–2,49% efir ýagy (onuň düzüminde α-pinen, β-pinen, limonen, menton, 27–28% izomenton, izomentil däl asetat, 55,2–56,5% pulegon, β-sitronellol, α-kariofillen, β-kariofillen, β-gurýunen, ilagen, ar-kurkumen, piperitenon, timol, kamfen, sabinen, β-mirsen, α-fellandren, β-osimen, 1,8-sineol, n-simol, terpinolen, alloosimen, α-gurýunen, nerol, geraniol, geptanol-2, β-fellandren, γ-terpinen, β-elemen, γ-elemen, alloaromadendren, gumulen, β-bizabolen, β-kadinen, γ-kadinen, kalamenen, α-kalakoren, karwakrol), triterpenoidler: oleanol turşusynyň stereoizomeri, 0,45% bungeol turşusy, alkaloidler, 2,93–5,42% eý maddalar, fenolkarbon turşusy we olaryň ugurdaşlary: kofe, metal efir 4-gidrokksi-3,5-dimetoksibenzon turşusy; flavonoidler: ziforin, hrizin, akasetin, diosmetin, 7-O-hrizin rutinozidi, linarin, diosmin,

lyuteolin, timonin, 7-metilsudahitin bar. Baldaklarynda 0,42%, ýapraklarynda 0,86%, güllerinde 0,61% organiki turşular, 1,30% efir ýagy, saponinler, 0,88% alkaloidler, flavonoidler, C witamin, 4,19% eý maddalar, gunçalarynda C witamin saklanylýar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümliğin dermanlyk häsiýetleri has gadymyýetden belli bolupdyr. Ol barasynda ilkinji maglumatlar Gippokratyň (b.e. ön 460–377-nji ýyllar) diwanlarynda gabat gelýär.

Orta asyrlaryň alym-lukmany Abu Aly ibn Sina özüniň lukmançylyk tejribesinde keyigotuny ýaralary bejermekde ulanypdyr.

Halk lukmançylygynda ösümliğin oty gipertoniýada, aterosklerozda, ýürek infarkty geçirenden soňra, beýleki ýürek-damar kesellerinde, aşgazan-içege bozulmalarynda, hususan-da mädedäki yzalarda, ýürekbulanmada, ýaramaz işdäde, ýaralary bitirmekte peýdalanylýar. Ösümliğin ýapraklarynyň peti diuretik serişde hökmünde, merzýelde, aşgazan sanjysynda, ýürekbulanmada, işdän kesilende ulanylýar. Ol melhemi çagalardaky bokurdak kesellerinde çäykamak arkaly haýyrlanylýar. Gülleriniň ekstrakty gastritde, ýygy-ýygdan gusmada, meteorizmde neplenilýär.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly, Gökdepe we Köýtendag etraplary) otunyň peti we jöwheri umumy berkidiji hökmünde, ýürek işjeňliginiň gowşamagynda, gipertoniýada, newrasteniýada, aşgazan-içege sökelliklerinde, içgeçmede, çagalaryň kolitinde ulanylýar. Ol melhemliklere madda alyş-çalyşygyň bozulmalary bilen bagly bolan deri kesellerinde suwa düşülýär. Ösümliğin ýapraklarynyň peti aşgazan-içege we weneriki kesellerde, ýürekbulanmada, çagalaryň bokurdak kesellerinde haýyrlanylýar. Ýapraklarynyň we gülleriniň jöwheridir çäýy peşew çykaryjy, derlediji, işdäni açmakda gyjyndyryjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Olardan mesge bilen garylyp taýýarlanylýan merhemi ýaralary bitirmekte we çişleri sormakda neplenilýär.

Ylmy lukmançylykda ösümlikdäki alkaloidleriň jeminiň kardiotonik we gemostatik häsiýeti ýüze çykaryldy. Onuň ekstrakty, peti we jöwheri kollateral koronar ganakmasyna, infarkt miokarda we onuň önüni almaklyga melhemlik oňyn täsirli, gipertoniiki kesellere, ýürek we klimakterik newrozlara, ýiti we gan aýlanyşyň ýetmezçiligi bilen baglanyşykly garrylyk rewmiokardite, çagalardaky rewmatik endomiokardite haýyrlý. Şeýle-de gipoksiýada dem alyş fermentleriniň işjeňligini gowulandyryýar.

Ösümliğin ýerüsti böleginden taýýarlanylýan «ziziforin» derman serişdesi antiaritmik, kardiotonik we gipotenziw häsiýeti ýüze çykaryýar.

Keyigotunyň dermanlyk serişdeleri ýüregiň işemiýa keselinde, aterosklerozda, miokartda peýdalanylýar.

Keyigotunyň efir ýagy parfümeriýa senagatynda ulanylýar.

Otunda hoşboý tagamynyň bolanlygy sebäpli, balyklary gaýtadan işlemekde jaz bolup hyzmat edýär.

Bezeg, azyklyk, bal we perga beriji ösümlik.

### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 çäý çemçe (5 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10–15 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Keyigotunyň 1 çäý çemçe (5 g) owradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanyan alawda 5–10 minut gaýnatmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan peti gün içinde 3 sapa nahardan ön 1 çäý çemçeden (5 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) otuny bir litrlik termosada demlemeli, birsalym goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 ýola nahardan ön 1 bulgurdan (200 ml) içmeli. Dowamlylygy – bir aý.

## **ŞINE ÝAPRAKLY SESELI**

**Жабрица клинолистная  
Seseli cuneifolium**

**Häsiýeti.** Haşal derman ösümliği. Otjumagyň dünýäde, takmynan, 100, Türkmenistanda 2 görnüşi duş gelýär.

Şine ýaprakly seseli – saýawanlylar maşgalasynyň seseliýalar urugynyň boýy 80–90 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Ösümlik tas ýalaňaç, çal reňkli. Baldagy ýekeleşýän, togalak, inçe joýaly, aşaky bölegi sähelçe tüýlülje, ortasyndan ikileýän şahalanan. Ýapraklary etlek, iki tarapy hem ýalaňaç. Kökýanynyň ýapraklary rozetka ýakyn, uzyn, göni sapaklyja. Olaryň sapaklary berk, togalak, esasynda giňäp üçburçly gyny emele getirýär. Ýapraklarynyň ülsüniň sudury giň üçburçly ýa-da süýri, ikileýän ýa-da üçleşýän dilinen. Birinji we ikinji tertibiniňki uzyn joýaly, ýokarylygyna egreden; ahyrkylary – sapaksyz, pişme kysmy, üç bölünen



ýa-da dilimlenen iri dişlije, uzynlygy 20–30 mm. Baldakdaky ýapraklary kiçi, aşaklary we ortaklary – sapakly, ýokarkylary – bir gysga gynly. Baldakdaky ýapraklaryň ülüşleri uýj çowly we çyzykly, gýralary büzülen, azda-kände tüýlüje.

Sebetjigi 2–6-şöhleli. Şöhleleriniň uzynlygy 2–4 sm, göni, kütilişen, gyny ýok. Sebetjigi gür, başlyja, gynyndan 12-si giň uýj çowly, aşaky üçden birisi bitişen, ýapraklary tüýlüje. Güljagazlary saýawanda 30–40-dan ýerleşýär, sapaksyz. Okarajygy dişsiz. Gül ýapraklary elliptik, içine gýşaran, ýokarsy ýitileşen, içi seýrek tüýlüje, uzynlygy 1,1 mm. Miweleri süýrümlik, gür ak keçe ýaly tüýlüje, uzynlygy 5 mm. Merikarpiýasy silindrik, gapyrgajygy ýiti garsa görnüşli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Şine ýaprakly seseli dag derýajyklarynyň gury hanalarynda, ýuwan zylçaly reňkli topraklarda, çinklerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýul–awgustda gülleýär, awgust–sentýabrda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpelyär, monokarpik ýa-da polikarpik.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kiçi Balkanda; Kündagda; Taýtyowlakda; Hazaryaka çölünde; Türkmenbaşyda, Akjaguýmada; Üstýurtda duşýar.

**Tebigy gory.** Şine ýaprakly seseli ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory çäkli. Ekip ýetşdirmek maslahat berilýär. Haşal ösümliki hökmünde duş gelýär.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri, oty we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otuny – ösümlik gülleýän döwründe (awgust–sentýabr), miweleri – bişen wagtynda (sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerinden we ýapraklaryndan taýýar bolan çig mallary mata haltalara, miweleriniňki – kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, garaňky ýerde saklamaly. Kökleriň we miweleriň saklanyş möhleti – 2–3, otunyňky – 1–1,5 ýyl.

**Himiki düzümi.** Şine ýaprakly seseliniň düzümine 0,50–0,55% efir ýagy, kumarinler, flavonoidler girýär. Onuň kökleri efir ýagyny, kumarinleri: izoimperatorin,

bergapten, anomalin, pteriksin, suksdorfin, 3`-asetoksi-4`-senesioiloksi-3`,4`-digidroseselin, ýumutanol saklaýar. Ösümliğin ýerüsti böleginde efir ýagy bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin kökleri we oty ysytmada, gysylma ýagdaýlarynda, diş agyryda, dowamly bitmesi kyn ýaralarda, demigmede peýdalanylýar. Ösümliğin miweleri paronihijada, meteorizmde, aşgazan-ägege ulgamynyň organlarynyň kesellerlerinde, ýiti respirator ýokançlarynda, spazmolitik, newrotik we diuretik serişde hökmünde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümliğin kökleriniň çişleriň garşysyna täsir edýän gowşak işjeňligini, otundaky efir ýaglarynyň antibakterial, şeýle-de fungistatik, antiamyoba, miweleriniň bakterisid häsiýetleri ýüze çykaryldy. Olar weterinariýada hem peýdalanylýar.

Ösümliğin efir ýagy parfümer we guta basmak senagatlarynda giňden ulanylýar.

Bal beriji we ot-iymlik ösümlik.

### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) owradylan köklerini 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3–4 gezek 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Seseliniň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan miwelerini 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanyan alawda 10–15 minut gaýnatmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan peti gün içinde 3–4 sapar nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin 2 nahar çemçe (30 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, bir litrlik termosda demlemeli, 30 minut goýmaly. Yzysüre süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 wagtyna nahardan ön 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Seseliniň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) 40%-li medisina spirtiniň içine atyp, agzy berk ýapylyan aýna gapda, garaňky ýerde 14 gün goýmaly. Yzygiderli çäýkap durmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwhere agzyňy çäýkamaly hem ony yzaly yerlerine çalmaly.

# ŞÖHLELI DAŞKEKRE

Василек солнечный

*Centaurea solstitialis*



## Häsiýeti.

Dagetek derman ösümligi. Şöhleli daşkekre – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň daşkekrelere urugynyň boýy 30–100 sm ýetýän birýyllyk otumak wekili. Ösümlik tutuş çal reňkli, gürräk-kereplije ýa-da kereplije-ak keçe ýaly tüýljuje. Baldagy ýekeleşýän, göni, köp bölegi ortasynda ýa-da birneme aşagragy, seýrek tas esasyňa çenli, şahalanan, uzyn ýaýraň ýokarlygyna galyp duran, ýokarkysy 1/3–1/2 gowşak şahalanan (1–2 gysgalan şahajykly), seýrek ýönekeý şahaly, gapyrgaly, inçe ganatlyja, sebetjigine çenli ýaprakly. Ýapragynyň gýralary бүдүр-сүдүр bolup, olardan ýiti çitenekler emele gelýär, iki tarapy hem çalymtyl, kerepli, ak keçe ýaly tüýljuje. Iň aşaky ýapraklary gysga sapaklyja, liroşekilli bölünen, süýrümlik, uýy ýitileşen, ownuk dişlije ýa-da gýralary abat segmentli, adatça, her tarapynda 2–6 sanysy we has iri, üçburçly-ýumurtga şekilli ýa-da tas elliptik, gýralary ýiti dişlije, käte tas gýralary abat ýokarky segmentli, seýrek abat. Galan ýapraklary uýy çowly-çyzykly, ýitileşen, adatça, gýralary abat, uzyn, baldakdan gaçýar. Sebetjikleri şahalaryň depesinde ýerleşýär we gysgalan şahajyklary ýekeleşýän, olar ösümlikde az sanly. Gyny sähelçe kereplije, ýumurtga şekilli-konus kysmy, uzynlygy 13–15 (18) mm we ini 7–12 (15) mm. Onuň ortaky ýaprajyklary ýumurtga kysmy, gaty, uzynlygy (12–30 mm), güýçli egreden, sary tikenjik, esasynda per şekilli ownuk (uzynlygy 2,5–4,0 mm) tikenjikler ýerleşýär. Olar 2–3-den her tarapynda bardyr. Içki ýaprajyklarynyň köp bölegi inçe, has gysga, uzynlygy 4–7 mm, tikenli. Içki ýaprajyklary süýrümlik-uýy çowly ýa-da süýrümlik, perdeli, ýuka, köplenç goňrumtyl reňkli deň dolmadyk dişlije, kiçijik çykyntyly.

Gülleri sary reňkli; gapdalyndakylary – ortadakylardan birneme gysgarak, çuň üç-baş bölünen, inçe-çyzykly ülüşli egreden. Çigitjagalary süýrümlik-elliptik ýa-da süýrümlik-ter ýumurtga şekilli, goňur reňkli, başda ýaýraň tüýljuje, ýetişenleri ýalaňaç, ýylanak, gysylan, ýalpyldawuk, uzynlygy 2,5 mm we ini takmynan 1 mm, onuň daşky hatary üpüksizje, galanlary – ak, galýan, ikileýin, çitenekli üpüklije. Daşky üpüjegi çigitjagazyndan iki esse uzynrak, uzynlygy 5 mm, içkileri – birnäçe esse gysga.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Şöhleli daşkekre ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol gury ownuk topurly we ownuk topurly-çagyly eňnitlerde, jülgelerde haşal bolup ösmäni halaýar. Ösümlik maý–iýulda güllýär, iýun–awgustda miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly we Kiçi Balkanda; Kürendagda: Däneatada; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Könekesirde, Tämilde, Magtymguluda, Sumbarda, Hojagalada, Süntde, Yolderede, Çendirde, Çakangalada; Merkezi Köpetdagda: Garwulda, Nohurda, Arwazda, Tagarawda, Degirmenlide, Sülüklide, Mergenölende, Gylgylawda, Germapda, Arçabilde, Giňdiwarda, Uly Garaňkyda, Gökderede, Duşakerekdagda, Wanowskide, Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Babazawda, Dagýşda, Daştoýda, Asylmada, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide, Guruhowdanda, Çyrlakda, Şamlyda, Aksuwda, Hiwabatda, Arçynýanda, Garatikende; Bathyzda: Serhetabatda; Köýtendagda: Marguşyda; Hazarýaka çölünde: Etrekde; Etrek medeni oturymynda; Köpetdagetok medeni oturymynda: Baharlyda, Gökpede, Köşüde, Aşgabatda, Bagyrda, Gäwersde, Kakada duşýar.

**Tebigy gory.** Şöhleli daşkekre ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ol bitýän ýerlerinde bol duşup, gürr otluklary emele getirýär. Her ýylda, takmynan, 15–20 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri, ýapraklary we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), ýapraklaryny we gülleri – ösümlik güllýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerinden we ýapraklaryndan taýýar bolan çig maly kagyz we mata haltalara, güllüniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Olary gury, garaňky ýerde saklamaly. Kökleriniň saklanýş möhleti 2–3, ýapraklarydyr gülleriňkini – 1–2 ýyl.



**Himiki düzümi.** Daşkekräniň düzümine uglewodlar we olaryň ugurdaşlary: arabinoza, sahara; alifatik spirtler, efir ýaglary, seskwiterpenoidler: 0,005% sentaurepenzin, solstitialin, solstitialin A, repin, sublyuteolid, akroptilin, ýanerin, sinapopikrin, solstitialid, episolstitialid, stizolisin; triterpenoidler, kauçuk, alkaloidler, C witamin, eý maddalar, flawonoidler, geterosiklik kislorod saklaýjy birleşmeler: 5-gidroksimetil-2-furfuraldegid, lipidler: ýag turşusynyň efirleri girýär. Onuň kökleri düzüminde poliasetilen birleşmeleri: tridekadien-1,11-tetrain-3,5,7,9 saklaýar. Ösümligiň ýerüsti böleginde 2,1% uglewodlar, seskwiterpenoidler: stizolisin, triterpenoidler; steridler, 0,05–0,65% alkaloidler, C witamin, fenolkarbon turşular, 1,8% eý maddalar, kumarinler, flawonoidler bar. Baldagydyr ýapraklarynda seskwiterpenoidler: solstitialin A, solstitialiniň asetaty, sinaropikrin, dezasetilsinaropikrin, taraksaterol triterpenoidler, flawonoidler: gomoorientin (izoorientir), orientin, şaftozid, 7-kwersetin glýukozid, 3-kwersetin glýukozid saklanýar. Ýapraklarynda 0,6% seskwiterpenoidler: solstitialin, solstitialiniň asetaty, skabiolid bar. Güllerinde 8,44% uglewodlar, 0,2% efir ýagy, 0,03% alkaloidler, C witamin, 3,34% eý maddalar, flawonoidler: orientin, gomoorientin, şaftozid, 3-kwersetin glýukozid, 7-kwersetin glýukozid, spinasetin, aksillarin, patuletin, gidrolizat 6-metoksi-3-O-metilkempferol, 6-metoksi-3-O-metilkwersetin (3,6-kwersetagetiniň dimetil efir, 5,7,3',4'-tetragidrokso-3,6-dimetoksiflawon, aksillfrin) saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda, ösümligiň kökleri gamaşdyryjy we aşgazany pugtalandyryjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Mundan başga-da, onuň gülleri gyzgyny peseldiji serişde üçin ulanylýar.

Halk we ylmy lukmançylygynda daşkekräniň efir ýagynyň we ýapraklarydyr gülleriniň aseton ekstraktlarynyň antibakterial işjeňligi ýüze çykarylady. Ösümlik dem alşa we gan aýlanyşyna stimullirleýji täsir edýär, şeýle-de ýylmanak muskullary tonizirleýär, köklerini aşgazanyň giposeksiýasynda, güllerini – ysytmada, tultuklykda, işdäni peseltmekde ulanmak maslahat berilýär.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1–2 çay çemçe (5–10 r) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, bir sagat goýmaly. Süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3 wagtyna nahardan 15 minut ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Şöhleli daşkekräniň 1 çay çemçe (5 g) guradylan güllerini 1 bulgur gaýnag suwa atyp, goýmaly. Hasa bilen

süzmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 gezek nahardan 30 minut ön 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

## **TEGELEK ÝAPRAKLY GERAN**

**Герань округлолистная  
Geranium rotundifolium**



**Häsiýeti.** Haşal dagetek derman ösümligi. Nepisje owadan ösümligiň dünýäde 350-den gowrak, Türkmenistanda 9 görnüşi duş gelýär.

Tegelek ýaprakly geran – geranlar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 20–40 sm yetýän birýyllyk otjumak wekilli. Ösümligiň baldagy ýaýraň şahalanan, gürr gysga ýumşak, ýokarsy gaty tüýjagazlar bilen örtülen. Ýapraklary tegelek-böwrek şekilli, baş-ýedi bölünen, kütäk dişlije bölünmedik segmentli, iki tarapy hem gysga we ýumşak tüýljuje. Okara ýaprajyklarynyň uzynlygy 3–4 mm, tüýljuje, oky gysga.

Gül ýaprajyklary okara ýaprajyklaryndan uzynrak, uzynlygy 5–6 mm çenli, ýokarsy abat, süýrüntik-pahna şekilli, symgylt-sowsany ýa-da gülgün reňkli. Miwesiniň gabygy ýylmanak, bulam-bujar tüýljuje, miwesi bişenden soňra çünkünden bölünip aýrylýar we onuň bilen bilelikde towlanýar. Tohumyň gabygy ownuk çukurlyja.

**Ýaşaýyş aýratynlygy.** Tegelek ýaprakly geran ölkämizde dagetek düzlüklerinden başlap tä deňiz derejesinden 1200 metr belentlikde bitýär. Ol jülgedir dereleriň demirgazyk eňitlerinde, derýajyklaryň we çeşmeleriň golaýynda, bakjalarda we üzümçiliklerde, köplenc, dageteklerinde, seýrek medeni oturumlarynda haşal ösüp boý almany halaýar. Ösümlik (mart) aprel–

maýda gülleýär, maý–iýunda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly we Kiçi Balkanda; Kürendagda: Jebelde, Garagözde, Doýronda, Isgenderde; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Hojagalada Süntde, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Arçabilde, Garaňkyda, Neftanowskide, Gökderede, Duşakerekdagda, Gurtlusuwda, Hunçada, Asylmada; Gündogar Köpetdagda: Manyşda, Duşakda; Köýtendagda; Hazarýaka çölünde: Türkmenbaşyda; Köpetdagetäk medeni oturymynda: Serdarda, Aşgabatda duşýar.

**Tebigy gory.** Tegelek ýaprakly geran ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşup, haşal ösümliki hökmünde gabat gelyär. Her ýylda, takmynan, 30–40 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty we ýapraklary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary ösümlik gülleýän döwründe (aprel–maý) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli ýaýda galyň matanyň üstünde guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Tegelek ýaprakly geranyň düzümine 1,68% efir ýagy, flavonoidler: 3-rutinozido-4'-kemferol glýukozidi girýär. Onuň ýerüsti böleginde sahara, glýukoza, fruktoza, raffinoza uglewodlary, azot saklaýan birleşmeler: γ-aminoýag turşusy; geranin, izogeranin eý maddalary, geksagidroksohidifenol, degidrokeksagidroksohidfenow glýukozidleri we gallow turşulary saklanýar. Ýapraklarynda kwersetin gidrolizat we kemferol flavonoidler bar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümliğin dermanlyk häsiýetleri irki döwürlerden belli. Ol barasyndaky ilkinji maglumatlar Pliniý ulunyň (b.e. 23–79-njy ýyllary) «Tebigy taryh» atly nusgawy eserinde berilýär.

Gülleriň dilinde ol köşeşdirmek, hormat goýmak diýen manyny aňladýar. Geran öýde atmosferany arassalamaga ukyply diýip hasap edýärler.

Orta asyrlarda Gündogaryň parlak ýyldyzlarynyň birisi meşhur alym Abu Reýhan Biruny özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly işinde geranyň melhemlik häsiýetleri barasynda beýan edýär.

Halk lukmançylygynda ösümliğin otundan taýýarlanylýan petidir jöwheri gamaşdyryjy we gemostatiki serişde hökmünde ulanylýar. Oňa diatezde suwa düşünilýär. Ýapraklarynyň şiresi dürli düwürtikleri dep etmekde

haýyrlanylýar. Jöwherlerini, buga tutulan täze otuny ýa-da şiresini agyryň bogunlara we gabarçyklara ýapylýar, şeýle-de gan akmasyny saklamak üçin peýdalanylýar. Ösümliğin melhemlik jöwheri içgeçmede, ganly içgeçmede, enterokolitlerde neplenýär. Mundan başga-da, geran gulak we böwregüsti agyrylary, ýaralary, zäherli ýylanlar çakanda, kerligi bejermek üçin, agyryny aýryjy, antiseptik, gany togtadyjy serişde hökmünde ulanylýar. Şeýle-de kelläni ýuwmak we ýatgydan akýan gany saklamak üçin neplenilýär.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly, Gökdepe we Ruhabat etraplarynda) otunyň jöwheri öýken gan akmasynda ulanylýar, onuň bilen iriňli ýaralary ýuýýarlar, angina bokuřdagyny çaykaýarlar.

Bezeg, bal beriji, ot-iymlik, boýag we eýleýji ösümlik.

### Derman taýýarlanylýşy hem ulanylýşy:

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owardylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 20 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek nahardan 30 minut öň 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Geranyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp mäjumlanan otuny 2 bulgur (400 ml) sowuk suwa atyp, 8 sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde her 2 sagatdan 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

## TIKENLI BÜRMƏK

Дурнишник колючий

Xanthium spinosum



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümliki. Täsin otjumagyň dünýäde, takmynan, 25, Türkmenistanda 2 görnüşü duş gelyär.

Tikenli bürmek – çylşyrymlygüllülür maşgalasynyň bürmekler urugynyň boýy 30–40 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümliğin baldagy joýaly, gür gysgajyk



tüýljuje. Ýapraklary gysga sapakly, üç kepjeli, pahna kysmy gysylan, uýy çowly kepjeli, gyralary abat ýa-da birneme we düşnüksiz dişlije (ortaky kepjesi gapdalkydan uly), ýokarsy gysylan tüýljuje, esasan, damarlarynda, aşagy agymtyl gür ýüňjümek we gysga tüýljuje, okarajygynyň esasy üç bölünen, iri saman-sary reňkli we tikenli.

Şärikli miwesiniň uzynlygy 8–13 mm we ini 4–5 mm, ýokarsy 2 esseden has uly, çitenekleriniň uzynlygy meňzeş däl, ýüzi ýuka, ýokarsy has egrelen.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Tikenli bürmek ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol köne ekin meýdanlarynda, suwarymly ulgamlarda, jülgelerde, bag-bakjalarda, medeni oturymlarda, ruderal haşal ösümliگی hökmünde ösüp boý almany halaýar. Örän seýrek, uly bolmadyk topbaklary emele getirýär. Ösümlik iýul–noýabryda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Yaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda; Merkezi Köpetdagda: Arçmanda, Wanowskide; Köpetdagetok medeni oturymynda: Aşgabatda; Murgap medeni oturymynda: Maryda duşýar.

**Tebigy gory.** Tikenli bürmek ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory uýjypsyzja. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ol ýabany bitýän haşal ösümliگی hökmünde duşýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliگیň kökleri, oty, ýapraklary we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), otlaryny we ýapraklaryny – ösümlik gülleýän döwründe (iýul–sentýabr), miwelerini – bişen wagtynda (oktyabr–noýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerden, otdan we ýapraklardan taýýar bolan çig mallary kagyz we mata haltalara, miweleriniňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Kökleriň saklanyş möhleti – 2–3, otlardyr ýapraklaryňky – 1–2, miweleriňki – 3 ýyla çenli.

**Himiki düzümi.** Bürmegiň düzümine efr ýagy (onuň düzüminde seskwiterpenoidler: ksantanin, ksantanol, izoksantanol, ksantinin, solstitialin, stizolisin); triterpenoidler: spirt düzümi C<sub>30</sub>H<sub>50</sub>O<sub>5</sub>; steroidler: β-sitosterin; triterpen saponinler, alkaloidler; fenolkarbon turşusy we olaryň gidrolizat ugurdaşlary: kofe, hlorogen; 2,72% eý maddalar, kumarinler; flavonoidler: 8-(γ-dimetilallil) apigenin, gidrolizatda kwersetin,

kemferol, hrizin, ýag girýär. Ösümliگیň ýerüsti böleginde seskwiterpenoidler: ksantanin, ksantinin, 1β5β-epoksi-1,5-digidroksantanin, dezasetilksantiuminol; flavonoidler: 8-(Δ<sup>3</sup>-izopentenil)-5,7,3',4'-tetragidroksiflawon saklanýar. Tohumynda ýag (onuň düzüminde 64,6% linolew, 26,5% olein, palmitin, stearin turşusy) bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliگیň kökleriniň peti diş agyryda peýdalanylýar. Otunyň peti ganly içgeçmede, diareýada, reumatizmde, galkan şekilli mázleriň kesellerinde, ýürek, öýken, böwrek, wenerik we deri sökelliklerinde, allergiýada, ekzemada, dermatomikozlarda, gyzzymada, babasylda, zäherli ýylanlar çakanda ulanylýar. Ösümliگیň ýapraklarynyň jöwheri galkan şekilli mázleriň kesellerinde, guduzlan haýwanlar dişlände detoksikasion serişde hökmünde haýyrlanylýar. Bu melhemi ýaralary bitirmekde ýuwmak, gyrgyn keselinde (tozlaryny), howply täze döremelerde suwa düşünmek arkaly ulanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly we Baharly etraplary) ösümliگیň ýapraklarynyň peti diuretik, derlediji, saliwasiýany güýçlendiriji serişde hökmünde ulanylýar. Bürmegiň kökleriniň we miweleriniň petini ysytmada, ganly içgeçmede, diareýada, gyrgynda, saryň gaýnamasynda, peşew haltasynyň we peşew ýollarynyň kesellerinde peýdalanylýar. Miwelerinden taýýarlanylan merhemi haýwanat dünýäsindäki deri örgünlerinde haýyrlanylýar. Çagalaryň diatezinde, dermatomikozlarda (ýerli) ösümliگیň şiresini çalmak arkaly haýyrlanylýar.

Bürmegiň ýerüsti bölegi Paragwaýyň farmako-peýasyna resmi ýagdaýda girýär.

Durmuşda ýaşajyk ýapraklaryny borşlary we işdäaçarlary taýýarlamakda peýdalanylýar. Onuň ýagy hem azyklyk üçin ýaramly.

Azyklyk we boýag ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümliگیň 1 çay çemçe (5 g) guradylan köklerini ýa-da miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan öň 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Bürmegiň 1–2 nahar çemçe (15–30 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanýan alawda 10–15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Häzir bolan peti gün içinde 3 gezek 1/2–3/4 bulgurdan (100–150 ml) kabul etmeli.

Ösümliگیň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan ýapraklaryny bir litrlik termosda demlemeli, 45 minut goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri

her gün 3 sapar nahardan 15–20 minut ön 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Bürmegiň 1 nahar çemçe (15 g) mäjumlanyp toz görnüşine çenli ýetirilen miwelerini 50 gram guýruk ýagy bilen garyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 7–10 gün goýmaly. Birsyhly garyp durmaly. Häzir bolan merhem bilen günün dowamynda 2 gezek (irden hem agşam) deriniň zeperlenen yerlerini suwamaly.

Ösümligiň 10 gram täze otundan we miwelerinden alnan şiresini süzmeli, deriniň zeperlenen yerlerine çalmaly.

## ТОКАЎ ÜZÜMI

Виноград лесной

*Vitis sylvestris*



**Häsiýeti.** Dag we dagetek derman ösümligi. Tokaý üzümi – üzümler maşgalasynyň adybir urugynyň uzynlygy 10 metre ýetýän iri liana wekili. Ýapraklarynyň uzynlygy 6–9 sm, togalak, kese-kesimi süýrümlik ýa-da tas böwrek şekilli, tas abat ýa-da sähelçe kesilen, köplenç üç ýa-da baş kepjeli. Sapajygynyň kesiminiň köp bölegi örän ýaýbaň, seýrek inçe, açyk, kütek, seýrek düýbi ýiti, ýokarky kepjesi sähelçe uzynlygyna çekilen, adatça, gysga we giň gysga üçburçly. Ýokarkysynyň kesimi çuň däl, köplenç, sähelçe bildirýär ýa-da oňat ösen, gyalary iri deň däl ýiti dişlije, seýrek dişjagazlary togalanan. Tüý örtügi has dürli-dürli: kerepleşen çitenecli tüýjagazlar ýa-da garyşyk, köplenç ýapragyň aşaky tarapynda ýerleşmäni halaýar. Seýrek ýapraklary ýalaňaç. Sapajyklary seýrek çitenecli ýa-da tas ýalaňaç.

Gülleri iki öýli. Tohumy iýmişde, sany – 1–4, uzynlygy 3,5–6,0 mm we ini 3–4 mm, ýumurtga şekilli, çalymtyl-gyzylymtyl reňkli ýa-da çalymtyl-gyzylymtyl goňur reňkli, seýrek gyzylymtyl-çypar. Burunjagazy gysga, uzynlygy 1

mm çenli. Halazasy giň tohumda tas togalak, sähelçe inçe – birmene süýrümlik, soňkusy görnetin egik ýa-da tas ýasy, tohumjagazlary bildirýär, gyalarynyň joýajyklary görnetin inçe, göni ýa-da birmene bükülen. Miwe getirýän wagtynda salkymynyň uzynlygy 15 sm çenli, ýumşak, şahalanan, sapajygynyň uzynlygy 4–7 mm, iýmişiniň gabarasy 10 mm, gara çalymtyl-gögümtil örtüklü, derisi dykyz, eti nepisje, ak reňkli ýa-da siresi sähelçe reňklenen.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Tokaý üzümi ölkämizde deňiz derejesinden 800–1200 metr belentlikde bitýär. Ol jülgerdäki çeşmeleriň we dag derýajyklaryň golaýynda ösüp boý almany halaýar. Üzümi maýda gülläýär, awgust–sentýabrda miweleýär. Ol tohumy arkaly we wegetatiw ýoly bilen köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Güýende, Guratyda, Arpeklende, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Ypaýda duşýar.

**Tebigy gory.** Tokaý üzümi ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ony ekip ýetirdirmek maslahat berilýär.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň ýapraklary we iýmişleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Ýapraklaryny ösümlik gülläýän döwründe (maý–iýun), iýmişlerini – bişýän wagtynda (awgust–sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada ýa-da oňat ýel çekerli jaýda galyň matanyň ýa-da kagyzyň üstünde umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapragyndan taýýar bolan çig maly mata haltalara, iýmişiniňkini – kagyz haltalara, gutujyklara ýa-da agzy ykjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Ýapragynyň saklanyş möhleti – 1–2, iýmişiniňkini – 4–5 ýyl.

**Himiki düzümi.** Üzümiň miwelerinde uglewodlar we onuň kowumdaş birleşmeleri: dekstroza, pektin; organiki turşular: çakyr, alma, limon we pigmentler saklanýar. Onuň tohumynda ýaglar bar.

**Peýdalanylyşy.** Tokaý üzüminiň dermanlyk häsiýetleri Pliniý ulunyň (b.e. 23–79-njy ýyllary) we Kolumellanyň (b.e. I asyry) ylmy işlerinde ilkinji gezek beýan edilýär.

Orta asyrlarda Gündogaryň meşhur alym lukmany Muhammet Huseýn özüniň «Melhemler hazynasy» atly düýpli ylmy işinde şeýle ýazýar: «...Guradylan üzümi terinden örän tapawutlanýar. Gadymy tebipler kişmiş iýmitlendiriji azyk önümi hökmündäki ähmiýetinden başga-da, bejeriji ähmiýetiniň bardygyna: nerw ulgamyny berkidýändigine, tolgunmany, gahary ýatarmaga itergi berýändigine ynanyldyrlar we ş.m...».



Halk lukmançylygynda üzümiň miweleri böwrek, öýken, bagyr kesellerinde, gaýtalanyň durýan bogun agyryda, gipertoniýada, diareýada, holesteriniň derejesi ýokarlananda, umumy berkidişi we gyzgyny peseldişi serişde hökmünde ulanylýar. Anginada we parodontozda jöwheri bilen agyz çaýkalýar. Ýöne süýjükeselde, semremede, aşgazanyň başly ýaralarynda we öýkeniň sowuklama ahwallarynda peýdalanmaklygy çäklendirmeli.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly we Baharly etraplary) üzümiň ýapraklary antiseptiki, zäherlenmä we sowuklama garşy, gan togtadyjy, ýarany bitiriji serişde hökmünde peýdalanýlar. Onuň şiresi tonizirleýji täsirli, gandaky holesteriniň mukdaryny azaldýar, bedeniň gyzgynyň we arterial gan basyşyny peseldýär, şeýle-de ganly içgeçmä, gaýtalanyň durýan bogun agyry, dowamly içgatama haýyrly.

Ylmy lukmançylykda üzümiň bejeriji täsirleri esasan, onda köp mukdarda glýukozany we kaliniň duzlaryny saklaýandygy barada barlag geçirildi.

Salkymynyň, pyntyklarynyň we ýapraklarynyň hoşboý tagama eýe bolandygy sebäpli, jaz görnüşinde etlere we beýleki naharlara goşulýar. Ýemişi azyklyk hökmünde täze we gury görnüşinde ulanylýar, olara kişmiş, mürepde, marinad, sirke taýýarlamak üçin haýyrlanylýar. Tohumy surrogat hökmünde kofe we azyklyk ýaglaryny almak üçin ýaramlydyr.

Ösümligiň agajyny sellýuloza senagatynda giňden ulanylýar.

Bezeg, iýmitlik, baldyr perga beriji we ot-iýmlik ösümlük.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylýşy:**

100 gram kişmiş 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Emele gelen jöwheri her gün 3–4 gezek 1/3–1/2 bulgurdan (75–100 ml) içmeli. Melhem gakylyk goparyjy we üsgülewügiň garşysyna haýyrly serişde.

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) kişmişini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwher bilen bokurdagyňy we agzyňy çäýkamaly.

Täze turşy şiräniň 1/2 bulguryňy (100 ml) 1/4 bulgur (50 ml) gyzgyn aý çäý bilen garmaly, oňa 4 çäý çemçe (20 g) şeker goşmaly. Häzir bolan içgini dessine 1 gezekde içmeli.

Kişmiş 100 gramyny 200 gram guýruk ýagy bilen goşup, agzy ykjam ýapylyan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün goýmaly. Yzygiderli bulap durmaly. Taýýar bolan

merhemi her gün 2 gezek (irden hem agşam) şikeslenen ýerleriňe çalmaly.

Üzümiň ýaşajyk ýapraklaryny hasaň arasyna salyp, yzaly ýerleriňe ýapmaly, bir sagatdan ýyly suw bilen ýuwmaly. Sowuk kompressory günüň dowamynda 10 sapar etmeli. Ýaranyň guramagy üçin haýyrly serişde.

Ýatgydan gan akmada guradylan üzüň ýapraklaryndan taýýarlanan tozy günde 3 gezek 1–2 gramdan ulanmaly.

Gaýtalanyň durýan bogun agyryda 3 aýlap her gün üzüň iýmeli. Soňra günde 2 gezek (irden hem agşam) nahardan 1 sagat ön şiresini içmeli. Şire aşakdaky tertipde ulanylýar: 5 günläp 1/4 bulgurdan (50 ml); 5 günläp – 1/2 bulgurdan (100 ml); 5 günläp – 3/4 bulgurdan (150 ml); 5 günläp – 1 bulgurdan (200 ml); 5 günläp – 1,25 bulgurdan (250 ml) kabul etmeli.

Iç gatamada şiresini 2 aýyň dowamynda her gün 3 sapar nahardan 1 sagat ön 2 bulgurdan (400 ml) içmeli.

## **TORLY GÜLHATMA** **Шток-роза сетчатоплодная** **Alcea rhyticarpa**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Torly gülhatma – mamamçörekler maşgalasynyň gülhatmalar urugynyň boýy 50–150 sm ýetýän ikiýyllik ýa-da köpýyllik otjumak wekili. Ählisi dykyz ýumşak ak keçe ýaly tüýjagazlar bilen örtülen birnäçe baldakly. Ýapraklary ýürek şekilli ýa-da aralykdakylary tas esasyndan kesilen ýa-da togalak ýa-da togalak-böwrek kysmy, baş-ýedi kepjeli, gysga ýarym aýlawly, dügürlü kepjeli, ýokarkylary kiçiräk, togalak-ýumurtga şekilli ýa-da ýumurtga kysmy, abat ýa-da tas üç kepjeli, esasy tegelenen.

Gülleri süyrümtik salkymda ýerleşýär. Kiçi okarajyklary esasynda bitişen 6–9 sany ýaprajyklardan ybarat, ondan 1/3–1/5 esse uzyn, okarajykdan 2 esse gysga. Gültäji okarajygyndan 2–2,5 esse uly, gara-gyzyl ýa-da gyzyl-sowsany reňkli, guran ýagdaýynda gök-syýa ýa-da symgylyt goýy gülgün-syýa reňkli, esasy sary (köplenç guranda gögümtil) gül ýapraklarynyň ýokarky ýarysý sarymtyl şöhleli. Miweleri 25–30 sany miwejiklerden ybarat, kese kesiminde 16–18 mm. Miwejikleri ganatsyz, arkasynyň uzboýuna guýguçly, tutuş tüýlçe, esasan guýguçlyklary, gapdalyndan torjumak gasyňly, miwejigiň oýulan ýerlerinden başgasy tüýlçe, käte ýylçyr. Tohumy gyzyl-goňur reňkli, käte ownuk aýymtyl-menekli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Torly gülhatma ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol mele toprakly eňňitlerde, jülgelerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýulda gülleýär, iýun–awgustda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda; Günorta-Günbatar Köpetdagda; Merkezi Köpetdagda; Germapda, Çäyekte, Neftanowskide; Gündogar Köpetdagda; Bathyzda: Pulhatynda, Şorabada, Şorsetide, Serhetabatda, Serhetçide; Köýtendagda; Köpetdagetok medeni otury-mynda: Bereketde, Serdarda, Bagyrda duşýar.

**Tebigy gory.** Torly gülhatma ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri we porrugy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Gazylyp alnan kökleri arassalamaly, ýuwmaly hem guratmaly, deslapky ülüşlere bölüşdirmeli. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde goýmaly. Kökleriň we porrugyň saklanyş möhleti – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Gülhatmanyň düzümine nemler girýär. Onuň köklerinde saponinler saklanýar. Ösümliğin ýerüsti böleginde kumarinler, saponinleriň yzlary bar. Baldaklarynda uglewodlar: 2,4% polisaharidler (onuň düzüminde 34% glýukuron we galakturon turşusy, 2,3% ksiloza, 2,3% arabinoza, 47,6% ramnoza, 10,2% glýukoza, 3,4% galaktoza) saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda gülhatmanyň kökleriniň, ýapraklarynyň we gülleriniň petleridir jöwherleri sowuklama, ýiti respirator sökelliklerinde, deri kesellerinde,

içegeleriň sowuklama ahwallarynda, diş etiniň, mindalynyň we kentlewügiň sowuklamasynda peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylygynda ösümliğin ýapraklarynyň we gülleriniň spirtli ekstraktynyň antibakterial işjeňligi ýüze çykaryldy.

Bezeg, bal beriji, ot-iýmlik, tehniki we boýag ösümlik.

Güllerini ýüpek matalary limon-sary, mawumtyl-çal we syýa reňklere boýamak üçin boýag senagatynda ulanylýar.

Bezeg, bal beriji, ot-iýmlik, tehniki we boýag ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 2 nahar çemçe (30 g) gury köklerini 0,5 litr gyzgyn suwa atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 5 minut gaýnatmaly. Bir sagadyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan pet bilen içegeleriň sowuklama ahwalynda klizm etmeli.

Gülhatmanyň 1 çay çemçe (5 g) owradylan köklerini 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suwuň içine atyp, bir sagat goýmaly. Hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri günde her 2 sagatdan 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli. Melhemi deriniň zeperlenen ýerlerine çalmaly.

## TUMARGÜL

### Вздутостебельник узловатый Physocaulis nodosus



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliği. Täsir guruluşy owadanjy otjumagyň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Tumargül — saýawanlylar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 40–60 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümliğin baldagynyň bogunlary egreden, içi boş, bogunlarynyň aşagy has çişen, gaty çitenekler bilen örtülen. Ýapraklary inçe, iki tarapy hem tüýlçe. Aşaky ýapraklary sapaklyja, olaryň ülüşleri iki gezek per şekilli ýa-da üçleýin



bölünen, süýrümlik, segmentleri kütelişen. Soňkusy per şekilli bölünen, üçburçly-ýumurtga şekilli, ülüşleri ýitiräk.

Saýawanlary gysga sapajykly, garşylyklaýyn ýaprakly, gynsyz. Şöhleleriniň sany — 2–3, ýognas, бүдүр-сүдүр. Saýawanjyklary 5–1-güllüje, gynjagazy köp sanly çyzykly ýa-da uýj çowly, aşaklygyna epilen, tüýlүje ýapraklyja. Gülleri enelik we iki jynsly. Gül ýapraklarynyň daşy çitenekler bilen örtülen. Miwesiniň uzynlygy 9–10 mm, süýrümlik, ýokarlygyna gysylan, çitenekli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Tumargül ölkämizde deňiz derejesinden 800–1600 metr belentlikde bitýär. Ol jülgelerde, agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň arasynda, dereleriň guzaýynda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär, iýun–iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda, Süntde, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Deşitde, Nohurda, Uly Garaňkyda, Gökderede, Dagysda, Asylmada; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide duşýar.

**Tebigy gory.** Tumargül ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümliki Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümlikiň oty we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun), miwelerini — bişen wagtynda (iýun–iýul) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mal güýçli ötgür ysa, aýj tagama eýedir. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, miweleriniňkini — kagyz gutujyklara ýa-da agzy mäkäm ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, garaňky ýerde saklamaly. Otunyň saklanýş möhleti — 1–2, miweleriniňkini — 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümlikiň düzümine efr ýagy girýär. Onuň köklerinde we ýapraklarynda poliasetilen birleşmeler, miwelerinde — 3-rutinozid kwersetin flawonoidler, 8,3% ýag (onuň düzüminde petrozelin turşusy) saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümlikiň otunyň we miwesiniň petidir jöwheri deri kesellerinde we dem alyş ýollarynyň ýokarky katarynda, üsgülewükde peýdalanylýar.

Durmuşda tumargülüň ýaşajyk pudaklary işdäaçara goşmak arkaly ulanylýar.

Bezeg, iýmitlik we bal beriji ösümlik.

### Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Ösümlikiň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 5–10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek nahardan öň 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Tumargülüň 4 çay çemçe (20 g) owradylan miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 20 minut goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3–4 sapar 1/3 bulgurdan (65 ml) kabul etmeli. Bu melhemi günde 2 ýola (irden hem agşam) deriniň zeperlenen ýerlerine çalmaly.

## TURAN PYŞDYLOTY

Амбербоа туранская  
Amberboa turanica



**Häsiyeti.** Dagetek we düzlük derman ösümliki. Turan pyşdyloty — çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 60 sm çenli ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Köplenç ýere ýazylyp ösýär, tas baldaksyz ýa-da ýokarky bölegi esasyndan şahalanan baldakly, köp bölegi ösen görnüşde, şahasyz we ýapraksyz, ýaş wagtynda tüýjümek, soňra ýalaňaç ýa-da tas ýalaňaç. Ösümlikiň hemme ýapraklary sapakly, kökýanyndakylary we aşaky baldakdakylary — ýaýbaň ýumurtga şekilliden başlap tä süýrümlik-ýumurtga görnüşli, abat ýa-da seýrek per şekilli bölünen, gyralary örän egri diş-diş, esasy pahna şekilli, sapaga süýrelen, ýokarsy kütäk ýa-da köp bölegi ownuk ýiti dişlije. Galan ýapraklary — süýrümlik, gyralary abat ýa-da ýek-tük dişlije, köplenç ýiti ýa-da ýitileşen ýa-da aglaba ýagdaýda ýelek şekilli ýa-da lirogörnüşli bölünen. Hemme ýapraklarynyň iki tarapyň hem köp bölegi ýalaňaç, ýaşyl,

sallanyp duran. Sebetjikleri ýekeleýin baldagyň ujunda we şahalarda uzyn ýaprak sapaksyz ýerleşýär. Gyny ýumurtga şekilli ýa-da ýaybaň ýumurtga kysmy, ýokarsy has gysylan, ýünjümeň örtüklü, ýeňil ýuwulýar, soňra tüýjagazlary sary ýa-da ýaşylymytl-sary reňke öwrülýär. Onuň daşky we ortaky ýaprajyklary ýarym togalak, gýralary inçe bardaly, ortakylary – ýaybaň ýumurtga şekilli, ýokarsy köplenç gysga bardaly gutarýar, perdeli çykyntgylý, içki ýapraklary – süýrümlik ýa-da ýaybaň uýy çowly, tegelenen we ýokarsy uýy çowly, bardaly, çykyntgy bilen gutarýar.

Ösümliğin gülleri sary reňkli. Çigitjikleri silindrik, köp böleginiň uzynlygy 5–6 mm, garamtyl, kese-kesimi ştrihli we kese-kesiminde göz-görtele gasynlary bildirýär, ýumşak gür tüýjagazlar bilen örtülen, olar ýeňillik bilen gopýar. Üpügi örän gysga dişlije perde bilen örtülen, köp bölegi sähelçe gyzylymytl, seýrek – sarymytl öwüşginli.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Turan pyşdyloty ölkämizde düzlük toýunly we çägeli çöllerde, deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol köplenç gury eňňitlerde, günorta medeni oturumlarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik aprel–iýunda güllýär we miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda; Sekidag jülgesinde, Baleýşemde; Kiçi Balkanda; Kürendagda; Däneatada, Torgaýda, Isgenderde; Günorta-Günbatar Köpetdagda; Magtymguluda; Merkezi Köpetdagda; Şorsuwda, Gylgylawda, Arçabilde, Gökderede, Duşakerekdagda, Wanowskide; Gündogar Köpetdagda; Robergowskide, Guruhowdanda, Şamlyda; Bathyzda; Daşköprüde, Eşek-Rabat-Rafatakda, Çemenabatda; Köýtendagda; Çarşaňnyda, Köýtendagda, Lälemekanda; Hazarýaka çölünde; Esenguluda; Üstýurtda; Demirgazyk-Günbatar Garagumda; Türkmenbaşyda, Gumsebşende, Çagylda; Gündogar Garagumda; Repetekde, Garawulguýuda; Köpetdagetäk medeni oturymynda; Aşgabatda, Gowşutda; Tejen-Murgap medeni oturymynda; Tejende, Göksürde duşýar.

**Tebigy gory.** Turan pyşdyloty ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Her ýylda, takmynan, 20–25 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçiligi bar.

**Dermanlyk çig maly.** Dermanlyk maksatlary üçin turan pyşdylotunyň oty çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümliğin güllýän döwründe (aprel–may) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar

bolan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara gaplamaly. Çig maly gury ýerde saklamaly we oňa Gün şöhesi düşmeli dälir. Saklanýş möhleti 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Pyşdylotunyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine seskwiterpenoidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Ylmy lykmançylygynda ösümlikdäki seskwiterpenoidleriň jeminiň işjeňligi netijesinde anti-bakterial we antifungal täsirleri ýüze çykaryldy.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

## TURNEFORYŇ KENGARY

Гунделия Турнефора  
Gundelia tournefortii



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümliği. Otjumagyň Türkmenistanda 1 görnüşü duş gelýär.

Turneforyň kengary – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň kengarlar urugynyň boýy 30–60 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Iri, tas ýalaňaç ýa-da sähelçe kerepli-tüýlçe, tikenekli, süýt şireli ösümlik. Baldagy ýognas, ýönekeý ýa-da ýokarsy şahalanan. Ýapraklary derijimek, gaty, ortaky damary küti we inli, süýrümlik ýa-da süýrümlik-uýy çowly, per kysmy bölünen, kepjeli, azda-kände dişlije we gýralary küti çitenekli.

Sebediniň ýumagy ýumurtga kysmy, çitenekli ýapraklar bilen gurşalan. Miwesi – gynynyň ýapraklarynyň bitişmesinden emele gelen, daşy gabykly çigitjagaz, ol ters piramida şekilli, hozjagaz kysmy, uzynlygy 1,5–1,7 sm we ini 0,8–1,0 sm, ýokarsy tikenli çitenek bilen gutarýar, çal ýa-da çal-goňur reňkli.



**Ýaşajyş aýratynlygy.** Turneforyň kengary ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol jülgerlerde we eňňitlerde, seýrek ekinlerde ruderal hal bolup ösmäni halaýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär, maý–iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda, Sumbar we Çendir derýalarynyň jülgesinde; Gündogar Köpetdagda: Arçynyňanda, Garatikende, Hoşowda; Bathyzda: Serhetabatda, Çilduhtarda; Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Turneforyň kengary ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde haşal ösümliki hökmünde duşup, gür otluklary emele getirýär. Her ýylda azyndan 40–50 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Kengaryň ýerasty böleginde saponinler: 3-O-(2-[α-L-arabinopiranozil-(1→3)-β-D-gentiotriozil-(1→6)-β-D-glýukopiranozil] ksilopiranozid) oleanolow turşusy, 3-O-(2-[α-L-arabinopiranozil-(1→3)-β-D-gentiobiozil-(1→6)-β-D-glýukopiranozil]-β-D-ksilopiranozid) oleanolow turşusy saklanýar. Ösümliğin ýerüsti böleginde kauçuk bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin otundan taýýarlanylýan petidir jöwheri deri hem ýokarky dem alyş ýollarynyň kesellerinde peýdalanylýar.

Türkmen milli tebigçiliginde hem halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly, Gökdepe we Köýtendag etraplarynda) kengaryň sakyzyny gusduryjy serişde hökmünde ulanylýar.

Ýerli ilat tarapyndan ösümliğin ýaşajyk baldaklary we gül toplumlary azyklyk üçin ulanylýar. Tohumy kofe üçin surrogat bolup hyzmat edýär.

Bezeg, azyklyk we ot-iymlik ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylan otuny 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 20 minut gaýnatmaly. Soňra 30 minut saklap, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün nahardan ön 1 nahar çemçeden (15 ml) 3 gezek içmeli.

Kengaryň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp goýmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde bulguryň 1/4-ni (50 ml) nahardan ön kabul etmeli.

## TÜRKMENLERIŇ ALMASY Яблоня туркменов Malus turkmenorum



**Häsiyeti.** Dag derman ösümliki. Almanýň dünýäde 30, Türkmenistanda 2 görnüşi duş gelýär.

Türkmenleriň almasy – bağüller maşgalasynyň almalar urugynyň boýy 2–3 metre ýetýän gyrymsy agaç wekili. Bol çykyntgylly, ýaşajyk pudaklary gür ak keçe ýaly tüýjagazlar bilen örtülen, bir ýaşyndakylary gara-goýy gyrgyzy, tüýlek, iki ýaşyndakylary çalymtyl, seýrek mählije. Ýapraklarynyň uzynlygy 6–8 sm, ini 3,2–3,8 sm, elliptik ýa-da uýy çowly, iki tarapy hem ýitileşen, steril pudaklarda has ýaýbaň, ýumurtga kysmyna çenli, uzynlygy 10 sm deňeç we ini 6 sm, görnegin damarly hem azda-kände ýaýbaň ýiti dişlije, ýaş wagtynda aşagy has tüýlülje, ýetişenleriniňki esasan, damarlary sähelçe tüýlülje. Sapajygynyň uzynlygy 2,0–2,5 sm, tüýlülje.

Gülleri uly däl, gabarasy, takmynan, 2,5–3,0 sm. Gül sapajyklary, gipantiýasy we okara ýaprajyklary has tüýlülje. Miweleri ownuk, gabarasy, takmynan, 2,5 sm, togalak, ýaýbaň, ýöne esasynda ownuk çuňlaşan, sähelçe gapyrgaly, sarymtyl-ýaşyl reňkli. Okarajygy miwesinde ýapyk, uýy okara ýaprajygy çowly, tüýlülje, uzynlygy, takmynan, 5 mm çenli. Gül sapajygy miwesinde gury, uzynlygy 5–3,0 sm. Tohumy ýasy we uzyn.

**Yaşayyş aýratynlygy.** Türkmenleriň alması ülkä mizde deňiz derejesinden 1600–2000 metr belentlikde bitýär. Ol demirgazyk ownuk topurly-çagyly, seýrek daşly eňňitleriň tarazynda, jülgerlerde, derýajyklaryň hanasynda, ýek-tük düýp bolup ösmäni halaýar. Gyzgyna we gurakçylyga çydamly, polimorfizmiň ýokary görkezjisine eýe. Alma aprel–mayda gülleýär, awgustda miweleýär. Ol kök çykyntgylary arkaly köpeliýär. Bir agaçada 600-e çenli çykyntgy bar. Uly agaçlaryň ýaşı 30–50 ýyl.

**Yaýrawy.** Daragt diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Könekesirde, Güýende, Tämilde, Çohagaçada, Hasardagda, Süntde, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Garagurada, Howuzlyjada, Garrynohurda, Degirmenlide, Müsünewde, Hyrsderede, Tazytahtyda, Sakaltutanda duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Türkmenleriň alması ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ol Magtymgulynyň ylmy-önümçilik synag merkezinde we Aşgabadyň botanika bagynda ekip ýetişdirilýär. Daragt Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar. Türkmenleriň alması Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin sütünleriniň gabygy, ýapraklary we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Gabygyny ir baharda (mart), ýapraklaryny ösümlik gülleýän döwründe (aprel–may), miwelerini – bişýän wagtynda (awgust) ygnamaly. Olary teläriň aşagynda aýyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda galyň matanyň üstünde guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mal güýçli hoşboý ysa eýe, miweleri – turşumtyk tagamly, ýapraklary yaşyl reňkli bolýar. Taýýar bolan çig mallary mata ýa-da kagyz haltalara gaplamaly. Olary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Gabygyň saklanýş möhleti – 2–3, ýapraklaryňky – 1–2, miweleriňki – 3–4 ýyl.

**Himiki düzümi.** Türkmenleriň almasynyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine şeker, organiki turşular, pektin maddalar, witaminler we demir girýär. Onuň agajynda fridelin triterpenoidler, sitosterin steroidler, apigenin, lýtuteolin, kwersetin, 7-O-glýukozid apigenin, 3-O-glýukozid aromadendrin, 3-O-glýukozid kwersetin flavonoidleri saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyrlarda Gündogarda alma giň ýaýran we meşhur ösümlikleriň biridir. Olara diňe bir görnükli alymlar üns bermän, hatda ýönekeý adamlar hem gyzyklanypdyrlar. Bu meşhurlyk biziň günlerimize hem gelip

ýetdi. Statistikanyň maglumatlaryna görä, dünýädäki her bir miweli ekinleriň birisi almadyr.

Gündogaryň parlak ýyldyzlarynyň biri Abu Aly ibn Sina «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly işinde almanyň ýapraklarynyň we şiresiniň çişleri we ýaralary aýyrmakda, ýüregi pugtalandyrmakda oňyn täsirliidigi barada ýatlap geçýär. Abu Reýhan Biruny hem «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly eserinde almanyň birnäçe dertlere em bolýanlygy barasynda beýan edýär. Meşhur tebib hem görnükli alym Seyit Ysmaýyl Gürgenli (Jürjany) özüniň «Horezm şanyň genji-hazynasy» atly nusgawy diwanynda turşy almanyň şiresiniň beýniniň we kelläniň kesellerinde rahatlandyryjy täsiriniň bardygyny ýazýar.

Muhammet Gaýmaz Türkmen özüniň «Pygamber tebibçiligi» atly eserinde almanyň şypaly häsiýetlerini ýatlap geçýär. Alma yürek-damar kesellerinde berkidiji häsiýete eýedir. Almanyň şiresi ýüregi güýçlendirýär we waswaslylygyny aýrylmagyna peýda berýär. Onuň miwesinden taýýarlanan mürepbe we alma şiresi saglyga örän peýdaly. Yöne, turşy almany yzygiderli iýip ýörmek huşsuzlyk derdine sataşdyrýar.

Orta asyrlaryň görnükli lukmanlarynyň biri Muhammet Huseýn «Melhemler hazynasy» atly nusgawy eserinde şeýle ýazýar: «...alma ýüregi, bagry, aşgazany, içegeleri pugtalandyryýar, işdäni açýar, keýpiňi çaglaýar, şähdiňi açýar we şatlandyryýar... Esasan, alma kynlyk bilen dem alnanda, yürek çalt urmada peýdaly... Almany iýeniňde we onuň ysny sorup alanyňda nerw bozulmalaryna has haýyryly. Olar beýnä oňyn täsir edýär, onuň iş ukyplylygyny artdyryýar... Almany çendenaşa iýmeklik öykene, şeýle-de nerw ulgamyna zyýanly. Bu kemçilikleri ary baly ulanylanda aýyryýar».

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplary) almanyň ýapraklarynyň we gülleriniň jöwherini ganazlykda, süýjükeselde, şöhle sökelliklerinde peýdalanylýar. Miweleriniň petidir jöwheri madda alyş-çalşygy bozulanda, işdän kesilende, ýiti we dowamly gastritde, gan damarlarynyň gowşaklygynda, yürek sebäpli döreýän çişlerde, gipertoniýada, yürek-damar ulgamynyň kesellerinde, aşgazan sökelliklerinde, enterokolitde, dowamly içgatamada, üsgülewükde, laringitde, gripde, hor-çekmede, şeýle-de damarlary giňeldiji, gan dörediji, peşew çykaryjy, gakylyk goparyjy, rahatlandyryjy serişde hökmünde ulanylýar. Tohumy galkan şekilli mälzeriň kesellerinde haýyrlanylýar. Miweleriniň şiresi gipertoniýada, ganazlykda, reumatizmde, gaýtalanyp durýan bogun agyryda, süýjükeselde, semizlikde, ýiti respirator ýokançlarynda, bagyr kesellerinde, böwregkaterosklerozda,



peşew-daş sökelliklerinde peýdalanylýar. Ýöne, gastritli we aşgazanyň baş keselli adamlara, ony çäkli haýyrlanmak maslahat berilýär.

Ylmy lukmançylykda almanyň ýaşajyk pudaklarynyň spirtli ekstraktynyň antioksidant häsiýeti ýüze çykaryldy. Şeýle-de miwelerinde saklanýan pektiniň antiwirus we pugtalandyryjy täsirleri mälüm edildi.

Almanyň hoşboý tagamy bolanlygy üçin, ony kulinariýada mürepbeleri, jemleri, marmelad taýýarlamakda ulanylýar.

Bezeg, azyklyk, bal beriji, tehniki we boýag ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Iki sany aramlyk almanyň ownuk kesilenini 1 bulgur (200 ml) gyzgyn süýdüň we 1/2 bulgur (100 ml) suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 5 minut gaýnatmaly. Taýýar bolan peti günün dowamynda 1 gezek içmeli. Ol garrylyk halyndaky iç gatama haýyrlý.

Bir almany, 1 kartofelini we 1 düýp sogany 1 litr sowuk suwuň içine atyp, syrçaly pitide pessaý otda 0,5 litr bolýança gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Häzir bolan peti gün içinde 3 gezek 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.

Bir almanyň gabygyny, 1 nahar çemçe (15 g) zygyryň guradylan tohumyny, 2 çay çemçe (10 g) ary balyny 1,5 bulgur (300 ml) suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön ýyly görnüşinde kabul etmeli.

Almanyň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan ýapraklaryny we güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, bir sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3 wagtyna nahardan ön 2 nahar çemçeden (30 ml) içmeli.

Gabygy arassalanan 1 almany 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, goýmaly. Jöwheri gün içinde 1 gezek ýyly görnüşinde ulanmaly.

Ownuk kesilen 1 almany 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 1–2 sagat goýmaly. Hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri gün içinde 3–4 ýola nahardan soň 1 bulgurdan (200 ml) haýyrlanmaly.

Almanyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, bir sagat goýmaly. Yzysüre süzmeli. Häzir bolan jöwheri ary baly bilen günde 3 sapa nahardan soň 1 bulgurdan (200 ml) içmeli.

Gyrgyçdan geçirilen almany, guýruk ýa-da örküç ýagy, şeker, ýumurtganyň sarysy, gyrgyçdan geçirilen şokolady garmaly. Soňra birneme saklamaly. Taýýar bolan garyndyny, her gün 3–4 gezek çörege çalyپ iýmeli. Zzyndan 1 bulgur (200 ml) gyzgynja süýt içmeli.

Arassalanyp gyrgyçdan geçirilen almany 1 bulgur (15 ml) zeytun ýagynyň, süýdün ýa-da gaýmagyň içine atmaly, oňa 1 ýumurganyň agyny goşmaly. Hemmesini garmaly we ýüzüne çalmaly, 15 minut saklamaly. Soňra mylaýym suw bilen ýuwup aýyrmaly.

Gyrgyçdan geçirilen 1 almany 1 nahar çemçe (15 g) tworog bilen garmaly, şeýle-de 1 nahar çemçe (15 ml) süýt we şol mukdarda gaýmak goşmaly. Ählisini mäkäm garmaly we ýüzüne çalyپ, 20 minut saklamaly, yzysüre mylaýym suw bilen ýuwmaly.

Her günde almanyň 150 gramyny iýmeli. Öňünden we iýeniňden soňra 4–5 sagatlap hiç zat iýmeli we içmeli däl.

Her günde gyrgyçdan geçirilen täze almanyň 300 gramyny iýlen ýagdaýynda enterokolitlere, içgeçmä haýyrlý.

Gün içinde almanyň çigitjagazlaryndan 5–6-syny iýmeli. Ol galkan şekilli mázleriň kesellerine peýdaly.

Yzygiderli galagoply günler bolanda, almanyň 600–800, tworogyň 300–400 gramyny iýmeli. Dowamlylygy – 5 gün.

## **TÜRKMEN ARMYDY**

### **Груша туркменская**

### **Pyrus turcomanica**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliги. Türkmen armydy – bägüller maşgalasynyň armytlar urugynyň boýy 10–12 metre ýetýän, ýaýbaň nädogry telpekli agaç wekili. Ýaşajyk pudaklary, pyntyklary, gür ýumşak ak keçe ýaly, soňra ýalaňaç, gyzyl-goňur reňkli. Şahalary çal reňkli, ýylmanak, seýrek çişlije. Tiken i yok. Çişjagazlary we ýapraklary, köplenç olaryň aşaky tarapy, başda gür ak keçe ýaly tüýlülje, miweleri bişen pursadynda tas ýalaňaç, diňe damarlaryň goltugynda azda-kände tüýjagazlar bolýar, sapajyklaryň uzynlygy

3,5–5,0 sm. Yaprak üzüşleri dykyz, tas derijemek, açyk ýaşyl reňkli, aşagy has açygrak reňkli, guradylan wagtynda garalmaýar, togalak ýa-da şar şekilli, uzynlygy 4–7 sm we ini 3–5 sm, esasy pahna kysmy, ýokarsy tegelenen, köplenç, oýuk, ýa-da gysga ýitileşen, gýralary abat ýa-da esasan, depesine ýakyn ýeri, tüylüdür we sähelçe kütäk dişlije.

Gülleri iri. Gül sapajyklarynyň uzynlygy 2–4 sm, kütüräk, ýokarlygyna ýognaýar. Miweleri giň armyt şekilli, uzynlygy 2,5 sm we ini 2 sm. Okarajygynyň bölekleri miwä gysylan. Olar süýji tagamly, sakyzjymak ysly, bol daşlaşan öýjükli.

**Yaşajyş aýratynlygy.** Türkmen armydy ölkämizde deňiz derejesinden 1200–1600 metr belentlikde bitýär. Ol jülgerlerde, derýalaryň kenarynda, seýrek gury daşly-ownuk topurly eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Kserofit. Daragt aprel–maýda gülleýär, iýul–awgustda miweleýär. Ol tohumy we kök çykyntgysy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Mustapaderede, Garagaçda, Mirajyda; Merkezi Köpetdagda: Sülükli (Žardan jülgesinde), Müsünewde, Hyrsderede, Tazytahtyda, Sakaltutanda, Mergenölende duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Türkmen armydy ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetisdirmek maslahat berilýär. Ol Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar. Daragt Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Armydyň miweleri we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary bişýän döwründe (iýul–awgust) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallar güýçli hoşboý ysa eýe. Olary kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Daragtyň miweleri 6–10% şeker (esasan, monosaharidleri): glýukoza, fruktoza, saharoza; 0,12–0,19% organiki turşulary: limon, alma; pektin we eý maddalar; fitonsitleri, flavonoidleri, C, P witaminleri, karotini (az mukmarda) hem-de mikroelementleri saklaýar.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyrlaryň görnükli alymy-tebigaty synag edijisi Muhammet Huseýn «Melhemler hazynasy» atly düýpleýin ylmy işinde armydyň melhemlik

häsiýetleri barasynda şeýle häsiýetlendirýär «...armydyň ähli sortlary, goý, täzesi bolsun, ýa-da guradylany, içegeleriň bozulmalarynda peýdalanylýar. Armydyň miwesiniň etini alma garanynda, organizm ýeňil özleşdirýär. Armydyň ýaramaz täsirlerini bitaraplaşdyrýan oňat serişdelere ary baly, zenjebil, badyýan, gara burç degişli. Gowrulan armyt özüniň ýaramaz täsirlerini ýitirýär».

Halk lukmançylygynda ösümligiň peti böwrekdaş kesellerinde, şeýle-de peşew çykaryjy, gyzgyny peseldiji, antiseptik serişdelik üçin peýdalanylýar. Guradylan armydyň süle bilen bilelikdäki peti dispepsiýada (çagalarda), allergiýada, pugtalandyryjy serişde hökmünde ulanylýar. Miweleri aşgazan-ichege ulgamynyň hyzmatyny kadalaşdyrmaga ukyply.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplarynyň daglyk obalarynda) armydyň gaýnadylan we gowrulan miwelerini ýokarky dem alyş ýollarynyň kesellerinde, inçekeselde üsgülewügi kemeltmekde, peşew bölüp çykaryşyny kadalaşdyrmakda, şeýle-de pugtalandyryjy serişde hökmünde ulanylýar.

Armyt şiresi P, C, witaminleriň, karotinoidleriň çeşmesi bolup hyzmat edýär. Ol kapillýarlary berkidýär, berhiz iýmiti hökmünde peýdalanmak maslahat berilýär.

Bezeg, azyklyk, witamin saklaýjy, bal beriji, tehniki we boýag ösümlik.

### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Armydyň guradylyp owradylan miweleriniň 100 gramyny 1 litr suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 30 minut gaýnatmaly. 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Süläniň ýa-da gerkulesiň 100 gram ýarmasyny 1,5 litr suwa atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanyan alawda 20 minut gaýnatmaly. 2 sagat goýup, süzmeli. Armydyň petini ön ýanyndaky melhemlikler esasynda taýýarlamaly. Iki peti hem garmaly. Häzir bolan garyndyny günün dowamynda 2 sapa 1 bulgurdan (200 ml) kabul etmeli.

Armydyň 100 gram guradylyp owradylan miwelerini 1 litr suwa atyp, içi syrçaly pitide haýal ýanyan otda 30 minut gaýnatmaly. Sowuk suwda krahmaly eretmeli we ony gaýnap duran pete goşmaly. Soňra sowatmaly. Taýýar bolan peti günde 1 bulgurdan (200 ml) içmeli.

Her günde armydyň täze miwelerinden 100 grama çenlisini iýmeli.



# TÜRKMEN ASPERULASY

Ясменник туркменский  
*Asperula turcomanica*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Dünýäde 200-e çenli, Türkmenistanda 3 görnüşi duş gelyär.

Türkmen asperulasy – boýy 20–40 sm ýetýän selmeler maşgalasynyň asperulalar urugynyň köpýyllyk otjumak wekili. Ösümlik çalymtyl-ýaşyl reňkli, küti, ýokarsy açaçlaşan köpbaşly kökli we köp sanly baldakly. Baldagy dört gyraňly, döwürlegen, güz uzyn bolmadyk küdür ýaýraň tüýjagazlar bilen örtülen. Bogunlarynyň arasy esasan, ýokarlygyna süýndürilen. Ýapraklary çogdamlayyn altydan ýerleşýär, çyzykly, uzynlygy (5) 8–10 mm, kütüleşen, gyrasyna tarap yzlygyna öwürülen, orak şekilli egrelen, tutuş üsti ýaýraň ownuk çiteneklije.

Gül toplumy çylşyrymly baş, 3–5 towlanan dessejiklerden ybarat, aglaba iki gatly, her başda 20–25 güljagazlar saklanýar. Gülleri jübüt, her goltukda iki garşylyklaýyn güljanjagazlar ýerleşýär. Güljanjagazlarynyň

ujy çowly ýa-da inçe ujy çowly, ownuk çitenekli, tüylüje, aşagy çymgylt-sowsany reňkli we gyzalary örän köp kirpikli. Gülleri ýaşylymtyl-sary reňkli, uzynlygy 8–12 mm, güljanjagazlary bilen tas deň ýa-da ondan birnäçe gezek uzyn, çitenekli-tüylüje. Miwesi – goňur reňkli, büdür-südür, tas togalak jübüt hozjagazly, uzynlygy 3 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Türkmen asperulasy ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol çagylyly we daşly eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýulda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Jelilede, Ýaşyl jülgede; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Magtymguluda, Hojagalada, Ýolderede, Çendirde; Merkezi Köpetdagda: Arwazda, Degirmenlide, Sülüklide, Mergenölenide, Heýrabatda, Çäýekde, Çopandagda, Arçabilde, Bozukýamowda, Neftanowskide, Gökderede, Gurtlusuwda, Daştoýda, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide, Şamlyda duşýar.

**Tebigy gory.** Türkmen asperulasy ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeliýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ol bitýän ýerlerinde bol duşýar. Her ýylda çig maldan, takmynan, 10–20 tonna ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin baldagy, ýapragy, gülleri we tohumy çig mal bolup hyzmat edýär. Baldagyny, ýapraklaryny we güllerini ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun), tohumyny – bişen wagtynda (iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda aýyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Baldakdan we ýapraklardan taýýar bolan çig mallary mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara, tohumynyňkyny – kagyz gutujyklara ýa-da agzy ykjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Çig mallary gury hem salkyn ýerde saklamaly. Baldagynyň, ýapragynyň we gülleriniň saklanýş möhleti – 1–2, tohumynyňky – 3–4 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümliğin ýerüsti böleginde dezasetilasperulozid, asperulozid iridoidler; fenolkarbon turşusy we olaryň birleşmeleri: hlorogen, 3-n-kumaroilhin, 5-n-kumaroilhin; kumarinler, izorutin flavonoidi; gyzyl reňkli boýag saklanýar.

**Peýdalanlylygy.** Türkmen milli tebigçiliginde hem halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplary) baldagynyň, ýapraklarynyň we gülleriniň peti sarygetirmede ulanylýar. Şeýle-de ösümliğin guradylyp owradylan oty ýaralaryň üstüne sepiliýär.

Bezeg hem boýag ösümlik.

### Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan baldagyny we ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 5 minut gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 ýola nahardan ön 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Asperulanyň 1 çay çemçe (5 g) gury güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 8–10 minut gaýnatmaly. Ýarym sagadyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan peti gün içinde 3 sapa nahardan ön 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

## TÜRKMEN SELMELEGI

Мандрагора туркменская

Mandragora turcomanica



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Dünýäde 5, Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelyär. Ösümlik başgaça «selmelek», «mährigöýä», «söýgi oty» ýa-da «ömür oty» diýlip atlandyrylýar.

Türkmen selmelegi — itüzümler maşgalasynyň selmelekler urugynyň boýy 20–40 sm ýetýän, gabaraly, baldaksyz köpýyllyk otjumak wekili. Ýapraklary ýazgyn, rozetka görnüşinde, gabarasy 160 sm çenli. Aşaky ýapraklarynyň uzynlygy 80 sm çenli we ini 60 sm, giň süýrütlik ýa-da ýumurtga şekilli, ýokarky böleginde iri, dogry däl üçburçly dişlije, uzynlygy 2 sm çenli. Ýokarky ýapraklary ownuk, süýrütlik-ýumurtga kysmy ýa-da giň ujy çowly, köp böleginiň gyrasy abat. Aşagy kerepjimek tüýjagazly, ýaşajyk ýagdaýynda ýapraklarynyň ýokarsy hem sähelçe tüýlülje, beýlekileri ýylmanak, dügürlü gasyňly, tas ýalaňaz, gyalary tolkunly, aşagy has bildirýän tor şekilli damarly.

Gülleri ýekeleýin ýa-da başda gysga (0,5 sm) 2–3-den, soňra uzyn (2–3 sm), sähelçe tüýlülje sapajykly, ýapraklaryň goltugynda 3-den ýerleşýär, haçanda miweler bişende, ösüp uzynlygy 7–18 sm çenli ýetýär. Ösümlikde olaryň umumy sany 100-e çenli. Okarajygynyň uzynlygy, takmynan, 1,5–2,0 sm, baş-alty bölünen. Onuň ülüşleriniň uzynlygy, takmynan, 1,0–1,5 sm we ini 0,5–0,9 sm, az-kem tüýlülje, ýumurtga şekilli-ujy çowly ýa-da üçburçly-ujy çowly, ýokarsy ýitileşen, miweleri bişende has ösýär, iýmişiniň uzynlygynyň 3/4-ne çenli ýa-da tutuş gurşap alýar. Gültäji jaňjagaz şekilli, daşy sähelçe tüýlülje, açyk-syýa reňkli, esasy ýarysyna çenli ýetýän 3 ak zolakly, uzynlygy, takmynan, 2,0–2,5 sm, 5 (6) birneme gyşaran, giň, ýumurtga şekilli, kütigräk ülüşli, uzynlygy, takmynan, 1,5 sm we ini 0,75–1,20 sm. Tyçinkalarynyň sany — 5 (6). Olaryň sapaklarynyň uzynlygy, takmynan, 0,5 sm, esasy gür açyk-sary, ak keçe ýaly tüýlülje. Tozgalygy açyk-mawy reňkli, uzynlygy, takmynan, 0,4 sm. Tozgajygy sarymtyl-ak. Düwünçeği dört gyraňly. Sütünjigi tyçinkalardan uzyn, 1/3-si egrelen. Tumşujagy başly, iki bölünen, ýaşyl. Miwesi — togalak iýmiş, gabarasy 6 sm çenli, ýylmanak, ýalpyldawuk, bişen wagtynda mämişisary reňkli, iýmäge ýaramly. Tohumy böwrek şekilli, gaty, uzynlygy, takmynan, 0,4–0,5 sm we ini 0,6–0,7 sm, sary ýa-da açyk-goňur reňkli.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Türkmen selmelegi ölkämizde deňiz derejesinden 800–1200 metr belentlikde bitýär. Ol toýunly, oňat çyglaşan mele topraklarda, çagylyly we daşly günorta eňňitlerde, agaçdyr gyrymsy agaçlaryň arasynda, garatikenekligiň jeňňelliklerinde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik noýabr–aprelde gülleýär, may–iýulda miweleýär. Şitilleri üç ýaşynda gülläp we miweläp başlaýar. Uly düýp 100-e çenli miwe berýär. Ol ir baharda tohumy arkaly, şeýle-de wegetatiw köpelmäge ukyply. Selmelegiň köp ýaşayanlygy, sowuga durnuklylygy we ösüş döwrüniň uzaga çekýänligi onuň gymmatynyň üstüni ýetirýär we gök ekinlerde seçgi işlerini geçirmek üçin ol geljegi bar bolan ösümlik hasaplanýar.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Hozluda, Dagdanlyda, Ýekeçynarda, Çohagaçda, Şywlanda, Altybaýda, Galalgözde, Hydyrsuwderede, Goçdemirde, Süntde duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Türkmen selmelegi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ol Magtymgulynyň ylmy-önümçilik synag merkezinde we Aşgabadyň botanika bagynda ekip yetiştirilýär. Ösümlik Sünt-Hasardag döwlet



goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň kökleri, ýapraklary we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr), ýapraklaryny – ösümlik gülläýän döwründe (noýabr–aprel), miwelerini – bişen wagtynda (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Köklerden we ýapraklardan taýýar bolan çig mallary mata haltalara, miweleriniňkini – kagyz gutujyklara ýa-da agzy ykjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Kökleriň we miweleriň ýaramlylyk möhleti – 2–3, ýapraklaryňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Türkmen selmelegiň himiki düzüminiň derňewi doly ýerine ýetirilmedi. Ösümligiň düzümine alkaloidler: skopolamin, giosiamin, krahmal girýär. Onuň miweleri düzüminde 80 mg/%-e çenli C witamini saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümligiň dermanlyk häsiýetleri irki döwürlerden bäri mälüm bolupdyr. Ol hakyndaky ilkinji maglumatlar Korneliýa Selsiň (b.e. I asyry), Kolumellanyň (b.e. I asyry), Pliniý ulunyň (b.e. 23–79-njy ýyllary) nusgawy işlerinde berilýär.

Botanika ylmynyň atasy hasaplanýan gadymy grek alymy Feofrast (b.e. ön 370–285-nji ýyllar) özüniň «Ösümlikler hakyndaky barlaglar» atly ylmy işinde: «... selmelegiň ýapraklaryny una bulap, ýaralara ýapmak peýdaly. Gyrgyçdan geçirilip, sirkede ezilen köki bezede, gaýtalanyp durýan bogun agyryda we ukusyzlykda kömek edýär, söýgi içgisi hökmünde ulanylýar. Ony çakyr ýa-da sirke bilen äberilýär, edil turpy kesen ýaly tegelek edip kesilýär we täze üzüm şiresiniň üstünden asyp, tüsseledýärler» diýip ýazýar.

Pifagor (b.e. ön 580–500-nji ýyllar) selmelegi «adam şekilli ösümlik», Kolumella – «ýarym adam oty» diýip atlandyrýar. Gippokrat (b.e. ön 460–377-nji ýyllar) bu ösümlik zerarly ýüze çykýan gallýusinasialaryň, göze görünmeleriň, samrama ýagdaýlarynyň kemaklylyga getirip biljekdigini, az mukdarda ulanylanda gorky duýgusyna, depressiýa garşy netijeli serişde bolup biljekdigini, has köp mukdarda ulanylanda bolsa, geň duýgulary dörediji täsir edýändigini belläpdir. Selmelegiň has uly dozalarda rahatlandyryjy we ukyňy tutduryjy häsiýete eýedir. Gomer garaguş kesellileri selmelegiň bugundan dem almak bilen bejerilýändigini ýatlap geçýär.

Şeýle maglumatlar Pliniýiň we onuň döwürdeşi Dioskoridiň (b.e. I asyry) ösümlikleriň barlagyna bagyşlanan we 1500 ýylyň dowamynda uly meşhurlykdan peýdalanan eserlerinde-de duş gelýär. Selmelegiň agyrysyzlandyryjy serişde hökmünde ulanyp boljakdygy barada ilki bolup Dioskorid, soňra bolsa, Pliniý aýdýar. Olar ony anestetikleriň toparyna daşky alamatlary boýunça goşýarlar.

Gadymyýetde «selmelek gülleriň arasynda has täsindir, şonuň üçin ol adamlary geň galdyrmalydyr» diýip hasaplapdyrlar. Gadymy rowaýatlaryň birinde şeýle diýilýär: «Arwahy ýa-da dinden çykany görmekçimi? Onda selmelegiň kökünü suw bilen keramatlandyr-da, tagtyň üstünde goý we kyrk günläp elleme. Şonça gün geçenden soň alyp, ýanyňda saklasaň suw melgunyny, howa iblisini görersiň. Biri ýaralanan ýa-da bir ýeri kesilen bolsa, ýarasyna ýap, üç günde biter».

Ebersiň üç münň baş ýüz yaşly müsür papirusynda-da selmelek hakynda agzalyp geçilýär. Post özüniň «Florasynda» onuň miwelerini örän hoşboý ysly iýmiş hökmünde suratlandyrýar. Ekkleziastyň «Rowaýatlar rowaýatynda» Süleýman şeýle diýýär: «selmelek eýýäm hoşboý ysyny ýaýratdy. Biziň howlymyzda-da dürli ajaýyp miweler bar. Men olary saňa goýdum, eý, meniň söýgülim!».

Aleksandr Kupriniň bir hekaýasynda Sulamif Süleýman bilen söhbetdeşlikde: «Men käte kiçijik adamjyklara meňzeş selmelegiň kökünü köwlap alýaryn. Olary haldeý söwdagärleri satyn alýarlar. Olar ondan uky tutduryjy içgini ýasaýarmysyn...Aýtsana, selmelegiň miwesi söýgüde kömek edýär diýilýäni çynmy? diýip, sorayar.

– Ýok, Sulamif – diýip, Süleýman jogap berýär – söýgüde diňe söýgi kömek edýändir».

Gadymy Gresiyada selmelek «yşk almasy» ady bilen belli bolupdyr. Ol muhabbet taňrýsy Afroditanýň gülleriniň hataryna goşulypdyr. Bu ösümlik barada ençeme asyrlaryň dowamynda dürli rowaýatlar, ynançlar döräpdir. Käbir halklar ony diňe bigünä öldürilen adamlaryň asylan dar agajynyň astynda ösýändigir, şonuň üçin jadyly güýje eýedir öýdýärler. Olaryň pikirçe, bu ösümligiň köküne eýe bolan adama baky juwanlyk, söýgi, maýyl etmek ukyby, baýlyk hemra bolýar. Bu ösümlik zürýatsyzlara zürýat berýär, ondan yşk meýi ýasalýar. Selmelegiň köki geçmişde «adamyň kellesi» diýen ada hem eýe bolupdyr. Ternaklar (ýörite söwdagärler) bu köki alyp-satmak bilen meşgullanypdyrlar. Hemmetaraplaýyn güýçli bu tumaryň hyrydary şeýle bir köpelpidir welin, ynsapsyz söwdagärler selmelege derek andyzyň kökünü aldap satmakdan hem gaýtmandyrlar. Arabystanda selmelek gijelerine ýanyar diýen ynanç bolupdyr. Şonuň



üçin ony kä melgunyň şemi, käte bolsa jadygöý kempiriň güli diýip atlandyrypdylar. Jadygöýler selmeleğiň kömegi bilen adamy akyly-huşundan we gözelliginden mahrum edip bilýändir öýdüpdirler. Şol bir wagtda onuň adamy hiç zat täsir edip bilmejek ýagdaýy kuwwatlandyryandygyna, oňa hazyna tapmaga, geljegi önünden bilmäge kömek edýändigine ynanydylar. Arabystanda dörän pikire görä, eger selmeleğiň kökünü ikä bölseň, kökün her böleginde bir şekil peýda bolýar. Olaryň biri erkek adamyň, beýlekisi zenanyň suduryna meňzeýär. Kökün esasy häsiýeti adama adamzat neslini dowam etdirmäge güýç bermekden ybaratdyr. Ol erkeklere söýgüde durnukly bolmak ukybyny, aýallara bolsa çaga dogurmak ukybyny peşgeş berýär.

Dürli halklarda bu ösümlik bilen baglanyşyklykda dürli yrmalar döräpdir. Gadymky döwürde onuň kökünü köwläp almak şeýle bir kyn çylşyrymly hasaplanylpydyr welin, hatda ony ýeriň astyndan çykaryp alnanda döreyän howpdan-hatardan gorumak üçin käbir düzgünleri berjaý etmeli bolupdyr. Feofrast özüniň «Ösümlikler hakyndaky barlaglar» atly işinde: «...Gyljyňyz bilen selmeleğiň daşyndan üç sany tegelek çyzyň. Soňra günbatara seredip durşuňyza kökünü çapyň. Kökünden ikinji bölegi çapyp almazdan ön ösümliğin daşynda tans edip, söýgi dogasyny okaň» diýip ýazýar. Soňra alym selmelekden söýgi içgisiniň taýýarlanylşy barada gürrüň berýär. Bu ösümliğin ýsga düşüriji täsiri baradaky ynançlar gadym eýýamdan bäri dilden-dile geçip, aýdylyp gelinýär. Siriýada, Türkiýede bolsa, onuň köküne hasyllylyga, önelgelige täsirli doga hökmünde seredilýär.

Selmeleğiň kökünü gazyp almagyň Feofrast tarapyndan beýan edilen usuly has gadymky awtorlaryň gürrüň beren usullary bilen deňeşdirilende ýönekeý, ýöntem görünýär. Olar goparylan wagtynda ösümliğin çirkin gygyryandygyny, howpsuzlyk çärelerini berjaý etmän, ony goparan adamyň üstüne uly howpuň abanyandygyny şeýle sözler bilen tassyklapdyr: «Goranmak maksady bilen kökün töweregini gazyp, oňa ýüpüň bir ujuny berkidipdirler. Ýüpüň beýleki ujuny açlykdan ýaňa ölere gelen gara itiň guýrugyna daňypdylar. Itiň önüne bir bölejik et oklapdylar. It eti almak üçin özüni zyňanda ýüp çekilipdir. Şeýdip köki goparan it ösümliğin gykylygy zerarly takga jan beripdir». Kökün ýerden gara itiň kömegi bilen çykarylyp alnyşy Feofrastyň grek dilinde ýazylan, Wenadaky kitaphanada saklanýan golyzmasynyň baş sahypasynda reňkleriň kömegi bilen beýan edilýär.

Piramidalarda gazuw-agtaryş işleri geçirilende 3300 ýyl mundan ozal jaýlanan Tutanhamonyň sarkofagyndan selmelek

tapyldy. Müsürliler bu ösümliğin miwelerini duýgularyňy oýaryjy serişe hasaplapdylar. 1984–1985-nji ýyllarda Baýramaly şäheriniň golaýynda Zorostratyň ybadathanasynda geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde selmeleğiň ýapraklary şekillendirilen dogalar tapyldy.

Dünyä medisina ylmynda öçmejek yz galdyran meşhur lukman we akyldar Abu Aly ibn Sina özüniň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly işinde şeýle ýazýar: «Selmelek ukyňy tutdyrýar, ukuçylyk we göwnüçökünlik ýagdaýyna salýar. Eger ony çakyra garsaň, has serhoş bolarsyň». Gündogar lukmany selmeleğiň mundan başga-da, gusduryjy, agyrysyzlandyryjy, peşew kowujy, gan durzujy täsiriniň bardygyny, ýatgydaky näsazlyklarda, ýiti göz agyryda, gaty çişlerde, iriňli başly ýaralarda, zäherli mör-möjekler çakanda (ýapgy etmek) peýdalydygyny beýan edýär. Ýapraklarynyň gan öýen ýerlere, kökünüň çyban çykan ýerlere, bogun agyryda yzaly ýerlerine ýapylýandygyny belleýär.

Selmelek orta asyrlarda Merkezi Aziýanyň farmakognosiýasynda uly ähmiýete eýe bolupdyr. Şol döwürüň meşhur alymlarynyň biri Abu Reýhan Biruniniň «Lukmançylykda farmakognosiýa» atly ylmy eseri hem muňa güwä geçýär. Awtor bu kitabynda antik döwürde ýaşan ýewropaly alymlaryň we orta asyryda ýaşap geçen gündogarly kârdesleriniň ylmy işlerinden alan ähli maglumatlaryny jemläpdir.

Selmeleğiň dermanlyk häsiýetleri barasyndaky doly maglumatlar orta asyrlarda ýaşap geçen Gündogaryň ezber lukmany we alymy Muhammet Huseýniň «Melhemler hazynasy» atly nusgawy eserinde mälim edilýär.

Selmelek Sumbar jülgesiniň gadymy ilatynyň arasynda meşhur bolupdyr. Ol bu ýerde köp sanly keselleri bejermekde ulanylpydyr. Onuň kömegi bilen ýaralary, zolotuhany (örgünli iriňli dömmeli çaga keseli) bejeripdirler.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly etrabynyň daglyk obalary) bu ösümlik agyrysyzlandyryjy, gyjyndyryjy, ukyňy tutdyryjy, dogalaýjy, narkotiki täsiri bilen tanalýandyr. Ol jynsy gatnaşyklara meýillendiriji we önelgesizlige garşy serişde hökmünde ulanylýar. Onuň köki bezede, gaýtalanyp durýan bogun agyryda, ukusyzlykda; ýapraklary — bitmesi kyn ýaralarda; bişen miweleri — garamükrüde, ýaralarda, başlarda, çykuwlarda haýyrlanylýar. Miwesiniň şerbeti nerw dartgynlygyny aýyrýar, bedeniň umumy ýagdaýyna oňyn täsir edýär, jynsy kuwwatlylygy ýokarlandyryr.

Türkmenler selmeleğiň bagt we şatlyk getirýändigine ynanydylar. Ony tapan adama bişen miwesini iýmegi,



çigidini öýe getirmegi we bişenden soň ýmegi ýa-da ýagşylyk dileýän adamyňa bermegi ündeyärler. Selmelegiň miweleri çagalarda iriňli örgünleri we dürli ýaralary bejermekde ýardam edýär. Çig ýa-da bişip baryan miwesini ýmeli dældigini her bir türkmen bilýär. Selmelegiň doly bişmedik miwesi gallýusinasialaryň, teşneligiň ýüze çykmagyna, ýöne bokurdagyň gysylmagy zerarly suw içmegiň kynlaşmagy bilen häsiýetlendirilýän zäherlenme döredýär. Ýüz, aýaklar, eller çişýär, bedeniň gyzgyny 39 gausa çenli ýokarlanýar, bedeniň we ýüzüň derisi gyzarýar, göreç giňelýär, syrkaw özüniň isleýşi ýaly hereket edip bilmeýär. Bu alamatlar 1–3 günden soň ýok bolýar.

Ylmy lukmançylykda selmelegiň rahatlandyryjy häsiýeti gaýtalanyň durýan bogun agyrynyň, reumatizmiň bejergisinde ulanylýar.

Selmelegiň özbaşdak ulanylmagy pajygaly ýagdaýlaryň ýüze çykmagyna getirip bilýär. Ony ulanmazdan öň hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Bezeg, azyklyk, bal beriji, ot-ýmlik we boýag ösümlük.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 çemçe (5 g) owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Ýarym sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün nahardan soň 3 gezek 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli. Şeýle-de günüň dowamynda 2 ýola (irden hem aňşam) ýapgy etmeli.

Selmelegiň 1/2 çay çemçe (2,5 g) owradylan tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanyan otda 5–6 minut gaýnatmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapa nahardan öň 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) owradylan tohumyny bir litrlik termos demlemeli, 30 minut goýmaly. Hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 wagty 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Selmelegiň 2 nahar çemçe (30 g) gury ýapraklaryny 1/2 bulgur (100 ml) 40%-li spirte atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün goýmaly. Birsyhly çaykap durmaly. Soňra süzmeli. Şerbeti günüň dowamynda 2 gezek 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 1 çay çemçe (5 g) owradylan ýa-da guradylan miwelerini 1/2 bulgur (100 ml) medisina spirtine atyp, agzy mäkäm ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde bir hepde goýmaly. Yzygiderli çaykamaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Taýýar bolan şerbeti günüň dowamynda 2 sapa (irden hem aňşam) 1 sagat nahardan öň, ajöze 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli. Eger-de gijesine biynjalyk ýüze çykan ýagdaýynda,

agşamky içmeli dermandan ýüz döndürmeli. Şerbeti berk ýapylýan, garaňky ýerde saklamaly.

Selmelegiň dermanlaryny ulanyljak wagtyň öň ýanynda hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

## **TÜRKMEN TILKIÇAYY**

### **Чистец туркменский**

### **Stachys turcomanica**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Türkmen tilkiçayy – dodakgüllüler maşgalasynyň tilkiçaylar urugynyň boýy 15–30 sm ýetýän köpylyk otjumak ýa-da ýarym gym-syja wekili. Ösümlük köp sanly ýönekeý we göni baldakly, agymtyl, gür gysga gysylan, ýyldyz şekilli tüýjagazlar bilen örtülen. Ýapraklary süýrümlik-ujy çowly we çyzykly-ujy çowly, baldaga saralýan, inçejik sapakly. Ýokarky ýapraklary çyzykly, tas sapaksyz. Ähli ýapraklary gyalary abat, ýiti, pahna şekilli esasly, ýokarsy dagynyk, aşagy gür, gysylan, ýyldyzjagaz şekilli tüýljuje we çykyp duran damarly. Gülüň aşagyndaky ýapraklary süýrümlik.

Gül toplumu birnäçe, köp bölegi ýalan çogdamdan emele gelen, hersi 5–7 güllüje. Gülleri tas sapaksyz ýa-da örän gysga sapaklyja. Gülyanynyň ýapraklary örän ownuk, çitenek şekilli, gül sapajygundan gysga ýa-da deň, gür ýyldyzjagaz şekilli tüýljuje. Okarajygynyň uzynlygy, takmynan, 10 mm, trubkaly jaňjagaz şekilli, inçe ak keçe ýaly tüýjagazlar bilen örtülen, ujy çowly ýitileşen, içkileriniň dişjagazlary tüýljuje, uzynlygy 4–5 mm, dişjagazlarynyň arasy ýönekeý tüýljuje. Gültäji okarajykdan çykýar, esasyndan tä ortasyňa çenli ýalaňaç, trubkaly. Onuň ortasyndan ýokarsy bulaşyk ýönekeý tüýljuje. Gültäjiniň içi gür ýyldyz şekilli tüýjagazly. Ýokarky dodagy ýaýbaň süýri, aşakydan gysga. Aşaky dodagy giň togalak aralyk kepjeli we has gysga gapdal

ülüşlije. Tyçinkalary gültäjinden çykmaýar, agzyna çenli ýetýär. Hozjagazlary üç gyraňly, ýalaňaç.

**Yaşaýyş aýratynlygy.** Türkmen tilkiçaýy ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlde bitýär. Ol çagylyly, daşly we ownuk topurly eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär, iýun–iýulda miwelenýär. Ol tohumy arkaly köpelenýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly we Kiçi Balkanda: Tüysmergende, Gurbannepesde; Kürendagda: Jelilede, Soňudagda, Gamyşlyda; Günorta-Günbatary Köpetdagda: Daynada, Magtymguluda, Sumbarda, Bagandyrd, Hojagalada, Hasardagda, Süntde, Ýolderede, Çendirde; Merkezi Köpetdagda: Nohurda, Üçguýuda, Garayalçyda, Arwazda, Tagarawda, Sarymsaklyda, Degirmenlide, Sülüklide, Müsünewde, Mergenölende, Gylgylawda, Germapda, Sekizýapda, Heýrabatda, Çäyekde, Çopandagda, Arçabilde, Hanyýalada, Gökderede, Duşakerekdagda, Wanowskide, Gurtlusuwda, Howdanda; Gündogar Köpetdagda; Bathyzda duşýar.

**Tebigy gory.** Türkmen tilkiçaýy ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde bol duşup, topbajyklary emele getirýär. Her ýylda 25–30 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury, garaňky, Gün şöhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Türkmen tilkiçaýynyň düzümine alkaloidler girýär. Onuň ýerüsti böleginde 0,033–0,150% efir ýagy (onuň düzümine limonen, kampfen,  $\beta$ -pinen, 1,8-sineol, n-simol), kumarinler, flavonoidler: betamisin, stahidrin, irdoidler, sakyz, Ca duzlary, uglewodlar, fenol-karbon turşular, K witamini saklanýar. Tohumynda ýag bar.

**Peýdalanylyşy.** Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly we Gökdepe etraplary) ösümligiň otunyň peti we jöwheri ýürek-damar kesellerinde, gan aýlanyşyň bozulmalarynda, kakynda, özüňden gitmede, garaguş keselinde peýdalanylýar. Şeýle-de ýaralary we başlary bitirmekde ýapgy hökmünde ulanylýar; şerbetini – newrozlarda, myşsanyň ýygrylyjylygyny güýçlendirmekde, ganyň lagtalanmasyny gowulandyrmakda, sedatiw serişde hökmünde haýyrlanylýar.

Onuň efir ýagy parfümer-kosmetik senagatynda giňden ulanylýar.

Bezeg, bal beriji we tehniki ösümlik.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Tilkiçaýyň 1 çay çemçe (5 g) guradylyp owardylan otuny 2 bulgur (400 ml) gaýnaga atyp, bir sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapa nahardan ön 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

## TÜRKÜSTAN GUŞGONMAZY Сафлор туркестанский Carthamus turkestanicus



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Dünýäde 19, Türkmenistanda 2 görnüşü duş gelýär.

Türküstan guşgonmazy – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň guşgonmazlar urugynyň boýy 30–100 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik ýüňjüme, çalymtyl-yaşyl reňkli, käte ýokarsy kereplije. Baldagy göni, gaty, ýokarsy galkan şekilli ýa-da bulam-bujar şahalan. Ýapraklary sähelçe gaty tüýlüje; kökanyndakylary – 6–8-den lirogörnüşli, süýrümük-ujy cowlly, ýiti dişlije, gapdal üleşli we ýumutga kysmy jübüt däl üleşlije. Baldakdaky ýapraklary derijimek, çykyp duran damarly, esasy baldaga saralan, ujy cowlly, tikenli perşekilli bölünen. Ýapraklaryndaky tikenjikleri goňur reňkli, has inçe we gysga.



Sebetjigi iri, ini 1,5–2,0 sm (gynynyň sallanyşyp duran ýapraýyklarynyň ini 7 sm çenli), ýumurtga şekilli. Gynynyň daşky ýapraýyklary ýaprakly açar kysmy dişlije; içkileri – uýj çowly, abat, uýj tikenli. Gülleri açyk-sary reňkli. Gyrazy çigitjagazlary üpüksiz, togalak-dört gyraňly, bir reňkli, tas göni çyzykly, esasynda gysylan, uzynlygy, takmynan, 5 mm, ini 3,0–3,5 mm we tas şular ýaly galyňlykda. Içki çigitjikleri küti, pahna pisint-dört gyraňly, ýylmanak, keseligine çyzykly we uly, 12 mm çenli, üpüki, yzygiderlilikde süýnýär, gyzylary bütür-südü. Daşky çigitjagazy (has gysga) dilnen we ýokarsy oýuk, içkileri – ýiti, daşkysynyňkydan birneme gysga.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Türküstan guşgonmazy ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 belentlikde bitýär. Ol seýrek dagöňüniň düzlüklerinde, jülgerlerde we eňňitlerde, şeýle-de medeni oturumlarda ruderal haşal ösümligi hökmünde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär, iýun–awgustda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly we Kiçi Balkanda; Kürendagda; Günorta-Günbatar Köpetdagda; Magtymguluda, Aşaky we Ýokarky Sumbarda, Çendirde; Merkezi Köpetdagda: Garawulda, Nohurda, Germapda, Arçabilde, Uly Garaňkyda, Komarowskiýde, Gökderede, Duşakerekdagda, Wanowskide, Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Asylmada, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskiýde, Guruhowdanda, Şamlyda; Bathyzda; Köytendagda; Hazarýaka çölünde: Üçdepelerde, Etrekde; Etrek medeni oturymynda; Köpetdagetok medeni oturymynda: Köşide, Bagyrda, Kakada; Murgap medeni oturymynda duşýar.

**Tebigy gory.** Türküstan guşgonmazy ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Bitýän ýerlerinde haşal ösümligi hökmünde bol duşýar. Her ýylda 50–70 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň ýapraklary we miweleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Ýapraklaryny ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun),

miwelerini – bişen wagtynda (iýun–awgust) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda, açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklardan taýýar bolan çig mallary mata haltalara, miweleriniňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Olary gury, garaňky ýerde saklamaly. Ýapraklaryň saklanyş möhleti – 1–2, miweleriňki – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Guşgonmazyň düzümine efir ýagy we ýag girýär. Onuň güllerinde hromogen glýukozidler: gyzyl kartamin we izokartamin saklanýar. Miwelerinde 27,8–31,0% ýarym guraýan ýag, gliserid linol turşusy bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň ýapraklarynyň peti we jöwheri diuretik, mädilik, öt we der çykarjy seişde hökmünde, sarygetirmede, kakynly tutgaýlarda ulanylýar. Şeýle-de melhemi angina (borkudagyňy çaykamak) haýyrlanylýar. Miweleri gowşak içsürüji.

Ylmy lukmançylykda guşgonmazyň ekstraktynyň stafilokokklaryň mutantlarynyň we rak öýjükleriniň garşysyna işjeňligi ýüze çykaryldy.

Ýapraklary parfümer-kosmetiki senagatynda al-gyrmyzy reňki taýýarlamak üçin peýdalanylýar. Mundan başga-da, boýag senagatynda ýüpek matalary mämişi goýy gyzyl reňklere boýamakda ulanylýar.

Azyklyk, bal beriji, ot-ýimlik we boýag ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) gury ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10 minut gaýnatmaly. 30 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3–4 gezek nahardan 10–15 minut ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Guşgonmazyň 2 çay çemçe (10 g) owradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, bir sagat goýmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3–4 sapar nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan miwelerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, bir sagat goýmaly. Hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 ýola 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

# TÜRKÜSTAN GYZLAGAJY

Рябина туркестанская  
*Sorbus turkestanica*



**Häsiyeti.** Dag derman ösümligi. Türküstan gyzlagajy – bägüller maşgalasynyň gyzylagaçlar urugynyň boýy 4–6 metre ýetýän agaç wekili. Pyntyklary sähelçe tüýlüje. Ýapraklary süýrüntik-elliptik, ýokarsy ýiti ýa-da küt McGräk, esasy pahna kysmy gysylan. Ülüşleriniň uzynlygy (5,5) 6,0–10,0 (12,0) sm we ini (3,0) 3,5–6,5 (8,0) sm, aşaklygyna per şekilli dilnen, 1–2 jübüt segmentli, köp bölegi kepjeli, per kysmy dilnen, aşaky we ortaky kepjeleriniň çuňlугy 1/3–1/2-ne, ýapragyň ininiň ýarysyna deň, derijimek, ýokarsy ýalaňaç, aşagy çalt tüýlüje, gýralary 30–50 dişlije. Dişjagazlary kiçi, kese üçburçly-ujy çowly, ýiti, käte tas ok kysmy. Gapdal damarlarynyň sany – 7–9. Olaryň burçy, ortasynda 45°. Kejjeleri süýrüntik ýa-da süýrüntik-üçburçly, ýiti, seýrek küt McGräk. Daşky gýralary birnäçe, içkileri 1–2 kiçi dişlije. Okara ýaprajyklary ak keçe ýaly tüýlüje, uzynlygy 0,7–2,0 sm.

Galkanýyklary köp güllüje. Gül sapagy güllýän wagtynda ýalaňaç (seýrek örän sähelçe tüýlüje). Gül ýatagy ýalaňaç. Okarajygy ak keçe ýaly tüýlüje, inçe ujy çowly dişjagazly. Gül ýapraklary ak, togalak-ters ýumurtga şekilli, esasynda gysylan. Miweleri süýri ýa-da süýri-armyt şekilli, mämişi reňkli.

**Yaşayyş aýratynlygy.** Türküstan gyzlagajy ölkämizde deňiz derejesinden 1600–2800 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly-daşly demirgazyk eňňitlerde we daşly ýapgytlarda, gyrymsy agaçlaryň jeňňelleriniň arasynda ösüp boý almany halaýar. Uly bolmadyk topbajyklary emele getirýär. Daragt sowuga çydamly, toprak dannamaýar. Ösümlik may–iýulda güllýär, awgust–sentýabrda miweleýär. Ol tohumy we kök çykyntylary arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Daragt diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Müsünewde, Hyrsderede, Tazytahtyda, Semansurda, Çopandagda duşýar.

**Tebigy gory.** Türküstan gyzlagajy ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Hasaplamalara görä, Merkezi Köpetdagda agajyň 400-den gowrak düýbi hasaba alyndy (A.Akmyradow, G.Gurbanmämmadowa, 2011 ý.). Ekip ýetdirmek maslahat berilýär. Daragt Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Daragtyň sütüniniň gabygy we miweleri dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Gabygyny ir baharda (mart), miwelerini – bişen wagtynda (sentýabr) ýygnamaly, galyň matanyň üstünde oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mala özboluşly, hoşboý ys häsiýetli. Gabykdan taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara, miweleriniňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümligiň ýerüsti böleginde fenolkarbon turşular we olaryň ugurdaşlary, flavonoidler saklanýar. Miwesinde C, P witaminleri, karotin; organiki tutşular; eý we aý maddalar bar. Tohumynda ýag saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümligiň dermanlyk häsiýetleri hakynda Abu Reýhan Birunyň «Lukmançylykda farmakognoziýa» nusgawy eserinde, orta asyrlarda Gündogaryň ezber lukmany Muhammet Huseýniň «Melhemler hazynasy» atly işinde: «...gyzylagaç gusmany köşeşdirýär, içgeçmäni togtadýar, esasan, bu babatda, daragtyň täze bişmedik miweleri güýçli täsir edýär» diýlip bellenilýär.

Halk lukmançylygynda ösümligiň miwesinden taýýarlanylýan şerbeti we ekstrakty paratífde, bakteriýaly kesellerde (daşky serişde hökünde) peýdalanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Baharly we Gökdepe etraplarynda) miwesiniň we gülleriniň peti aşgazan-içege kesellerinde ulanylýar.



Ylmy lukmançylykda agajyň miwesiniň garamükriniň garşysyna, diuretik, öt çykarjy häsiýete eýedigini mälim edildi. Miweleri witaminli ýygynlaryň we toşaplaryň düzümine girýär.

Özünde hoşboý tagamy saklaýanlygy üçin aşpezlikde haýyrlanylýar. Şekere ýatyrylan miwelerinden mürepbe taýýarlanylýar, ondan berhiz önümi çykarylýar.

Bezeg, azyklyk, witamin saklaýjy, bal beriji, insektisid, boýag we topragy berkidişi ösümlik.

### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Daragtyň miweleri bilen güllerinden we süýji ýekeniň (airiň) kökünüň 3:1 gatnaşykda 1 nahar çemçe (15 g) garyndysyny, 1 bulgur (200 ml) sowuk suwa atyp, bir sagat goýmaly, soňra içi syrçaly gapda pessaý otda 5 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.

Gyzylagajyň 2 çay çemçe (10 g) guradylan miwelerini 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, bir sagat goýmaly, islegiňe görä, şeker goşmaly. Jöwheri gün içinde 3–4 ýola kabul etmeli.

Daragtyň täze şiresiniň uly bolmadyk 2 rýumkasyny, 1 bulgur (200 ml) suwa garyp, islegiňe görä, şeker goşup içmeli. Babasyla haýyrlý serişde.

Gyzylagajyň miweleriniň şiresinden her gün 2–3 ýola 1/5–1/4 bulgurdan (40–50 ml) içmeli.

Daragtyň ýemişinden her gün 50-sini içmeli.

reňkli, ýönekeý ýa-da dihotomiki şahalanýan dört gyraňly we ýylmanak, käte diňe bogunlarynda sähelçe бүдүр-сүдүр gapyrgaly. Ýapraklary 8-den çogdamlayyn, aşaklary kepjeli-ters uýy çowly, uýy basym gurayar. Ýokarkylary inçe uýy çowly ýa-da tas çyzykly, ýasy, uýy күтеграк, gyralary ýaýraň çitenekli, бүдүр-сүдүр ýa-da ýylmanak.

Gültoplumu galkan şekilli baş, olar 6–10 gülgajaglardan ybarat. Gülgajaglary çyzykly-ters uýy çowly, ýasy, күтеграк, gyralary (esasan, aşaklygyna) uzyn ak kirpiklije. Gülleri göm-gök mawy ýa-da gök reňkli, gülgaj ýapraýyklary birnçäe esse gysga, ýalaňaç, uzynlygy 7–8 mm. Miwesi – ýylmanak, ýumurtga şekilli şar görnüşli ýa-da şar kysmy, posjumat-goňur reňkli, jübüt hozjagaz, uzynlygy 1,5–2,5 mm.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Tüýlek asperula ölkämizde deňiz derejesinden 800–1200 metr belentlikde bitýär. Ol çagylyly, daşly enňitlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik aprel–iýunda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda: Geçisuwda; Kürendagda: Däneatada, Torgaýda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Çohagaşda, Süntde, Ýolderede, Palyzakda; Merkezi Köpetdagda: Arwazda, Sarymsaklyda, Degirmenlide, Sülüklide, Mergenölende, Heýratbatda, Çäýekde, Çopandagda, Arçabilde, Bozukýamowda, Lülüde, Neftanowskiýde, Gökderede, Gurtlusuwda, Daştoýda, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskiýde, Şamlyda; Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Tüýlek asperula ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ösýän ýerlerinde bol duşýar. Her ýyl dermanlyk çig maldan, takmynan, 10–15 tonna ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin baldagy, ýapraklary, gülleri we tohumy çig mal bolup hyzmat edýär. Baldagyny, ýapraklaryny we güllerini ösümlik gülleýän döwründe (aprel–maý), tohumyny – bişýän wagtynda (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Baldagyndan we ýapraklaryndan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleriniňkini we tohumynyňkini – kagyz gutujyklara ýa-da agzy ykjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Baldagyň, ýapraklarynyň we gülleriniň saklanýş möhleti – 1–2, tohumynyňky – 2–3 ýyla çenli.

**Himiki düzümi.** Ösümliğin ýerüsti böleginde dezasetilasperulozid iridoidler; fenolkarbon turşusy

## **TÜÝLEK ASPERULA**

**Ясменник щетинистый**

**Asperula setosa**



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliki. Tüýlek asperula – çöpboýalar maşgalasynyň asperulalar urugynyň boýy 5–40 sm ýetýän birýyllyk otjumat wekili. Ösümliğin baldagy ýaşyl

we olaryň birleşmeleri: hlorogen, 3-n-kumaroilhin, 5-n-kumaroilhin; флавоноиды: kosmosiin, sinarozid, 7-arabinozilglýukozid, lýuteolin we 7-ksilozilglýukozid diosmetin, giperozid, izorutin, 7-arabinozilglýukozido-4'-glýukozid lýuteolin, 7-arabinozilglýukozido-4'-glýukozid apigenin, 7-arabinozilglýukozido-4'-glýukozid kwersetin saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda baldagynyň, ýapragynyň we gülleriniň peti bronh demgysmasynda, asitde, bagyr serrozynda, peşew ýollarynyň sowuklama sökelliklerinde, aşgazan yzasynda diuretik, peşew çykaryjy, derlediji, ýumşadyjy, gakylyk goparyjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Şeýle-de onuň peti bitmesi kyn ýaralarda, ikilenji ýokanç deri örgünlerinde, dokuzdonluda ýuwmak arkaly ýa-da ýapgy görnüşinde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda baldagy, ýapraklary, gülleri we tohumy süýtlahtalandyryjy asperulin fermentini almak üçin çişme bolup hyzmat edýär.

Bezeg we boýag ösümlük.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan baldagyny we ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 5 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün nahardan ön 1 nahar çemçeden (15 ml) 3 gezek içmeli.

Tüýlek asperulanyň 1 çay çemçe (5 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 8–10 minut gaýnatmaly. Ýarym sagadyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Peti gün içinde 3 ýola nahardan ön 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 2 nahar çemçe (30 g) guradylan otuny 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwuň içine atyp, bir sagat çemesi goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 4 sapar 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

## **TÜÝLI GUŞOKARA**

**Ворсянка щетинистая**

**Dipsacus strigosus**



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Tüýli guşokara – guşokaralar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 50–150 sm ýetýän ikiýyllyk otjumak wekili. Ösümligiň baldagy göni, gyraňly, tüýli we çitenekli. Ýapraklary dişlije, süýrümlik, ýitileşen, aşaklary abat we sapaklyja, baldakdaky ýapraklarynyň esasy per şekilli bölünen, 2–5 gapdal ülüşli, kirpiklije. Başy şar şekilli, gabarasy, takmynan, 3 sm. Gynynyň ýaprajyklary uýj çowly, ýitileşen, başjagazdan gysga.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Tüýli guşokara ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol derýalaryň jülgelerinde, derelerdäki gyrymsy agaçlaryň arasynda, çişmeleriň golaýynda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–iýulda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Hasardagda, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Garaýalçyda, Sülüklide, Gökderede, Dagyşda, Daştoýda, Howdanda duşýar.

**Tebigy gory.** Tüýli guşokara ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Käte haşal ösümligi hökmünde duşýar. Ol Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň kökleri, ýapraklary we gül toplumlary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Köklerini ir baharda (mart) ýa-da güýzde (sentýabr, otuny, ýapraklaryny we gültoplumyny ösümik gülleýän döwründe (iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem



taýýarlamaly. Köklerden we gültoplumlardan taýýarlanylýan çig maly kagyz haltalara, otlaryňkyny we ýapraklarynyňkyny – mata haltalara gaplamaly. Olary gury hem salkyn ýerde saklamaly. Kökleriň saklanyş möhleti – 2–3, otlaryňky, ýapraklaryňky, gültoplumlaryňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümligiň düzümine iridoidler, alkaloidler girýär. Onuň ýerüsti böleginde 2,1% tri-terpenoidler, 7-β-D-glýukopiranozid lýuteolin flavonoidler saklanylýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda kökleriniň, ýapraklarynyň we gül toplumlarynyň petlerdir, merhemleri babasyl düwünlerinde, gabarçyklarda we zäherli ýylanlar çakanda agyry aýryjy serişde hökmünde peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň ýerüsti böleginde saklanýan alkaloidleriň jeminiň hlorgidratynyň pressor işjeňligi, şeýle-de ýapraklaryndaky we gül toplumlaryndaky alkaloidleriň jeminiň we ekstraktynyň gan aýlanyşy, dem alma we böwregiň bölüp çykaryjy hyzmatyny stimullirleýji täsirleri ýüze çykarylýdy.

Bezeg we bal beriji ösümlük.

#### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp owradylan köklerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti ýapgy görnüşinde ulanmaly.

Guşokaranyň 1 çay çemçe (5 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Jöwheri her gün 3 wagtyna 2 nahar çemçeden (30 ml) içmeli.

## **TÜÝLI HANDELIÝA**

**Ханделия волосистая**

**Handelia trichophylla**



**Häsiýeti.** Dagetek derman ösümligi. Türkmenistanda 1 görnüşü duş gelýär.

Tüýli handeliýa – çylsyrmylgüllüler maşgalasynyň handeliýalar urugynyň boýy 40–60 sm ýetýän ikiýyllyk ýa-da köpýyllyk wekili. Baldagy göni, şahalanmadyk, aşagy ak keçe ýaly ýüň kysmy tüýlülje, yokarky bölegi tas ýalaňaç, galkan şekilli şahalanan. Kökýanyň ýapraklary sapakly, uzynlygy 20 sm çenli, baldakdakylary – sapaksyz ýa-da esasy gulaklyja. Ähli ýapraklary kerep kysmy tüýlülje, segmentli, tüýlülje uýy, ýiti ülüşleri köp sanly bölünen.

Gül sebetleri örän köp mukdarda sübseli-galkan şekilli gül toplumyna ýyganan. Gapdal galkanlyklary uzyn sapajyklarda ýerleşýär. Sebetjigi tas şar şekilli, ýumurtga kysmy jaňjagazly, ýalaňaç, gabarasy, takmynan, 5 mm. Ýaprajyklarynyň gyny ýaybaň süýrümlik, kütek, gyalary giň ak perdeli. Sebetdäki ähli gülleri trubkaly, iki jynsly, baş dişlije, sary (gyraky dillije gülleri ýok). Gülyatagy oýuk, perdeli, kütek, ýalaňaç teňňejikler bilen örtülen,

damarlarynda görnegin ak zolak görünýär. Çigitjagazynyň uzynlygy 1,5 mm. Arka tarapy togalak, garny – 3 damarly.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Tüýli handeliýa ölkämizde deňiz derejesinden 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol dag eňňitlerinde, şeýle-de gury jülgelerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýunda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Bathyzda: Serhetabatda; Köýtendagda: Hojagarawulda duşýar.

**Tebigy gory.** Tüýli handeliýa ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Bathyz we Köýtendag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty we gülleri dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlik gülleýän döwründe (maý) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda, aýyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Olary gury, garaňky ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Tüýli handeliýanyň düzümine seskwiterpenoidler: hanfillin, handelin girýär. Onuň ýerüsti böleginde efir ýagy, seskwiterpenoidler: hanfillin, handelin saklanýar. Gül toplumynda – seskwiterpenoidler: kumambrin A, artekamin, hrizartemin bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin otuny we güllerini nerw bozulmalarynda, dowamly icgatamada, deri we aşgazan-ičege kesellerinde peýdalanylýarlar.

Ylmy lukmançylykda ösümlikdäki handelin we kumambrin seskwiterpenoidleriň antibakterial işjeňligi ýüze çykarylýdy.

Bezeg we boýag ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümliň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan otuny 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessay otda 20 minut gaýnatmaly. Ýarym sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan öň 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Handeliýanyň 1 çay çemçe (5 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 20 minut goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 gezek nahardan 30 minut öň 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli. Şeýle-de bedeniň zeperlenen ýerlerini ýuwmaly, klizm etmeli.

Ösümliğin 2 çay çemçe (10 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 40 minut goýmaly.

Hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 ýola nahardan 30 minut öň 1/4 bulgurdan (50 ml) peýdalanmaly. Deri kesellerinde günün dowamynda 2 gezek (irden hem agşam) ýapgy yapmaly.

## TÜÝLEK ÝYLGYN

Гребенщик щетинистоволосый  
**Tamarix hispida**



**Häsiýeti.** Şorlukdyr çöl derman ösümliği. Tüýlek ýylgyn – ýylgynlar maşgalasynyň ýylgynlar urugynyň boýy 1,5–5,0 metre ýetýän gyrymsy wekili. Daragtyň sütüni goňur-gyzyl reňkli gabykly, tutuş gür, ak gysgajyk bir öýjüklü göni tüýjagazlar bilen örtülen. Ýapraklary giň ýumurtga şekilli, uzynlygy 0,5–2,0 mm we ini 0,5–0,7 mm, ýitiräk, esasy tas gulaklyja. Salkymy ýokarky, uzynlygy 5–7 sm we ini 3–5 mm ýa-da süýnen – uzynlygy 7–17 sm, gür sübsejige gysylan. Gülýanyň ýaprajyklary ýürek şekilli, uzynlygy 1,0–1,5 mm, ýitiräk, okarajyga deň ýa-da birneme uzynrak (gül saklaýjy bilen bilelikde).

Gülleri baş (seýrek dört-) agzaly. Okarajygy ýumurtga şekilli, ýitiräk, seýrek syýa-gyrmazy ülüşli. Ýapraklary al ýa-da gülgün reňkli, elliptik, uzynlygy 1,5–2,0 mm we ini 0,6–1,0 mm, okarajygyndan tas 1/3 uzyn, kütäk, egrenen,



gaçyan. Tyçinkasynyň sany – 5 (seýrek). Diski başburçly, sapagynyň esasyňa giňelen, okarajyga deň ýa-da sähelçe uly. Tozanjyklary kütek. Sütünjikleriniň sany – 3, gysgalan, köp bölegi gültäjinden 3–4 esse gysga. Gozajygynyň uzynlygy 4–5 mm we ini 1 mm, okarajygundan 4–5 esse uzynrak, köp bölegi reňkli, gyzylymtyl.

**Ýaşajyş aýratynlygy.** Tüýlek ýylgyn ölkämizde ezilen we per ýaly şorluklarda, aklaňly çägelikleriniň peselen ýerlerinde, derýalaryň, kölleriniň suw howdanlarynyň kenarynda, medeni oturumlaryndaky köne ekin meýdanlarynda ösüp boý almany halaýar. Daragt iýul–sentýabrda gülleýär, awgust–oktyabrda miweleýär. Ol vegetatiw joly arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik Türkmenistanyň hemme düzlük etraplarynda duşýar.

**Tebigy gory.** Tüýlek ýylgyn ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriniň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin ýapraklary, inçe baldaklary we şiresi dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary ösümlik gülleýän döwründe (iýul–sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Ýapraklardyr baldaklardan taýýar bolan çig mallary mata haltalara, gülleriniňkini – kagyž haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, garaňky ýerde saklamaly. Olaryň saklanyş möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ýylgynyň düzümine eý maddalar girýär. Onuň kökleriniň gabygynda 6,4% eý maddalar saklanýar. Baldaklarynda 3,3%-e çenli eý maddalar bar. Daragtyň gabygynda 0,23% kumarinler, 6,2% eý maddalar, 2,1% flawonoidler, antosianlar saklanýar. Gök şahajyklarynda 0,18% kumarinler, 2,8%-e çenli eý maddalar, 1,2% flawonoidler: kwersetin, izokwetsitrin, kempferol, tamariksetin, tamariksin bar. Güllerinde 0,08% kumarinler, 5,7% eý maddalar, 2,6% flawonoidler: kwersetin, izokwetsitrin, kempferol, tamariksetin, tamariksin, 8,75% antosianlar saklanýar. Miwelerinde 0,16% kumarinler, 16,88–22,58% eý maddalar, 3,44% flawonoidler, 6,2% antosianlar bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin şahajyklarynyň peti rewmatoid serişde hökmünde peýdalanylýar. Gabygynyň peti we jöwheri içgeçmede hem gan akmada gamaşdyryjy hökmünde haýyrlanylýar. Daragtyň ýapraklarynyň jöwheri aşgazan-ıçege ulgamynyň kesellerinde, dalak sökelliklerinde we rewmatizmde pugtalandyryjy, gany togtadyjy, sedatiw, der we peşew

çykaryjy serişde hökmünde ulanylýar. Gülleriniň jöwheri aşgazan we peşew haltasynyň kesellerinde haýyrlanylýar. Şiresi agyz boşlugyndaky başlary bejermekde neplenýär.

Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda, gyrymsynyň gabygy we kökleri aşgazan-ıçege kesellerinde peýdalanylýar. Ýapraklary – rewmatizmde; täze ösümliğin şiresi – başly stomatitlerde ulanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümliğin ýapraklarynyň we gülleriniň ýokary diuretik netijelligi ýüze çykaryldy.

Gökje şahajyklary we gül toplumlary boýag senagatynda ulanylýar. Gönleri açyk gülgün, yünleri çal, yaşyl, sary, goňur, syýa reňklere boýamakda peýdalanylýar.

Bezeg, bal we nektar beriji, boýag, eýleýji hem topragy berkidiji ösümlik.

### **Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Daragtyň 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp owradylan baldaklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 10–15 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti bedeniň agyryly ýerlerine çalmaly.

Ýylgynyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 30 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3 wagtyňa 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, birsalym goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 ýola nahardan ön 2 nahar çemçeden (30 ml) kabul etmeli.

## **TEGELEK ÝAPRAKLY DEREGÜL**

**Андрaхна круглолистная  
Andrachne rotundifolia**

**Häsiýeti.** Dagetek derman ösümliği. Täsin ösümliğin Türkmenistanda 3 görnüşi duşýar.

Tegelek ýaprakly deregül – seudekler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 20–40 sm ýetýän ýarymgyrymsyja wekili. Ösümliğin topakda agaçlaşan porrugy ýerleşýär, olar köpsanly ýaý şekilli, gür ýaprakly baldakly, esaslary kähalatda agaçlaşýar, yöne, köplenç, ýaşylygyna galýar. Ýaprakýanjagazlary ýumurtga şekilli ýa-da togalak, gyalary deň bolmadyk dişlije. Sapajyklary gysga, uzynlygy 1–3 mm. Ýapraklary togalak, togalak-elliptik we ters ýumurtga

şekilli, uzynlygy we ini 2,5–12,0 mm, togalak, seýrek pahna görnüşli ýa-da esasynda бүкүlen we tegelenen, seýrek – ýitileşen ýa-da depesi kesilen ýaly gysgalan.

Gülleri (1) 2–3-den ýapragyň goltugynda ýerleşýär. Atalyk gülleri (tyçinkaly) gysga, uzynlygy 0,3–2,5 mm, sapak şekilli gül sapaklyja. Olaryň okara ýaprajyklarynyň uzynlygy 1,50–1,75 mm, ini 1,0–1,25 mm, perdeli, gülyaprak şekilli, süýri, kütäk, goňrumtyl-ýaşylymtyl, ýaýbaň ak perdeler bilen jäheklenen. Gül ýapraklary süýri-pahna görnüşli, kütäk, okara ýaprajyklardan 1/3 esse gysga. Mäzjagazlarynyň diski çuň iki bölünen, inçe kepjeli. Enelik gülleri (pestik) gül sapaklyja, uzynlygy 1,5–5,0 mm (miwede 8–10 mm). Olaryň okaraýaprajyklary togalak-pişme kysmy, ýaşyl, inçe perdeler bilen jäheklenen. Gül ýapraklary has kiçi, mäzjagazly diskiň kepjesi kütäk, gysga. Miweleri süýndürilen şar şekilli, gabarasy 2,5 mm. Tohumy ýaýbaň üç gyraňly, uzynlygy 1,5–2,0 mm, ini 1,0–1,75 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Ösümlik ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol, köplenç, daşlaşan we çagylyly eňňitlerde, mele toprakly çägeleşen reňkli jynslaryň çykyan ýerlerinde, käte haşal ösüp boýalmany halaýar. Ösümlik aprel–awgustda gülleýär we miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Deregül diýarymyzda Uly we Kiçi Balkanda: Garburunda, Nazarekeremde, Daşlyderede, Garja jülgesinde, Baleýşemde, Çalsuwda, Şorjada, Toraňnylyda; Kürendagda: Däneatada, Temenderede, Torgaýda, Margyza, Oboýda, Jelilede, Duzlyçaýda, Bkyda, Isgenderde, Gamyşlyda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Ýuwangalada, Magtymguluda, Sumbar derýasynyň jülgesinde, Parhaýda, Hojagalada, Çakangalada; Merkezi Köpetdagda: Sülüklide, Germapda, Arçabilde, Giňdiwarda, Bekrewede, Gökderede, Duşakerekdagda, Wanowskide, Gurtlusuwda, Babazawda, Dagysda, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskiýde, Guruhowdanda; Bathyza: Gyzgädikde, Nowruzabatda, Akarçeşmede, Serhetabatda; Köýtendagda: Köýtendagderýa, Bulakdere, Öküzbulak, Garaňç, Leýlimekan jülgelerinde; Hazarýaka çölünde: Garbogazköldä, Döldülatada, Daşratatgalada, Türkmenbaşyda, Akjaguýmada; Köpetdagetäk medeni oturymynda: Serdarda, Köşide, Aşgabatda; Amyderýa medeni oturymynda: Kelifde, Burgunçyda, Pulyzyndanda duşýar.

**Tebigy gory.** Tegelek ýaprakly deregül ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ösýän ýerlerinde bol duşýar, gürluklary emele getirýär. Her ýylda 30 tonnadan gowrak çig maly ýygnamaga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin ýapragy we şiresi dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümliğin gülleýän döwründe (aprel–may) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly we taýýarlamaly. Ýaprakdan taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyz haltalara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Çig malyň saklanyş möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Tegelek ýaprakly deregülün himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin düzümine alkaloidler, nemler we süýt şiresi girýär.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin ýapragyndan taýýarlanylýan peti we jöwheri sowuklama, deri, ýürek-damar kesellerinde, sedatiw we iç sürüji serişde hökmünde; süýt şiresi – aşgazan-içege keselleriniň ulgamynda, içgadamada; daşky sökellikler bolan – demrewde, gijilewükde, gabarçakda peýdalanylýar.

Ösümliğin süýt şiresi Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda halk lukmançylygynda reumatizmde, zäherli mör-möjekler çakanda, ýaralary bitirmekde we siňňili aýyrmakda ulanylýar.

Bezeg ösümlük.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) guradylan ýapragynyň üstüne 2 bulgur (400 ml) gaýnag suw guýmaly, içi syrçaly gapda pes ýanyan otda 5–10 minut gaýnatmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek bulguryň 1/4-ni (50 ml) içmeli.

Deregülün 2 çay çemçe (10 g) guragylp owradylan ýapragyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, bir sagat goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapar 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin süýt şiresini günde 3 wagtyna nahardan ön 1 çay çemçeden (5 ml) haýyrlanmaly. Her gün 2 ýola (irden we agşam) deriniň zeperlenen ýerine çalmaly.



# ULY AMMI

Амми большая

Амми majus



**Häsiýeti.** Ekip ýetişdirilýän derman ösümlik. Uly amminiň watany – Müsür, Nil derýasynyň aşaky akymlary hasaplanýar. Dünýäde ösümligiň 10, Türkmenistanda 1 görnüşi duşýar.

Uly ammi – saýawanlylar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 30–140 sm ýetýän, ok köki agaçlaşan we göni baldakly, ortasyndan şahalanýan, birýyllyk ýa-da ikiýyllyk otjumak wekili. Ösümligiň ýapraklary ikileýin-üçleýin üç bölünen, ülsü (uzynlygy 5–9 sm) sudury üçburçly.

Gül toplumu – çylşyrymly saýawan (ini 5–8 sm), 20–60-şöhleli, saýawanjygy 30–35-güllüje. Saýawanjyklarynyň şöhleleri güllýän wagtynda ýaýbaň, miwesinde bilelikde gysylan. Ýapraýyklarynyň gyny per şekilli bölünen, gynjagazlary – abat, çiteneň görnüşli, köp sanly. Gülleri iki jynsly, ak reňkli (iýunda açylýar). Miwesi – ýaýbaň ýumurtga şekilli, ýalaňaç, ýylmanak. Ösümligiň miwesi ajymtyk ýiti ysly.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Uly ammi gurakçylygya we sowuga durnukly. Şitilleri gögerip, üç aý geçensoň güllýär. Ol iýun–awgustda güllýär, awgust–sentýabrda miweleýär. Uly amminiň miweleriniň (tohumynyň) yzygidersiz ýagdaýda ýetişmegi, onuň häsiýetli aýratynlygydyr. Ilkinji merkezindäki, has uly saýawanlardakylary ýetişýär, ýagny has uly tohumlary berýär, iň soňundan bolsa, has ownuk saýawanlary, adatça, ýetişmedik tohumlary emele

getirýär. Ösümlik diňe tohumy arkaly köpeliýär, onuň gögerijiligi ýokary, ekmeklikden ön taýýarlyk talap etmeýär, monokarpik. 1000 tohumyň agramy – 0,5 gram.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Ahal we Lebap welaýatlarynda duşýar.

**Tebigy gory.** Uly ammi ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin ösümligiň gory ýeterlik. Ösümligi ekip ýetişdirmek ýola goýlan. Ol ýöriteleşdirilen hojalyklarda we melleklerde ekip ýetişdirilýär.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň dermanlyk maksatlary üçin oty we miwesi çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny ösümligiň güllýän döwründe (iýun–awgust), miwesini – bişýän wagtynda (awgust–sentýabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly we taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig mallary mata ýa-da kagyz haltalara gaplamaly, miwesini – kagyz gutularda saklamaly. Miwesi açymtyk-ötgür ysly. Çig mallary gury, garaňky, Gün şöhlesi göni düşmeýän ýerde goýmaly. Otunyň saklanyş möhleti – 1–2, tohumynyňky – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Uly amminiň düzümine uglewodlar oňa ýakyn birleşmeler: 0,86% manit girýär. Onuň kökünde poliasetilen birleşmeleri; kumarinler: marmezin, ksantotoksin, izopimpinellin, bergapten saklanýar. Ýerüsti böleginde – flavonoidler: izoramnetin, kwersetin, kwersetiniň mono- we diglikozidleri bar. Baldagynda – kumarinler: marmezin, ksantotoksin, izopimpinellin, bergapten; flavonoidler: 3-glyukozid we 3-rutinozid izoramnetina (narsissin) saklanýar. Ýapragynda – umbelliferon, marmazin, ksantotoksin, izopimpinellin, bergapten, izoimperatorin kumarinler bar. Gültoplumynda – kumarinler: marmezin, ksantotoksin, izopimpinellin, bergapten, izoimperatorin, imperatorin saklanýar. Güllerinde – flavonoidler: izoramnetin, mono- we kwersetiniň diglikozidleri, kempferolyň glikozidleri bar. Miwelerinde – 0,08% efir ýagy (onuň düzüminde (±)-piperiton, identifikirlenmedik sikl spirt); kumarinler: bergapten, ksantotoksin, marmezinin, imperatorin, marmezin, izoimperatorin, izopimpinellin, ammirin, amminol, alloimperatorin, digidrooselon, umbelliprenin; flavonoidler: izokwersetin, 7-O-glyukozid kempferol, 7-O-glyukozid kwersetin (kwersimeritrin); 8,9–19,4% ýag (onuň düzüminde: miristelen, 4% palmittin, 1% sterin, 57,8% petrozelin, 28,2% olein, 7,6% linol, linolen turşusy); fosfolipidler: fosfatidilserin, lesitin saklanýar.

221

## Peýdalanylyşy. Ylmy lukmançylygykda ösümlikdäki

furakumarinleriň jemleriniň täsiri esasynda çişleriň garşysyna işjeňligi, şeýle-de kapillýarlary berkidiji, birnäçe sedatiw, öt we peşew çykaryjy, ýatgyny we içegäni tonizirleýji alamatlary ýüze çykarylýdy.

Ösümlikden taýýarlanylýan galen görnüşleri böwrekleri gyjyndyrýar. Uly amminiň galen derman serişdeleri bilen bejermek işleri Çehiýanyň dermatowenerologik klinkasynda synag edildi. Onuň tohumyndan şerbet görnüşinde spirtli ekstrakt taýýarlap, ony emulsiýa bilen garyp, daşky serişde hökmünde witoligoly (pis) näsaglary bejermek üçin peýdalanyldy. Bejerginiň netijeleri kanagatlanarly ykrar edildi. Daşky peýdalanylanda gaýrüzülmä ýüze çykmany. 1960-njy ýylda ylmy-barlag inistitutlarynda (DÖBI) ammifurin alyndy.

«Ammifurin» derman serişdesi üçin, ösümliğin miwesi çesme bolup hyzmat edýär, garyndynyň düzüminde üç furakumarinler – bergapten, izopimpinellin we ksantotoksin bar. Ony witoligoda (pis, leýkodermiýa) deriniň melanin pigmentini dikeltmek üçin, ultramelewşe şöhesiniň dozalary bilen bilelikde näsaglary bejermekde, psoriazda, neýrodermitde, gyzyl ýasy demrewde, kelläniň höwürtgeli we total ýylçyr bolmasynda peýdalanylýar. Ekstrakty meteorizmi bejermekde gipotenziv we antirewmatiki serişde hökmünde ulanylýar. Ol gerdejik we 50 ml flakonlarda 0,35%-li görnüşinde goýberilýär.

Psoriazly näsaglarda ammifuriniň täsirinde gijilewükli agyry aýrylýar, yzygiderlikde deridäki örgünler azalýar we infiltrasiýanyň derejesi peselýär. Witoligoly näsaglarda fotohimiýa usuly bilen bejergi geçirilende pigmentleriň toplanmasy ýüze çykýar, ak menekler ýitip gidýär. Ammifurin bilen bejergi geçirilýän döwründe günden gorayän äýnekleri dakynmak maslahat berilýär. Kähalatlarda ammifurin kabul edileninde ýürekbulanma, kellagyry, başaýlanma, ýüregiň çalt urmasy ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar, derman serişdesiniň kabul etmekligi bes edilende bu alamatlar aýrylýar.

Ammifurini deriniň inçekesinde, gipertoniki kesellerde, tireotoksikozda, ganyň, bagryň, böwregiň, ýürek-damar, merkezi nerw ulgamynyň sökelliklerinde, süýjükeselde, howply däl we howply çişlerde, hamylalykda, şeýle-de laktasiýa döwründe peýdalanmaklyk gadagan edilýär. Peýdalanmaklygyň ön ýanynda hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Uly ammi Türkmenistanyň dermanlyk serişdeleriniň döwlet reyestriniň sanawyndaky ösümlikleriň hataryna girýär.

Bezeg, bal beriji ösümlik.

## Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Her gün 3 gezek 1–2 gerdejikden içmeli, şol bir wagtda zeperlenen ýerleriňi 0,3%-li ergin bilen çalmaly we soňra ultramelewşe şöhelelerini kabul etmeli. Gerdejikleri nahardan soň içmeli we aşgazyň gyjynyjylygyndan dynmak üçin süýt kabul etmeli. Bejeriş terapiýasy 3–5 kursdan durýar (hersine 21–28 bejergi), bejerginiň umumy dowamlylygy bir ýyla çenli. Gerdejikleri şöhle kabul etmekligiň 2 sagat önünden içmeli, çalgy işlerini ondan bir sagat ön geçirmeli. Ilkinji şöhle kabul etmekligi 1 minut dowam etmeli, soňra seans her gezekde 1 minut uzaltmaly, aňryçägi 12 minuta çenli bolmaly. Ultramelewşe şöhesiniň çesmesiniň aralygy 100 sm. Bejergi kursunda hökmany 100 gezek çalgy, şunuň ýaly seansda şöhle we degişlilikde gerdejik kabul etmeli.

## UZYN MÖJEGAÝAK

Зюзник высокий

*Lycopus exaltatus*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliği. Uzyn möjegaýak –

dodakgüllüler maşgalasynyň möjegaýaklar urugynyň boýy 30–120 sm ýetýän köpýylyk otjumak wekili. Ösümliğin baldagy ýönekeý ýa-da birneme şahalanan, gysga tüýlçe. Ýapraklarynyň iki tarapy hem tüýlçe, süýrümlik ýa-da ýumurtga görnüşli-süýrümlik, uý çowla çenli, per şekilli bölünen ýa-da tas per şekilli bölünen, uý çowly ýa-da uý çowly ülüşli, gysgajyk sapaklyja. Aşaky ýapraklary käte dişlije, ülüşli, ýokarky ýapraklarynyň ülüşleri elmydama abat. Gülüňajagalary cyzykly-uý çowly.

Gülleri ownuk. Okarajygy tikeneklije üçburçly-biz şekilli dişlije, tas trubkasyna barabar. Gültäji görnetin okarajygyndan uly, ak ýa-da siren reňkli. Aşaky dodagy üç, tas birmeňeş kepjeli. Ortaky kepjesi ýarymaý



gyrmyzy menekli, beýlekileri ýaýbaň. Tyçinklary syýa reňkli tozanjykly. Gozajyklary ownuk, tüýlüje, arkasynda mäjzagazlar ýerleşýär.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Uzyn möjegaýak ölkämizde deňiz derejesinden 800–1600 metr belentlikde bitýär. Ol jülgelerde, derýajyklaryň kenarynda, çygly hem kölegeli ýerlerde, suwarymly melleklerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýun–awgustda gülläýär hem miweleşýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta–Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Magtymguluda, Sumbarda duşýar.

**Tebigy gory.** Uzyn möjegaýak ýurdumyzdaky seýrek ot–çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ujypsyzja. Ekip ýetşdirmek maslahat berilýär. Ol Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty we ýapraklary dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary ösümlik gülläýän döwründe (iýun–iýul) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury hem garaňky ýerde saklamaly. Otunyň we ýapraklarynyň saklanyş möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Möjegaýagyň ýerüsti böleginde efir ýagy, 0,03% fitol diterpenoidler, 1,19% ursul turşuly triterpenoidler, 0,05% steroidler, kardenolidler, saponinler, alkaloidler, 8% eý maddalary, apigenin, lýuteolin flavonoidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliğin peti we jöwheri reumatizmde, ýürek sökelliklerinde, öýken inçekesinde, sedatiw we ýumşadyjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Ýapragyndan taýýarlanylýan jöwheri ysytmada, bazed kesellerinde, metrorragiýada, diareýada, ganly içgeçmede ulanylýar. Şeýle-de ony infisirlenen ýaralarda gaýtadan işlemekde (buguna tutmak) haýyrlanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda ösümliğin oty hem ýapraklary (Magtymguly etrabynyň daglyk obalarynda) ýürek-damar ulgamynyň kesellerinde, hususan-da ateriosklerozda, gipertoniki sökelliklerde, koronar ýetmezçiliklerinde ulanylýar.

Ylmy lukmançylygynda ýerüsti böleginiň efir ekstraktynyň gemostatiki täsiri, antibakterial we antifungal işjeňligi ýüze çykarylady.

Ösümliğin oty gomeopatiýada bazed keselinde ýüregiň işjeňligini sazlamakda peýdalanylýar.

Bezeg, bal beriji, ot-iymlik, boýag we eýleýji ösümlik.

### Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:

Ösümliğin 1 çay çemçe (5 g) owradylan otuny 1/2 bulgur (100 ml) gyzgyn suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 7–8 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1/4 bulgurdan (50 ml) nahardan ön içmeli.

Möjegaýagyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 5–10 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Häzir bolan peti 1/2 bulgurdan (100 ml) gün içinde 3 sapa nahardan ön kabul etmeli. Şeýle-de buga tutmak görnüşinde haýyrlanylýar.

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa demlemeli, 2 sagat goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3–4 ýola 1/3 bulgurdan (65 ml) içmeli.

## ÜLEN GÖRNÜŞLI ÝERSAKGYÇ Хондрилла ситниковидная Chondrilla juncea



**Häsiýeti.** Dag derman ösümliği. Owadanja otjumagyň Türkmenistanda 4 görnüşü duş gelyär.

Ülen görnüşli ýersakgyç – çylşyrymlygüllüler maşgalasynyň ýersakgyçlar urugynyň boýy 50–100 sm ýetýän köpýyllyk otjumak wekili. Özüniň ähli böleklerinde, adatdan daşary üýtgän, esasyndan şahalanan, ýalaňaç ýa-da inçe kerep kysmy tüýlüje. Baldagy göni, aşaky bölegi gaty çitenekli. Kökýanynyň ýapraklarynyň rozetkasy ýonguç şekilli, gülläýänçä saklanýar; baldaklarynyňky – sapaksyz,

çyzyklydan ýumurtga şekillä çenli görnüşde, gyralary abat ýa-da dişlije, käte gyralary çiteneكليje, hemmesi ýasy.

Gül sebetjikleri sapaksyz, ýekeleşin ýa-da 2–3-den bilelikde, salkym ýa-da gysylan sübsejik gül toplumyny emele getirýär. Sebetjige ýygnan güljagazlaryň sany – 11 (8–12). Çigitjagazlarynyň burunjygyny hasaba almasaň, uzynlygy 2,5–5,5 mm, ini köplenç 3,5 mm, dügürlü-yrçaly, ýokarsynyň köp bölegi ýa-da diňe yokarky bölegi arkasy ырçyldap duran teňňejikler bilen örtülen. Adatça, birneme daş tarapyna egrelen, ýokarsynda elmydama oňat ösen täçli, köp bölegi 5–3 dişlije, seýrek abat teňňejikli. Burunjygynyň uzynlygy 2–6 mm we köp, tohumjagaza deň ýa-da 1,5 esse kiçi.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Ülen görnüşli ýersakgýç ölkämizde deňiz derejesinden 400–1200 metr belentlikde bitýär. Ol daşly we ownuk topurly-çagyly eňňitlerde, jülgedir derelerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik iýul–oktyabrda gülleýär hem miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Tutly jülgesinde, Magtymguluda, Yokarky Sumbarda, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Garaýalçyda, Arwazda, Sülüklide, Gylgylawda, Arçabilde, Uly Garaňkyda, Duşakerekdagda, Markawda, Wanowskide, Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Dagysda, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide, Guruhowdanda, Çyrlakda, Tekeçengesinde; Köýtendagda: Hojapilatada duşýar.

**Tebigy gory.** Ülen görnüşli ýersakgýç ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Her ýylda, takmynan, 5–8 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin kökleri we ýapraklary çig mal bolup hyzmat edýär. Kökleri ir baharda (mart)

ýa-da güýzde (sentýabr), ýapraklary – ösümlik gülleýän döwründe (iýul–awgust) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da galyň matanyň üstünde oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig mallary mata haltalara gaplamaly. Olary gury hem salkyn ýerde saklamaly. Kökleriň saklanyş möhleti – 3 ýyla çenli, ýapraklaryňky – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ýersakgýjyň köklerinde, baldagynda 0,870%, 0,263% degişlilikde kauçuk, süýt şiresi, 4,19–6,74% sakyz, hondistirin steroidler saklanylýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda ösümliğin köklerini we ýapraklarynyň peti diareýada, aşgazan-içege ýokançlarynda, zäherli ýylanlar çakanda peýdalanylýar. Şeýle-de cybanda ýapgy edilýär. Ýerasty böleginiň koagulirlenen süýt şiresini dişleri arassalamakda, ýerüsti bölegini – dismenoreýada neplenilýär.

Ýerli ilat ösümliğin täze ýapraklaryny işdäaçar hökmünde ulanylýar.

Bezeg, azyklyk we ot-iýmlik ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:**

Ösümliğin 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp owradylan köklerini we ýapraklaryny 1 litr gyzgyn suwa atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanýan otda 15 minut gaýnatmaly. 45 minutyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 gezek 1/3 bulgurdan (75 ml) içmeli.

Ýersakgýjyň 1 nahar çemçe (15 g) owradylan köklerini 2 bulgur (400 ml) gaýnag suwa atyp, bir sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 4 sapar nahardan ýarym sagat ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

Täze sykylan ýapraklaryny günün dowamynda 2 gezek nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.



# WAWILOWYŇ SOGANY

Лук Вавилова

*Allium vavilovii*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Hoşboý tagamly şypaly ösümligiň dünýäde, takmynan, 750, Türkmenistanda 68 görnüşi duş gelýär.

Wawilowynyň sogany – soganlar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 60–100 sm ýetýän köpylylyk otjumak wekili. Toprakdakysoganlygyri, ýumurtgaşekilli-togalak, galyňlygy 4–6 sm, posjumat-goňur ýa-da goňur reňkli gabyjak bilen örtülen. Köplenç soganlyklary 2–3-den toplanýar, gysga porrukly. Baldagy beýik, ýognas, içi boş, ortasynyň aşagy birden çişik, çişiniň ýokarsynda çybyk şekilli, esasy 4–5 ýalaňaç gynly, çalymtyl silindrik, ýokarlygyna birnäçe içi boş, ýognas, 3–10 mm-den 40 mm çenli galyňlykdaky ýapraklar ýerleşýär, baldaga garanynda, birnäçe gezek has gysga. Gaby, takmynan, saýawana deň.

Saýawany gür şar şekilli. Ýyldyz şekilli gülýanjagzalarynyň ýaprajyklary ýaşylymtyl-ak, ýaşyl damarly, tas deň, uzynlygy 4–5 mm, süýrümlik-ujy çowly, kütek ýa-da oýuk. Tyçinkalarynyň sapajygy gülýanynyň ýaprajyklarynda birneme ýa-da 1/4 uzynrak, özaralarynyň esaslary we gülýanjagazy bitişen, daşkylary cyzykly-biz kysmy, içkileri

ýumurtga şekilli, kütek, iki dişlije, olaryň esaslary cyzykly-biz şekilli. Gozajygy gabyjagy bilen bilelikde tas togalak, sähelçe oýulan, gabarasy, takmynan, 5 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Wawilowynyň sogany ülkämizde deňiz derejesinden 800–1600, seýrek – 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly-çagylyly, daşly-ownuk çagylyly, daşly we gaýaly çuň jülgerlerde, seýrek – daglaryň arasyndaky derelerde, bitýän ýerlerinde gür top-top bolup ösmäni halaýar. Yssa we gurakçylyga hem-de kesellere durnukly. Ösümlük maý–iýunda gülleýär, iýul–awgustda miweleýär. Ol tohumy (gögerijiligi 60%-den ýokary) we soganlygy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Baharly bilen Arwaz aralygyndan Howdana çenli ýerlerde, Sülükli, Gylgylawda (Laýarahdag), Germapda, Heýrabatda, Çäyekte, Ulydepede, Arçabilde, Neftanowskide, Gökderede, Duşakerekdagda, Damjada, Daştöýda, Howdanda (Mamudyn jülgesinde); Köýtendagda: Bulak obasynda duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Wawilowynyň sogany ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ösümlük Aşgabadynyň botanika bagynda ekilip ýetişdirilýär. Suw berlen ýagdaýynda tutuş ösüp kemala geliş sikli 2, dümede – 4–5 ýylyň dowamynda amala aşýar. Ösümlük Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň soganlygy we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Soganlygyny ir baharda (mart), tohumyny – bişen wagtyna (awgust) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Soganlykdan taýýar bolan çig maly mata ýa-da kagyzyň haltalara, tohumyňkyny – kagyzy gutujyklara ýa-da agzy ykjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Çig mallaryň ýaramlyk möhleti – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Wawilowynyň soganynyň soganlygynda şeker: monosaharidler (fruktoza we sahara), inulin polisaharidi, askorbin turşusy, karotin, B, E, PP witaminler topary, kwersetin flavonoidi, fermentler, saponinler, fitonsidler, kletçatka, beloklar, kül, mineral maddalar: kalsiý, magniý, demir, fosfor we beýlekiler saklanýar. Soganlygynda we ýapraklarynda efir ýagy, kükürt saklaýan birleşmeler, ýod, alma we limon organiki turşular bar.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyrlarda Gündogaryň meşhur alymy-tebigaty synag edijisi Abu Reýhan Biruny özüniň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly nusgawy işinde soganyň melhemlik häsiýetleri barasynda söz açýar.

Ezber alym-lukman Seyit Ysmaýyl Gürgenli (Jürjany) «Horezm şanyň genji-hazynasy» atly diwanynda soganyň petiniň sowuklama kesellerinde, sowuklama ahwallarynda, üsgülewükde, plewritde, pnemoniýada, bronh demgysmasynda, gripde, letargik ukuda, komatoz ýagdaýda, derletmekde, süýt çykarmakda peýdaly häsiýetlerini ýazýar. Taze sykylp alnan şiresi iç sürüji, deriniň günden ýanan ýerleriniň zeperlenmegine, derini arassalamakda we reňkini durlamakda (süýt bilen içilende), ary baly bilen deň gatnaşykda peýdalanylýanda garaguş keseline nepli.

Orta asyrlaryň ajaýyp alym-tebibi Muhammet Gaýmaz Türkmen özüniň «Pygamber tebiçiligi» atly nusgawy eserinde sogany işdäň kesilende, tultuklykda we jynsy gowşaklykda ulanmagy maslahat berýär.

Gündogaryň ezber, miras galan alym-tebibi Muhammet Huseýn özüniň «Melhemler hazynasy» atly nusgawy işinde şeýle ýazýar «...sogan dykyn almalary açýar, işdäni artdyrýar, bedeni ýumşadýar, kükregi we öýkeni oňat arassalaýar, sarygetirmede, dalagyň kesellerinde, işdäni açmakda we iýmiti siňdirmekde, beýniniň dykyn alan ýerlerini açmakda we buglary dargatmakda haýyryly».

Halk lukmançylygynda ösümlik içegeleriň atoniýasynda, kolitlerde, bakterial ganly içgeçmede, gipertoniýada, ateroskleroza, işdäň kesilende, garamükrüde, angina, bronhitde, aşgazan-ichege we soguljan kesellerinde peýdalanylýar. Ary baly garylan garnuwyny ýa-da süýtde taýýarlanylýan peti üsgülewükde, dümewde, sowuklamada, öt çykaryjy ýollarynyň diskineziýasynda, gaýtalanyp durýan bogun agryda, bedeniň garramagynda, soňkusyny çybanlarda we çykuwlarda onuň buguna tutmak we ýapgy etmek arkaly ulanylýar. Soganlygynyň peti ýokarky dem alyş ýollarynyň kesellerinde; jöwheri – göz kesellerinde, dümewde; şerbeti – peşew-daş we ýürek-damar sökelliklerinde haýyrlanylýar. Ýapgy we sürtemek usuly bilen sogan reumatizmde, gaýtalanyp durýan bogun agryda, çybanda, açyk ýaralarda, piodermiýada we deriniň beýleki kesellerinde neplenilýär. Soganyň mäjumy düwürtikleri, ýanygy, sowuk almany we başlary dep edýär. Ony we şiresini saçyň ýuwlanda ýa-da oňa sürtülende saçyň köklerini berkidýär. Yöne, gereginden artyk ulanylmagy ýatkeşligiň peselmegine getirýär we kelläni agyrdýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Baharly, Gökdepe we Köýtendag etraplary) ösümliki içgatamada, böwrekdäki daşlarda, peşew we öt çykaryjy, garmükrüniň garşysyna,

soguljan çykaryjy, mädä şypaly, bakterisid, witaminli serişde hökmünde peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda fitonsidleriniň zäheriň garşysyna täsiri ýüze çykaryldy. Bulardan başga-da, ol witamin we peşew çykaryjy täsirli.

Özünde hoşboý tagamynyň bolanlygy sebäpli kulinariýada ulanylýar. Gündogar aşhanasynda etli naharlara we palawa hoşboý tagam bermeklikde haýyrlanylýar.

Bezeg, azyklyk, bal beriji we boýag ösümlik.

### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 owradylan soganlygyny, 3 nahar çemçe (45 g) ary balyny 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5 minut gaýnatmaly. 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 4 gezek 1 çay çemçeden (5 ml) içmeli.

Soganyň 500 gram owradylan soganlygyny, 50 gram ary balyny, 2 bulgur şekeri (400 g) 1 litr suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanyan otda 3 sagat gaýnatmaly. Taýýar bolan peti gün içinde 3 sapar 2 nahar çemçeden (30 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin 1 aralyk soganlygyny owradyp, 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 12 sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri 3–4 günün dowamynda 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli. Askarid we ostris gurçuklaryny çykarmak üçin ulanylýar. Şeýle-de soganlygy ajöze haýyrlanmaly.

Soganyň ownuk kesilen soganlygyny 1:4 gatnaşykda suwa atyp, agzy ýapyk gapda 1 gije-gündiz goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3 wagtyna 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli. Dowamlylygy – bir hepde.

Ösümliğin 1 nahar çemçe (15 g) mäjumlanan soganlygyny 1 bulgur (200 ml) gaýnaga atyp, 2 sagat goýmaly. Bir nahar çemçe (15 g) ary balyny goşmaly. Jöwheri günün içinde 5–6 ýola burun boşlugyny we bokurdagy ýuwmaly.

Soganyň 300 gram soganlygyny, ýowşanyň guradylyp owradylan ýapraklarynyň 2 nahar çemçesini (30 g), 100 gram ary balyny 3,5 bulgur (700 ml) çakya atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky we salkyn ýerde 20 gün goýmaly. Birsyhly çaykap durmaly. Hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan şerbeti her gün 3 gezek nahardan öň 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Ösümliğin 40 gram ownuk dogralan soganlygyny 0,5 litr araga atyp, agzy ykjam ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde bir hepde goýmaly. Yzygiderli çaykamaly.



Soňra hasadan geçirmeli. Häzir bolan şerbeti günde 1 çay çemçeden (5 ml), suw bilen kabul etmeli.

Soganyň 100 gram soganlygyny we şol mukdardaky ary balyňy 3,5 bulgur (700 ml) çakyra atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 2 hepde goýmaly. Birsyhly çaykap durmaly. Hasadan geçirmeli. Taýýar bolan şerbeti günde 3 nahar çemçeden (45 ml) içmeli.

Ösümligiň 2–3 sany maýdalanýan soganlygyny 0,5 litr medisina spirtiniň içine atyp, agzy mäkäm ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 7 gün goýmaly. Yzygiderli çaykap durmaly. Soňra süzmeli. Häzir bolan şerbetiň her gün 1 çay çemçesini (5 ml), 3 nahar çemçe (45 ml) suw bilen garyp, aýöze kabul etmeli.

Soganyň soganlygyny 1:1 gatnaşykda ary baly bilen garmaly. Taýýar bolan garyndyny günüň dowamynda 2 gezek (irden hem agşam) 1 nahar çemçeden (15 g) içmeli. Kelle beýnisiniň damarlarynyň sklerozynda haýyrlanmaly. Dowamlylygy – 2 aý.

Ösümligiň mäjumlanan soganlygyny 1:1 gatnaşykda ary baly bilen garmaly. Häzir bolan garyndyny her gün 3–4 sapar nahardan 15–20 minut öň 1 çay çemçeden (5 g) kabul etmeli.

Soganyň gabygy bilen mäjumyny we 1:20 gatnaşykda suwa atyp, içi syrçaly gapda ýerleşdirmeli, suw hammamynda 15 minut gaýnatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri kelläň derisine sürtmeli. Saçy berkitmek üçin ulanylýar, oňa ýylpyldy berýär.

## ЎАВАНЫ СҮЎТЛЕЊЊИЇ

Лактук дикий

*Lactuca serriola*



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Otjumagyň Türkmenistanda 9 görnüşü duş gelýär.

Ýabany süýtleňňiç – boýy 50–125 sm ýetýän çylşyrymgüllüler maşgalasynyň süýtleňňiçler urugynyň birýyllyk ýa-da ikiýyllyk otjumak wekili. Baldagy göni, çylgam-çylgam, sarymtyl (esasy käte sähelçe gyzlymtyl-syýa reňkli), ýalaňaç ýa-da aşagy seýrek gaty çitenekli, ýokarky bölegi şahalanýan. Ýapraklary çal, tas elmydama oýuk per şekilli dilinen, baldakdaky ýapraklary abat, sapaksyz, baldaga çolanýan, esasy peýkam şekilli, esasy damarynyň aşagy sarymtyl çitenekli, gyralary ownuk çitenekli dişlije. Baldagyňyň iň ýokarky ýapraklarynyň köp bölegi ujy çowly, gyralary abat.

Sebetjigi silindrik ýa-da süýrümlik, ortaça 12–25-güllüje, şahalanýan-sübsejik çylşyrymly gül toplumyny emele getirýär, sapaklyja. Aýajyklarynyň köp bölegi sebetjigidan uzynrak, adatça, bir–birnäçe, daşy köplenç ak keçe ýaly tüýlүje, örän ownuk teňňe şekilli ýaprajyklary bilen örtülen, käte bildirmän gynyň ýaprajyklaryna öwrülýär. Gynyň ýaprajyklary üç-dört hatarly, daşy has gürrü kerep kysmy ýüňjümeç tüýlүje, köp bölegi bir–birnäçe syýa reňkli menekli ýa-da sähelçe syýa reňkli, ýokarsy kütäk we käte içi görnüp duran tüýjagazlaryň çogdamyny emele

getirýär. Daşky ýaprajyklary ýumurtga şekilli ýa-da üçburçly, içkileriniňkiden birnäçe gezek kiçi – çyzykly ýa-da süýrümlik-ujy çowly, gýralary perdeli, birneme tolkunly, jähekli. Gültäji sary (guranda gögümtil reňkli). Çigitjigi çal ýa-da goňrumtyl reňkli, süýrümlik-elliptik ýa-da inçe ters ýumurtga şekilli, ýepbeşen, gýralary inçe gaýmaly, (5) 7–9 her tarapa çykyşyp duran kese gapyrgaly, ýokarky bölegi has uzyn, ýokarlygyna gönügen, ak tüylüje. Çigitjiginiň esasy gysylan. Üpüklije, örän inçe, ak, ýumşak, köplenç dişlije, tüýjagazlary aňsatlyk bilen gaçýar.

Ýaşayyş aýratylygy. Ýabany süýtlenňiç ölkämizde medeni oturymlarda, ekinçilikde, üzümçilikde, bakjalarda, seýilgählerde, ýaplarda, köne ekin meýdanlarynda, jüljelerde, daglaryň derelerinde we dageteklerinde, derýajyklaryň golaýynda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik (aprel) maý–oktyabrda gülleýär, iýun–oktyabrda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Yaýrawy.** Ösümlik ölkämiziň tas hemme ýerlerinde duşýar.

**Tebigy gory.** Ýabany süýtlenňiç ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetşdirmek maslahat berilýär. Haşal ösümliki hökmünde ýabany ýagdaýda duşýar. Her ýylda 10–15 tonnadan az bolmadyk çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümlikiň oty we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny ösümlik gülleýän döwründe (maý–awgust), tohumyny – bişen wagtynda (oktyabr) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlamaly. Otdan taýýar bolan çig maly mata haltalara, tohumyňkyny – kagyz gutujyklara ýa-da agzy berk ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Çig mallary gury, Gün söhlesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Otuň ýaramlylyk möhleti – 1–2, tohumyňky – 2–3 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ýabany süýtlenňiçiň düzümine kauçuk girýär. Onuň köklerinde seskwiterpenoidler: laktusin, ýakwinelin, laktukopikrin, 8-dezoksilaktusin saklanýar. Miwelerinde laktusin glýukozidi, 35% ýag bar. Tohumynda ýag saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Ösümlikiň dermanlyk häsiýetleri irki wagtlardan bäri belli bolupdyr. Ol barasynda ilkinji maglumatlar Kolumellanyň (b.e. I asyry) işlerinde duş gelýär.

Gadymy grekler süýtlenňiji azyk hökmünde ulanypdyrlar, onuň şypaly häsiýetlerini ýazypdyrlar. Gülleriniň dilinde süýtlenňiç sowuk ýürek diýmekligi aňladýar.

Orta asyrlarda Gündogaryň parlak ýyldyzlarynyň biri meşhur alym Abu Aly ibn Sina özüniň belli «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» nusgawy işinde babasyly, ýiti içege sanjylaryny bejermekde hem-de ýatga ýumşadyjy oňyn täsirli. Ýapraklary kükrek täze döremelerde, zäherli mör-möjekler çakanda, bagryň, dalagyň we öýkeniň dykyn almaryny açýar. Şiresi tonizirleýji häsiýete eýe diýip ýazýar.

Gündogaryň tebibî Muhammet Gaýmaz Türkmen özüniň «Pygamber tebibçiligi» atly düýpleýin işinde süýtlenňiji melhemlik häsiýetlerini beýan edýär. Ýabany süýtlenňiji aşgazan kesellerine, sanja, ganly içgeçmä, içegäniň ýellenmeginde melhemlik täsirleri barada tekrarlaýar. Ýöne ony yzygiderli iýip ýörmek kähalatda gözün ejizlemegine sebäp bolýar. Ösümlik zenanlaryň süýdünü köpeldýär, ukusynda samraýanlara haýyryly, ynsan tohumyny guradýar, jynsy höwesiňi köşeşdirýär.

Halk lukmançylygynda ösümliki göz kesellerinde, bronh demgysmasynda, üsgülewükde, stenokardiýada, asitde, metrorragiýada, damar çekmesiniň garşysyna, gipotenziv, diuretik, içsürüji, garagurt möyi çakanda detoksikasion serişde hökmünde ulanylýar. Tohumy ýiti respirator ýokançlarynda, ýokanç we öýken kesellerinde, zäherlenmede, süňkleriň döwürmeginde, gyzgyny peseldiji serişde hökmünde haýyrlanylýar. Otunyň peti bronhitde, gökbogmada, demikmede, gaýtalanyp durýan bogun agyryda, çişlerde, gyzgyny peseldiji, analgezirleýji, sedatiw serişde hökmünde neplenýär. Süýt şiresi diuretik täsire eýe.

Ösümlikiň otuny Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda halk lukmançylygynda aşgazan kesellerinde, myşsalarýň süýnmeginde (buguna tutmak), ýaralary bitirmekde (tozy), sowuklama ahwalynda (merhemi) ulanylýar. Miweleri gakylyk goparyjy serişde bolup hyzmat edýär.

Gomeopatiýada ösümlikiň täze süýt şiresi ýürek-damar kesellerinde peýdalanylýar.

Durmuşda ýaşajyk pudaklary we ýapraklary işdäaçarlary, otly çorbalary taýýarlamakda ulanylýar, şeýle-de tohumyndan ýag alynýar.

Bezeg, azyklyk, bal beriji we ot-ýmlik ösümlik.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümlikiň 2 nahar çemçe (30 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–10 minut gaýnatmaly. Ýarym sagadyň dowamynda sowadyp süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) içmeli.



Ýabany süýtlenijiň 1 çay çemçe (5 g) mäjumlanan tohumyny 1/2 bulgur (100 ml) gaýnag suwa atyp, 3 sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri 3–4 gezek nahardan ön 1 bulgurdan (15 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 4 nahar çemçe (60 g) guradylyp owardylan otuny 1 bulgur (200 ml) zeýtun ýa-da sary ýaga atyp, agzy ykjam ýapylyan aýna gapda, garaňky ýerde 14 gün goýmaly. Yzygiderli çaykap durmaly. Taýýar bolan merhemi süzüp, günüň dowamynda 2 ýola (irden hem agşam) bedeniň sowuklan ýerlerine çalmaly.

## ÝALAN MURT

Живучка хиоская

Ajuga chia



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Täsin otjumagyň Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Ýalan murt – dodakgüllüler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 10–30 sm-e ýetýän köpýlyk otjumak wekili. Baldagy esasyndan has şahalanan, iki tarapy hem gysylan tüýlşe we käte bogunlarda tüýjagazlar galýar. Ýapraklary selçeň, uzyn, gaty ýünjümek tüýlşe. Ýokarky ýapraklary baldakdakylary bilen tas bir uzynlykda, güllerden gysga. Baldakdaky ýapraklary, edil aşaklary ýaly, üç kepjeli, bölünen, uzynlygy 15–35 mm, kepjeli-çyzlykly.

Gülleri ýekelikde ýokarky ýapraklaryň goltugynda ýerleşýär, dykz baş görnüşli gül toplumyny emele getirýär. Okarajygy jaňjagaz şekilli, uzynlygy 4–5 mm, ýarysyna çenli dilnen, baş ýiti giň üçburçly dişlije, içi ýalaňaç, daşy, gyalary we ortaky dişjagazlary gaty we uzyn tüýlşe. Okarajygynyň trubkasy damarly. Gültäjiniň uzynlygy 16–20 mm, okarajykdan 4–5 esse uly, limon-sary reňkli, damarlarynyň uzaboýuna goýy gyrmyzy zolakly,

aşakysy giň ýürek şekilli we dodagy oýuk, daşy tüýlşe. Tyçinkalarynyň we sütünjiginiň sapajyklary sähelçe tüýjagazlar bilen örtülen. Hozjagazy бүкүк, ýokarlygyna giňän, süýrүmtik, uzynlygy 2,5–3,0 mm, ini, takmynan, 1 mm, goňur reňkli, ýalaňaç, kese kesimi oýuk-gasynly. Käte gülleri bir jynsly hem bolýar.

**Ýaşayş aýratynlygy.** Ýalan murt ölkämizde deňiz derejesinden 1200–1600 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly we daşlaşan eňitlerde, çemenzarlyklarda, gyrymsy agaçly gyýaklyklarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý–iýulda gülleýär, iýun–awgustda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik Kürendagda: Soňudagda; Günorta–Günbatar Köpetdagda: Çohagaçda, Magtymguluda, Bagan-dyrda, Hasardagda, Gudzundagda duşýar.

**Tebigy gory.** Ýalan murt ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Sünt-Hasardag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury, gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ýalan murtuň düzümine efir ýagy, iridoidler: garpagid, 8-O-asetilgarpagid; alkaloidler, C witamin, flawonoidler girýär. Onuň ýerüsti böleginde 0,01% efir ýagy, triterpenoidler: ursul turşusy; fitoekdizonlar: siasteron, ekdisteron; C witamin, 2,02% eý maddalar, eskuletin kumarinleri, flawonoidleri: apigenin, lüteolin, 7-O-lüteolin glükopiranozidini saklanýar. Ösümligiň güllerinde fitoekdizonlar: ekdisteron, turkesteron bar. Tohumynda 17,4% ýag, gidrolizat turşular: 4,6% palmitin, 1,6% stearin, 16,1% olein, 55,7% linol, 29,1% linolen saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň otunyň peti gemostatik we gyzzrymanyň garşysyna dermanlyk serişde hökmünde peýdalanylýar.

Bezeg, bal beriji we ot-iýmlik ösümlik.

**Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5 minut gaýnatmaly. Bir sagadyň dowamynda sowatmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön 1/3 bulgurdan (75 ml) içmeli.



Otjumagyň 1 nahar çemçe (15 g) gury otuny 1,5 bulgur (300 ml) gaýnag suwa atyp, syrçaly pitide haýal ýanyan alawda 5 minut gaýnatmaly. Bir sagadyň dowamynda sowatmaly. Yzysüre hasadan geçirmeli. Peti gün içinde 3 gezek nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

## ÝAÝRAŇ GERAN

Герань раскидистая

*Geranium divaricatum*



**Häsiýeti.** Haşal derman ösümligi. Ýaýraň geran – geranlar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 20–40 sm-e ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümligiň baldagy ýaýraň şahalanan. Ýapraklary dlan görnüşli bölünen, esasyna çenli diýen ýaly 5 pişme kysmy ülüşli, uly we kütelişen dilimlenen dişlije, sudury baş burçly. Okara ýaprajyklarynyň uzynlygy 4–6 mm, ýumurtga şekilli, gysga ýiti, arkasy we gyalary çitenekli. Gül ýapraklary symgylt-gülgün reňkli, uzynlygy 6–8 mm, ýokarlygyna güýçli egreden, ýürek şekilli, sapajyksyz. Miweleriniň gabsasynyň uzynlygy 3–4 mm, kese kesimi gasyňly, ownuk tolkunly. Tohumy ýylmanak.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Ýaýraň geran ölkämizde ýokarky dageteginde, deňiz derejesinden 800–1600 metr belentlikde bitýär. Ol azda-kände garaňky ýerlerde, jülgerlerde, demirgazyk eňňitlerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik aprel–maýda gülleýär, maý–iýunda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda: Saka çeşmesinde; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda, Süntde, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Nohurda, Garaýalçyda, Arwazda, Sülüklide, Mergenölende, Germapda, Sandykly jülgesinde, Arçabilde, Hanýaýlada, Giňdiwarda, Garaňkyda, Gökderede, Wanowskide,

Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Babazawda, Dagyşda, Daştoýda, Dogryderede, Birinjimaýda, Howdan – Asylmada; Gündogar Köpetdagda: Robergowskide, Guruhowdanda, Çyrlakda, Şamlyda duşýar.

**Tebigy gory.** Ýaýraň geran ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Haşal ösümligi hökmünde duş gelýär. Her ýylda 20–25 tonnadan gowrak çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwründe (aprel–maý) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury hem salkyn ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Geranyň köklerinde eý maddalar, flavonoidler saklanýar. Ösümligiň ýerüsti böleginde sahara, glýukoza, fruktoza, raffinoza uglewodlar, 13,06% eý maddalar, flavonoidler bar. Ýapraklarynda 9%-e çenli eý maddalar, kwersetin gidrolizat, kempferol flavonoidler saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Gündogaryň beýik alymy Abu Reyhan Birunyň «Lukmançylykda farmakognoziýa» atly diwanynda geranyň şypaly alamatlary barasynda maglumatlar berilýär.

Halk lukmançylygynda ösümligiň otunyň jöwheri ganly içgeçmede, dürli gelip çykyşly aşgazan-ichege kesellerinde, orhitde, ber-beri keselinde, deriniň inçekeseline peýdalanylýar. Ösümligiň şiresi ýaralary we çişleri ýuwmak üçin hyzmat edýär.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly, Gökdepe we Ruhabat etraplarynda) ösümlik dowamly zenan kesellerini bejermekde ulanylýar. Mundan başga-da onuň melhemlikleri antidiareý we gemostatik serişde hökmünde haýyrlanylýar.

Bezeg, bal beriji, ot-iymlik, boýag we eýleýji ösümlik.

### Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Geranyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owradylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gapda haýal ýanyan otda 20 minut gaýnatmaly. Yzysüre süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ýarym sagat ön 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp majumlanan otuny 2 bulgur (400 ml) sowuk suwa atyp, 8 sagat goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Jöwheri günün dowamynda her 2 sagatdan 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.



# ÝEMŞIJEK

Яруточка пронзеннолистная

*Microthlaspi perfoliatum*

**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Türkmenistanda 1 görnüşi duş gelýär.

Ýemşijek – atanakgüllüler maşgalasynyň ýemşijekler urugynyň boýy 5–25 sm-e ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik ýalaňaç, ýönekeý ýa-da gowşak şahalanan, seýrek ýaprakly. Kökýanyň ýapraklary ters ýumurtga şekilli, örän uzyn sapakly, baldakdakylary – ýumurtga şekilli-ujy çowly, sapaksyz, esasy ýürek şekilli, baldaga çolaşyp duran, kütäk gulajykly. Okara ýaprajyklary inçe süýrümlik, uzynlygy takmynan, 1,0–1,5 mm, gül ýapraklary ak reňkli, çyzykly-kepjeli, uzynlygy 2–3 mm. Kürejekleriniň uzynlygy (4) 5–6 mm we ini (3) 4–5 mm, inçe kese durýan sapaklyja, gysga süýrümlik, gapdalyndan gysylan, gyalary inçe ganatlyja, yokarsy ýaýbaň egrelen, soňunda ýürek şekilli görnüşe öwrülýär, örän gysga saýgarylmaýan sütünlije. Tohumy her höwürtgede 2–4-den ýerleşýär, gysga süýrümlik, ýylanak, sary reňkli, uzynlygy, takmynan, 1 mm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Ýemşijek ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly, çagyly we daşly eňňitlerde, deredir jülgelerde ösüp boý almany halaýar, köp ýerlerde bol ösýär. Ösümlik mart-ijunda gülleýär we miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda: Däneatada, Soňudagda, Bereketde; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Magtymguluda; Merkezi Köpetdagda: Müsünewde, Arçabilde, Uly Garaňkyda, Duşakerekdagda, Gurtlusuwda, Babazawda, Dagyşda, Daştoýda, Howdanda; Gündogar Köpetdagda: Guruhowdanda; Köpetdagetok medeni oturymynda: Serdarda, Aşgabadýň, Bagyryň golaýyndaky dageteklerinde duşýar.

**Tebigy gory.** Ýemşijek ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ol bitýän ýerlerinde bol duşup, gür otluklary emele getirýär. Her ýylda, takmynan, 20 tonnadan az bolmadyk çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülleýän döwri (mart-aprel) ýygnamaly we teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly mata haltalara gaplamaly. Olary gury,

gün şöhesi göni düşmeýän ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ýemşijegiň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümligiň tohumynda sarymsak ýagy saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň otundan taýýarlanylýan peti we jöwheri garnyň ýellenmesinde, işiasde, guragyryda ulanylýar.

Bezeg, iýmitlik we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp owardylan otuny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 5–7 minut gaýnatmaly. Sowadyp, süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Ýemşijegiň 2 nahar çemçe (30 g) gury otuny 0,5-litrlik termosda demlemeli, soňra birneme goýmaly. Hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3–4 ýola nahardan ön 1/2 bulgurdan (100 ml) kabul etmeli. Şeýle-de agyz boşlugyňy we bokurdagyňy çaykamaly.

## ÝEPBEŞİK DAŞKEKRE

Василек приплюснутый

*Centaurea depressa*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Ýepbeşik daşkekrek – çylşyrymgüllüler maşgalasynyň daşkekrekler urugynyň boýy 20–40 (50) sm-e ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik tutuş çal reňkli, gürräk gysylan kerepli ýa-da ak keçe ýaly tüýlülje. Baldagy ýekeleýin, dik, esasynda köp bölegi birneme yokary, käte ortasyndan şahalanan, yokarlygyna gysyk gönügen, ýönekeý ýa-da gowşak şahalanan, sebedine çenli has gür ýaprakly şahalanan. Yapraklary kökýanynda ýerleşýär we aşaky baldakdakylary gysgajyk sapajyga

çekilen, süyrümtik ýumurtga şekilli-kepjeli, köplenç, süyrümtik-kepjeli ýa-da süyrümtik, ýitiräk ýa-da ýiti, gyalary abat hem-de dişlije, seýregräk liroşekilli bölünen, 1–2 (3) jübüt gapdaly segmentli. Galanlary – sapaksyz, süyrümtik, uýy çowly-çyzykly, depesi gysga, ýiti, adatça, gyalary abat; ortakysy – uzynlygy 2,5–6,0 sm we ini 0,5–1,2 sm. Sebetjigi şahanyň depesinde ýekeleýin ýerleşýär, sübe ýa-da tas galkan şekilli gültoplumyny emele getirýär. Gyny ýumurtga şekilli, ýalaňaç, aralyk ululykda, uzynlygy 15–17 mm we ini 10–11 mm. Onuň ýaprajyklary derjimek, kütüräk, sarymytl reňkli, kese kesiminden gara çyzyk geçmeýär, gyalary has giň, perdeli, içi görnüp duran ýaly jäheklenen, daşy ýumurtga şekilli, içi uýy çowly, uzyn gaçmaýan ýaprajykly, inçe germewli, kekeç kysmy ýumşak kirpijekli, togalak üçburçly çykyntygyly, uzyn kirpiklije. Daşky we içki ýaprajyklarynyň çykyntylarynyň ortaky bölegi üçburçly gara ýa-da garamtyl-goňur menekli, gyalary ak reňkli, käte bir reňkli, ak. Içki ýaprajyklary has ownuk, goňrumtyl reňkli.

Gapdaldaky gülleri gök ýa-da gök-syýa reňkli, güýçli ulalan, çuň baş-sekiz bölünen, süyrümtik-ýumurtga kysmy ýa-da uýy çowly ülüşli, gysyk guýguç şekilli egreden; ortakysy – syýa reňkli. Tohumlary elliptik-ters ýumurtga şekilli, goňrumtyl-zeýtun reňkli, esasy symgylyt ýa-da sarymytl-zeýtun reňkli, ýylanak, sähelçe ýaýraň tüylüje, ak uzyn tüýjagazlary dessejikde ýerleşýär, ýalpyldawuk, uzynlygy 5,0–5,5 mm we ini 2,5–2,8 (3,0) mm. Üpüjrigi gaçmaýar, ikileýin; daşkysy – çyparrak, çigitjagazdan birneme uzynrak, uzynlygy 6–7 mm, köpsanly byçgyly-büdür-südür çiteneklerden ybarat; içkileri – agymtyl, üç esse gysga, 20–23 sany süyrümtik kepjelerden durýar, ýokarsy deň bolmadyk dişlije we 2 ülüşli perde bilen bölünen, depesi konus şekilli.

**Ýaşayşy aýratynlygy.** Ýepbeşik daşkekre ölkämizde deňiz derejesinden 800–1600 metr belentlikde bitýär. Ol düme ekinlerde, köne ekin meýdanlarynda, gury eňňitlerde, jülgelerde ösüp boý almany halaýar. Ösümlik (aprel) maý–iýunda gülleýär, iýun–iýulda miweleýär. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Kürendagda; Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Ýokarky Sumbarda, Tazetaplada, Hojagalada, Magtymguluda, Kesedagda, Hasardagda, Süntde, Çendirde; Merkezi Köpetdagda: Deştde, Saýwanda, Garawulda, Nohurda, Arwazda, Degirmenlide, Sülüklide, Hyrsderede, Mergenölende, Gylgylawda, Germapda, Heýrabatda, Stollowaýa dagynda, Arçabilde, UlyweKiçiGaraňkyda, Gökderede, Duşakerekdagda, Wanowskide, Ýablonowskide, Gurtlusuwda, Asylmada,

Howdanda; Bathyzda: Serhetabatda, Çilduhtarda; Hazaryaka çölünde: Gardaşlyda, Etrekde duşýar.

**Tebigy gory.** Ýepbeşik daşkekre ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Her ýylda, takmynan, 10 tonna çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin oty we gülleri dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary ösümlik güllän döwründe (maý–iýun) ýygnamaly. Olary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyyet boýunça guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz gutujyklara gaplamaly. Olary gury, gün şöhlesiniň göni düşmeýän ýerinde saklamaly. Otlarynyň we gülleriniň saklanýş möhleti 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Daşkekräniň düzümine kauçuk, alkaloidler, flavonoidler: skutellarin, skutellarein, apigenin, kwersetin, apigeniniň glýukozidi girýär. Onuň köklerinde fenolkarbon turşusy we onuň ugurdaşlary: 0,32% kofe, 0,21% hlorigen saklanýar. Ösümliğin ýerüsti böleginde seskwiterpenoidler, eý maddalary, 0,27% saponinler, 0,5% kumarinler, 0,27% flavonoidler: skutellarein, kwersetin, apigenin bar. Ýapraklarynda 0,27% flavonoidler saklanýar. Güllerinde C witamin, 0,5% kumarinler, 0,05–0,36% flavonoidler: izokwetsitrin, skutellarein, skutellarin, 5-β-D-skutellarein glýukuronid, 5- skutellarein glýukuronid, 7-β-D- skutellarein glýukuronid, 3,7- kwersetin diglýukozid, apigenin gidrolizat, антоцианы 4,8% antosianlar saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümliги sowuklama kesellerinde, konýunktiwde, blefaritde, ýara bitiriji, peşew, der we öt çykaryjy serişde hökmünde ulanylýar. Deri kesellerinde ösümliğin otuna suwa düşüliýär.

Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda, ösümliğin gülleri sarygetirmede öt çykaryjy serişde hökmünde, şeýle-de depressiýada, newrasteniýada we göz kesellerinde, demigmede, dürli ownuk örgünlerde peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümliğin antibakterial, anti-fungal we diuretik işjeňligi ýüze çykaryldy.

Ösümliğin gülleri – weterinariýada ulanylýar.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

**Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümliğin 1 çay çemçe (5 g) guradylan gül ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, agzyny gapak bilen ýapmaly, bir sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar



bolan jöwheri her gün 3 ýola nahardan 30 minut ön 1/2 bulgur (100 ml) içmeli.

Deň gatnaşykdaýy daşkekräniň we buýanyň köklerinden taýýarlanylýan 1 nahar çemçe (15 g) garyndyny, 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 20 minut goýmaly. Sowadyp süzmeli. Jöwheri gün içinde 3 gezek 1 nahar çemçeden (15 ml) kabul etmeli.

2 nahar çemçe (30 g) solmazakdan, dyrnaklyjadan we benewşeden, 3 nahar çemçe (45 g) sarygülden, 1 nahar çemçe (15 g) daşkekräniň güllerinden taýýarlanylýan 2 nahar çemçe garyndyny, bir litrlik termosda demlemeli, gijäniň dowamynda goýmaly. Taýýar bolan jöwher bilen her gün ýüzüni 3–4 sapa süpürmeli.

Daşkekräniň 1 nahar çemçe (15 g) guradylan güllerini 1/2 bulgur (100 ml) ösümlik ýagynyň içine atyp, goýmaly. Soňra hasadan geçirmeli. Taýýar bolan jöwher bilen pamyk tamponyny ölläp, ony 15–20 minut kirpiklerde goýmaly, soňra derini süpürmeli.

Ösümliğin 4 çay çemçe (20 g) gury gül ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) medisina spirtiniň içine atyp, agzy berk ýapylyan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün goýmaly. Yzygider çaykap durmaly. Taýýar bolan şerbedi her gün 3–4 gezek nahardan ön 20–30 damjadan 1 nahar çemçe (15 ml) ýyly suwa goşup içmeli.

## ÝUMŞAK ÝYLGYN Гребенщик рыхлый Tamarix laxa



**Häsiýeti.** Çöl-düzlük derman ösümliği. Ýumşak ýylgyn – ýylgynlar maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 2–3 metre ýetýän gyrymsy agaç wekili. Daragtyň sütünleriniň gabygy çal ýa-da gyzylymtyl ýa-da çypar-goňur reňkli. Ýapraklary ýumurtga şekilli-süýrüntik, uzynlygy 1–2 (4) mm we ini 0,5–1,5 mm, ýiti, gyalary inçe perdeli, esasy kil şekilli. Salkymy gapdallaýyn, seýrek, gysga, ýekeleşýin, uzynlygy 0,5–2,5 (5,0) sm we ini 0,4–0,5 sm ýa-da gysgalan, galkan şekilli, uzynlygy 0,5–1,2 sm we ini 0,4–0,9 sm, gysgajyk (uzynlygy 2,5–3,0 mm) gül saklaýjyly, seýrek, süýrüntik, goňur reňkli teňňejikler bilen örtülen. Gül sapajyklarynyň uzynlygy 1,8–2,0 (2,8) mm, okarajygyndan 2–3 esse uzyn. Güňanjagazlary ýumurtga şekilli uý çowly, uzynlygy 1,0–1,2 mm, süýrüntik, ýitiräk, ýokarsy kitirdewükleşen, köp bölegi içine egreden, gyalary perdeli, gülsapajygyndan 2–3 esse gysgarak.

Gülleri dört (seýrek – baş)agzaly. Okarajygy giň ters ýumurtga şekilli, ýitiräk, gyalary giň perdeli ülüşli. Gül ýapraklary ak ýa-da gülgün reňkli, süýrüntik, uzynlygy 1,5–2,0 mm we ini 0,7–1,0 mm, okarajygynda 2 esse uly,

kütek, gaçýan. Tyçinkalarynyň sany – 4 (käte 5–6). Diski dört (seýrek baş-alty) burçly, burçlary oýuk, okarajygyndan birneme uly. Tozanjyklarynyň köp bölegi gysga, uýy ýiti. Sütünjiginiň sany – 3 (4), düwünçeginden 3–4 esse gysga. Gozajygyňyň uzynlygy 5–7 mm we ini 1,5–2,0 mm, okarajygyndan 5–6 esse uzynrak.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Ýumşak ýylgyn ölkämizde şorluklarda, derýalaryň, köllerin kenaryndaky çägelikde, çägeli çöllerdeki takyrlarda ösüp boý almany halaýar. Daragt mart–aprelde gülleýär, aprel–maýda miweleýär. Ol wegetatiw ýoly bilen köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda: Baleýşemde; Kürendagda: Uzynsuwda; Bathyzda: Serhetabatda; Hazaryaka çölünde: Daşarwatgalada, Türkmenbaşyda, Balkanabatda; Merkezi Garagumda: Başkakda, Esendiňlide; Günorta-Gündogar Garagumda: Kelteşorda, Gumçal guýusynda, Kelif Uzboýynda; Sandykly çölünde; Köpetdagetok medeni oturymynda: Serdarda, Aşgabatda, Gäwersde; Amyderýa medeni oturymynda: Akýarda, Gyzylaýak çägeliginde, Farapda, Türkmenabatda duşýar.

**Tebigy gory.** Ýumşak ýylgyn ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümliğin gabygy, ýapraklary we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Gabygyny ir baharda (mart), ýapraklaryny we gülleri – ösümlik gülleýän döwründe (mart–aprel) ýygnamaly. Gabygyndan we ýapraklaryndan taýýar bolan çig mallary mata ýa-da kagyz haltalara, gülleriniňkini – kagyz gutujyklara ýa-da agzy mäkäm ýapylyan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, garaňky ýerde saklamaly. Çig malyň saklanyş möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ýumşak ýylgynyň himiki düzümi az öwrenilen. Ösümliğin ýerüsti böleginde tamariksin flavonoidleri saklanylýar. Sütüniniň gabygynda, ýaşyl şahajyklarynda we ýapraklarynda eý maddalary bar.

**Peýdalanylyşy.** Orta asyrlarda Gündogaryň beýik alymy Abu Reýhan Birunyň «Lukmançylykda

farmakognoziýa» atly ensiklopediýasynda ösümliğin dermanlyk häsiýetleri barasynda maglumatlar berilýär.

Halk lukmançylygynda ösümliğin şahajyklarynyň petini rewmatoid, gabygynyň petidir jöwherini – içgeçmede we gan gitmede gamaşdyryjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Daragtyň ýapraklarynyň jöwherini rewmatizmde, dalak we limfatik ulgamyň kesellerinde pugtalandyryjy, sedatiw, gany togtadyjy, der we peşew çykaryjy serişde hökmünde ulanylýar. Gülleriniň jöwheri öt çykarmakda nepli. Daragtyň şiresini agyz boşlugyndaky başlary bejermekde (çaýkamak arkaly) haýyrlanylýar.

Halk lukmançylygynda Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda ösümliğin gabygy dürli gan akmalaryny saklamak üçin gamaşdyryjy serişde bolup hyzmat edýär. Baldaklarynyň peti rewmatizmde, merezýelde, ýapraklarynyňkini – dalak keselinde, gülleriniňkini – sarygetirmede, gepatitde, miweleriniňkini – erkek we aýal önelgesizliginde ulanylýar.

Bezeg, bal we nektar beriji, eýleýji hem topragy berkidýän ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ýylgynyň 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp mäjumlanan gabygyny 0,5 litr gaýnaga atyp, içi syrçaly gapda pessaý otda 20 minut gaýnatmaly. Sowadyp süzmeli. Taýýar bolan peti her gün 3 wagtyna 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Daragtyň 2 nahar çemçe (30 g) guradylyp owradylan gabygyny bir litrlik termosada demläp, bir sagat goýmaly. Yzsüre hasadan geçirmeli. Jöwheri ýapgy we çalgý etmeli.

Ýylgynyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp ýapraklaryny 1 bulgur (200 ml) gaýnaga atyp, 30 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri günde 3 sapa 1/4 bulgurdan (50 ml) içmeli.

Daragtyň 1 nahar çemçe (15 g) guradylyp gülleri 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, birsalym goýmaly. Hasadan geçirmeli. Häzir bolan jöwheri gün içinde 3 gezek nahardan ön 2 nahar çemçeden (30 ml) kabul etmeli.



# ÝYLANÇÖP

Воробейник лекарственный  
*Lithospermum officinale*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Türkmenistanda 2 görnüşü duş gelýär.

Ýylançöp – buraçnikler maşgalasynyň ýylançöpler urugynyň boýy 20–50 sm-e ýetýän köpýylyk otjumak wekili. Ösümlük bulam-bujar, gür bolmadyk, gysylan tüýlçe, esasyndan kütüleşen. Baldagy dik, gaty, adaty, depesi şahalanan. Ýapraklary sapakly, ýaybaň uýy çowly, ýitileşen, gýralary abat, gapdal damarlary görnegin bildirýär. Aşaky ýapraklary elliptik, adaty, güllýän wagtynda gurap gaçýarlar. Baldagyň ortaky we ýokarky ýapraklary uýy çowly ýa-da süýrümlik uýy çowly, uzynlygy 3–5 sm we ini 8–12 mm, aşagy çalymtyl reňkli.

Gül toplumu sübseli-salkym şekilli. Onuň aýry şahajyklary (çogdamlary) uzyn, ýaprakly. Okarajygynyň ülşi çyzykly, miwesinde birneme süýnen we giňelen. Gültäji ak-ýaşylymtyl ýa-da sarymtyl-ak reňkli, uzynlygy 5 mm, gysga trubkaly, agzy kiçi ýumşak çykyntyly. Hozjagazy ak reňkli, ýylmanak, has ýalpyldawuk, süýrümlik-ýumurtga şekilli, yokarsy birneme ýitileşen, boýy 3 mm.

**Ýaşaýyş aýratynlygy.** Ýylançöp ölkämizde deňiz derejesinden 400–1600 metr belentlikde bitýär. Ol jülgerlerde, derýajyklaryň kenarynda ösüp boý almany halaýar. Ösümlük aprel–maýda güllýär, maý–iýulda miwelenýär. Ol tohumy arkaly köpelenýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda Günorta-Günbatar Köpetdagda: Aýyderede, Könekesirde, Daýnasuwda, Süntde, Ýolderede; Merkezi Köpetdagda: Sülüklide, Arçabilde, Gökderede; Bathyzda; Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Ýylançöp ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip yetiştirmek maslahat berilýär. Ýylançöp Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet goraghanalarynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň oty we miweleri (hozjagazlary) dermanlyk çig maly bolup hyzmat edýär. Çig mallyk otuny ösümlük güllýän (aprel–maý) döwründe, miwelerini – bişýän wagtynda (maý–iýul) ýygnamaly we açyk howada galyp, matanyň ýa-da kagyzyň üstünde oňat ýel çekerli ýajda guratmaly hem taýýarlamaly. Otundan taýýar bolan çig maly mata haltalara, miwesiniňkini – kagyza haltalara we gutujyklara ýa-da agzy ykjam ýapylýan aýna gaplara gaplamaly. Olary gury, gün şöhleleriniň göni düşmeýän ýerlerinde saklamaly. Otunyň saklanýş möhleti – 1–2, miweleriniňkini – 3–4 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümligiň düzüminde mineral maddalar (50% çenli), kalsiý duzlary we kremniý turşusy agdyklyk edýär, litospermin reňkleýji maddalar, alantoin, alkaloidleriň yzlary, antigormonal maddalar girýär. Onuň kökünde uglewodlar, sianogen birleşmeler, fenol turşusy, naftohinonlar, gyzyl pigment saklanýar. Ösümligiň ýerüsti böleginde organiki we fenol turşular, flavonoidler, naftohinonlar, 20 m% C witamini, karotin bar. Miwelerinde ýag, tohumynda 20,76%-e çenli gurayýan ýaglar saklanýar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň oty, onuň oňat peşew we öt çykaryjy täsiri sebäpli, peşew ýollarynyň kesellerinde, şeýle-de iç sürüji hem agyryny köşgediriji serişde hökmünde peýdalanylýar. Ösümligiň jöwheri – bazed we peşewdaş kesellerinde ulanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharly, Gökdepe we Köýtendag etraplarynda) miwelerini-hozjagazlaryny böwrekdäki, peşew we öt haltasyndaky daşy aýyrmakda peýdalanylýarlar.

Ýapraklaryny çayyň ýerine ulanmak bolýar.

Bezeg, azyklyk we boýag ösümlük.

**Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) guradylan oty bilen tohumyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içinde atyp, 2 sagat goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3–4 gezek 2 nahar çemçeden (30 ml) içmeli.

Ýylançöpüň 1 nahar çemçe (15 g) gury miwelerini 0,5-litr termosda demlemeli, 30 minut goýmaly. Hasadan geçirmeli. Jöwheri gün içinde 3 sapar nahardan ön 1/4 bulgurdan (50 ml) kabul etmeli.

# ZAKASPIÝ SÜMMÜLI

Гиацинт закаспийский

*Hyacinthus transcaspica*



**Häsiýeti.** Dag derman ösümligi. Örän nepisje owadan ösümligiň dünýäde 4, Türkmenistanda 2 görnüşi duş gelýär.

Zakaspiý sümmüli – sowsanlar maşgalasynyň sümmüller urugynyň boýy 10–20 sm-e ýetýän köpylyk otjumak wekili. Ösümligiň toprakdaky soganlygy ýumurtga şekilli ýa-da koniki, galyňlygy 1–2 sm, gara-çal reňkli kagyz kysmy bardajyk bilen örtülen. Baldagy 1–(2) bir soganlykly, 1/2-ne çenlisi toprakda ýerleşýär. Ýapraklarynyň sany – 2–3, çyzykly, ini 2–10 mm, ýitiräk, esasynda sähelçe gysylan, ýerüsti bölegi baldak bilen gurşalan, gynylyja, köplenç, gül toplumyndan geçýär.

Gültoplumy salkym şekilli (1)–3–5–(10)-güllüje, ýumşak. Gülsapajyklarynyň köp bölegi gülýanyndan 2 esse gysga (1,5–3 esse), kütüleşen, ýokarlygyna gönügen, miwede aşaklygyna eglen. Gülýanjagazlary gül sapajygynyň esasynda jübüt, perdeli, reňkli, gülsapajygundan 2–3 esse gysga ýa-da tas oňa deň. Gülýany çaň şekillije, uzynlygy 10–15 mm, mawy reňkli, ýaprajyklary бүкүлен, trubka deň, üçburçly – uýy çowly, ýitiräk, nobatlaýyn has inçe we күтек. Tyçinkalary ýokarky 1/3 trubka berkleşen, tozanjagazlary süýrүmtik, 1/2 egremli. Gozajygynyň (örän ýaş) gabarasy takmynan, 0,5 sm.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Ösümlük ölkämizde deňiz derejesinden 1200–2800 metr belentlikde bitýär. Ol ownuk topurly we ownuk topurly-çagylyly demirgazyk eňňitlerde, jülgelerde, gaýalaryň jaýryklarynda, uly ýaşly agaçlaryň kölegesinde ýa-da garlygyň gyrasynda, şeýle-de ereýän garlyklarda ösüp boý almany halaýar. Ösümlük mart–iýunda güllýär hem miweleýär. Soganlykly polikarpik (ömründe

birnäçe gezek tohum berýär). Ol tohumy (gögerijiligi 70–80%), aňzakly gyşda – soganlygy arkaly köpeliýär. Ilkinji gülleriniň 5–6-ýaşly şitiller berýändigini belenildi.

**Ýaýrawy.** Zakaspiý sümmüli diýarymyzda Merkezi Köpetdagda: Arwazdan başlap tä Howdan we Asylma aralygynda, Çopandagda, Rizarşde, Ljüde; Gündogar Köpetdagda: Akgayada duşýar. Endemik.

**Tebigy gory.** Ösümlük ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ony ekip yetiştirmek ýola goýuldy. Aşgabadynyň botanika bagynda ekip yetiştirilýär. Ösümlük Köpetdag döwlet goraghanasynda goralýar. Zakaspiý sümmüli Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999, 2011) we TGHB-niň Gyzyl sanawyna (1998) girizildi.

**Dermanlyk çig maly.** Sümmüliň soganlygy we gülleri dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Soganlygyny ir baharda (mart), güllerini – ösümligiň gülleýän döwründe (mart–aprel) ýygnamaly we umumy kabul edilen usulyýyt boýunça teläriň aşagynda guratmaly hem taýýarlamaly. Soganlygyň taýýar çig malyňy mata haltalara, gülleriniňkini – kagyz halta ýa-da gutujyklara gaplamaly. Olary gury, salkyn ýerde saklamaly. Soganlygyň saklanyş möhleti – 2, gülleriniňkini – 1 ýyl.

**Himiki düzümi.** Ösümligiň himiki düzümi barasynda maglumat ýok.

**Peýdalanylyşy.** Sümmüliň dermanlyk häsiýetleri irki wagtlardan bäri mälum bolupdyr. Ol barasyndaky ilkinji maglumatlar Kolumellanyň (b.e. I asyry), Wergiliýanyň (b.e. öň 70–b.e. 19-njy ýyllary), Pliniý ulynyň (b.e. 23–79-njy ýyllary) işlerinde berilýär.

Gadymy Gresiýada ösümlige uly sarpa goýupdyrlar. Grek rowaýatlarynda ol gamgynlygyň we ölümiň alamaty hasaplanypdyr. Bu güljagaza Apollonyň gowy görýän yetginjegi bolan Giasintiň pajygaly ölümi barasyndaky hekaýat mysal bolup biler. Çünki ösümligiň özi gamgynlygyň harpyny aňlatmak bilen, agyryny çekmekligi aňladýar. Gülleriň dilinde sümmül gamgynlygy we hasraty aňladýar.

Gündogaryň parlak ýyldyzlarynyň birisi meşhur alym hem lukman Abu Aly ibn Sinanyň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly nusgawy eserinde ösümligiň melhemlik häsiýetleri açylyp görkezilýär. Ol ýürek ritmini we maddalaryň alyş-çalşyny kadalaşdyrýar, dykyn almalary açýar, çişleri sorýar, döş kapasany we öýkenleri arassalaýar, beýniniň, bagryň we aşgazanyny işjeňligini pugtalandyrýar, sarygaýnamany dep edýär, kirpikleriň ösmegine haýyrlý. Şeýle-de meşhur tebib ösümligiň güllerini dem alyş ýollarynyň katarynda, sarygetirmede, kynlyk bilen peşew



çykarylanda, menstrual sikl saklananda peýdalanyndyr. Çakyrdan taýýarlanylýan şerbedi dalak kesellerinde ulanylýar. Şeýle-de ýatgynyň dürli çişlerinde we gan akmada oňa suwa düşülýär.

Türkmen halk lukmançylygynda (Baharly we Gökdepe etraplary) ösümligiň şiresi bilen ýumurtgalaryň çişlerini bejerýärler, ol şeýle-de saçlaryň ösmegine we jynsy ýetişmegiňe ýardam berýär.

Bezeg, bal beriji we boýag ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 1 nahar çemçe (15 g) gury soganylygyny 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içine atyp, 15 minut goýmaly. Soňra süzmeli. Taýýar bolan jöwheri her gün 3 watgyna nahardan 30 minut öň 1 nahar çemçeden (15 ml) içmeli.

Sümmüliň 1 çay çemçe (5 g) gury gül ýapraklaryny 1/2 bulgur (100 ml) çakryň içine atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda, garaňky ýerde 6 hepde goýmaly. Yzygider çäýkap durmaly. Hasadan geçirmeli. Ulanmazdan öň 1:3 gatnaşykda suw garmaly. Şerbedi gün içinde 3 gezek 1 çay çemçeden (5 ml) kabul etmeli.

Ösümligiň täze şiresi deriniň sowuklamasynda we dokuzdonluda ýapgy edilýär.

## **ZYLÇALY TOWŞANDODAK Зайцегуб гипсовый Lagochilus gypsaceus**



**Häsiýeti.** Dagetek derman ösümligi. Zylçaly towşandodak – dodakgüllüler maşgalasynyň towşandodaklar urugynyň boýy 30–40 sm-e ýetýän gyrymsyja wekili. Baldagy bulam-bujar tüýlülje. Ýapraklary tüýlülje,

esasy pahna şekilli, gysga sapakly, giň ters ýumurtga şekilli-togalak, iri ujy kütek ýa-da ýitileşen kepjeli. Güľanyňnyň ýapraklary kiçelen, pahna kysmy ters ýumurtga şekilli, düşnüksiz üç kepjeli, güllerinden gysga.

Ýalan çogdamy köp sanly, tas ýakynlaşan, köp bölegi 6 gülli, käte ýekeleşýin. Ýaprakýanlary we güľanlary biz kysmy, tikenli, tüýlülje, göni, soňra gyşaryan, trubkadan tas iki esse gysga. Gülländen soňra okarajygynyň uzynlygy 12–15 mm, miweländen soňra 18–20 mm, gür tüýlülje, trubkaly-jaňjagaz şekilli, derjimek, tikenli, esasy ýumurtga şekilli-üçburçly dişlije, trubkajykdan üç esse gysga. Gültäjiniň uzynlygy, takmynan, 2,5 sm, ýumşak tolkunly. Gültäjiniň trubkasy okarajyga açylýar. Ýokarky dodagyň uzynlygy, takmynan, 10 mm, ini 5 mm, gysga ikä bölünen, giň oýukly, gyralary uzyn we gür tüýlülje. Aşaky dodagy ýokarkydan birnäçe esse uzyn. Tyçinkalary ýaý şekilli eglen, ýokarkysy has gysga, birneme içine öwrülen, aşaky tyçinkalary daşyna öwrülen, tüýlülje. Hozjagazlarynyň ýokarsy giň kese dilimlenen, gaty däl, üç gyraňly.

**Ýaşayyş aýratynlygy.** Zylçaly towşandodak ölkäimizde 400–800 metr belentlikde bitýär. Ol dürli reňkli toýunlaryň ýüz açylmalarynda ösüp boý almany halaýar. Ösümlük maý–awgustda gülleýär hem miweleşýär. Towşandodak ömrüniň üçünji–dördünji ýylynda gülläp başlaýar. Ol tohumy arkaly köpeliýär.

**Ýaýrawy.** Ösümlük diýarymyzda diňe Köýtendagda duşýar.

**Tebigy gory.** Zylçaly towşandodak ýurdumyzdaky seýrek ot-çöpleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabygorly. Ekip ýetşirmek maslahat berilýär. Ol Köýtendag döwlet goraghanasynda goralýar.

**Dermanlyk çig maly.** Ösümligiň baldagy, ýapraklary we gülleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Olary ösümlük gülleýän döwründe we ondan soň (maý–iýul) ýygnamaly. Çig mallary teläriň aşagynda açyk howada umumy kabul edilen usulyýet boýunça ýa-da oňat ýel çekerli jaýda guratmaly hem taýýarlama. Taýýar bolan çig mal gülleriň garyndysyndan ybarat bolup, onuň düzüminde birneme ownuk ýapraklar we ýaşyl ýa-da gara-goňrumtyl reňkli inçe baldaklar bolmaly. Olar hoşboý gowşak ysly, aýy tagamly. Taýýar bolan çig mallyk baldaklary we ýapraklary mata haltalara, gülleriňkini – kagyz haltalara ýa-da gutujyklara gaplamaly. Çig mallary gury, garaňky ýerde saklamaly. Möhleti – 1–2 ýyl.

**Himiki düzümi.** Towşandodagyň köklerinde eý maddalar saklanýar. Ösümligiň ýerüsti böleginde 0,082% efir ýagy, 1,976% lagohilin diterpenoidler, C, K<sup>1</sup> witaminler,

karotin, organiki turşular, eý maddalar, uglewodlar, az mukdarda kalsiý, mikroelementler bar. Ösümligiň baldagynda 0,09% lagohilin diterpenoidler, eý maddalar saklanýar. Ýapraklarynda 3,5% uglewodlar, organiki turşular: 5,78% limon, 1,75–1,94%, efir ýagy, eý maddalar, karotin, askorbin turşusy, kalsiý we magniý saklanýar. Ýapraklarynda we güllerinde 1,53% lagohilin diterpenoidler, 1,9% lagohtltn tetraasetat bar. Güllerinde we miwelerinde 1,95–2,11% lagohilin diterpenoidler saklanýar. Okarajyklarynda we gül ýapraklarynda degişlilikde 1,95%, 0,45% lagohilin diterpenoidler bar.

**Peýdalanylyşy.** Halk lukmançylygynda ösümligiň ýapraklarynyň peti we jöwheri çagalaryň gingiwitinde hem parodontozda peýdalanylýar.

Ylmy lukmançylykda ösümligiň jöwheriniň sedatiw, damarlary giňeldiji, gipotenziw, damar çekmäniň garşysyna we detoksikasiýa täsiri ýüze çykarylýdy. Şeýle-de towşandodak ganyň lagtalanmasyny çaltlandyrýar, plazmanyň geparina bolan tolerantlylygyny ýokarlandyrýar we rekalsifikasiýasynyň wagtyny gysgaldýar.

Ösümligiň derman serişdeleri gan akmasyny, esasan, içki, hususan-da, öýkendir aşgazan-ıcege, ýatgydyr babasyl, şikeslerdäkini we bogundakyny saklamakda ulanylýar. Şeýle-de hirirgiýa amalyýetlerinde gan akmasynyň önüni almakda peýdalanylýar. Şular ýaly maksatlar üçin gemofiliýada peýdalanylýar. Mundan başga-da towşandodagyň galan derman serişdeleri merkezi nerw ulgamynyň hyzmatlarynyň bozulmalary bilen baglanyşykly kesellerinde, gipertoniýada, babasylly

diatezde, glaukomada, aşgazanýň, on iki barmak içegäniň başly kesellerinde, arterial basyşyň ýokary bolanda we nerw gyjynyjylykda, deriniň allergiýa sökelliklerinde – ekzemada, neýrodermitde haýyrlanylýar.

Ösümligiň dermanlyk serişdelerini ulanmazdan ön hökman lukman bilen maslahatlaşmaly.

Bezeg we bal beriji ösümlik.

#### **Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:**

Ösümligiň 2 çay çemçe (10 g) gury ýapraklaryny we güllerini 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, içi syrçaly gaba ýerleşdirip, gapagyny ýapmaly, gaýnap duran suw hammamynda 15 minut gyzdymaly. 45 minutyň dowamynda sowatmaly. Süzüp, galan çig maly sykmary. Taýýar bolan jöwhere başlangyç göwrümüne çenli (200 ml) gaýnag suw garmaly. Gany togtadyjy serişde hökmünde her gün 3–5 gezek 1–2 nahar çemçeden (15–30 ml) içmeli, şeýle-de şol melheme hasany batyryp, dokumalaryň gan öýen ýerlerine ýapmaly. Gemorragik diatezlerde gün içinde 3–4 sapa 1/2–1/3 bulgurdan (100–75 ml) kabul etmeli.

Towşandodagyň 2 çay çemçe (10 g) guradylyp owradylan ýapraklaryny we güllerini 1/2 bulgur (100 ml) 70%-li medisina spirtine atyp, agzy ykjam ýapylyan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün goýmaly. Birsyhly çaykap durmaly. Şerbedi günde 3–5 sapa 1–2 çay çemçeden (5–10 ml) 1/2 bulgur suwa (100 ml) garyp içmeli.

Ösümligiň gury ekstraktyny saklaýan, lagohilusyň gerdejiklerinden her gün 3–4 gezek 1 gerdejikden kabul etmeli.











II bap

MAGLUMATNAMA

# ÖSÜMLIKLERİN FARMAKOTERAPEWTİK HÄSİYETLERİNİ GÖRKEZIJİ

## NERW ULGAMYNÝ RAHATLANDYRYJY ÖSÜMLIKLER

Adaty galgan  
Adaty üzüm  
Çal galgan  
Andosowyň daşkekresi  
Buassýeniň armydy  
Gültagt  
Iberiýa zirki  
Žeraryň jigergüli  
Kenarot  
Kiçijik zibera  
Komarowyň melegi  
Köpetdag üljesi  
Litwinowyň anisi  
Mamamçörek temenlik  
Meýdan gyzyrgygy  
Popowyň üpüklijesi  
Türkmen selmelegi  
Türküstan guşgonmazy  
Saglygoty  
Siňniloty  
Spirally gaýraç  
Şine ýaprakly seseli  
Tokay üzümi  
Türkmenleriň almasy  
Türkmen tilkiçayy  
Zakaspiý sümmüli

## GAN DAMARLARYNY GIÑELDÝÄN WE GAN BASYŞYNY PESELDÝÄN ÖSÜMLIKLER

Adaty üzüm  
Ala gözli akargül  
Eýran üçgaty

Grek gyzylagajy  
Gülýanly üçgat  
Iberiýa zirki  
Jungar goturoty  
Kenarto  
Köpetdag tümmüljesi  
Litwinowyň tuwulgalyjasy  
Lýozeliň kertiklisi  
Meýdan gyzyrgygy  
Popowyň zygyrbaldagy  
Saglygoty  
Sibir aktikeni  
Siňniloty  
Süýri ýaprakly keyigot  
Tokay üzümi  
Türkmenleriň almasy  
Uzyn möjegaýak  
Wawilowyň sogany  
Zylçaly towşandodak

## ÝATGA TÄSIRLI ÖSÜMLIKLER

Adaty birýuçına  
Ajyja  
Andosowyň daşkekresi  
Bungeniň ýylgyny  
Çal galgan  
Çopandag aýgüli  
Çöl peçegi  
Žeraryň jigergüli  
Kenarot  
Kenepli çerbiýe  
Meýdan ýemşik  
Popowyň üpüklijesi  
Saglygoty  
Siňniloty  
Türkmen selmelegi

Uly ammi  
Ýayraň geran  
Zakaspiý sümmüli

## UKYNY KADALAŞDYRYJY ÖSÜMLIKLER

Çopandag aýgüli  
Çöl peçegi  
Eýran peçegi  
Popowyň üpüklijesi  
Saglygoty  
Sowdagan  
Türkmen selmelegi

## AGYRA TÄSIRLI ÖSÜMLIKLER

Adaty nar  
Batga oty  
Birýyllyk frankeniýa  
Çopandag aýgüli  
Dogry siella  
Galyň ýaprakly garatiken  
Gögümtil dänegerçek  
Grek gyzylagajy  
Gülýanly üçgat  
Iliniň daşkekresi  
Komarowyň melegi  
Köpetdag daşkekresi  
Litwinowyň tuwuljalyjasy  
Meýdan gyzyrgygy  
Popowyň zygyrbaldagy  
Sibir aktikeni  
Süýri ýaprakly keyigot  
Tegelek ýaprakly deregül  
Türkmen selmelegi  
Türkmen tilkiçayy



Tüýlek ýylgyn  
Uly ammi  
Uzyn möjegaýak  
Ýabany süýtleniç  
Zylçaly towşandodak

## ZÄHERLENMÄ GARŞY TÄSIRLI ÖSÜMLIKLER

Adaty galgan  
Buassýeniň armydy  
Bungeniň porsukerti  
Büdür-südü akargül  
Hazar akargüli  
Iberiýa zirki  
Komarowyň melegi  
Köpetdag çyrşy  
Saglygoty  
Tegelek ýaprakly geran  
Tikenli bürmek  
Türkmen selmelegi  
Ülen görnüşli ýersakgýç  
Ýabany süýtleniç

## BAGRA WE ÖT HALTASYNA TÄSIRLI ÖSÜMLIKLER

Adaty gyzgan  
Adaty nar  
Adaty sygyrguýruk  
Adaty üzüm  
Ala gözli akargül  
Anrosowyň daşkekresi  
Büdür-südü akargül  
Çal galgan  
Çöl peçegi  
Eýran gyzylagajy  
Eýran peçegi  
Galyň ýaprakly garatiken  
Grek gyzylagajy  
Gündogar zozimasy

Iberiýa daşkekresi  
Iberiýa zirki  
Žeraryň jigergüli  
Kelle kökli akargül  
Kenarot  
Komarowyň melegi  
Kölegeli pakyr  
Köpetdag bidenegi  
Köpetdag daşkekresi  
Köpetdag gyzgany  
Litwinowyň anisi  
Maýmyn orhisi  
Meýdan gyzyrgygy  
Meýeriň ýylgyny  
Ownuk tohumly pakyr  
Popowyň zygyrbaldagy  
Pürli atguýruk  
Saglygoty  
Saýawanly pseudohandeliýa  
Türkmen asperulasy  
Türkmenleriň almasy  
Türküstan guşgonmazy  
Türküstan gyzylagajy  
Tüýlek asperula  
Uly ammi  
Wawilowyň sogany  
Ýabany süýtleniç  
Ýepbeşik daşkekre  
Ýumşak ýylgyn  
Ýylançöp  
Zakaspiý sümmüli

## BÖWREK WE PEŞEW ÝOLLARYNYŇ KESELLERINE HAYYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty bürelije  
Adaty karlina  
Adaty nar  
Adaty üzüm

Ala gözli akargül  
Androsowyň daşkekresi  
Başbugday  
Buassýeniň armydy  
Çöl peçegi  
Dogry siella  
Dört diş rindera  
Eýran gyzylagajy  
Eýran üçgaty  
Gruziýa narpyzagy  
Gündogar zozimasy  
Hazar akargüli  
Iberiýa daşkekresi  
Iberiýa zirki  
Iliniň daşkekresi  
Kenarot  
Kenepli çerbiýe  
Komarowyň melegi  
Köpetdag bidenegi  
Köpetdag bürelijesi  
Köpetdag daşkekresi  
Köpetdag üljesi  
Litwinowyň anisi  
Litwinowyň tuwulgalyjasy  
Meýdan ýemşik  
Meýdan ýylançöp  
Ownuk tohumly pakyr  
Pergül  
Popowyň zygyrbaldagy  
Pürli atguýruk  
Siňniloty  
Spirally gaýraç  
Süýri ýaprakly keýigot  
Tikenli bürmek  
Türkmenleriň almasy  
Türküstan guşgonmazy  
Türküstan gyzylagajy  
Tüýlek asperula  
Uly ammi  
Wawilowyň sogany  
Ýepbeşik daşkekre

Ýumşak ýylgyn  
Ýylançöp

## DERLEDIJI WE GAKYLYK GOPARYJY ÖSÜMLIKLER

Adaty karelina  
Adaty sygyrguýruk  
Adaty üzüm  
Başbugdaý  
Burçly gülhatma  
Çöl peçegi  
Dört diş rindera  
Eýran peçegi  
Hazar akargüli  
Inçejik keyigot  
Irio kertikli  
Kenepli çerbiye  
Köpetdag bidenegi  
Litwinowyň tuwulgalyjasy  
Ownuk miweli ülje  
Popowyň zygyrbaldagy  
Saýawanly psewdohandeliýa  
Tikenli bürmek  
Türküstan guşgonmazy  
Ýabany süýtlenňiç  
Ýepbeşik daşkekres

## SOWUKLAMA KESELLERINE HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty sygyrguýruk  
Beýik kertikli  
Burçly gülhatma  
Dört diş rindere  
Eýran gyzylagajy  
Galyň ýaprakly garatiken  
Gruziýa narpyzagy  
Gündogar zozimasy  
Jungar goturoty  
Iberiýa daşkekresi

Iberiýa zirki  
Iliniň daşkekresi  
Kenarot  
Köpetdag üljesi  
Litwinowyň tuwulgalyjasy  
Maýmyn orhisi  
Meýdan gyzyrgyjy  
Nikitiniň gülhatmasy  
Pergül  
Popowyň zygyrbaldagy  
Saýawanly psewdohandeliýa  
Tokaý üzümü  
Torly gülhatma  
Ýabany süýtlenňiç  
Ýepbeşik daşkekres

## ÝÜREK-DAMAR KESELLERINE HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty atýelmik  
Adaty birýuçına  
Adaty nar  
Adaty üzüm  
Buassýeniň armydy  
Bungeniň porsukerti  
Çopandag aýgüli  
Gögümtil dänegerçek  
Grek gyzylagajy  
Gyrgy ýaprak saryjaot  
Hazar akargüli  
Iberiýa daşkekresi  
Iberiýa zirki  
Inçejik keyigot  
Jungar goturoty  
Komarowyň melegi  
Köpetdag tümmüljesi  
Litwinowyň tuwulgalyjasy  
Lýozeliň kertiklisi  
Pürli atguýruk  
Saglygoty  
Saýawanly psewdohandeliýa

Siňniloty  
Süýri ýaprakly keyigot  
Türkmenleriň almasy  
Türkmen tilkiçagy  
Uzyn möjegaýak  
Ýabany süýtlenňiç  
Zakaspiý sümmüli

## TÄZE DÖREMELERE WE ÇIŞLERE HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty galgan  
Adaty nar  
Ajyja  
Ala gözli akargül  
Bir ýaprakly ýylgaý  
Bungeniň ýylgyny  
Büdür-südür akargül  
Çopandag aýgüli  
Dürli reňkli porsukert  
Gündogar zozimasy  
Irio kertikli  
Kenarot  
Kenepli çerbiye  
Köpetdag çyrşy  
Pürli atguýruk  
Şine ýaprakly seseli  
Tikenli bürmek  
Türküstan guşgonmazy  
Uly ammi  
Ýabany süýtlenňiç  
Zakaspiý sümmüli

## IMPOTENSIÝA HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty üzüm  
Buassýeniň armydy  
Hazar akargüli  
Litwinowyň anisi



Inçejik keyigot  
Köpetdag çyrşy  
Litwinowyň sümmüli  
Meýdan ýemşik  
Meýeriň ýylgyny  
Ownuk tohumly pakyr  
Regeliň gerany  
Türkmen selmelegi  
Wawilowyň sogany  
Ýabany süýtlenňiç  
Ýumşak ýylgyn  
Zakaspiý sümmüli

#### DEM ALYŞ ÝOLLARYNYŇ KESELLERINE HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty birýuçına  
Adaty gyzgan  
Adaty nar  
Adaty üzüm  
Adaty ýylangül  
Ala gözli akargül  
Anrosowyň daşkekresi  
Batga oty  
Berk bugratiken  
Beýik kertikli  
Birýyllyk frankeniýa  
Buassýeniň armydy  
Çal galgan  
Eýran gyzylagajy  
Eýran peçegi  
Garadennan  
Gögümtil dänegerçek  
Gügümtil jigergül  
Gyrymsy hemeşe  
Hazar akargüli  
Irio kertikli  
Kelle kökli akargül  
Adaty sygyrguýruk

Komarowyň melegi  
Kenarot  
Kenepli çerbiýe  
Kiçi maňysak  
Köpetdag bidenegi  
Köpetdag gyzgany  
Köpetdag tümmüljesi  
Köpetdag üljesi  
Litwinowyň anisi  
Meýdan gyzyrgyjy  
Wawilowyň sogany  
Spirally gaýraç  
Popowyň üpüklijesi  
Pürli atguýruk  
Tikenli bürmek  
Tumargül  
Turneforyň kengary  
Türkmen armydy  
Uzyn möjegaýak  
Ýabany süýtlenňiç  
Zakaspiý sümmüli

#### SÜÝJÜKESELE HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty nar  
Ala gözli akargül  
Iberýa zirki  
Buassýeniň armydy  
Eýran gyzylagajy  
Kenarot  
Kölegeli pakyr  
Ownuk miweli ülje  
Ownuk tohumly pakyr  
Türkmenleriň almasy

#### ANTISEPTIKLER

Ownuk miweli ülje  
Tokaý üzümü  
Türkmen armydy

#### ÝARANY BITIRIJI ÖSÜMLIKLER

Adaty galgan  
Adaty nar  
Adaty sygyrguýruk  
Adaty üzüm  
Ala gözli akargül  
Androsowyň daşkekresi  
Başbugdaý  
Berk bugratiken  
Beýik kertikli  
Biberşteýniň ýylangüli  
Bungeniň porsukerti  
Çal galgan  
Çöl peçegi  
Eýran peçegi  
Gültagt  
Jungar goturoty  
Žeraryň jigergüli  
Köpetdag büreljesi  
Köpetdag çyrşy  
Ownuk miweli ülje  
Popowyň üpüklijesi  
Pürli atguýruk  
Regeliň gerany  
Süýri ýaprakly keyigot  
Tegelek ýaprakly deregül  
Tikenli bürmek  
Tokaý üzümü  
Türkmen asperulasy  
Türkmen selmelegi  
Türkmen tilkiçaýy  
Ýabany süýtlenňiç  
Ýepbeşik daşkekrek

#### GÖZ WE GULAGA HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty bürelje  
Adaty nar  
Adaty sygyrguýruk

Androsowyň daşkekresi  
Başbugdaý  
Bungeniň porsukerti  
Bungeniň ýylgyny  
Büdür-südü akargül  
Çopandag aýgüli  
Guguň çigildemi  
Iberiýa daşkekresi  
Jungar goturoty  
Kenepli çerbiýe  
Komarowyň melegi  
Köpetdag çyrşy  
Köpetdag daşkekresi  
Litwinowyň anisi  
Tegelek ýaprakly geran  
Türkmen selmelegi  
Wawilowyň sogany  
Ýepbeşik daşkekrekre

#### DIŞ AGYRA HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty bürelije  
Adaty nar  
Bungeniň porsukerti  
Bungeniň ýylgyny  
Büdür-südü akargül  
Çopandag aýgüli  
Dogry siella  
Eýran üçgaty  
Jungar goturoty  
Kenepli çerbiýe  
Kiçi maňyrsak  
Köpetdag bidenegi  
Meýdan gyzyrgygy  
Nikitiniň gülhatmasy  
Şine ýaprakly seseli  
Tikenli bürmek  
Torly gülhatma  
Ülen görnüşli ýersakgýç  
Zylçaly towşandodak

#### AŞGAZAN–IÇEĞE KESELLERINE HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty galgan  
Adaty gyrgan  
Adaty karlina  
Adaty nar  
Adaty sygyrguýruk  
Adaty üzüm  
Ala gözli akargül  
Androsowyň daşkekresi  
Atabaýewiň haramçybygy  
Başbugdaý  
Bungeniň porsukerti  
Büdür-südü akargül  
Çal galgan  
Çöl peçegi  
Dänelije  
Dürli reňkli porsukert  
Eýran gyzylagajy  
Eýran üçgaty  
Galyň ýaprakly garatiken  
Gelşikli eşekselme  
Gögümtil dänegerçek  
Gruziýa narpyzagy  
Gülýanly üçgat  
Gündogar zozimasy  
Iberiýa daşkekresi  
Iberiýa zirki  
Inçejik keýigot  
Kenepli çerbiýe  
Kiçi maňyrsak  
Komarowyň melegi  
Köpetdag daşkekresi  
Köpetdag gyrgan  
Maýmyn orhisi  
Meýdan gyzyrgygy  
Meýeriň ýylgyny  
Popowyň üpuklijesi  
Regeliň gerany

Saglygoty  
Siňniloty  
Sowdagan  
Spirally gaýraç  
Süýri ýaprakly keýigot  
Şine ýaprakly seseli  
Şöhleli daşkekrekre  
Tegelek ýaprakly deregül  
Türkmen armydy  
Türkmenleriň almasy  
Türküstan gyzylagajy  
Tüýlek asperula  
Tüýli handeliýa  
Ülen görnüşli ýersakgýç  
Wawilowyň sogany  
Ýabany süýtleniňç  
Ýumşak ýylgyn  
Zakaspiý sümmüli  
Zylçaly towşandodak

#### DERI KESELLERINE HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty üzüm  
Adaty sygyrguýruk  
Ajy kekrek  
Adaty nar  
Ala gözli akargül  
Almaçöp  
Androsowyň daşkekresi  
Arça arsewtobiumy  
Başbugdaý  
Bungeniň porsukerti  
Burçly gülhatma  
Çal galgan  
Dörtidiş rindere  
Dürli reňkli porsukert  
Eýran üçgaty  
Galyň ýaprakly garatiken  
Grek gyzylagajy  
Gültagt



Gündogar zozimasy  
 Gülýanly üçgat  
 Iberiýa daşkekresi  
 Iri ýaprakly ýylgaý  
 Jungar goturoty  
 Žeraryň jigergüli  
 Kenepli çerbiýe  
 Kiçi maňyrsak  
 Kiçijik zibera  
 Kenarot  
 Komarowyň aktiken  
 Köpetdag bidenegi  
 Köpetdag daşkekresi  
 Köpetdag tümmüljesi  
 Litwinowyň anisi  
 Litwinowyň sümmüli  
 Nikitiniň gülhatmasy  
 Popowyň zygyrbaldagy  
 Sibir aktiken  
 Siňňiloty  
 Süýri ýaprakly keýigot  
 Tegelek ýaprakly deregül  
 Tegelek ýaprakly geran  
 Tikenli bürmek  
 Tumargül  
 Turneforyň kengary  
 Türkmen selmelegi  
 Tüýlek asperula  
 Tüýli handeliýa  
 Uly ammi  
 Ülen görnüşli ýersakgyç  
 Wawilowyň sogany  
 Ýaýraň geran  
 Ýepbeşik daşkekres  
 Zylçaly towşandodak

#### SOGULJANLARYŇ GARŞYSYNA HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty atýelmik  
 Adaty nar

Ajy kekres  
 Batga oty  
 Buassýeniň armydy  
 Bungeniň porsukerti  
 Kenarot  
 Saýawanly pseudohandeliýa  
 Popowyň zygyrbaldagy  
 Popowyň üpükljesi  
 Saglygoty  
 Wawilowyň sogany

#### ÝANYKLARA HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty sygyrguýruk  
 Eýran üçgaty  
 Köpetdag bidenegi  
 Wawilowyň sogany

#### SEMIZLIK KESELINE HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Buassýeniň armydy

#### TONIZIRLEÝJI TÄSIRLI ÖSÜMLIKLER

Dogry siella  
 Grek gyzylagajy  
 Guguň çigildemi  
 Köpetdag çyrşy  
 Köpetdag daşkekresi  
 Litwinowyň tuwulgalyjasy  
 Pürli atguýruk  
 Şöhleli daşkekres

#### GAN AKMASYNY TOGTADYJY ÖSÜMLIKLER

Adaty nar  
 Beýik kertikli

Bungeniň ýylgyny  
 Eýran gyzylagajy  
 Eýran peçegi  
 Eýran üçgaty  
 Grek gyzylagajy  
 Gruziýa narpyzagy  
 Guguň çigildemi  
 Gültagt  
 Gülýanly üçgat  
 Iberiýa daşkekresi  
 Iberiýa zirki  
 Kenarot  
 Mamamçörek temenlik  
 Meýeriň ýylgyny  
 Ownuk miweli ülj  
 Regeliň gerany  
 Tegelek ýaprakly geran  
 Tokaý üzümi  
 Türkmen selmelegi  
 Zylçaly towşandodak

#### ÝOKANÇ KESELLERINE HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty bürelije  
 Adaty nar  
 Adaty pyşdyloty  
 Ajyja  
 Ajy kekres  
 Androsowyň daşkekresi  
 Atabaýewiň haramçybygy  
 Başbugdaý  
 Batga bürelijesi  
 Büdür-südü akargül  
 Çöl peçegi  
 Eýran üçgaty  
 Kenepli çerbiýe  
 Iberiýa daşkekresi  
 Litwinowyň tuwulgalyjasy  
 Meýdan ýemşik  
 Meýeriň ýylgyny

Pürli atguýruk  
Şine ýaprakly seseli  
Tikenli bürmek  
Tokaý üzümi  
Turan pyşdyloty  
Uzyn möjegaýak  
Ülen görnüşli ýersakgyç  
Wawilowyň sogany  
Ýabany süýtleňňiç  
Ýalan murt

Ýaýraň geran

## SÜŇK DÖWÜLMESINE WE ÇYKUWLARA HAÝYRLY ÖSÜMLIKLER

Adaty nar  
Burçly gülhatma  
Kenepli çerbiýe  
Popowyň üpükljesi

Turneforyň kengary  
Ýabany süýtleňňiç

## GUSDURYJY ÖSÜMLIKLER

Atabayewiň haramçybygy  
Çopandag aýgüli  
Galyň ýaprakly garatiken  
Türkmen selmelegi  
Spirally gaýraç





# DERMAN ÖSÜMLİKLERİNİŇ ATLARYNYŇ TÜRKMENÇE, LATYNÇA WE RUSSÇA SÖZLÜGI

Adaty atýelmik – *Koelpinia linearis* – Коельпиния  
линейная

Adaty birýuçina – *Ligustrum vulgare* – Бирючина  
обыкновенная

Adaty bürelije – *Pulicaria vulgaris* – Блошница  
обыкновенная

Adaty galgan – *Cirsium vulgare* – Бодяк обыкновенный

Adaty gyzgan – *Lycium ruthenicum* – Дрезна русская

Adaty karlina – *Carlina vulgaris* – Колючник  
обыкновенный

Adaty nar – *Punica granatum* – Гранат обыкновенный

Adaty pyşdyloty – *Amberboa amboi* – Амбербоа  
обыкновенная

Adaty sygyrguýruk – *Verbascum thapsus* – Коровяк  
обыкновенный

Adaty tmin – *Carum carvi* – Тмин обыкновенный

Adaty üzüm – *Vitis vinifera* – Виноград культурный

Adaty ýylangül – *Echium vulgare* – Синяк обыкновенный

Ajyja – *Saussurea salsa* – Горькуша солончаковая

Ajy kekre – *Acroptilon repens* – Горчак ползучий

Ala gözli akargül – *Inula oculus-christi* – Девясил  
Христово око

Almaçör – *Lachnophyllum gossypinum* – Шерстелистник  
хлопчатниковый

Amyderýa porsyoduny – *Reaumuria oxiana* – Реомюрия  
амударьинская

Androsowyň daşkekresi – *Centaurea androssovii* – Василек  
Андросова

Arça arsewtobiumy – *Arceuthobium oxycedri* –  
Арцетовиум можжевельниковый

Atabaýewiň haramçybygy – *Colutea atabajewii* – Пузырник  
Атабаева

Başbugdaý – *Abutilon theophrasti* – Канатник Теофраста

Batga bürelijesi – *Pulicaria uliginosa* – Блошница  
болотная

Bakja sarygalgany – *Sonchus oleraceus* – Осот огородный

Baljuan çerriği – *Ranunculus baldshuanicus* – Лютик  
бальджуанский

Batga oty – *Rorippa palustris* – Жерушник болотный

Bathyz smirniomy – *Smyrniolum cordifolium* – Смирния  
сердцелистная

Baýsun sonarçasy – *Anemone baissunensis* – Ветерница  
байсунская

Berk bugratiken – *Acanthophyllum glandulosum* –  
Колючелистник железистый

Beýik erkek çopantepik – *Anthemis altissima* – Пулавка  
высочайшая

Beýik kertikli – *Sisymbrium altissimum* – Гулявник  
высочайший

Biberşteýniň ýylangüli – *Echium biebersteinii* – Синяк  
Биберштейна

Bir öýli andyz – *Bryonia monoica* – Переступень  
однодомный

Bir sütünjikli seudek – *Euphorbia monostyla* – Молочай  
одноствольниковый

Birýylyk frankeniýa – *Frankenia pulverulenta* – Франкения  
порошистая

Bogunly torilis – *Torilis nodosa* – Пупырник узловатый

Buassýeniň armydy – *Pyrus boissieriana* – Груша Буассье

Buassýeniň seudegi – *Euphorbia boissieriana* – Молочай  
Буассье

Bungeniň porsukerti – *Haplophyllum bungei* –  
Цельнолистник Бунге

Bungeniň ýylgyny – *Tamarix bungei* – Гребенщик Бунге

Burçly gülhatma – *Alcea angulata* – Шток-роза угловатая

Büdü-r-südü-r akargül – *Inula aspera* – Девясил  
шероховатый

Çal galgan – *Cirsium incanum* – Бодяк седой

Çala tüýlçe peçek – *Convolvulus subhirsutus* – Вьюнок  
слабоволосистый



Çalarýan seudek – *Euphorbia canescens* – Молочай  
сереющий

Çernýaýewiň sonarçasy – *Anemone tschernjaewii* –  
Ветерница Черняева

Çopandag aýgüli – *Silene czopandagensis* – Смолевка  
чопандагская

Çöl peçeği – *Convolvulus hamadae* – Вьюнок пустынный

Çörboýa – *Rubia tinctorum* – Марена красильная

Çüňkli çumylgan – *Hypocoum pendulum* – Гипекоум  
повислый

Dagdagán – *Bellis perennis* – Маргаритка многолетняя

Deňiz süýtçeği – *Glaux maritima* – Млечник морской

Dere topbaşı – *Pyrethrum parthenifolium* – Пиретрум  
девичелистный

Dänelije – *Acinos rotundifolius* – Шербушка  
круглолистная

Dogry siella – *Siella erecta* – Сиелла прямая

Dört diş rindere – *Rindera tetraspis* – Риндера  
четырёхщитковая

Dürek güläle – *Papaver hibridum* – Мак гибридный

Dürli reňkli porsukert – *Haplophyllum versicolor* –  
Цельнолистник разноцветный

Eçisonyň üpüklijesi – *Corydalis aitchisonii* – Хохлатка  
Эчисона

Egri tohumly gelinçek – *Consolida camptocarpa* – Сокирки  
согнутоплодная

Eýran gyzylagajy – *Sorbus persica* – Рябина персидская

Eýran ömrüzaýasy – *Adonis persica* – Адонис персидский

Eýran peçeği – *Convolvulus persicus* – Вьюнок персидский

Eýran üçgaty – *Lonicera nummulariifolia* – Жимолость  
монетолистная

Fergana ýowşany – *Artemisia ferganensis* – Полынь  
ферганская

Galkanoty – *Androsace maxima* – Проломник большой

Galyň ýaprakly garatiken – *Rhamnus coriacea* – Жостер  
кожистолистный

Gaňçör – *Chelidonium majus* – Чистотел большой

Gandyýar – *Psoralea drupacea* – Псоралея костянковая

Garadennan – *Caccinia macranthera* – Каччиния  
крупнопольниковая

Garamtyl garagat – *Ribes melananthum* – Смородина  
темноцветная

Geşikili eşekselme – *Chrozophora gracilis* – Хрозофора  
изящная

Germewli narpyzak – *Lallemantia peltata* – Лаллеманция  
щитковидная

Giň ýaprakly turgeniýa – *Turgenia latifolia* – Тургенция  
широколистная

Goşa pragnos – *Prangos didyma* – Прангос двойчатый

Goýun çomujy – *Ferula ovina* – Ферула овечья

Göğümtil dänegerçek – *Datura tatula* – Дурман  
фиолетовый

Göğümtil jigergül – *Bupleurum semicompositum* –  
Волoduшка полусложная

Grek gyzylagajy – *Sorbus graeca* – Рябина греческая

Gruziýa narpyzagy – *Lallemantia iberica* – Лаллеманция  
грузинская

Guguň çigildemi – *Tulipa hoogiana* – Тюльпан Гуга

Gültagt – *Chaerophyllum bulbosum* – Бутень клубневой

Gülýanly üçgat – *Lonicera bracteolaris* – Жимолость  
прицветничковая

Gündogar zozimasy – *Zosima orientalis* – Зозима  
восточная

Günebakar seudek – *Euphorbia helioscopia* – Молочай  
солнцегляд

Gurgy ýaprak saryjaot – *Erysimum hieracifolium* –  
Желтушник ястребинколистый

Gurymsy hemeşe – *Jasminum fruticans* – Жасмин  
кустарниковый

Hazar akargüli – *Inula caspica* – Деясил каспийский

Horasan derwüşoty – *Erigeron khorassanicus* –  
Мелкопестник хорасанский

Hyýaroty – *Borago officinalis* – Огуречная трава  
лекарственная

Iberiýa daşkekresi – *Centaurea iberica* – Василек  
иберийский

Iberiýa zirki – *Berberis iberica* – Барбарис иберийский



Ilîniň daşkekresi – *Centaurea iljinii* – Василек Ильина

Inçe ýaprakly igde – *Elaeagnus angustifolia* – Лох узколистный

Inçe ýaprakly torilis – *Torilis leptophylla* – Пупырник тонколистный

Inçejik keýigot – *Ziziphora tenuior* – Зизифора тонкая

Intizargül – *Facaria fascicularis* – Чистяк пучковатый

Iri tyçinkaly güläle – *Papaver macrostomum* – Мак крупнотычиночный

Iri ýaprakly akargül – *Inula macrophylla* – Девясил крупнолистный

Iri ýaprakly ýylgaý – *Cotoneaster nummularioides* – Кизильник монетовидный

Irio kertikli – *Sisymbrium irio* – Гулявник ирио

Isfagan deltegi – *Clematis isphaganica* – Ломонос исфаганский

Jungar goturoty – *Scabiosa songarica* – Скабиоза джунгарская

Žeraryň jigergüli – *Bupleurum gerardii* – Володушка Жерара

Kareliniň çomuýy – *Ferula karelinii* – Ферула Карелина

Kelle kökli akargül – *Inula rhizocephala* – Девясил корнеглавый

Kenarot – *Nasturtium officinale* – Жеруха лекарственная

Kenepli çerbiýe – *Althaea cannabina* – Алтей коноплевидный

Kerjeli çerrik – *Ranunculus linearilobus* – Лютик линейнолопастный

Kerjeli gökgüläle – *Glaucium oxylobum* – Глауциум остролистный

Kerkaw – *Acer turcomanicum* – Клен туркменский

Keýikburça – *Psammogeton canescens* – Песколюб седоватый

Kiçi maňyrsak – *Hyoscyamus pusillus* – Белена маленькая

Kiçijik zibera – *Sieberta nana* – Зибера карликовая

Komarowuň aktikeni – *Nitraria komarovii* – Селитрянка Комарова

Komarowuň melegi – *Atropa komarovii* – Красавка Комарова

Kölegeli pakyr – *Cousinia umbrosa* – Кузиния теневая

Köpetdag bidenegi – *Salvia kopetdaghensis* – Шалфей копетдагский

Köpetdag büreljisi – *Pulicaria gnaphalodes* – Bloшница сушеницевидная

Köpetdag çyrşy – *Eremurus kopetdaghensis* – Эремурус копетдагский

Köpetdag daşkekresi – *Centaurea kopetdaghensis* – Василек копетдагский

Köpetdag gyzgany – *Lycium kopetdaghi* – Дереза копетдагская

Köpetdag pişigoty – *Nepeta kopetdaghensis* – Котовник копетдагский

Köpetdag seudegi – *Euphorbia kopetdaghi* – Молочай копетдагский

Köpetdag tümmüljesi – *Johreniopsis seselioides* – Иорениовидка жабрицевидная

Köpetdag üljesi – *Cerasus pseudoprostrata* – Вишня ложнопростертая

Kör şahaly ýylgyn – *Tamarix ramosissima* – Гребенщик многоветвистый

Lemanyň çigildemi – *Tulipa lehmanniana* – Тюльпан Лемана

Litwinowuň anisy – *Pimpinella litvinovii* – Бедренец Литвинова

Litwinowuň gülälegi – *Papaver litwinowii* – Мак Литвинова

Litwinowuň sümmüli – *Hyacinthus litwinowii* – Гиацинт Литвинова

Litwinowuň tuwulgalyjasy – *Scutellaria litwinowii* – Шлемник Литвинова

Lýozeliň kertiklisi – *Sisymbrium loeselii* – Гулявник Лёзеля

Mamaňçörek temenlik – *Erodium malacoides* – Журавельник мальвовидный

Mawritan mamaňçöregi – *Malva mauritiana* – Просвирник мавританский

Maýda gülli çumylgan – *Hypecoum parviflorum* – Гипекоум мелкоцветковый

Maýda güllüje mamaňçörek – *Malva parviflora* – Просвирник мелкоцветковый

Maýmyn orhisi – *Orchis simia* – Ятрышник обезьяний

Meýdan anagalisi – *Anagalis arvensis* – Очный цвет полевой

Meýdan çerrigi – *Ranunculus arvensis* – Лютик полевой

Meýdan gyzyrgyzy – *Sinapis arvensis* – Горчица полевая

Meýdan torilisi – *Torilis arvensis* – Пупырьник полевой

Meýdan ýemşik – *Thlaspi arvense* – Ярутка полевая

Meýdan ýylançöpi – *Lithospermum arvense* – Воробейник полевой

Meýeriň ýylgyny – *Tamarix meyeri* – Гребенщик Мейера

Miheliň çigildemi – *Tulipa micheliana* – Тюльпан Михеля

Nargyz – *Sternbergia lutea* – Штернбергия желтая

Nädogry gülli seudek – *Euphorbia anisopetala* – Молочай неравнолепестный

Nikitiniň gülhatmasy – *Alcea nikitinii* – Шток-роза Никитина

Nis mamamçöregi – *Malva nicaeensis* – Просвирник ницкий

Okaýa ýapraksyz şaterne – *Fumaria asepal* – Дымянка бесщастелистниковая

Orak görnüşli seudek – *Euphorbia falcata* – Молочай серповидный

Ownuk miweli ülje – *Cerasus microcarpa* – Вишня мелкоплодная

Ownuk tohumly pakyr – *Cousinia microcarpa* – Кузиния мелкоплодная

Pergül – *Turritis glabra* – Вяжечка голая

Pes boýly seudek – *Euphorbia humilis* – Молочай низкорослый

Pette – *Populus pruinosa* – Тополь сизолистный

Popowuň üpüklijesi – *Corydalis popovii* – Хохлатка Попова

Popowuň zygyrbaldagy – *Linaria popovii* – Льянка Попова

Pürli atguýruk – *Equisetum ramosissimum* – Хвощ ветвистый

Raddenini alwany – *Fritillaria raddeana* – Рябчик Радде

Regeliň gerany – *Geranium regelii* – Герань Регеля

Rionuň suw lýtutigi – *Batrachium rionii* – Водяной лютик Риона

Saglygoty – *Valeriana chionophila* – Валериана снеголюбивая

Sary rezeda – *Reseda lutea* – Резеда желтая

Sarymytyl rezeda – *Reseda luteola* – Резеда желтоватая

Sarymytyl saryçöp – *Delphinium bitermatum* – Живокость дваждытройчатая

Saýawanly psewdohandeliýa – *Pseudohandelia umbellifera* – Псевдоханделия зонтичная

Segýueroýuň seudegi – *Euphorbia seguierana* – Молочай Сергеев

Sibir aktiken – *Nitraria sibirica* – Селитрянка сибирская

Siňniloty – *Filago arvensis* – Жабник полевой

Soltanabat üçgüňkisi – *Thalitrum sultanabadense* – Василистник султанабадский

Sowdagan – *Diarthron vesiculosum* – Двучленник пузырчатый

Spirally gaýraç – *Ungernia spiralis* – Унгерния спиральная

Stoksuň gelinçegi – *Consolida stocksiana* – Сокирки Стокса

Süýri ýaprakly keyigot – *Ziziphora clinopodioides* – Зизифора клинолистная

Syçangyuruk – *Myosurus minimus* – Мышехвостник маленький

Şahly gökgülälek – *Glaucium corniculatum* – Глауциум рогатый

Şangül – *Aquilegia vicaria* – Водосбор замещающий

Şildirbaş – *Sphaerophysa salsula* – Сферофиза солонцовая

Şine ýaprakly seseli – *Seseli cuneifolium* – Жабрица клинолистная

Şöhleli daşkekrek – *Centaurea solstitialis* – Василек солнечный

Şübhele doňuzgataňnyr – *Leontice incerta* – Леонтице сомнительная

Tarhun – *Artemisia dracunculus* – Полынь эстрагон

Tegelek ýaprakly geran – *Geranium rotundifolium* – Герань округлолистная

Tegelek ýaprakly deregül – *Andrachne rotundifolia* – Андрахна круглолистная

Teňňeli gökgülälek – *Glaucium squamigerum* – Глауциум чешуйчатый

Tikenli bürmek – *Xanthium spinosum* – Дурнишник колючий



Tokaý üzümi – *Vitis sylvestris* – Виноград лесной  
 Toraňňy – *Populus euphratica* – Тополь евфратский  
 Torly gülhatma – *Alcea rhyticarpa* – Шток-роза  
 сетчатоплодная  
 Turan pyşdyloty – *Amberboa turanica* – Амбербоа  
 туранская  
 Turçaninowyň seudegi – *Euphorbia turczaninowii* –  
 Молочай Турчанинова  
 Turneforyň kengary – *Gundelia tournefortii* – Гунделия  
 Турнефора  
 Tumargül – *Physocaulis nodosus* – Вздутостебельник  
 узловатый  
 Türkmen armydy – *Pyrus turcomanica* – Груша  
 туркменская  
 Türkmen asperulasy – *Asperula turcomanica* – Ясменник  
 туркменский  
 Türkmen badamy – *Amygdalus turcomanica* – Миндаль  
 туркменский  
 Türkmen selmelegi – *Mandragora turcomanica* –  
 Мандрагора туркменская  
 Türkmenleriň almasy – *Malus turkmenorum* – Яблоня  
 туркменов  
 Türkmen tilkiçaýy – *Stachys turcomanica* – Чистец  
 туркменский  
 Türküstan guşgonmazy – *Carthamus turkestanicus* –  
 Сафлор туркестанский  
 Türküstan gyzylagajy – *Sorbus turkestanica* – Рябина  
 туркестанская  
 Tüýlek asperula – *Asperula setosa* – Ясменник  
 щетинистый  
 Tüýlek frankeniýa – *Frankenia hirsuta* – Франкения  
 жестковолосистая  
 Tüýlek ýylgyn – *Tamarix hispida* – Гребенщик  
 щетинистоволосый  
 Tüýli guşokara – *Dipsacus strigosus* – Ворсянка  
 щетинистая  
 Tüýli handeliýa – *Handelia trichophylla* – Ханделия  
 волосистая  
 Ullakan tordiliüm – *Tordylium maximum* – Тордилиум  
 наибольший

Uly ammi – *Ammi majus* – Амми большая  
 Uzyn möjegaýak – *Lycopus exaltatus* – Зюзник высокий  
 Uzyn sapakly saryçöp – *Delphinium longipedunculatum* –  
 Живокость длинноцветножковая  
 Üç kepjeli çumylgan – *Hypocoum trilobum* – Гипекоум  
 трехлопастный  
 Üçem saryçöp – *Delphinium ternatum* – Живокость  
 тройчатая  
 Ülen görnüşli ýersakgýç – *Chondrilla juncea* – Хондрилла  
 ситниковидная  
 Wawilowyň sogany – *Allium vavilovii* – Лук Вавилова  
 Wilsonyň çigildemi – *Tulipa wilsoniana* – Тюльпан  
 Вильсона  
 Ýkrykça – *Eupatorium cannabinum* – Посконник  
 коноплевидный  
 Ýabany süýtleňňiç – *Lactuca serriola* – Лактук дикий  
 Ýalan murt – *Ajuga chia* – Живучка хиоская  
 Ýaýraň geran – *Geranium divaricatum* – Герань  
 раскидистая  
 Ýazylagan tilkisumaý – *Galium humifusum* –  
 Подмаренник распростертый  
 Ýemşijek – *Microthlaspi perfoliatum* – Яруточка  
 пронзеннолистная  
 Ýepbeşik daşkekre – *Centaurea depressa* – Василек  
 приплюснутый  
 Ýiti sarygalgan – *Sonchus asper* – Осот шероховатый  
 Ýiti tohumly çerrik – *Ranunculus oxyspermus* – Лютик  
 остроплодный  
 Ýogyn baldakly suw ýútigi – *Batrachium pachycaulium* –  
 Водяной лютик толстостебельный  
 Ýumşak ýylgyn – *Tamarix laxa* – Гребенщик рыхлый  
 Ýylançöp – *Lithospermum officinale* – Воробейник  
 лекарственный  
 Zakaspiý sümmüli – *Hyacinthus transcaspica* – Гиацинт  
 закаспийский  
 Zereň – *Acer pubescens* – Клен пушистый  
 Zylçaly towşandodak – *Lagochilus gypsaceus* – Зайцегуб  
 гипсовый



## DERMAN ÖSÜMLİKLERİN ÇİĞ MALLARIN ÝYGNAMAKLYGYN SENENAMASY

| Ösümliklerin ady    | mart   | aprel               | may                                                        | ýun                                                        | ýul                                                        | awgust                                                     | sentýabr                     | oktyabr | noýabr |
|---------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|
| 1                   | 2      | 3                   | 4                                                          | 5                                                          | 6                                                          | 7                                                          | 8                            | 9       | 10     |
| Adaty atýelmik      |        | oty,<br>gülleri     | oty,<br>gülleri                                            | oty,<br>gülleri                                            |                                                            |                                                            |                              |         |        |
| Adaty birýuçına     |        | ýapragy,<br>gülleri |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            | miwesi                       | miwesi  |        |
| Adaty bürelije      |        |                     |                                                            |                                                            | oty                                                        | oty                                                        |                              |         |        |
| Adaty galgan        | köki   |                     |                                                            | oty                                                        | oty                                                        |                                                            | köki                         |         |        |
| Adaty gyzgan        |        |                     | miwesi                                                     | miwesi                                                     |                                                            |                                                            |                              |         |        |
| Adaty karlına       |        |                     |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                              |         |        |
| Adaty nar           | gabygy |                     | baldagyň,<br>şahajygyň,<br>sapajygyň<br>gabygy,<br>gülleri | baldagyň,<br>şahajygyň,<br>sapajygyň<br>gabygy,<br>gülleri | baldagyň,<br>şahajygyň,<br>sapajygyň<br>gabygy,<br>gülleri | baldagyň,<br>şahajygyň,<br>sapajygyň<br>gabygy,<br>gülleri | gabygy,<br>miwesi,<br>tohumy |         |        |
| Adaty sygyrguýruk   |        |                     |                                                            | ýapragy,<br>gülleri                                        | ýapragy,<br>gülleri                                        |                                                            |                              |         |        |
| Adaty pyşdyloty     |        | oty                 | oty                                                        |                                                            |                                                            |                                                            |                              |         |        |
| Adaty torumgaldyran |        |                     | oty                                                        | oty                                                        | oty                                                        | tohumy<br>miwesi                                           |                              |         |        |
| Adaty üzüm          |        | ýapragy             | ýapragy                                                    |                                                            |                                                            |                                                            | miwesi                       |         |        |
| Adaty ýylangül      |        |                     |                                                            | oty                                                        | oty                                                        |                                                            |                              |         |        |
| Aýja                |        |                     |                                                            | oty                                                        | oty                                                        |                                                            |                              |         |        |
| Aýj kekre           | köki   |                     | oty                                                        | oty,<br>miwesi                                             | oty,<br>miwesi                                             | oty,<br>miwesi                                             | köki<br>miwesi               | miwesi  |        |
| Ala gözli akargül   |        |                     |                                                            | ýapragy,<br>gülleri                                        | ýapragy,<br>gülleri                                        |                                                            |                              |         |        |
| Almaçöp             |        |                     |                                                            |                                                            |                                                            | ýapragy                                                    | ýapragy                      |         |        |



| 1                      | 2             | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     | 8              | 9              | 10 |
|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----|
| Androsowyn داشkekresi  |               |                       | yapragy, gülleri      | yapragy, gülleri      |                       |                       |                |                |    |
| Arça arsewtobiumy      |               |                       | yapragy               | miwesi, tohumy        | oty                   | oty                   |                |                |    |
| Atabayewiň haramçybygy |               |                       |                       | oty, yapragy, gülleri | oty, yapragy, gülleri | oty, yapragy, gülleri | köki           |                |    |
| Başbugday              | köki          |                       |                       | yapragy, gülleri      | yapragy, gülleri      |                       |                |                |    |
| Batga büreljisi        |               |                       | oty                   |                       |                       |                       |                |                |    |
| Batga oty              |               |                       |                       |                       |                       |                       |                |                |    |
| Berk bukratiken        | köki          |                       |                       |                       |                       |                       | köki           |                |    |
| Beyik kertikli         |               | oty                   | oty                   | tohumy                |                       |                       |                |                |    |
| Biberşteýniň ýylangülü | köki          |                       | oty                   | oty                   |                       |                       | köki           |                |    |
| Birýýlyk frankeniya    |               | oty                   | oty                   | oty                   |                       |                       |                |                |    |
| Buassýeniň armydy      |               |                       |                       |                       |                       | miwesi, tohumy        | miwesi, tohumy | miwesi, tohumy |    |
| Bungeniň porsykerti    |               |                       | oty, yapragy          | oty, yapragy          |                       |                       |                |                |    |
| Bungeniň ýylgyny       | gabygy        |                       | yapragy, gülleri      | yapragy, gülleri      | yapragy, gülleri      |                       |                |                |    |
| Burçly gülhatma        | köki, porrugy |                       |                       |                       |                       |                       | köki, porrugy  |                |    |
| Büdür-südür akargül    | porrugy       |                       |                       |                       |                       |                       | porrugy        |                |    |
| Çal galgan             | köki          | oty, yapragy, gülleri | oty, yapragy, gülleri | oty, yapragy          | oty, yapragy miwesi   | oty, yapragy miwesi   | köki           |                |    |
| Çala tüylüje peçek     | köki          |                       | oty, gülleri          | oty, gülleri          | tohumy                | tohumy                | köki           |                |    |
| Çopandag aýgüli        |               |                       |                       |                       | oty                   |                       |                |                |    |



| 1                           | 2                   | 3                          | 4                          | 5               | 6        | 7                   | 8                   | 9      | 10     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| Dänelije                    |                     |                            | oty                        | oty             | oty      |                     |                     |        |        |
| Dogry siella                | köki                |                            |                            | ýapragy         | ýapragy  |                     | köki                |        |        |
| Dörtiň rindera              |                     | oty                        |                            |                 |          |                     |                     |        |        |
| Dürli reňkli porsykert      |                     | oty,<br>ýapragy            | oty,<br>ýapragy            |                 |          |                     |                     |        |        |
| Eýran gyzylagajy            | gabygy              |                            |                            |                 |          |                     | miwesi              |        |        |
| Eýran peçegi                | köki                |                            | oty,<br>gülleri            | oty,<br>gülleri | tohumy   | tohumy              | köki                |        |        |
| Eýran üçgaty                |                     |                            | ýapragy                    | ýapragy         |          | miwesi              | miwesi              |        |        |
| Galyň ýaprakly<br>garatiken | gabygy              |                            |                            |                 |          |                     | miwesi              | miwesi | miwesi |
| Garadennan                  | köki                | oty                        | oty                        |                 |          |                     | köki                |        |        |
| Gelşikli eşekselme          |                     |                            | oty                        | oty             | oty      |                     | tohumy              | tohumy |        |
| Gögümtül dänegerçek         |                     |                            |                            |                 |          | ýapragy,<br>gülleri | ýapragy,<br>gülleri | miwesi | miwesi |
| Gögümtül jigergül           |                     |                            | oty,<br>ýapragy            |                 |          |                     |                     |        |        |
| Grck gyzylagajy             | gabygy              |                            |                            |                 |          |                     | miwesi              |        |        |
| Gruziýa narpyzagy           |                     | oty                        | oty                        |                 |          |                     |                     |        |        |
| Gugunň çigildemi            | soganlygy           | gülleri                    | gülleri                    |                 |          |                     |                     |        |        |
| Gülyanly üçgat              | şahasynyň<br>gabygy | şahasynyň<br>gabygy        |                            |                 | miwesi   | miwesi              | miwesi              |        |        |
| Gündogar zozimasy           | oty,<br>gülleri     | oty,<br>gülleri,<br>miwesi | oty,<br>gülleri,<br>miwesi |                 |          |                     |                     |        |        |
| Gyrgy ýaprak saryjaot       |                     |                            |                            | oty,<br>gülleri |          |                     |                     |        |        |
| Gyrymsy hemeşe              |                     | şahasy,<br>ýapragy         | şahasy,<br>ýapragy         |                 |          |                     |                     | miwesi |        |
| Gültagt                     | köki                |                            | oty                        | oty,<br>tohumy  | tohumy   |                     | köki                |        |        |
| Hazar akargülü              | köki                |                            |                            | ýapragy, güli   | ýapragy, | ýapragy, güli       | köki                |        |        |



| 1                    | 2                                          | 3                   | 4                         | 5                          | 6                     | 7                 | 8                              | 9      | 10               |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------|------------------|
| Iberiýa daşkekresi   | köki                                       |                     | oty,<br>ýapragy           | toplumy<br>oty,<br>ýapragy | gül toplumy<br>miwesi | toplumy<br>miwesi | köki                           |        |                  |
| Iberiýa zirki        | köki                                       | ýapragy             | oty,<br>gülleri           |                            | miwesi                |                   | köki                           |        |                  |
| Iliniň daşkekresi    |                                            |                     | oty,<br>gülleri           |                            |                       |                   |                                |        |                  |
| Inşejik keyigot      |                                            | oty                 | oty                       | oty                        | miwesi                |                   |                                |        |                  |
| Irio kertikli        | oty                                        | oty                 | oty,<br>tohumy            | tohumy                     |                       |                   |                                |        |                  |
| Iri ýaprakly akargül | köki,<br>porrugy                           |                     | yapragy,<br>gül sebelleri | yapragy,<br>gül sebelleri  |                       |                   | köki,<br>porrugy               |        | köki,<br>porrugy |
| Iri ýaprakly ýylgay  | köki,<br>agajynyň<br>gabygy,<br>pyntyklary | yapragy,<br>gülleri | yapragy,<br>gülleri       | yapragy,<br>gülleri        |                       |                   | köki,<br>pyntyklary,<br>miwesi | miwesi |                  |
| Jungar goturoty      | köki                                       |                     |                           | oty                        |                       |                   | köki                           |        |                  |
| Žetaryň jügergüli    |                                            |                     | oty                       | oty                        |                       |                   |                                |        |                  |
| Kelle köki akargül   | köki                                       |                     |                           | yapragy, gül<br>toplumy    |                       |                   | köki                           |        |                  |
| Kenarot              |                                            | oty                 | oty                       |                            |                       |                   |                                |        |                  |
| Kenepli çerbiye      | köki,<br>porrugy                           |                     |                           |                            |                       |                   | köki,<br>porrugy               |        |                  |
| Kiçi matyrsak        |                                            | yapragy,<br>gülleri |                           |                            |                       |                   |                                |        |                  |
| Kiçjik zibera        |                                            | oty                 |                           |                            |                       |                   |                                |        |                  |
| Komarowyň aktikent   |                                            | oty                 | oty                       | oty                        |                       |                   |                                |        |                  |
| Komarowyň melegi     | köki                                       |                     | yapragy                   | yapragy                    | ýapragy               |                   | köki                           |        |                  |
| Kölegeli pakyr       | köki                                       |                     |                           | oty                        |                       |                   | köki                           |        |                  |
| Köpetdag bidenegi    |                                            |                     | oty                       |                            |                       |                   |                                |        |                  |
| Köpetdag büreljiesi  |                                            |                     |                           |                            |                       | oty               | oty                            |        |                  |

| 1                       | 2                  | 3                     | 4                         | 5                         | 6                         | 7      | 8             | 9 | 10 |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|---------------|---|----|
| Köpetağ çyrşy           | köki               | oty, gülleri          | oty, gülleri              | miwesi                    |                           |        | köki          |   |    |
| Köpetağ daşkekresi      |                    |                       | oty                       | oty                       |                           |        |               |   |    |
| Köpetağ gyzgany         |                    |                       | ýapragy                   | ýapragy                   | miwesi                    | miwesi | miwesi        |   |    |
| Köp şahaly ýylgyn       | gabygy             |                       | baldagy, ýapragy, gülleri | baldagy, ýapragy, gülleri | baldagy, ýapragy, gülleri |        |               |   |    |
| Köpetağ tümmüljesi      | köki               |                       |                           | oty                       | oty                       |        | köki          |   |    |
| Köpetağ üljesi          | gabygy             | ýapragy               | ýapragy                   | ýapragy                   |                           | miwesi | miwesi        |   |    |
| Litwinowyň anisi        | köki               |                       |                           | oty                       | oty, miwesi               | miwesi | köki          |   |    |
| Litwinowyň sümmüli      | soganlygy, gülleri | gülleri               |                           |                           |                           |        |               |   |    |
| Litwinowyň tuwulgaljasy | köki               | oty, ýapragy, gülleri | oty, ýapragy, gülleri     | oty, ýapragy, gülleri     |                           |        | köki          |   |    |
| Lýozeliň kertiklisi     |                    | oty                   | oty                       | tohumy                    |                           |        |               |   |    |
| Mamamçörek temenlik     |                    |                       | oty, ýapragy              | oty, ýapragy              |                           |        |               |   |    |
| Maymyn orhisi           | klubenköki         |                       |                           |                           |                           |        | klubenköki    |   |    |
| Meydan gyzzyrgyry       |                    |                       |                           | tohumy                    |                           |        |               |   |    |
| Meydan ýemişik          |                    |                       | oty                       | oty                       |                           |        |               |   |    |
| Meydan ýylançöpi        |                    | oty                   | oty, miwesi               | miwesi                    | tohumy                    |        |               |   |    |
| Meyeriň ýylgyny         |                    | ýapragy, gülleri      | ýapragy, gülleri, miwesi  | miwesi                    |                           |        |               |   |    |
| Nargyz                  | soganlygy          |                       |                           |                           |                           |        | gülleri       |   |    |
| Nikitiniň gülhatmasy    | köki, portugy      |                       | ýapragy, gülleri          | ýapragy, gülleri, miwesi  | ýapragy, gülleri          |        | köki, portugy |   |    |
| Owruk miweli ülje       | gabygy             |                       |                           | miwesi                    | miwesi                    |        |               |   |    |
| Owruk tohumly pakyr     | köki               |                       |                           |                           | miwesi                    |        | köki          |   |    |



| 1                         | 2              | 3                 | 4                             | 5                             | 6            | 7            | 8                  | 9      | 10     |
|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------|
| Pergül                    |                |                   | oty                           |                               |              |              |                    |        |        |
| Popowyň üpükljesi         | klubeni, oty   | oty               | oty                           |                               |              |              | klubeni            |        |        |
| Popowyň zygyrbaldagy      |                |                   | oty                           | oty                           |              |              |                    |        |        |
| Pürli atguýruk            |                | tomusky pudaklary | tomusky pudaklary             |                               |              |              |                    |        |        |
| Regeliň gerany            |                |                   |                               | oty, ýapragy                  | oty, ýapragy | oty, ýapragy |                    |        |        |
| Saglygoty                 | oty            | oty               |                               |                               |              |              | köki, portrugy     |        |        |
| Saýawanly psewdohandeliýa |                |                   | ýapragy, gülleri, gül toplumy | ýapragy, gülleri, gül toplumy |              |              |                    |        |        |
| Sibir aktikeni            |                |                   |                               |                               | miwesi       | miwesi       |                    |        |        |
| Sinhiloty                 |                |                   | oty, ýapragy                  | oty, ýapragy                  | tohumy       |              |                    |        |        |
| Sowdagan                  |                |                   | oty                           | oty                           |              |              |                    |        |        |
| Spirally gaýraç           | soganlygy      |                   |                               |                               |              | ýapragy      | ýapragy            |        |        |
| Süýri ýaprakly keyigot    |                |                   | oty, ýapragy, gülleri         | oty, ýapragy, gülleri         |              |              |                    |        |        |
| Şine ýaprakly seseli      | köki           |                   |                               |                               |              | oty          | köki, oty, miwesi  |        |        |
| Şöhleli daşekre           | köki           |                   | ýapragy, gülleri              | ýapragy, gülleri              |              |              | köki               |        |        |
| Tegelek ýaprakly geran    |                | oty, ýapragy      | oty, ýapragy                  |                               |              |              |                    |        |        |
| Tikenli bürmek            | köki           |                   |                               |                               | oty, ýapragy | oty, ýapragy | köki, oty, ýapragy | miwesi | miwesi |
| Tokay üzümi               |                |                   | ýapragy                       | ýapragy                       |              | miwesi       | miwesi             |        |        |
| Torly gülhatma            | köki, portrugy |                   |                               |                               |              |              | köki, portrugy     |        |        |

| 1                           | 2                | 3                  | 4                               | 5                               | 6                   | 7                   | 8                   | 9 | 10      |
|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
| Tumargül                    |                  |                    | oty                             | oty,<br>miwesi                  | miwesi              |                     |                     |   |         |
| Turan pyşdyloty             |                  | oty                | oty                             | oty                             |                     |                     |                     |   |         |
| Turneforyň kengary          |                  |                    | oty                             |                                 |                     |                     |                     |   |         |
| Türkmenleriň almasy         | gabygy           | ýapragy            | ýapragy                         |                                 |                     | miwesi              |                     |   |         |
| Türkmen armydy              |                  |                    |                                 |                                 | miwesi,<br>tohumy   | miwesi,<br>tohumy   |                     |   |         |
| Türkmen asperulasy          |                  |                    | baldagy,<br>ýapragy,<br>gülleri | baldagy,<br>ýapragy,<br>gülleri | tohumy              |                     |                     |   |         |
| Türkmen setmelegi           | köki,<br>ýapragy | ýapragy            | miwesi                          | miwesi                          | miwesi              |                     | köki                |   | ýapragy |
| Türkmen tilkiçäýy           |                  |                    | oty                             | oty                             |                     |                     |                     |   |         |
| Türkistan gusgonmazy        |                  |                    | ýapragy                         | ýapragy,<br>miwesi              | miwesi              | miwesi              |                     |   |         |
| Türkistan gyzylagajy        | gabygy           |                    |                                 |                                 |                     |                     | miwesi              |   |         |
| Tüylek asperula             | köki             |                    |                                 | oty,<br>ýapragy,<br>gül toplumy |                     |                     | köki                |   |         |
| Tüýli guşokara              | köki             |                    |                                 | oty,<br>ýapragy,<br>gültoplumy  |                     |                     | köki                |   |         |
| Tüýli handeliýa             |                  |                    | oty,<br>gülleri                 |                                 |                     |                     |                     |   |         |
| Tüylek ýylgyn               |                  |                    |                                 |                                 | ýapragy,<br>gülleri | ýapragy,<br>gülleri | ýapragy,<br>gülleri |   |         |
| Tegelek ýaprakly<br>deregül |                  | ýapragy,<br>şiresi | ýapragy,<br>şiresi              |                                 |                     |                     |                     |   |         |
| Uly ammi                    |                  |                    |                                 | oty                             | oty                 | oty,<br>miwesi      | miwesi              |   |         |
| Uzyn möjegäýäk              |                  |                    |                                 | oty,<br>ýapragy                 | oty,<br>ýapragy     |                     |                     |   |         |
| Ülen görnüşli ýersakgyç     | köki             |                    |                                 |                                 | ýapragy             | ýapragy             | köki                |   |         |



| 1                   | 2                        | 3                | 4                         | 5                         | 6      | 7      | 8 | 9      | 10 |
|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|--------|--------|---|--------|----|
| Wawilowyň sogany    | soganlygy                |                  |                           |                           |        | tohumy |   |        |    |
| Yabany süýtleňňiç   |                          |                  | oty                       | oty                       | oty    | oty    |   | tohumy |    |
| Yalan murt          |                          |                  | oty                       | oty                       |        |        |   |        |    |
| Yýraň geran         |                          | oty              | oty                       |                           |        |        |   |        |    |
| Yemşijek            | oty                      | oty              |                           |                           |        |        |   |        |    |
| Yepbeşik daşkekre   |                          |                  | oty, gülleri              | oty, gülleri              |        |        |   |        |    |
| Yumşak ýylgyn       | gabygy, ýapragy, gülleri | ýapragy, gülleri |                           |                           |        |        |   |        |    |
| Yylançöp            |                          | oty              | oty, miwesi               | miwesi                    | miwesi |        |   |        |    |
| Zakaspiý sümmüli    | soganlygy, gülleri       | gülleri          |                           |                           |        |        |   |        |    |
| Zylçaly towşandodak |                          |                  | baldagy, ýapragy, gülleri | baldagy, ýapragy, gülleri |        |        |   |        |    |

1. Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda saglygy goraýşy ösdürmegiň ylmy esaslary. – Aşgabat, 2007. 96 s.

2. Abu Aly ibn Sina. Lukmançylyk ylmyň kanunlary. – Aşgabat, 2004.

3. Akmyradow A. Badrakema çomujynyň biologiki aýratynlyklary we hojalyk ähmiýeti //Bilim, 2011, №4. S. 78–81.

4. Akmyradow A. Bathyzyň käbir efemeroidleriniň tebigy dermanlyk çig mallarynyň resurslary // Türkmenistanyň lukmançylygy, № 3, 2011. S. 33–38.

5. Akmyradow A., Rustamow I.G. Bathyz efemeroidleriniň mediko-biologiki aýratynlyklary we ähmiýeti // Türkmenistanda saglyk problemasyny formirlemegiň mediki-biologiki we sosial aspektleri (Ylmy işleriň ýygındysy). – Aşgabat, 1995. S. 166–168.

6. Akmyradow A.A. Çopandag aýgüli (Ýelmeşek) // Türkmenistanyň Gyzyl kitabý. T:1. Ösümlikler we kömelekler. Gaýtadan işlenen we üsti ýetirilen 3-nji neşir. – Aşgabat, 2011. – S. 82–83.

7. Akmyradow A. Derman otlar. – Aşgabat: Türkmenistan, 1993. 143 s.

8. Akmyradow A. Haşal derman ösümlikler // Türkmenistanyň halk magaryfy, 1992, № 1. S. 26–30.

9. Akmyradow A. Köpetdagyň we Köýtendagyň halk lukmançylygynda peýdalanylýan pteridoflorasy //Türkmen ylmy galkynyş we halkara gatnaşyklar ýolunda (Ylmy makalalar ýygındysy – 2011-1). – Aşgabat: Ylym, 2011. S. 761–768.

10. Akmyradow A., Gurbanmämmadowa G. Köpetdag goraghanasynyň seýrek we ýitip baryan dermanlyk ösümlikleri //Türkmenistanyň lukmançylygy, № 4, 2011. S. 35–40.

11. Akmyradow A. Lälezar melhemlikler //Saglyk, №3, 2011.

12. Akmyradow A. Mähriğöýä syryny açýar... //Saglyk, №2, 2011.

13. Akmyradow A. Nar //Saglyk, №6, 2011.

14. Akmyradow A. Tenekar gadymy daragtlar //Saglyk, №4, 2011.

15. Akmyradow A. Türkmenistanyň florasyndaky käbir dermanlyk we hoşboý ysly ösümlikleri öwrenmeklik dogrusynda //Professor-mugallymlar düzüminiň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününüň 10-ýyllygyna we TDMI-niň 70 ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly Maslahatyndaky

çykyşlaryň gysgaça beýanlarynyň ýygındysy. – Aşgabat, 2001. S. 385–386.

16. Akmyradow A. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde dermanlyk we hoşboý-tagam beriji ösümlikleri öwrenmeklik dogrusynda //Ruhnama we bilim. – Türkmenabat, 2001.S. 161–163.

17. Akmyradow A., Gurbanmämmadowa G. Şypaly türkmen armydy //Saglyk, №1, 2010.

18. Akmyradow A. Üzüň – jenneti iýmiş //Saglyk, №5, 2011.

19. Akmyradow A. Ylmy we halk lukmançylygynda peýdalanylýan, Merkezi Köpetdagyň dermanlyk florasynyň sanawy //Türkmenistanyň lukmançylygy, № 2, 2011. S. 36–40.

20. Akyýewa M. Türkmenistanyň peýdaly ösümlikleri. – Aşgabat: Türkmenistan, 1980. 48 s.

21. Ataýew G. Tebigy dermanhana. – Aşgabat: Magaryf, 1993. 40 s.

22. Ataýew G. Türkmenistanyň tebigy derman otlary. – Aşgabat: Türkmenistan, 1998. 44 s.

23. Gurbanmämmadowa G., Akmyradow A. Melhem badamlar //Saglyk, №3, 2010.

24. Gurbanmämmadowa G., Akmyradow A. Merkezi Köpetdagyň dendroflorasynyň ekologiki ähmiýeti we konspekti //«Türkmenistanyň beýik Galkynyş zamanasy we saglygy goraýşy ulgamyndaky özgerişler – 2010» atly halkara ylmy maslahatynyň nutuklarynyň ýygındysy. – Aşgabat, 2010. S. 177–184.

25. Gurbanmämmadowa G.M., Akmyradow A.A. Merkezi Köpetdagyň käbir ösümlikleriniň çig mallyk resurslary //«Täze Galkynyş eýýamynyň ylmy we bilimi dünýäniň ylym-bilim ulgamynda» halkara ylmy maslahatynyň nutuklarynyň gysgaça beýany. – Aşgabat, 2009. S. 514–517.

26. Gurbanmämmadowa G., Akmyradow A. Tenekar türkmen almasy //Saglyk, №5, 2009.

27. Seýit Ysmayyl Jürjany. Tebipçiligiň ýan kitabý. – Aşgabat, 1995. 279 s.

28. Türkmenistanyň ilatynyň saglygyny goramakda ulanylýan esasy derman serişdeleriniň milli formulýary. – Aşgabat, 2011. 540 s.

29. Аббасов Р.М. Биохимическое изучение полыней Азербайджана: Автореф. дисс... канд. биол. наук. – Баку, 1965. 28 с.

30. Абдуллаев А.Д. Антибиотические свойства растений Ташкентского оазиса: Автореф. дисс... канд. биол. наук. – Ташкент, 1953. 18 с.



31. Абрамова С.Н. Биологические особенности перспективных сортов тюльпанов и ирисов // Интродукция и экология растений. — Ашхабад: Ылым, 1983. Вып. 8. С. 3–17.
32. Абрамова С.Н. Тюльпаны. — Ашхабад: Ылым, 1976. 65 с.
33. Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. Кн. 2. О простых лекарствах. — Ташкент, АН УзССР, 1956–1966.
34. Абу Райхан Беруни. Избранные произведения. Т. IV (фармакогнозия в медицине). — Ташкент, Фан, 1973. 1120 с.
35. Агафонов А.Д., Андрист Б.В. Организация заготовок дикорастущих плодов, ягод, грибов и лекарственных трав. — М.: Колос, 1975.
36. Айзиков М.И. Антиатеросклеротическая активность некоторых ротеноидов, терпеноидов и проантоцианидинов из флоры Средней Азии: Автореф. дисс. ... докт. медиц. наук. — Ташкент, 1993. 31 с.
37. Акмурадов А.А. Смолёвка чопандагская // Красная книга Туркменистана. Т.1: Растения и грибы. Изд. 3-е, переработанное и дополненное. — Ашхабад, 2011. — С. 82–83.
38. Акмурадов А.А. Состояние редких и исчезающих видов растений Копетдагского государственного заповедника. //Материалы научно-практической конференции, посвященной 75-летию Хазарского государственного заповедника. Ашхабад–Туркменбаши, 2008.
39. Акмурадов А. Список лекарственной флоры Центрального Копетдага, применяемой в научной и народной медицине //Türkmenistanyň lukmançylygy, № 2, 2011. С. 36–40.
40. Акмурадов А. Ресурсы природного лекарственного сырья некоторых эфемероидов Бадхыза // Türkmenistanyň lukmançylygy, № 3, 2011. С. 35–38.
41. Акмурадов А.А. Численность и состояние лука Вавилова в ущельях Даштой и Арчабиль //Природа Туркменистана в эпоху Великого Возрождения и новых преобразований. — Ашхабад: Ылым, 2008. С. 170–171.
42. Акмурадов А.А., Курбанмамедова Г.М. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения сосудистые растения Центрального Копетдага // Пробл. осв. пустынь, № 3–4, 2009. — Ашхабад. С. 52–56.
43. Акмурадов А., Рахманов О., Курбанназарова Г., Чарыев Х. Лекарственные ресурсы плодово-ягодных и орехоплодных Центрального Копетдага // Сборник тезисов Международной научной конференции «Эпоха великого Возрождения Туркменистана и достижения в здравоохранении — 2010» — Ашхабад, 2010. — Ашхабад, 2010. С. 533–536.
44. Акопов И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение. — Ташкент, 1986. 557 с.
45. Акопов И.Э. Кровоостанавливающие растения. — Ташкент: Медицина УзССР, 1981. 296 с.
46. Аксенова Н.А. Клены. М., 1975. 96 с.
47. Алексеев Б.Д. Важнейшие дикорастущие полезные растения Дагестана. — Махачкала, 1967. 141 с.
48. Алексеев Б.Д. Распространение видов *Juniperus* L. в Дагестане и их химический состав // Растительные ресурсы. — 1980. Т. 16, вып. 2. С. 219–224.
49. Алексеев Г.А., Якимов З.П. Лекарственные растения на территории Чувашии. — Чебоксары, 1975. 229 с.
50. Алексеев Е.Б., Губанов И.А., Тихомиров В.Н. Ботаническая номенклатура. — М.: Изд-во МГУ, 1989. 168 с.
51. Алиев Р.К. и др. Лекарственные растения Азербайджана. — Баку, 1972. 196 с.
52. Алиев Р.К., Применко Л.И., Дамиров И.А. Перспективы использования местных растительных ресурсов для производства лекарственных препаратов в Азербайджане. — Баку, 1961. 227 с.
53. Алимбаева П.К. и др. Лекарства вокруг нас. — Фрунзе, 1987. 135 с.
54. Алимбаева П.К., Гончарова А.В. Дикорастущие лекарственные растения Киргизии. — Фрунзе, 1971. 99 с.
55. Алтымышев А.А. Лекарственные богатства Киргизии (природного происхождения). Фрунзе, 1976.
56. Алтымышев А.А. Природные целебные средства. — Бишкек, 1991. 351 с.
57. Алюкина Л.С. Эфедра — как дубильное растение //Изв. АН КазССР. Сер. биол. наук. — 1955. Вып. 9. С. 55–64.
58. Андросов Н.В. Пряно-пищевые, травянистые, дикие растения Туркмении //Тр. ТФАН СССР. — Ашхабад, 1942, № 2.
59. Анненков Н. Ботанический словарь. Справочная книга для ботаников, сельских хозяев, садоводов, фармацевтов, врачей, путешественников в России и вообще сельских жителей. — СПб., 1878. 645 с.
60. Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР. — Л., 1983. 208 с.

61. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): Кн. 1. — М.: Агропромиздат, 1989. 383 с.
62. Асеева Т.А. и др. Лекарствоведение в тибетской медицине /Т.А. Асеева, Д.Б. Дашиев, А.Н. Кудрин, Е.Л. Толмачева, Н.Н. Федотовских, И.С. Хапкин. — Новосибирск, 1989. 192 с.
63. Астафьева Н.Г., Адо В.А., Горячкина Л.А. Растения и аллергия. — Саратов, 1986. 336 с.
64. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. — М.: Медицина, 1983.
65. Атлас лекарственных растений СССР. — М., 1962. 703 с.
66. Ахмедов Р.Б. Избранные рецепты из копилки опытных травников и знахарей. — Уфа, 1991. 32 с.
67. Ахмедов Р.Б. В растениях — целебная сила: Из копилки народных врачей. Т. 1. — М., 1992. 106 с.
68. Аширова А.А. Лекарственные растения флоры Туркмении, применяемые в народной медицине. — Ашгабат: Магарыф, 1992. 240 с.
69. Бажецкая А.А., Алымбаева Г.Ш. Полезные растения Киргизии (лекарственные). — Фрунзе, 1983. 123 с.
70. Базанов Г.А., Богомоллов Р.Г. Целебная флора Верхней Волги. — Тверь, 1990. 136 с.
71. Базнов Г.А. и др. Волшебство трав в народной косметике. — М., 1991. 44 с.
72. Балицкий К.П., Воронцова А.Л. Лекарственные растения и рак. — Киев, 1982. 375 с.
73. Батарчук И.Н., Дзыбов В.И. Лекарственные растения Адыгеи, или 1500 советов исцеления. — Майкоп, 1992. 233 с.
74. Бгажба М.Т. Растительные ресурсы Абхазии и их использование. — Сухуми, 1964. 578 с.
75. Белинская Н.К. Дикие виды винограда и их использование //Вестн. с-х. науки Казахстана. 1983. №10. С. 61–63.
76. Белоусова Л.С., Денисова Л.В. Редкие растения мира. — М.: Лесная промышленность, 1983.
77. Беляева В.А. Пряниковые растения, их свойства и применение. — М., 1946. 108 с.
78. Бендер К.И., Гоменюк Г.А., Фрейдман С.Л. Указатель к применению лекарственных растений в научной и народной медицине. — Саратов, 1988. 110 с.
79. Берсон Г.З. Дикорастущие съедобные растения. — Л., 1991. 72 с.
80. Биленко Н., Сахтырьек З., Семенов М. Народная медицина Адыгеи // Народная медицина — прошлое, настоящее, будущее. — М., 1993. С. 6–7.
81. Блинков И.Л. Лекарственные растения в клинике. — М., 1983. 61 с.
82. Блиновский К.В. *Sorbus L.* — Рябина //Флора Туркмении. Ашхабад: Изд-во ТФАН СССР, 1949. Т. 4. С. 35–37.
83. Борисенко С.М. Сибирский траволечебник. — Иркутск, 1992. 150 с.
84. Бочанцев В.П., Камелин Р.В., Горелова Т.Г. Сосудистые растения Батхызского заповедника (оперативно-информационный материал). — М., 1990. 56 с.
85. Быкова О.П. Биологические особенности некоторых представителей шток-розы (*Alcea L.*) в связи с их использованием: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. — Л., 1990. 24 с.
86. Вандышева В.И. и др. Лекарственные растения Киргизии и перспективы их использования. — Фрунзе, 1977. 66 с.
87. Ваниорек Л. Ароматерапия. — М.: Интерэкспорт, 1995.
88. Васильченко И.Т. Новые для культуры виды яблони. М.; Л., 1963.
89. Ваша домашняя аптека /Сост. С.П. Кожан. — Петропавловск-Камчатский, 1990. 127 с.
90. Виноградов А.С. Список лекарственных растений, применяемых в народной медицине Средней Азии //Тр. ТГМИ, т. 4. — 1950. С. 338–347.
91. Виноградов Б.В. Растительные индикаторы и их использование при изучении природных ресурсов. — М., 1964. 184 с.
92. Виноградов В.М., Мартынов В.К., Чернакова В.В. Лекарственные растения в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. — Л., 1991. 142 с.
93. Волкинд И.В., Гуревич И.Я., Урюпов О.Ю. Рецептурный справочник для врачей и фармацевтов. — Л., 1976. 648 с.
94. Востоков В. Секреты целителей Востока. — Ташкент: Узбекистан, 1993.
95. Вострикова Г.Г. Древесные растения в народной медицине аборигенов Приамурья //Тезисы докладов 29-й науч. юбил. сессии /Хабаровск. мед. ин-т. — Хабаровск, 1972. С. 265–266.
96. Вульф Е.В., Малеева О.Ф. Мировые ресурсы полезных растений. — Л., 1969.



97. Габриэлян Э.Ц. Рябины (*Sorbus L.*) Западной Азии и Гималаев. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1978. 170 с.
98. Гаммерман А.Ф. Обзор лекарственных растений Туркмении //Тр. ФАН СССР, 1942, вып. 2. С. 55–92.
99. Гаммерман А.Ф. и др. Лекарственные растения научной медицины СССР, не включенные в фармакопею. – Ашхабад: Ылым, 1970. 187 с.
100. Гаммерман А.Ф., Гром И.И. Дикорастущие растения СССР. – М., 1976. 286 с.
101. Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Яценко-Хмелевский А.А. Лекарственные растения (растения-целители). – М.: Высшая школа, 1983. 400 с.
102. Гаммерман А.Ф., Шупинская М.Д., Яценко-Хмелевский А.А. Растения целители. – М., 1963.
103. Гейдеман Т.С. и др. Полезные дикорастущие растения Молдавии // Т.С. Гейдеман, Б.И. Иванова, С.И. Ляликов, Л.П. Николаева, Л.П. Пожариская, Б.Г. Холодейко, Т.А. Школьников, Д.А. Шутов и др. – Кишинев, 1962. 416 с.
104. Гелбахиани П.Г. Лекарственные богатства Грузии. – Тбилиси, 1961. 78 с.
105. Георгиевский В.П., Комиссаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е. Биологически активные вещества лекарственных растений. – Новосибирск, 1990. 333 с.
106. Герман Э.В., Катин И.А. Растение и наше здоровье. – Алма-Ата, 1987. 224 с.
107. Гиллер А.Г. Полезные растения. – М., 1936. 143 с.
108. Гиппократ. Избранные книги. Пер. с греч. проф. В.И. Руднева. – М., 1936.
109. Гладышев А.И., Камахина Г.Л. Природные растительные ресурсы горной Туркмении и их рациональное использование //Изв. АН ТССР. Сер. биол. наук. – 1991, № 2. С. 3–8.
110. Глухов М.М. Медоносные растения. Изд. 7-е, перераб. и доп. М., «Колос», 1974. 304 с.
111. Головкин Д.Н., Рожко Ф.М. Сбор, сушка, хранение и упаковка лекарственного сырья. – М., 1950.
112. Головкин Б.Н., Китаева Л.А., Нетченко Э.П. Декоративные растения СССР. – М.: Мысль, 1986. 320 с.
113. Голышенков П.П. Лекарственные растения и их использование. – Саранск, 1982. 312 с.
114. Городецкий В.Д. Пособие по дендрологии для Средней Азии. – М.; Ташкент, 1934. 323 с.
115. Горяев М.И. Эфирные масла флоры СССР. – Алма-Ата, 1952. 378 с.
116. Государственная фармакопея СССР. Изд. 11, вып. 2. – М.: Медицина, 1990. 400 с.
117. Гринкевич Н.И., Сорокина А.А. Легенды и были о лекарственных растениях. – М., 1988.
118. Губанов А.И., Патудин А.В., Рабинович А.М. Лекарственные растения и грибы, используемые в гомеопатии. Краткий справочник. – М.: Гомеопатический центр, 1995.
119. Губанов И.А., Боцманова М.С. Лекарственные растения Киргизии. – Фрунзе, Киргизиздат, 1968.
120. Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С. Дикорастущие полезные растения. – М., 1987. 159 с.
121. Губанов И.А., Крылова И.Л. Дикорастущие полезные растения СССР. – М., 1976. 360 с.
122. Губанов И.А., Либизов Н.И. Лекарственные и технические растения Афганистана //Растительные ресурсы, 1970. Т. 6, вып. 1. – С. 128–137.
123. Гумаров В.З. Башкирская народная медицина. – Уфа, 1985. 144 с.
124. Дадобаева О. Словарь научных и местных названий лекарственных растений Северного Таджикистана. – Душанбе, 1972. 130 с.
125. Дадобаева О.Д. Лекарственные растения Северного Таджикистана: Автореф. дисс... канд. биол. наук. – Душанбе, 1967. 18 с.
126. Дамиров И.А. Лекарственные растения Азербайджана. – Баку, 2005. 24 с.
127. Дамиров И.А. и др. Лекарственные растения Азербайджана / И.А. Дамиров, Л.И. Прилипко, Д.З. Шукюров, Ю.Б. Керимов. 3-е изд. – Баку, 1988. 319 с.
128. Данилевский Н.Ф., Зинченко Т.В., Кодола Н.А. Фитотерапия в стоматологии. – Киев, 1984. 182 с.
129. Дикорастущие полезные растения России. – Санкт-Петербург, 2004.
130. Дикорастущие растения и грибы в медицине и кулинарии / Под. ред. Э.А. Нечаева. – М., 1994.
131. Доброхотова К.В., Чудинов В.В. Лекарственные растения Казахстана. – Алма-Ата, 1961. 120 с.
132. Донцов А.А. и др. Запасы дикорастущих лекарственных растений в юго-восточных районах Свердловской области //Растительные ресурсы, 1984. Т. 20, вып. 2. – С. 177–182.
133. Дубянский В.А. Исследование лекарственной флоры Закаспийской области. – СПб., 1917.
134. Дубянский В.А. Отчёт об исследовании Закаспийской области в отношении лекарственных и технических растений. – Пгр., 1918. 74 с.



135. Дудченко Л.Г., Козьяков А.С., Кривенко В.В. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения. — Киев, 1989. 304 с.
136. Дьяченко В., Стацевич М. Соки растений и их фармакотерапевтическое действие. — М., 1992. 63 с.
137. Егорова Т.В. О работе и решениях номенклатурной секции XVI Международного ботанического конгресса (Сент-Луис, июль–август 1999 г.) // Ботанический журнал, 2000. Т. 85, № 5. С. 138–147.
138. Егошина Т.Л. Запасы сырья и ресурсная характеристика некоторых лекарственных растений в северо-восточных районах Кировской области // Растительные ресурсы, 1989. Т. 25, вып. 2. — С. 173–180.
139. Епанчинов А.В. Лекарственные растения Урала и Зауралья. — М., 1990. 191 с.
140. Ефимов А.С., Щербак А.В. Фитотерапия ожирения и сахарного диабета. — Киев, 1993. 96 с.
141. Ефремова Н.А. Заветные травы: Дикорастущие и культивируемые растения северо-восточной части России и их лечебные свойства. Петропавловск-Камчатский, 1992. 240 с.
142. Жигар М.П., Николайчук Л.В. Мир целебных корней. — Минск: Урджай, 1991.
143. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. — Л.: Колос, 1964.
144. Залиевский И.Л. Декоративные кустарники. Л., 1956.
145. Захаров Ю.А. Фитокосметика: Рецепты, дарующие молодость, здоровье и красоту. — М.: Яуза; ЭКСМО-Пресс, 1999.
146. Землинский С.Е. Лекарственные растения СССР. — М.: Медгиз, 1958. 603 с.
147. Золотницкая С.Я. Лекарственные ресурсы флоры Армении, т. 1–2. — Ереван, 1957, 1965.
148. Ибрагимов Ф.И., Ибрагимова В.С. Основные лекарственные средства китайской медицины. — М., 1960.
149. Иванов В.А. Из мудрости веков (Народные рецепты, в том числе о радиации). — СПб., 1993. 92 с.
150. Иванов В.И. Тайны народной медицины. — М.: Олма-Пресс, 2000.
151. Иванов С.И. Рецепты природы // Применение лекарственных растений (в 2 книгах). — СПб., 1992, книга 1. 347 с.
152. Иванова Р.Г. Дикорастущие съедобные растения Татарии. — Казань, 1987. 199 с.
153. Иванченко В.А. Основные растения в медицине народов Востока. — Ашхабад: Туркменистан, 1985. 112 с.
154. Исаков Ш.И. К употреблению лекарственных растений в народной медицине Иссык-Кульской долины // Сов. здравоохранение Киргизии. — 1964, № 3. С. 3–6.
155. Исаков Ш.И. Материалы к изучению лекарственных растений, применявшихся киргизским народом: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. — Ашхабад, 1969. 29 с.
156. Камахина Г.Л. Флора и растительность Центрального Колетдага (настоящее, прошлое и будущее). — Ашхабад, 2005. 245 с.
157. Камелин Р.В. Розоцветные (Rosaceae). — Барнаул: Алтайские страницы, 2006. — 100 с.
158. Капранов В., Хашим Р. Мудрость веков (Древняя таджикская медицина о сохранении здоровья). — Душанбе: Ирфон, 1981. 216 с.
159. Каррыев М.О. Лекарственные растения Туркменистана в научной и народной медицине. — Ашхабад, 1988.
160. Каррыев М.О. Лекарственные растения Туркменистана. — Ашхабад, 1996.
161. Каррыев М.О. Фармакохимия некоторых эфирномасличных растений флоры Туркмении. — Ашхабад: Ылым, 1973. 152 с.
162. Картамбаев Дж. Эфедры Киргизии и вопросы их охраны. — Фрунзе, 1980. 15 с.
163. Катц К.В. Декоративные кустарники. М., 1959.
164. Кербабаяев Б.Б. Народные и научные туркменские названия растений. — Ашгабат: Ылым, 1992. 192 с.
165. Кербабаяев Б.Б., Мещеряков А.А. Лекарственные растения Туркмении. — Ашхабад: Ылым, 1975.
166. Кернер Э. Жизнь растений. Том II. — СПб, 1908.
167. Киселева А.В. Травяной чай: теория и практика // Химия и жизнь, № 3, 2002. — Москва. С. 46–47.
168. Киселева Т.М., Шабалина И.А. Запасы сырья лекарственных растений в западных и центральных районах Кировской области // Растительные ресурсы, 1986. Т. 22, вып. 1. — С. 45–49.
169. Кит С.М. и др. Распространение и запасы некоторых дикорастущих лекарственных растений Ивано-Франковской области // Растительные ресурсы, 1982. Т. 18, вып. 1. — С. 24–29.
170. Кит С.М., Турчин И.С. Лекарственные растения в эндокринологии. — Киев, 1986. 80 с.



171. Кондратенко Н.Т., Кур С.Д., Рожко Ф.М. Заготовка, выращивание и обработка лекарственных растений. — М., 1965.
172. Кореньюк С.В., Томенко С.М. Чудеса натуротерапии. — СПб.: Комплект, 1997.
173. Корсун В.Ф., Клинецвич Н.Н., Волчкевич А.Ф. Лекарственные растения в дерматологии. — Минск, 1991. 40 с.
174. Корхов В.В., Мац М.Н., Хамидов М.Х. Растительные препараты в акушерстве и гинекологии. — Ташкент, 1987. 127 с.
175. Кос Ю.И. Лекарственные растения Кабардино-Балкарии. — Нальчик, 1963. 136 с.
176. Кочкарева Т.Ф., Чукавина А.П. Дикорастущие пищевые растения Ховалингского района (Центральный Таджикистан) //Растительные ресурсы, 1985. Т. 21, вып. 2. — С. 140–149.
177. Кощеев А.К. Дикорастущие съедобные растения в нашем питании. — М., 1981. 255 с.
178. Красилов С.П. Легенды о цветах. — М.: Мол. гвардия, 1990. 303 с.
179. Красная книга Туркменистана. — Ашхабад: Туркменистан, т. 1: Растения и грибы. 2011. 288 с.
180. Красная книга Туркменистана. — Ашхабад: Туркменистан, т. 2, 1999. 263 с.
181. Красная книга Туркменской ССР. — Ашхабад: Туркменистан, 1985. 413 с.
182. Кузнецова М.А. Лекарственное растительное сырье. — М.: Высшая школа, 1984.
183. Кукунов М.К. Ботаническое ресурсосведение Казахстана. — Алматы, 1999.
184. Кукунов М.К. Эфирномасличные растения Казахстана и их рациональное использование. — Алма-Ата, 1990. 143 с.
185. Кукунов М.К. и др. Лекарственные растения Казахстана. — Алматы, 1996.
186. Курамысова И.И., Аксенова В.Ф., Татимова Н.Г. Лекарственные растения: Заготовка, хранение, переработка, применение. Изд. 3-е. — Алма-Ата, 1988. 304 с.
187. Курбанмамедова Г.М., Акмурадов А.А. Дикие плодовые дендрофлоры Копетдагского государственного заповедника //Природа Туркменистана в эпоху Великого Возрождения и новых преобразований. — Ашхабад: Ылым, 2008. С. 239–241.
188. Курбанмамедова Г.М., Акмурадов А.А. Дикорастущая груша туркменская в Центральном Копетдаге //Пробл. осв. пустынь, № 4, 2008. — Ашхабад. С. 31–33.
189. Курбанмамедова Г.М., Акмурадов А.А. Дикорастущая яблоня в Центральном Копетдаге // Пробл. осв. пустынь, № 1–2, 2009. — Ашхабад. С. 68–70.
190. Курбанмамедова Г.М., Акмурадов А.А. Конспект и экологическое значение лекарственной дендрофлоры Центрального Копетдага //Сборник тезисов Международной научной конференции «Эпоха великого Возрождения Туркменистана и достижения в здравоохранении — 2010» — Ашхабад, 2010. С. 525–533.
191. Курбанмамедова Г.М., Акмурадов А.А. Популяция рябины персидской в Центральном Копетдаге //Пробл. осв. пустынь, № 3, 2008. — Ашхабад. С. 43–45.
192. Курбанов Д. Анализ флоры Северо-Западного Копетдага. — Ашхабад: Ылым, 1992.
193. Курбанов Д.К., Власенко Г.П., Сахатова М.О. Важные сырьевые растения Большого Балхана //Пробл. осв. пустынь, № 1–2, 2009. — Ашхабад. С. 38–43.
194. Курбанов Дж. Конспект флоры западных низкогорий и среднегорий Копетдага (Северо-Западный Копетдаг и другие низкогорья Западной Туркмении). — Ашхабад: Ылым, 1988. 260 с.
195. Курбанов Дж., Власенко Г.П. Дикорастущие полезные растения Туркменистана //Пробл. осв. пустынь, № 2, 2006. — Ашхабад. С. 9–12.
196. Курбанов Дж., Власенко Г.П. Семейство молочайных во флоре Туркменистана //Пробл. осв. пустынь, № 2, 2008. — Ашхабад. С. 24–26.
197. Куреннов И.П. Энциклопедия лекарственных растений. Изд. 2-е, испр. и доп. М: Мартин, 2010. 384.
198. Куренков П.М. Русский народный лечебник. — СПб.: Комплект, 1996.
199. Кысов П.А. Лекарственные растения: самый полный справочник. — М.: Эксмо, 2011. — 944 с.
200. Ладынина Е.А., Морозова Р.С. Фитотерапия. 2-е изд., доп. — Л.: Медицина, 1990. — 304 с.
201. Лазерев А.И. Дары щедрого леса. — Алма-Ата.: Кайнар, 1990.
202. Лангенфельд В.Т. Яблоня: Морфологическая эволюция, филогения, география, систематика. Рига: Зинатие, 1991.
203. Лебеда А.Ф., Джуренко Н.И. и др. Лекарственные растения. Самая полная энциклопедия. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. — 496 с.

204. Левин Г.М. Дикий гранат (*Punica granatum* L.) в Туркменистане //Изв. АН ТССР. Сер. Биол. Наук. 1981. №2. С. 60–63.
205. Лекарственное растительное сырье. Фармакогнозия /Под. ред. Яковлева Г.П., Блиновой К.О. – СПб, 2004.
206. Лекарственные растения Сибири для лечения сердечно-сосудистых заболеваний /Н.В. Казарипова, М.И. Ломоносова, В.М. Триль и др. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ние, 1991. 240 с.
207. Линчевский И.А. Мандрагора //Флора СССР, т. 22. – М.–Л., 1955. С. 75–77.
208. Ломакина М.И., Ломакин Э.Н. Химический состав диких плодовых растений западного Копетдага // Растит. ресурсы, 1973, т. 9, вып. 4. – С. 573–577.
209. Мазнев Н.И. Золотая книга лекарственных растений. – 15-е изд., доп. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2009. – 621 с.
210. Мазнев Н.И. 2000 рецептов народной медицины. М.: Мартин, 1999.
211. Максимов О.Б., Горовой П.Г., Чумак Г.Н. Содержание антиоксидантов в семенах некоторых видов флоры Приморского края //Растительные ресурсы. 1990. Т. 26, вып. 4. – С. 487–498.
212. Маркова А.В. Большая книга народной медицины. Уникальное собрание самых лучших рецептов. – М: АСТ; СПб.: Сова, 2009. – 1184 с.
213. Мацку Я., Крейча И. Атлас лекарственных растений. Издательство Словацкой Академии Наук. – Братислава, 1972. 464 с.
214. Машанов В.И., Покровский А.А. Пряноароматические растения. – М.: Агропромиздат, 1991. 287 с.
215. Международный кодекс ботанической номенклатуры (Сент-Луисский кодекс), принятый шестнадцатым Международным конгрессом, Сент-Луис, Миссури, июль–август 1999 г. //Перевод с английского. – СПб.: Изд-во СПХФА, 2001. 210 с.
216. Меньшикова З.А., Меньшикова И.Б., Попова В.Б. Лекарственные растения в каждом доме. М., 1993. 376 с.
217. Меньшикова Н.И., Чистякова А.М. Фитотерапия в педиатрии. – М., 1990. 64 с.
218. Мизгирева О.Ф. Мандрагора туркменская // Проблемы ботаники. Вып. II. – 1955. С. 167–205.
219. Мизгирева О.Ф. Новый вид мандрагоры в Туркмении //Труды Туркм. фил. АН СССР, 2. – 1942. С. 165–170.
220. Минеджян Г.З. Сборник по медицине и нетрадиционным способам лечения. М.: Самоцвет, 1994.
221. Михайленко Е.Г., Радзинский В.Е., Захаров К.А. Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии. – Киев: Здоровье, 1987. 191 с.
222. Мухитдинов Н.М., Паршина Г.Н. Лекарственные растения. – Алматы, 2002.
223. Мякушко Т.Я., Зинченко Т.В. Определитель лекарственных растений Украины: Справочное пособие. Киев, 1982.
224. Назаров М.Н. О лекарственной флоре Таджикистана, применяемой при лечении сердечно-сосудистых заболеваний //Современные методы профилактики и лечения в практической медицине. – Душанбе, 1991. С. 119–120.
225. Национальный формуляр основных лекарственных средств Туркменистана. Ашхабад, 2011. 540 с.
226. Некрасова В.Л. История изучения дикорастущих сырьевых растений в СССР. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1958.
227. Никитин В.В., Гельдиханов А.М. Определитель растений Туркменистана. – Л.: Наука, 1988. 680 с.
228. Никитин В.В., Кербабаяев Б.Б. Народные и научные туркменские названия растений. – Изд. АН ТССР, 1962.
229. Никитина Т.И., Насыров Х.М. Фитология: Лекарственные растения в научной медицине. Уфа, 1993. 255 с.
230. Никифоров Ю.В. Алтайские травы-целители. – Горно-Алтайск, 1992. 207 с.
231. Никифоров Ю.В. Заветные травы Алтая. – Барнаул, 1989. 205 с.
232. Николаева А.Г. Фитохимическая исследование лоха узколистного: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук. Харьков, 1971. 24 с.
233. Носульчак В.А., Минаков Н.М. *Atropa komarovii* Blin. et Shal. – редкий эндемик Туркмении //Растит. ресурсы, 1976, т. 12, вып. 4.
234. Нуралиев Ю.Н. Фитотерапия импотенции (из опыта народной, древневосточной и современной медицины). – Душанбе, 1993. 40 с.
235. Одо из Мена. О свойствах трав. – М., 1976.



236. Оголовец Г.С. Энциклопедический словарь лекарственных, эфирномасличных и ядовитых растений. — М.: Сельхозлитература, 1951.
237. Олешко Г.И. и др. Запасы сырья дикорастущих лекарственных растений в восточных и юго-восточных районах Пермской области //Растительные ресурсы, 1987. Т. 23, вып. 3. — С. 319–325.
238. Определитель растений Средней Азии. Том I–VII. — Ташкент: Фан, 1968–1983.
239. Определитель растений Туркменистана. Т. II–III. — Ашхабад: Ылым, 1980–1985.
240. Определитель хвощеобразных, папоротникообразных, голосеменных и однодольных растений Туркменистана. — Ашхабад: Ылым, 1978. 328 с.
241. Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б., Ибрагимов А.К. Ядовитые животные и растения СССР. — М.: Высш. шк., 1990. 272 с.
242. Павлов Н.В. Дикие полезные и технические растения СССР. — М., 1942. 640 с.
243. Петков В. Современная фитотерапия. Медицина и физкультура. — София, 1988.
244. Петров В.А. Растительные красители Азербайджана. — Баку, 1940. 48 с.
245. Плотников Д.А., Шмидт А.С. Запасы дикорастущих лекарственных, ягодных и плодовых растений в Парабельском районе Томской области //Растительные ресурсы, 1988. Т. 24, вып. 2. — С. 177–182.
246. Полуденный Л.В., Сотник В.Ф., Хлапцев Е.Е. Эфирномасличные и лекарственные растения. — М.: Колос, 1979. 286 с.
247. Поляковска М. Лесные лекарственные растения — Варшава, 1986. 252 с.
248. Попов К.П., Нешатаева Г.Ю. Новое и редкие виды орхидных //Изв. АН СССР. Сер. Биол. Наук. 1982. №4. С. 15–19.
249. Правила сбора и сушка лекарственных растений (сборник инструкции). — М.: Медицина, 1985. 328 с.
250. Рабинович А.М. Лекарственные травы и рецепты древних времен. М.: Росагропромиздат, 1991.
251. Раздинский В.Е., Аннаев Х.А., Аннаева О.М. Лекарственные растения Туркменистана в педиатрии и гинекологии. — Ашгабат, 1993. 176 с.
252. Растения для нас. Справочное издание /Под. Ред. Г.П. Яковлева и К.Ф. Блиновой. — СПб.: Учебная книга, 1996.
253. Растительные ресурсы России и сопредельных государств. Т. 8. Сем. Butomaceae — Typhaceae. — СПб. 1994.
254. Растительные ресурсы России и сопредельных государств. Т. 9. — СПб., 1996.
255. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование. Т. I–VII. — Л.: Наука, 1984–1993.
256. Рахимов К.Д. и др. Руководство по работе с лекарственными растениями. — Алматы, 1999.
257. Редкие и исчезающие виды природной флоры СССР, культивируемые в ботанических садах и других интродукционных центрах страны. М.: Наука, 1983.
258. Рекомендации по охране лекарственных и родственных им растений. — М., 1984. 51 с.
259. Рубцов Н.И. Дикорастущие лекарственные, технические и пищевые растения Западного Казахстана. Алма-Ата; Москва, 1934. 31 с.
260. Русанов Ф.И. Среднеазиатские тамариксы. Ташкент, 1949. 159 с.
261. Рустамов И.Г., Сухова Г.В., Акмурадов А. Особенности строения и распределения подземных органов некоторых эфемероидов Бадхыза //Известия Академии наук Туркменистана. Сер. биол. наук., № 6, 1996. — Ашхабад: Ылым. С. 8–14.
262. Рыбицкий Н.А., Гаврилов И.С. Дикорастущие плоды и ягоды. — Лениздат, 1969.
263. Савельев А.Т., Шиманюк А.П. Дикорастущие плодовые, ягодные и орехоплодные растения наших лесов. — М., 1970.
264. Самойлов А.Ф. Витаминоносители флоры Туркмении //Тр. ТФАН СССР, 1942, вып. 4. — С. 24–26.
265. Сахобиддинов С.С. Дикорастущие лекарственные растения Средней Азии. — Ташкент, 1948. 276 с.
266. Сахобиддинов С.С. Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана. — Ташкент, 1955. 46 с.
267. Сахобиддинов С.С. Словарь местных и научных названий полезных и вредных растений Средней Азии. — Ташкент, 1953.
268. Свиридонов Г. Полезные растения Горного Алтая. — Горно-Алтайск, 1978. 231 с.
269. Свиридонов Г.М. Напитки здоровья. — М., 1990.
270. Середин Р.М. Лекарственные растения Дагестана. — Махачкала, 1961.
271. Синельников Н.А. Лекарственное растение яндак или верблюжья колючка и её врачебное применение. — Ашхабад: Туркменистан, 1965.
272. Складковский Л.Я., Губанов И.А. Лекарственные растения в быту. — М., 1968.

273. Складаровский Л.Я. Целебные свойства пищевых растений. — М., 1972.
274. Складаровский Л.Я. Ядовитые растения. — М.: Медицина, 1967.
275. Соколов В.С. Алкалоидоносные растения СССР. — М.—Л., 1952. 380 с.
276. Соколов С.Я., Замотаев И.П. Справочник по лекарственным растениям. Фитотерапия. — М.: Металлургия, 1989.
277. Солнцева Л. Лекарственные плоды, овощи, фрукты, орехи и ягоды. Челябинск: Аркаим, 2004. - 431 с.
278. Солодухин Е.Д. Аптека в лесу. — М.: Агропромиздат, 1989. 351 с.
279. Сотник В.Ф. Кладовая здоровья: Альбом о лекарственных растениях, их использовании и охране. — М.: Лесн. пром-сть, 1985. 64 с.
280. Станков С.С. Дикорастущие полезные растения СССР. — М., 1951. 316 с.
281. Стрижев А.Н. Лесные травы. — М.: Лесная промышленность, 1979. 192 с.
282. Суворов Ю.П., Сахарова Н.А., Сутормина Н.В. Ресурсы лекарственного и плодово-ягодного сырья в Горном Алтае. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1981. 242 с.
283. Сырьевые ресурсы Туркмении и их промышленное использование. — Ашхабад, 1943. 140 с.
284. Тавлинова Г.К., Гладкий Н.П. Декоративные многолетники. Л., 1958.
285. Тайс Б., Тайс П. Лекарственные травы — путь к здоровью. — СПб., 1993. 328 с.
286. Тахмазов Ф.А. Материалы к изучению некоторых представителей семейства Крестоцветных из флоры Азербайджана: Автореф. дисс. ... канд. фармац. наук. — Баку, 1965. 24 с.
287. Токин Б.П. Целебные яды растений. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1980.
288. Тотров В.К. Советы народной медицины. — Владикавказ, 1992. 255 с.
289. Турова А.Д. Лекарственные растения СССР и их применение. — М.: Медицина, 1974. 424 с.
290. Улуханов Б.Г. Лекарственные растительные ресурсы северо-восточного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджана): Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. — Махачкала, 1975. 21 с.
291. Ушбаева К.У., Курамысова И.И., Аксенова В.Ф. Целебные травы. — Алма-Ата: Кайнар, 1975. 200 с.
292. Федосеенко В.М. Новая энциклопедия растений: мифы, целебные свойства, гороскопы, растительный календарь. — М., 2003. 736 с.
293. Федченко Б.А. Изучение лекарственных растений Южного Туркестана. — Спб., 1917.
294. Федченко Б.А. Растительность Туркестана. — Пгр., 1915. 824 с.
295. Феофраст. Исследование о растениях. — Л.: Изд. АН СССР, 1951.
296. Флора Туркмении. Т. I—VII. — М., Л., Ашхабад, 1932—1960.
297. Хазанович Р.Л. Изучение лекарственных растений Узбекистана слабительного и вяжущего действия: Автореф. дисс. ... докт. фармац. наук. — Ташкент, 1954. 23 с.
298. Хайдаров К.Х. Лечебные растения Таджикистана. — Душанбе, 1988. 86 с.
299. Халматов Х.Х. Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана. — Ташкент, 1964. 279 с.
300. Халматов Х.Х. Растения Узбекистана с диуретическим действием. — Ташкент, 1979. 180 с.
301. Харкевич С.С., Качура Н.Н. Редкие виды растений советского Дальнего Востока и их охрана. — М., 1981. 232 с.
302. Хархарова С.Г. Лекарственные растения Дагестана и их рациональное применение. — Махачкала, 1981. 84 с.
303. Хлопин И.Н. Мандрагора туркменская в истории народов Востока //Известия АН ТССР, Сер. биол. наук. — 1979. С. 70—75.
304. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана. — Душанбе, 1989. 368 с.
305. Чарыева Г.А. История изучения и использования лекарственных растений Туркменистана. — Ашхабад: Ылым, 1988. 160 с.
306. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. — СПб.: Мир и семья, 1995. 990 с.
307. Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. — Л.: Наука, 1981. 510 с.
308. Черепнин В.Л. Пищевые растения Сибири. — Новосибирск, 1987. 188 с.
309. Чиков П.С. Лекарственные растения. — М.: Лесная промышленность, 1987. 383 с.
310. Чиков П.С., Лаптев Ю.П. Витаминные и лекарственные растения. — М.: Колос, 1976.



311. Чиков П.С., Павлов М.И. Наука и лекарственные растения. — М.: Знание, 1981. 160 с.
312. Чопик В.И., Дудченко Л.Г., Краснова А.Н. Дикорастущие полезные растения Украины. — Киев, 1983. 398 с.
313. Чхе Тхэсоп. Лекарственные растения. — М., 1987. 606 с.
314. Шалыт М.С. Дикорастущие полезные растения Туркменской ССР. — М., 1951. 222 с.
315. Шемитов В.Ф. Лечение растительными средствами детей. — Смоленск, 1992. 111 с.
316. Шмерко Е., Мазан И. Лечение и профилактика растительными средствами: Болезни дыхательной системы. — Минск, 1993. 255 с.
317. Шмерко Е.П., Мазан И.Ф. Лечение и профилактика растительными средствами: Болезни пищеварительной системы. — Баку, 1992. 315 с.
318. Шпиления С.Е., Иванов С.И. Азбука природы (Лекарственные растения). — М.: Знание, 1989. 224 с.
319. Шретер А.И. и др. Лекарственная флора Кавказа. — М., 1979. 368 с.
320. Шретер А.И., Крылова И.Л. Как находят лекарственные растения. — М.: Медицина, 1962.
321. Шретер Г.К. Лекарственные растения и растительное сырье, включенные в отечественные фармакопеи. — М., 1972. 119 с.
322. Шульга Т.П. Как собирать, хранить и применять лекарственные растения. — М., 1991. 96 с.
323. Энден О.А. Дикорастущие дубильные растения Туркмении. — Тр. Туркм. фил. /АН СССР, Ашхабад, 1942, вып. 2, с. 19–36.
324. Энден О.А. Красильные растения Туркмении. — Тр. Туркм. фил. /АН СССР, Ашхабад, 1944, вып. 5, с. 60–116.
325. Юнусов С.Ю. Алкалоиды. — Ташкент: Фан, 1981.
326. Юхананов Д.Х. Род колючелистник *Acanthophyllum* С. А. М. во флоре Средней Азии как источник гликозидов гипогенина: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. — Томск, 1972. 27 с.
327. Ягодка В.С. Фитотерапия в дерматологии и косметике. — Киев, 1987. 136 с.
328. Ягодка В.С. Лекарственные растения в дерматологии и косметике. — Киев, 1991. 268 с.
329. Akhani H., Ghorbani A.-B. *Mandragora turcomanica* (Solanaceae) in Iran: a species new distribution record for an endangered // *Systematics and Biodiversity*. — 2003, 1(2).
330. Akmyradov A. A. *Silena czopandagensis* // *The Red Data Book of Turkmenistan. Vol.1: Plants and Fungi*. Ed. 3 rd, Revised and updated — Ashgabat, 2011. P. 82–83.
331. Akmyradov A. List of medicinal of the Central Kopetdag used in scientific and folk medicine // *Türkmenistanyň lukmançylygy*, № 2, 2011. P. 36–40.
332. Akmyradov A. Resources of natural medicinal raw material of some efemeroids of the Bathyz // *Türkmenistanyň lukmançylygy*, № 3, 2011. P. 33–38.
333. Akmyradov A., Gurbanmamedova G. Rare and disappearing medicinal plants of the Kopetdag reserve // *Türkmenistanyň lukmançylygy*, № 3, 2011. P. 35–40.
334. Dymock William. *Pharmacographia indica*. A history of the principal drugs of vegetable origin, 1890. Reprinted by Hamdard. The journal of the Institute of Health and. Tbbi (Medical) Research, Pakistan, Karachi, 1972. Vol. XV. — 546 pages.
335. *Encyclopedie des Plantes Medicinales*. — Laronsse, Milan, 1997.
336. Geylan A. *Tibbi bitkiler I*. — Bornova /Izmir, 1995. 140 y.
337. Hocking G.M. *Pakistan medicanal plants* // *Qual. plant. et mater. veg*. 1958. Vol. 5, № 1–2. — P. 145–153.
338. Nadkarni K.M. *Indian materia medica*. — Bombay, 1954. Vol. 1, 2. 1319 p.
339. Newall C.A., Anderson L.A., Philipson Y.D. *Herbal medicines. A Guide for Health-care Professional*. — London, 1996.
340. Parsa A. *Medicinal plants and drugs of plant origin in Iran* // *Qual. plant. et mater. veg*. 1959. Vol. 6, № 1. — P. 71–137; 1960. Vol. 7, № 2. P. 137–156.
341. Read B. E. *Chinese medicinal plants*. — Peking, 1936. 389 p.



**Gurbanguly Berdimuhamedow**

**B 50**     **Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri, III.** – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2012.

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Redaktorlar | <i>B. Orazdurdyýewa, O. Bäşimowa,<br/>J. Amanowa</i> |
| Tehredaktor | <i>O. Nuryagdyýewa</i>                               |

TDKP № 17, 2012

KBK 52.81 + 52.82

© Gurbanguly Berdimuhamedow, 2012

Çap etmäge rugsat edildi 31.01.2012. Ölçeği 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Ofset çap ediliş usuly.  
Şertli çap listi 31.62. Şertli reňkli ottiski 128.48. Hasap-neşir listi 33.17.  
Çap listi 34.0. Sargyt № 325. Sany 10 000.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy.  
744004. Aşgabat, 1995-nji köçe, 20.

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkezi.  
744004. Aşgabat, 1995-nji köçe, 20.





TÜRKMENISTANYŇ  
ÖSÜMLIKLERI