Clinica Dentale San Pio X s.r.l.

Via Montegrappa 2/A 31039 Riese Pio X (TV) P.I. 03725240281

Consenso informato anestesia

Informazione per il consenso al trattamento : anestesia

Cognome e nome: \$\$cognomenome\$\$

C.F: \$\$codicefiscale\$\$

Indirizzo: \$\$indirizzo\$\$

Nel presente modulo verranno specificati rischi, benefici ed alternative del trattamento anestetico che viene effettuato in questa struttura . La preghiamo di leggere attentamente . Può richiedere copia di queste pagine in segreteria.

ANESTESIA: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Nella terapia odontoiatrica è molto spesso necessario praticare l'anestesia; si tratta di anestesia locale che si effettua con una iniezione vicina al dente o dalla parte da curare oppure direttamente sul tronco nervoso principale nell'arcata inferiore, nel qual caso si parla di anestesia tronculare.

RISCHI GENERICI

L'anestetico locale è naturalmente un FARMACO e come tale può presentare effetti indesiderati. Vi sono rischi di INTERAZIONE con altri farmaci perciò e' assai importante conoscere se il paziente ne stà assumendo e quali. La presenza nell'anestetico di un VASOCOSTRITTORE, quando previsto, è controindicata in molte patologie quali NEFROPATIE, IPERTENSIONE ARTERIOSA, MALATTIE ISCHEMICHE, IPERTIROIDISMO, DIABETE, GLAUCOMA e nel corso di GRAVIDANZA accertata od anche solo presunta.

Sono possibili effetti collaterali più spesso di natura nervosa quali ECCITAZIONE, TREMORI, DISORIENTAMENTO E VERTIGINI, SUDORAZIONE, ARITMIE, NAUSEA E VOMITO. NEI SOGGETTI PREDISPOSTI ED IPERSENSIBILI SONO POSSIBILI FENOMENI ALLERGICI per lo più locali che si manifestano con ORTICARIA e PRURITI CUTANEI, ma si possono avere anche fenomeni generali caratterizzati da BRONCOSPASMO ed EDEMA LARINGEO fino al quadro di collasso cardiocircolatorio da shock anafilattico.

FARMACI USATI

Si tratta sempre e comunque di farmaci prodotti da industrie farmaceutiche di primaria importanza, diffusi ed utilizzati in tutto il mondo da molti anni.

ALTERNATIVE

E' difficile proporre delle alternative all'uso dell'anestesia locale se non nei casi nei quali è possibile effettuare la terapia senza il bisogno dell'anestesia (detartresi, piccole cure o poco più).

Riese Pio X, lì \$\$data\$\$

Clinica dentale San Pio X Direttore sanitario dott. Giovanni Toniolo