



FLUXO DE ADMISSÃO UNIDADES DE INTERNAÇÃO




1. Pacientes que estejam em isolamento de contato por detecção prévia de agentes patogênicos multirresistentes (ERC/VRE) permanecerão em precaução não sendo indicada nova coleta de swabs e assim devem permanecer até a sua alta.
2. Pacientes provenientes da comunidade sem internações prévias devem permanecer em precaução padrão.
3. **Checar no sistema, se existem culturas de vigilância em andamento. Na existência, manter em precaução de contato, aguardar resultado. Não sendo necessário nova coleta.**
4. Cabe ao enfermeiro do plantão solicitar as avaliações pelo NCIH caso necessário, de segunda a sexta. NCIH contato: Ramal 5479 e 5228. Email: ncihhrq@gmail.com

FLUXO DE ADMISSÃO UNIDADES DE PRONTO - ATENDIMENTO



1. Pacientes que estejam em isolamento de contato por detecção prévia de agentes patogênicos multirresistentes (ERC/VRE) permanecerão em precaução não sendo indicada nova coleta de swabs e assim devem permanecer até a sua alta.
2. Pacientes provenientes da comunidade sem internações prévias devem permanecer em precaução padrão.
3. Checar no sistema, se existem culturas de vigilância em andamento. Na existência, manter em precaução de contato, aguarda resultado. Não sendo necessário nova coleta.
4. Cabe ao enfermeiro do plantão solicitar as avaliações pelo NCIH caso necessário, de segunda a sexta. NCIH contato: Ramal 5479 e 5228. Email: ncihhrq@gmail.com

FLUXO DE ADMISSÃO - UTI ADULTO



1. **SERVIÇOS DE SAÚDE:** Qualquer instituição hospitalar privada ou pública, serviços de home care, clínicas de quimio/radioterapia e instituições de longa permanência;
2. **DISPOSITIVOS INVASIVOS:** Tubo orotraqueal (TOT), cateter venoso central (CVC), cateter de hemodiálise, sonda vesical (SVD/CVD) e drenos torácicos ou abdominais;
3. A equipe deve sempre avaliar os critérios de troca de dispositivos invasivos. Sondas gástricas ou enterais **NÃO** devem ser trocadas;
4. INDIVIDUALIZAR a troca de dispositivos de pacientes provenientes do Centro Cirúrgico do HRG;
5. Pacientes que estejam em isolamento de contato por detecção prévia de agentes patogênicos multirresistentes (ERC positivos) permanecerão em precaução não sendo indicada nova coleta de swabs e assim deverão permanecer até a data de alta da unidade;
6. Cabe ao enfermeiro do plantão solicitar as avaliações pelo **NCIH** caso necessário, de segunda a sexta.

NCIH contato: Ramal 5479 e 5228 Email: ncihhr@gmail.com