

ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

RECOMENDAÇÕES PARA USO DE SOROS ESPECÍFICOS CONTRA VENENO DE ANIMAIS PEÇONHENTOSⁱ

ANIMAL	SORO	APRESENTAÇÃO Frasco-ampola	DOSE	VIA DE APLICAÇÃO
ARANHA	ARACNÍDICO (<i>Loxosceles</i> , <i>Phoneutria</i> e <i>Tityus</i>) (aranha armadeira)	5ml	Acidente Moderado: 3 ampolas para crianças (menor de 7 anos)	Intravenoso
			Acidente Grave: 6 ampolas	Intravenoso
	ARACNÍDICO (<i>Loxosceles</i> , <i>Phoneutria</i> e <i>Tityus</i>) (aranha marron)	5ml	Acidente Grave Cutâneo: 5 ampolas	Intravenoso
			Acidente Grave Cutâneo- hemolítico (Cutâneo Visceral): 10 ampolas	Intravenoso
COBRA	ELAPÍDICO (coral verdadeira)	10 ml	Acidente Moderado: 5 ampolas	Intravenoso
			Acidente Grave: 10 ampolas	Intravenoso
	BOTÓPRICO* (jararaca, jararacuçu, urutu, caíçara)	10 ml	Acidente Leve: 3 ampolas	Intravenoso
			Acidente Moderado: 6 ampolas	Intravenoso
			Acidente Grave: 12 ampolas	Intravenoso
	CROTÁLICO (cascavél boicininga)	10 ml	Acidente Leve: 5 ampolas	Intravenoso
			Acidente Moderado: 10 ampolas	Intravenoso
			Acidente Grave: 20 ampolas	Intravenoso
	LAQUÉTICO** (surucucu – pico-de- jaca)	10 ml	Acidente Moderado: 10 ampolas	Intravenoso
			Acidente Grave: 20 ampolas	Intravenoso
ESCORPIÃO	ESCORPIÔNICO	5ml	Acidente Moderado: 3 ampolas	Intravenoso
			Acidente Grave: 6 ampolas	
LAGARTA	LONÔMICO (taturana e oruga)	10 ml	Acidente Moderado: 5 ampolas	Intravenoso
			Acidente Grave: 10 ampolas	Intravenoso

* Na falta do SAB, utilizar o SABC ou o SABL.

** Antibotrópico (pentavalente) e antilaquético

ⁱ FONTE: 1. Processo SEI 00060-00031263/2022-61 – Encaminha OFÍCIO CIRCULAR Nº 7/2022/SVS/MS, referente a Informações da Coordenação-Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial sobre a situação do abastecimento de antivenenos no Brasil e da vigência dos protocolos clínicos de atendimento de acidentes por animais peçonhentos. 2. Nota Técnica nº 4/2022 – CGVZ/DEIDT/SVS/MS