Pressaro P/ Angliatamacprasia. Tambén especa 18 (braco De

Ficha de Marcação de Tomografia Computadorizada – Hospital Regional do Gama

SES: RG: Tel:			
Tomografia de :()SEM () COM c	ontraste	iodado	
Marcado Para:Hora:			
() Paciente Internado - pedido deve estar inserido no sistema TRACKCARE (X) PREPARO, se exame com contraste: - Exame agendando para turno da MANHÃ - JEJUM a partir das 23:00 do dia anterior ao exame - PREDNISONA 60 mg via oral às 19:00 (dia anterior) e 7:00 (no dia do + POLARAMINE 2mg via oral às 7:00 (no dia do exame) - Exame agendando para turno da TARDE: - JEJUM a partir das 8:00 do dia do exame - PREDNISONA 60 mg via oral às 23:00 (no dia anterior ao exame) e + POLARAMINE 2mg via oral às 13:00 (no dia do exame) (X) Vir com acesso venoso com Jelco 16 ou 18. (X) Creatinina atual (X) Hidratação abundante no dia anterior e no dia do exame # Paciente diabético em uso de METFORMINA (glifage, glucaformin): INTERROMPER O 2 dias depois do exame.	13:00 (no) o dia do	exame)
# OUTRAS doenças: NÃO PARAR a MEDICAÇÃO de USO CONTÍNUO. Termo de Consentimento Informado para Exame de Tomografia Computadoriza	nda	Pa-	
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente c	a computa que a tom	ografia ut	iliza radia
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente c ionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aqu e que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são subst informação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações ad	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas que incomun	iliza radia tomográfi e melhora s, sendo n
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente o ionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informados de la fez algum exame com contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral,	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas qu	iliza radia tomográfi e melhorai
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente o ionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque e que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informados de la fez algum exame com contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral, cateterismo cardíaco)	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas que incomun	iliza radia tomográfi e melhora s, sendo n
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente cionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informação diagnóstica de contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral, cateterismo cardíaco) 2 - Você Já apresentou reação alérgica ao utilizar contraste iodado?	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas que incomun	iliza radia tomográfi e melhora s, sendo n
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente cionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informação diagnóstica de contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral, cateterismo cardíaco) 2 - Você Já apresentou reação alérgica ao utilizar contraste iodado? 3 - Tem algum tipo de alergia ou asma?	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas que incomun	iliza radia tomográfi e melhora s, sendo n
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente o ionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informos de la fez algum exame com contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral, cateterismo cardíaco) 2 - Você Já apresentou reação alérgica ao utilizar contraste iodado? 3 - Tem algum tipo de alergia ou asma? 4 -É portador de insuficiência renal ou outra doença dos rins?	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas que incomun	iliza radia tomográfi e melhora s, sendo n
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente o ionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informedor de la fez algum exame com contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral, cateterismo cardíaco) 2 - Você Já apresentou reação alérgica ao utilizar contraste iodado? 3 - Tem algum tipo de alergia ou asma? 4 -É portador de insuficiência renal ou outra doença dos rins? 5 - Faz diálise?	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas que incomun	iliza radia tomográfi e melhora s, sendo n
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente o ionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informador de la fez algum exame com contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral, cateterismo cardíaco) 2 - Você Já apresentou reação alérgica ao utilizar contraste iodado? 3 - Tem algum tipo de alergia ou asma? 4 - É portador de insuficiência renal ou outra doença dos rins? 5 - Faz diálise? 6 - É portador de doença da Tireóide?	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas que incomun	iliza radia tomográfi e melhora s, sendo n
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente o ionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informedor de la fez algum exame com contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral, cateterismo cardíaco) 2 - Você Já apresentou reação alérgica ao utilizar contraste iodado? 3 - Tem algum tipo de alergia ou asma? 4 -É portador de insuficiência renal ou outra doença dos rins? 5 - Faz diálise?	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas que incomun	iliza radia tomográfi e melhora s, sendo n
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente o ionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informo 1- Já fez algum exame com contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral, cateterismo cardíaco) 2 - Você Já apresentou reação alérgica ao utilizar contraste iodado? 3 - Tem algum tipo de alergia ou asma? 4 -É portador de insuficiência renal ou outra doença dos rins? 5 - Faz diálise? 6 - É portador de doença da Tireóide? 7 - Faz uso de Aminoglicosídeo, Anfotericina B, Cisplatina ou Ciclosporina	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas que incomun	iliza radia tomográfi e melhora s, sendo n
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente o ionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informador de la ferção a o utilizar contraste iodado? 1- Já fez algum exame com contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral, cateterismo cardíaco) 2 - Você Já apresentou reação alérgica ao utilizar contraste iodado? 3 - Tem algum tipo de alergia ou asma? 4 -É portador de insuficiência renal ou outra doença dos rins? 5 - Faz diálise? 6 - É portador de doença da Tireóide? 7 - Faz uso de Aminoglicosídeo, Anfotericina B, Cisplatina ou Ciclosporina 8 - Faz uso de outra medicamento diário? Qual? 9 - Faz tratamento com algum medicamento para Diabéticos? Qual?	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas que incomun	iliza radia tomográfi e melhora s, sendo n
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente or ionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque e que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informador de la fez algum exame com contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral, cateterismo cardíaco) 2 - Você Já apresentou reação alérgica ao utilizar contraste iodado? 3 - Tem algum tipo de alergia ou asma? 4 - É portador de insuficiência renal ou outra doença dos rins? 5 - Faz diálise? 6 - É portador de doença da Tireóide? 7 - Faz uso de Aminoglicosídeo, Anfotericina B, Cisplatina ou Ciclosporina 8 - Faz uso de outra medicamento diário? Qual? 9 - Faz tratamento com algum medicamento para Diabéticos? Qual?	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas que incomun	iliza radia tomográfi e melhora s, sendo n
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente or conizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substa informação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informado en determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informado en cardíaco) 1- Já fez algum exame com contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral, cateterismo cardíaco) 2- Você Já apresentou reação alérgica ao utilizar contraste iodado? 3 - Tem algum tipo de alergia ou asma? 4 - É portador de insuficiência renal ou outra doença dos rins? 5 - Faz diálise? 6 - É portador de doença da Tireóide? 7 - Faz uso de Aminoglicosídeo, Anfotericina B, Cisplatina ou Ciclosporina 8 - Faz uso de outra medicamento diário? Qual? 9 - Faz tratamento com algum medicamento para Diabéticos? Qual? 10 - Está fazendo quimioterapia? 11 - Você está grávida? (válido para paciente do sexo feminino)	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que:	ografia ut imagens micas que incomun	iliza radia tomográfi e melhora s, sendo n
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente o ionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informante de reactiva de r	a computa que a tomo uisição das âncias quí versas são o que: Sim	ografia ut imagens micas que incomun Não	iliza radia tomográfie melhorais, sendo m
Eu, acima descrito, na condição de paciente do Hospital Regional do Gama, autorizo a realização de tomografia utilização de contraste iodado endovenoso e/ou oral, caso a equipe médica julgue necessária. Estou ciente o ionizante, e que a exposição a Raio X pode acarretar riscos. Sei também que essa radiação é necessária para aque que o uso de doses controladas minimiza os riscos. Sei também que os meios de contraste iodados são substinformação diagnóstica. O uso de meio de contraste é considerado um procedimento seguro e suas reações adfrequentes em determinados grupos de pacientes. E para avaliar meu grau de risco a possíveis reações, informos para deterismo cardíaco) 1- Já fez algum exame com contraste iodado? (tomografia, urografia excretora, colecistograma oral, cateterismo cardíaco) 2 - Você Já apresentou reação alérgica ao utilizar contraste iodado? 3 - Tem algum tipo de alergia ou asma? 4 - É portador de insuficiência renal ou outra doença dos rins? 5 - Faz diálise? 6 - É portador de doença da Tireóide? 7 - Faz uso de Aminoglicosídeo, Anfotericina B, Cisplatina ou Ciclosporina 8 - Faz uso de outra medicamento diário? Qual? 9 - Faz tratamento com algum medicamento para Diabéticos? Qual? 10 - Está fazendo quimioterapia? 11 - Você está grávida? (válido para paciente do sexo feminino) 12- É portador de algum problema cardíaco?	a computa que a tom uisição das âncias quí versas são o que: Sim nografia tado coloc is, na tenta	ografia ut imagens micas que incomun Não Computa ar a minh ativa de a	iliza radia tomográfia melhora s, sendo m

Esquema medicamentoso sugerido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia para prevenção às reações adversas graves após uso de meios de contraste iodado. ("Assistência à Vida em Radiologia – Guia Teórico - Prático". CBR, 2000)