	_	1	1
			D
		V	7

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

		d	a	b	
	(
	1	ì	ē	á	
	í	F	٩	ø	
	į	ř			
•	•	4	ę	ĺ	
	ı	۰	-	-	
	1	þ		=	
	١	F			
	i	i		120	
	i	ŕ	Ļ	٥	
		ľ			
	1	Ç			
	ì	ŕ	Ξ	3	
	į	۱			
	١	í		É	

	RECEITUARIO			
Nome:		Reg.:		Nome:
Unid. de Saúde:	Clínica: Ambulat	Ambulatório Emergência	٠	Unid. de Saúde:
SBS:	USO INALATÓRIO			SES:
01. () BECLOMETASOl Aspirar 02 jatos de 12/12h.	01. () BECLOMETASONA (CLENIL) Aerosol 200mcg. Uso contínuo / 01 frasco Aspirar 02 jatos de 12/12h . Enxaguar a boca após cada aplicação.	ínuo / 01 frasco		01. () BECLOME Aspirar 02 jatos de 1
02. () BECLOMETASON Aspirar 02 jatos de 12/12h.	02. () BECLOMETASONA (CLENIL) Aerosol 250mcg. Uso contínuo/ 01 frasco Aspirar 02 jatos de 12/12h. Enxaguar a boca após cada aplicação.	ínuo/ 01 frasco	ب سعید دوستاند واقع در دوستاند و دوس	02. () BECLOME' Aspirar 02 jatos de 1
03. () BECLOMETASON Aspirar 03 jatos em caso de	03. () BECLOMETASONA (MIFLASONA) Cápsulas 200 mcg Cáp. Aspirar 03 jatos em caso de falta de ar ou Chiado no peito, até 4/4 h Uso contínuo	Cáp/mês Uso contínuo		03. () BECLOMET Aspirar 03 jatos em
de falta de ar ou Chiado no peito , até de 4/4 horas.	04. () Salbutamol (aerolin) SPRAY 100mcg. 01 fraco/mês Aspirar 03 jatos em caso de falta de ar ou Chiado no peito, até de 4/4 horas.	ar 03 jatos em caso	Mississian	04. () Salbutarsol de falta de ar ou Chj
,	USO NASAL			
05. () BUDESONIDA NASAL mcg u Aplicar 01 jato em cada narina de 12/12 horas.	ASALmcg uso contínuo/ 01 frasco/mês rina de 12/12 horas.	/mês		05. () BUDESONI Aplicar 01 jato em e
06. () BECLOMETASONA NASAL 50mcg_us Aplicar 01 JATO em cada narina de 12/12 horas.	06. () BECLOMETASONA NASAL 50mcg_uso continuo/ 01 frasco/mês Aplicar 01 JATO em cada narina de 12/12 horas.	co/mês		06. () BECLOME: Aplicar 01 JATO en
	•		and the second s	5
O FUMO I	'O FUMO FAZ MAL À SUA SAÚDE E À DOS OUTROS'	ROS"		Data:
1	Assinatura e Carimbo	00		8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

	Nome:		Reg.:	
	Unid. de Saúde:	Clínica:	Ambulatério [☐ Emergência
	SBS:	USO INALATÓRIO		
	01. () BECLOMETASONA (CLENIL) Aerosol 200mcg. Uso continuo / 01 frasco Aspirar 02 jatos de 12/12h . Enxaguar a boca após cada aplicação.	ENIL) Aerosol 2001 guar a boca após cad	ncg. Uso contínuo / (a aplicação.)l frasco
	02. () BECLOMETASONA (CLENIL) Aerosol 250mcg. Uso contínuo/ 01 frasco Aspirar 02 jatos de 12/12h . Enxaguar a boca após cada aplicação.	ENIL) Aerosol 250n guar a boca após cad	ncg. Uso contínuo/ 0	frasco
	03. () BECLOMETASONA (MIFLASONA) Cápsulas 200 mcgCáp. Aspirar 03 jatos em caso de falta de ar ou Chiado no peito, até 4/4 h Uso contínuo	TLASONA) Cápsula e ar ou Chiado no pe	s 200 mcgito, até 4/4 hUso co	Cáp/mês ntínuo
	04. () Salbutansol (aerolin) SPRAY 100mcg. 01 fraco/mês Aspirar 03 jatos em caso de falta de ar ou Chiado no peito, até de 4/4 horas.	AY 100mcg. 01 fra até de 4/4 horas.	co/mês Aspirar 03 j	atos em caso
		USO NASAL		
	05. () BUDESONIDA NASALmcg u Aplicar 01 jato em cada narina de 12/12 horas.	mcg uso conti 12/12 horas.	mcg uso contínuo/ 01 frasco/mês horas.	-
	06. () BECLOMETASONA NASAL 50mcg_uso continuo/ 01 frasco/mês Aplicar 01 JATO em cada narina de 12/12 horas.	sAL 50mcg_uso con le 12/12 horas.	finuo/ 01 frasco/mês	
Parameter Comments				
	O FUMO FAZ MA	O FUMO FAZ MAL À SUA SAÚDE E À DOS OUTROS	À DOS OUTROS'	
	Data:			

Assinatura e Carimbo