

Tabela de Estabilidade de Medicamentos Sólidos para serem Administrados via Sonda Enteral									
MEDICAMENTO GÊNERICO	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	FORMA FARMACÊUTICA	TRITURAÇÃO/ DILUIÇÃO/ ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR	DISSOLVE SEM TRITURAR	RESÍDUOS	VOLUME DE ÁGUA P/ DILUIR	OBSERVAÇÕES	
ACTOZOLAMIDA 250 MG	DIAMOX	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	1+	15 ML		Uso Hospitalar
ACICLOVIR 200 MG	ZORIVAX	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	2+	20 ML	PODE SER ADMINISTRADO SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL	UBS e uso Hospitalar
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	ASG	COMPRIMIDO	—	SIM	SIM	1+	15ML	PODE SER ADMINISTRADO SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL	UBS e uso Hospitalar
ÁCIDO FÓLICO 5MG	ENDOFOLIN 5MG	COMPRIMIDO REVESTIDO	—	SIM	NÃO	3+	15ML		Uso Hospitalar
ÁC. FOLÍNICO FOLINATO CaJ 15MG	PREVAX	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM (bento)	2+	15ML		UBS e uso Hospitalar
AC. TRANSAMINICO 250 MG	TRAGAMIM	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	20-50ML		Uso Hospitalar
ALBENDAZOL 400 MG	ZOLBEM	COMPRIMIDO	—	SIM	LENTO	4+	20-30ML		UBS e uso Hospitalar
ALOPURINOL 100MG	ZYLORIC 100MG	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	20ML		UBS e uso Hospitalar
ALOPURINOL 300MG	ZYLORIC 300MG	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	20ML		UBS e uso Hospitalar
AMINOPIRINA 100 MG	AMINOPIRINA	COMPRIMIDO	—	SIM	SIM (bento)	3+	15 ML	PAUSAR A DIETA 1 HORA ANTES E 1 HORA DEPOIS DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO	Uso Hospitalar
AMIODARONA 200MG	ATLASIL	COMPRIMIDO	PREFERÊNCIA UTILIZAR A OPÇÃO GOTAS	SIM	SIM	2+	10-20ML	NÃO HA ESTUDOS SOBRE EFICÁCIA, SEGURANÇA E FARMACOCINÉTICA	UBS e uso Hospitalar
AMOXI + CLAV 500MGs + 125MGs	CLAVULIN	COMPRIMIDO REVESTIDO	PREFERÊNCIA UTILIZAR SUSPENSÃO	OPCIL	LENTO	1+	20-30ML	ALIMENTOS NÃO INTERFEREM NA ABSORÇÃO	UBS e uso Hospitalar
AMOXILINA 500MG	AMOXIL	CÁPSULA	PREFERÊNCIA UTILIZAR SUSPENSÃO	SIM	SIM	2+	30-40ML		UBS e uso Hospitalar
ANLCOPIRIDO 5MG	ROXYLAM	COMPRIMIDO	DILUIR EM ÁGUA E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	15ML	ADMINISTRAR SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA MINIMIZAR EFEITOS GASTROINTESTINAIS	UBS e uso Hospitalar
ANLCOPIRIDO 10MG	ROXYLAM	COMPRIMIDO	DILUIR EM ÁGUA E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	15ML	ADMINISTRAR SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA MINIMIZAR EFEITOS GASTROINTESTINAIS	UBS e uso Hospitalar
ATENÓLOL 50 MG	ATENÓLOL	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	15ML		UBS e uso Hospitalar
ATENÓLOL 100MG	ATENÓLOL	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	15ML		UBS e uso Hospitalar
AZATIOPRINA 50MG	IMURIAN	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	—	15ML	MEDICAMENTO NÃO DEVE SER MACERADO POR POSSUIR RISCO CARCINOGÊNICO, DEVENDO SER FEITA EM FLUXO LAMINAR	Farmácia do Componente Especializado e Uso Hospitalar
AZITROMICINA 500MG	AZITROMICINA DI-HIDRATADA	COMPRIMIDO REVESTIDO	PREFERÊNCIA UTILIZAR SUSPENSÃO	SIM	SIM	3+	20 ML		UBS e uso Hospitalar
BACLOFENO 10MG	LIORISAL	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	2+	15ML		Farmácia do Componente Especializado e Uso Hospitalar
BISACODIL 5 MG	DULCOLAX	DRÁGUA	NÃO RECOMENDADO: SUGERIR A OPÇÃO GUTTALAX					DULCOLAX É RESISTENTE AO SUCO GÁSTRICO E AO INTENÇO PARA SER LIBERADO APENAS NO CÓLON. PORTANTO, PODE SUA CARACTERÍSTICA QUANDO SAÍDO POR SONDA (TRITURADO E DISSOLVIDO). ASSIM, TEM UMA REDUÇÃO SIGNIFICANTE NA BIODISPONIBILIDADE E EFICÁCIA.	Uso Hospitalar
BIDROPIDOL 10 MG	DIOSILAN	CÁPSULA	PREFERÊNCIA UTILIZAR GOTAS	ABRIR A CÁPSULA	NÃO		15ML		UBS e uso Hospitalar
CABERGOLINA 0,5MG	DOSTINEX	COMPRIMIDO	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética (manual Santa Helena)	NÃO			NÃO DILUIR	NÃO PODE SER FEITO POR SONDA	Farmácia do Componente Especializado e Uso Hospitalar
CAPTROPIL 25MG	CAPTROPIL	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE. PODE OPTAR PELA VIA SUBLINGUAL	SIM	MUITO LENTO	2+	20-30ML	A ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA A NUTRIÇÃO ENTERAL REDUZ ABSORÇÃO 30% A 40%	UBS e uso Hospitalar
CAPTROPIL 50MG	CAPTROPIL	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE. PODE OPTAR PELA VIA SUBLINGUAL	SIM	MUITO LENTO	2+	20-30ML	A ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA A NUTRIÇÃO ENTERAL REDUZ ABSORÇÃO 30% A 40%	Uso Hospitalar
CARBONATO DE CÁLCIO 500MG	CALCIUM	COMPRIMIDO	NÃO É RECOMENDADO	SIM	SIM (lento)	—	10-100 ML	SE PRESENÇA DE EXCIPIENTE QUE PODEM DILUIR A SONDA QUANDO INGESTO	UBS e uso Hospitalar
CARBONATO DE CA + VIT. D	OS-CAL D	COMPRIMIDO REVESTIDO	NÃO É RECOMENDADO: PREFERIR A FORMULAÇÃO DE CARBONATO DE CA EFERVESCENTE + COLICOLTEROL GOTAS	—	—	—	—	RISCO DE OBSTRUÇÃO DE SONDA.	UBS e uso Hospitalar
CARVEDILOL 3,125 MG	DIVELOL 3,125 MG	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR EM MEIO ÁCIDO E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	1+	15 ML	PODE ADMINISTRAR SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA MINIMIZAR A HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA	UBS e uso Hospitalar
CARVEDILOL 6,25 MG	DIVELOL 6,25 MG	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR EM MEIO ÁCIDO E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	1+	15 ML	PODE ADMINISTRAR SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA MINIMIZAR A HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA	UBS e uso Hospitalar
CARVEDILOL 12,5 MG	DIVELOL 12,5	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR EM MEIO ÁCIDO E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	1+	15 ML	PODE ADMINISTRAR SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA MINIMIZAR A HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA	UBS e uso Hospitalar
CEFALOXINA 500MG	REFLEX	DRÁGUA	DEVIDO A VISCOSIDADE DE OUTRA FORMAS FARMACÊUTICAS, PREFERIR A OPÇÃO COMPRIMIDO	SIM	SIM	1+	20 ML	A CEFALOXINA DA CÁPSULA POSSUI REVESTIMENTO E EXCIPIENTES QUE PODEM OBSTRUIR A SONDA QUANDO MACERADOS.	UBS e uso Hospitalar
CICLOBENZAPRINA 10 MG	MIOBAN	COMPRIMIDO REVESTIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	2+	20 ML		UBS e uso Hospitalar
CINARIZINA 75MG	STUGERON	COMPRIMIDO	—	SIM	LENTO	2+	15 ML		UBS e uso Hospitalar
CIPROFLOXACINO 500 MG	CIPRO	COMPRIMIDO REVESTIDO	QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	NÃO	SIM	3+	20 ML	PAUSAR A DIETA 1 HORA ANTES E 1 HORA DEPOIS DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO	UBS e uso Hospitalar
CLINDAMICINA 300 MG	DALACIN	CÁPSULA	PODE ABSTRURA DA CÁPSULA ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	ABRIR A CÁPSULA	NÃO	2+	15 ML	PODE OCORRER INTIMAÇÃO E DANOS AO TRATO GASTROINTESTINAL	UBS e uso Hospitalar
CLOPIDOGREL 75 MG	PLAVIX	COMPRIMIDO REVESTIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	2+	15 ML	PODE ADMINISTRAR SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA MINIMIZAR EFEITOS GASTROINTESTINAIS	Farmácia Ambulatorial do HIBDF e Policlínica de Teleatendimento
COMPLUJO B	RENIDOC	DRÁGUA	PREFERÊNCIA PARA OPÇÃO GOTAS	SIM	NÃO	1+	20 ML		Uso Hospitalar
DESMETILSALINA 1MG	DELCAROLIN	COMPRIMIDO	UTILIZAR A OPÇÃO FLUIR	SIM	SIM	3+	15 ML		UBS e uso Hospitalar
DEXGOSFENAMINA 2 MG	POLARAMINE	COMPRIMIDO	PREFERÊNCIA PARA OPÇÃO SOLUÇÃO	SIM	SIM	1+	20 ML	PODE RETARDAR O ESVAZIAMENTO GÁSTRICO E DIMINUIR A MOTILIDADE GASTROINTESTINAL	UBS e uso Hospitalar
DISODINA 0,25 MG	DISODINA	COMPRIMIDO	UTILIZAR A OPÇÃO FLUIR	SIM	SIM	1+	15 ML		UBS e uso Hospitalar
DILTIZEN 60 MG	CARDIZEM	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	3+	15 ML		UBS e uso Hospitalar
DOMPRIZONA 10 MG	MOTILUM	COMPRIMIDO	PREFERÊNCIA PARA OPÇÃO PARA SUSPENSÃO	SIM	NÃO	1+	15 ML	FAVORECE O ESVAZIAMENTO GÁSTRICO E ESTIMULA A MOTILIDADE INTESTINAL, PODEMDO CAUSAR DIARREIA	Uso Hospitalar
DORICILINA 100 MG	VIBRAMICINA	COMPRIMIDO SOLÚVEL	DISSOLVER EM SINA DE ÁGUA ANTES DA ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	NÃO	SIM	1+	50 ML	ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA A NUTRIÇÃO ENTERAL REDUZ SUA ABSORÇÃO	UBS e uso Hospitalar
ENALAPRIL 5MG	RENITEC 5MG	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	1+	15 ML		UBS e uso Hospitalar
ENALAPRIL 20MG	RENITEC 5MG	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	1+	15 ML		UBS e uso Hospitalar
ERTITROMICINA 500MG	ERTITEX	COMPRIMIDO	UTILIZAR A OPÇÃO SUSPENSÃO DEVIDO A SUA ALTA CONCENTRAÇÃO E VISCOSIDADE. DILUIR COM VOLUME ADICIONAL EM ÁGUA	SIM	NÃO	3+	30 ML		UBS e uso Hospitalar
ESPHOLACTONA 100 MG	ALDACTONE 100MG	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	4+	20 ML	ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA AUMENTAR SUA ABSORÇÃO E MINIMIZAR SEUS EFEITOS GASTROINTESTINAIS	Uso Hospitalar
ESPHOLACTONA 25 MG	ALDACTONE 25MG	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	2+	15 ML	ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA AUMENTAR SUA ABSORÇÃO E MINIMIZAR SEUS EFEITOS GASTROINTESTINAIS	UBS e uso Hospitalar
FLUCONAZOL 150 MG	ZOLTEC	CÁPSULA	ABRIR A CÁPSULA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE. NÃO USAR SONDAS DE PVC	ABRIR A CÁPSULA	NÃO	2+	15 ML	ABRIR A CÁPSULA E AGUARDAR A DISSOLUÇÃO DOS GRÂNULOS, NÃO MACERAR. ADMINISTRAR APÓS COMPLETA SOLUBILIZAÇÃO	UBS
FLUOXETIMIDA 60MG	LASIX	COMPRIMIDO	PREFERIR A OPÇÃO SUSPENSÃO	SIM	SIM	1+	15 ML	SUSPENSÃO PODE SER MANIPULADA IMAGINEL	UBS e uso Hospitalar
GLIBENZCLAMIDA 5MG	DONAL	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	15 ML	ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA A NUTRIÇÃO ENTERAL REDUZ SUA ABSORÇÃO	UBS e uso Hospitalar
GLUCAZINA 50MG	DIAMICROM	COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA	NÃO É RECOMENDADO	—	—	—	—	RISCO DE ALTERAÇÕES GLUCÊMICAS PARA O PACIENTE	UBS e uso Hospitalar
HIDRALAZINA 50MG	APRESOLINA	DRÁGUA	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	3+	15 ML	ABSORÇÃO RÁPIDA APÓS SUA ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO SIGNIFICANTE DA BIODISPONIBILIDADE E EFICÁCIA QUANDO ADMINISTRADO COM NUTRIÇÃO ENTERAL	UBS e uso Hospitalar
HIDROCLOROZOTADIA 25 MG	CLORANA	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	2+	15 ML	ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA A NUTRIÇÃO ENTERAL REDUZ A ABSORÇÃO	UBS e uso Hospitalar
HIDROKLUREIA 500MG	HYDREA	COMPRIMIDO	MEDICAMENTO CISTOSTÁTICO	—	—	—	—	RISCO OCUPACIONAL PARA O MANIPULADOR. SEGUIR NORMAS GERAIS DE MANEJO DE CISTOSTÁTICOS	Farmácia do Componente Especializado e Hospitalar

IBUPROFENO 600MG	MOTRIN	COMPRIMIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	--	--	15 ML	PODE SER ADMINISTRADO SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL
INDAPAMIDA 1,5MG (CX C/ 30)			dados não disponíveis					
ISOSSORBIDA 5 MG	ISORDIL	COMPRIMIDO SUBLINGUAL		SIM	NÃO	1+	10 ML	USAR VIA Sonda EM PACIENTES COM DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO OU DEFIÇA
ISOSSORBIDA 40MG	ISOCORD	CÁPSULA	O comprimido de liberação imediata pode ser triturado, e seu conteúdo dissolvido, em volume adequado de água para a administração via sonda.	--	--	--	--	RISCO DE OBSTRUÇÃO DE Sonda
ISOSULPRINA 10 MG	INIBINA	COMPRIMIDO	Pode ser administrado por sonda (Manual Santa Helena)	SIM				DILUIR
ITRACONAZOL 100MG	SPORANOX PULSO	CÁPSULA	ABRIR A CÁPSULA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	NÃO	NÃO	4+	15 ML	
IVERMECTINA 6 MG	REVECTINA	COMPRIMIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	2+	15 ML	
LEVOPLOXACINO 250 MG	LEVAGUM	COMPRIMIDO REVESTIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	2+	15 ML	PAUSAR A DIETA 1 HORA ANTES E 1 HORA DEPOIS DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO
LEVOTIROXINA 25 MCG	PURAN T4 25 MCG	COMPRIMIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	1+	15 ML	PAUSAR A DIETA 1 HORA ANTES E 1 HORA DEPOIS DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO
LEVOTIROXINA 100 MCG	PURAN T4 100 MCG	COMPRIMIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	1+	15 ML	PAUSAR A DIETA 1 HORA ANTES E 1 HORA DEPOIS DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO
LOKATADINA 10 MG	CLARITIN	COMPRIMIDO	PREFERÊNCIA UTILIZAR OPÇÃO XAROPE	SIM	SIM	2+	15 ML	
LOMATANA POT. 10 MG	COZAR	COMPRIMIDO REVESTIDO	QUANDO SE FAZER NECESSÁRIO TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	2+	15 ML	
METFORMINA 850 MG	GLIFAGE 850 MG	COMPRIMIDO REVESTIDO		SIM	NÃO	2+	20 ML	EXISTE RISCO DE OBSTRUÇÃO EM SONDAS DE CALIBRE FINO
METILDOPA 250 MG	ALDOMET 250 MG	COMPRIMIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	20 ML	--
METMETHEURON 0,125 MG	METHEURON 0,125 MG	DRÁGUA	NÃO É RECOMENDADO	--	--	--	--	RISCO DE OBSTRUÇÃO DE Sonda
METIMAZOL	TAPAZOL	COMPRIMIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	1+	15 ML	
METOPROLOL SUCCINATO 50 MG	SELOXOL 10 MG	COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Para a administração via sonda, preferencialmente administrar a suspensão oral feita a partir do comprimido (Parafarm). Os comprimidos de liberação imediata podem ser triturados, e seu pó, dissolvido em volume adequado de água para a administração (uso imediato). Pausar a dieta antes e após a administração e irrigar a sonda com água.	--	--	--	--	RISCOS DE ALTERAÇÕES FARMACOCINÉTICAS QUE POSSAM LEVAR À BRADICARDIA
METOPROLOL 2,5 MG			O comprimido ou a dose do injetável pode ser misturado em água para uso imediato. Para a dieta antes da administração, irrigar a sonda com água após o término da administração					
METRONIDAZOL 400 MG	FLADIL 400 MG	COMPRIMIDO REVESTIDO	UTILIZAR A OPÇÃO SUSPENSÃO	--	--	--	--	RISCO DE OBSTRUÇÃO DE Sonda
NAPROXENO 250 MG	NAPROXIN 250 MG	COMPRIMIDO		SIM	SIM	3+	20 ML	
NAPROXENO 500 MG	NAPROXIN 500 MG	COMPRIMIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	20 ML	
N-BUTILEPOLOMINA/HIDROXINA 10 MG	BUSCOPAN 10MG	COMPRIMIDO		SIM	NÃO	3+	15ML	
NIFEDIPINA 10 MG	ADALAT 10 MG	CÁPSULA DE LIBERAÇÃO GELATINOSA	ROMPER A CÁPSULA E DISSOLVER DEBAND DA LINGUA					UTILIZAR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS A REDUÇÃO SIGNIFICANTE DA BIODISPONIBILIDADE E EFICÁCIA QUANDO ADMINISTRADO COM NUTRIÇÃO ENTERAL
NIMODIPINA 30 MG	OXIGEN 30 MG	COMPRIMIDO REVESTIDO	PODE SER TRITURADO E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	LENTO	1+	20 ML	
NITROFURANTOINA 100 MG	MACRONDANTINA	SUSPENSÃO	UTILIZAR A OPÇÃO SUSPENSÃO	NÃO	SIM		20 ML de ÁGUA PARA CADA 10 ML DE SUSPENSÃO	
NORFLOXACINO 400 MG	FLOXACIN 400 MG	COMPRIMIDO REVESTIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	1+	15 ML	ADMINISTRAR 1 HORA ANTES OU 2 HORAS APÓS A NUTRIÇÃO ENTERAL. ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL. NÃO ASSOCIAR EM ATÉ 24h DEVIDO À SUA COMPLEXAÇÃO COM IONS (Ca, Mg, Al)
OMEPRAZOL 20 MG	OMEPRAZOL	CÁPSULA	NÃO É RECOMENDADO UTILIZAR A OPÇÃO OMEPRAZOL XAROPE (HET), administrar o comprimido Looset Muphi ou Nexium. Pausar a dieta antes e depois de cada tempo possível	--	--	--	--	OS SINCOS GRANULADOS NÃO POSSAM SER TRITURADOS (INATIVOS EM pH ÁCIDO)
ONDANSETRONA	ZOFAN	COMPRIMIDO REVESTIDO C. SUBLINGUAL	UTILIZAR A OPÇÃO SUBLINGUAL	SIM		2+	15 ML	
ONIBUTINA 5 MG			Administrar o xarope via sonda, diluir em 20ml de água para facilitar a administração. Pausar a dieta antes e depois de cada tempo possível					
PARACETAMOL 500 MG	TYLENOL	COMPRIMIDO	UTILIZAR A SOLUÇÃO ORAL OU GÓTAS	SIM	NÃO	3+	20-40 ML	
PENTOXIFILINA 400 MG	TRENTAL 400 MG	COMPRIMIDO REVESTIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	--	50-100 ML	
PIRIDOSTIGMINA 60 MG	MESTINON 60 MG	COMPRIMIDO		SIM	SIM	3+	20 ML	
PREDNISONA 5 MG	METICORTEM 5 MG	COMPRIMIDO	DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE. MELHOR SUBSTITUIR POR EQUIVALENTE TERAPÊUTICO EM SOLUÇÃO ORAL	SIM	NÃO	3+	15 ML	ADMINISTRAR SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL
PREDNISONA 20MG	METICORTEM 20 MG	COMPRIMIDO	DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE. MELHOR SUBSTITUIR POR EQUIVALENTE TERAPÊUTICO EM SOLUÇÃO ORAL	SIM	NÃO	3+	15 ML	ADMINISTRAR SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL
PROMETETAZINA 25 MG	ENEBRIGAN 25 MG	COMPRIMIDO	UTILIZAR A OPÇÃO XAROPE	SIM	NÃO	2+	15 ML	
PROPRANOLOL 300MG	RTIMONORM 300 MG	COMPRIMIDO REVESTIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	3+	15 ML	
PROPTILANTRATO 10 MG	SUSTRATE 10 MG	COMPRIMIDO	PREFERIR O COMPRIMIDO VIA SUBLINGUAL	SIM	SIM	2+	10 ML	CUIDADO EM SITUAÇÕES DE DEFICIÊNCIA E REABANDONAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO
PROPTILOXACIL 100 MG	PROPRIL	COMPRIMIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM		1+	15 ML	
PROPRANOLOL 40 MG	INDERAL	COMPRIMIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	2+	15 ML	PODE SER ADMINISTRADO SIMULTANEAMENTE A NUTRIÇÃO ENTERAL
SINVASTATINA 20 MG	SINVASCOIN 20 MG	COMPRIMIDO REVESTIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	20 ML	A DISSOLUÇÃO DO COMPRIMIDO EM ÁGUA PODE LEVAR ALCUMOS MINUTOS
SINVASTATINA 40 MG	SINVASCOIN 40 MG	COMPRIMIDO REVESTIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	20 ML	A DISSOLUÇÃO DO COMPRIMIDO EM ÁGUA PODE LEVAR ALCUMOS MINUTOS
SULFADIAZINA 500 MG	SULADININ	COMPRIMIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	--	15 ML	ADMINISTRAR ÁGUA ABUNDANTE PARA EVITAR CRISTALÚRIA
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOP	BACTRIM	COMPRIMIDO	NÃO É RECOMENDADO UTILIZAR A OPÇÃO SUSPENSÃO	SIM	SIM	2+	20 ML	O PRINCÍPIO ATIVO E OS EXCIPIENTES QUANDO MACERADOS POSSAM CAUSAR OBSTRUÇÃO DA Sonda
SULFATO FERROSO 40 MG	SULFATO FERROSO	COMPRIMIDO	NÃO É RECOMENDADO PREFERIR A OPÇÃO SOLUÇÃO	NÃO	NÃO	--	--	NÃO PODE SER TRITURADO, DEVIDO CAUSAR OBSTRUÇÃO
TERBINAFINA 250 MG			dados não disponíveis					
TIAMINA 300 MG	BENERVA	COMPRIMIDO		SIM			15-20 ML	MONITORAR POSSÍVEIS REAÇÕES ADVERSAS NO TGO
URSODESICÓLICO ÁCIDO 300 MG	URSACOL	COMPRIMIDO	TRITURA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	1+	15 ML	

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

Uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

Uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

Uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

Farmácia do componente especializado, Farmácia Ambulatorial do HBDP e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

Farmácia do Componente Especializado e Hospitalar

Uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

Uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

Farmácia do Componente Especializado e Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

Uso Hospitalar

UBS e uso Hospitalar

Farmácia do Componente Especializado, Farmácia Ambulatorial do HBDP

ção deve ser administrado via sonda, e não existe outra forma farmacêutica disponível. Guia farmacêutico marinho hospital naval

Não deve ser triturado, pois perde as características de liberação levando ao risco de nanotização/instabilidade do nível sérico do fármaco.

<https://www.gov.br/dsbv/hjbr/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hu-ufgd/governanca/atencao-a-saude/AnexoResolucao2Guiafarmaceuticoadministrativamenteviasonda.pdf>

o isossorbida de 20 mg comprimido pode ser triturado e administrado via sonda

OK

SANTA HELENA

<http://arquivos.braspen.org/journal/abr-mai-jun-2019/artigos/14-Manual-de-diacao.pdf>

OK

OK

OK

OK

OK

OK

VARFARINA 5 MG	COUMADIN 5 MG	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	2+	15 ML	PAUSAR A DIETA 1 HORA ANTES E 1 HORA DEPOIS DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO DEVIDO A DIETA CAUSAR REDUÇÃO NA CONCENTRAÇÃO DE VARFARINA	UBS e uso Hospitalar
VERAPAMIL 80 MG	DILACORON 80 MG	COMPRIMIDO REVESTIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	2+	15 ML		UBS e uso Hospitalar

PSICOTRÓPICOS									
MEDICAMENTO GENÉRICO	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	TRITURAÇÃO/ DILUIÇÃO/ ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR	DISSOLVE SEM TRITURAR	RESÍDUOS	VOLUME DE ÁGUA P/ DILUIR	OBSERVAÇÕES	
ACIDO VALPROICO 250 MG	DEPAKENE	XAROPE	UTILIZAR A OPÇÃO XAROPE	NÃO	SIM	VISCOSO	50 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
ACIDO VALPROICO 500 MG	DEPAKENE	COMPRIMIDO REVESTIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	3+	20 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
AMITRIPTILINA 25 MG	TRYPTANOL	COMPRIMIDO REVESTIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	2+	15 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
BIPERIDENO	AKINETON	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	2+	15 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
CARBONATO DE LÍTIIO	CARBOLITUM	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	4+	10 - 20ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
CARBAMAZEPINA CP	TEGRETOL	COMPRIMIDO REVESTIDO	UTILIZAR A OPÇÃO SUSPENSÃO	NÃO	SIM	3+	15 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
CLONAZEPAM 2 MG	REVOTIL	COMPRIMIDO	UTILIZAR A OPÇÃO SUSPENSÃO OU COMPRIMIDO SUBLINGUAL	SIM	SIM	3+	15 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
CLOPRAMAZINA CP	AMPUCLIL	COMPRIMIDO	UTILIZAR A OPÇÃO GOTAS	SIM	NÃO	2+	15 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
CODEINA 80 MG	CODÉIN	SOLUÇÃO ORAL	NÃO RELATADO NA LITERATURA	NÃO	NÃO			NÃO RELATADO NA LITERATURA	Farmácia do Componente Especializado e Hospitalar
DIAZEPAN CP	DIGESAN	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	1+ / 2+	15 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
FENITONA CP	HIDANTAL	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM		10 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
FENOBARBITAL CP	GARDENAL	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	2+	10 - 20 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
FLUCONITINA	PROZAC	CAPSULA	PREFERÊNCIA UTILIZAR A OPÇÃO GOTAS	SIM	NÃO	1+	20 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
GABAPENTINA 300 MG	NEUROTIN	CAPSULA	ABRIR A CAPSULA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	1+	15 ML		Farmácia do Componente Especializado e Hospitalar
GABAPENTINA 400 MG	NEUROTIN	CAPSULA	ABRIR A CAPSULA, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO		20 ML		Farmácia do Componente Especializado e Hospitalar
HALOPERIDOL 1	HALDOL	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO		10 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
HALOPERIDOL 5	HALDOL	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO		10 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
IMIPRAMINA	TRIOFANIL	DRAGEA	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	2+	15 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
LEVOMEPROMAZINA 100	NECZINE	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO		10 ML		UBS - Unidades de Referência e uso Hospitalar
METAZONA	MYTEDON	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	2+	15 ML		Farmácia do Componente Especializado e Hospitalar
MIGAZOLAM 15 CP	DORMONID	COMPRIMIDO REVESTIDO	UTILIZAR A OPÇÃO SOLUÇÃO ORAL	SIM	SIM	3+	15 ML		Uso hospitalar
MORFINA 10 MG CP	DIMORF	SOLUÇÃO ORAL	UTILIZAR A OPÇÃO SOLUÇÃO ORAL	NÃO	SIM	..	10 - 20 ML		Farmácia do Componente Especializado e Hospitalar
MORFINA 30 MG CP	DIMORF	COMPRIMIDO	NÃO RECOMENDADO UTILIZAR A OPÇÃO VIA ORAL	SIM	NÃO	3+	15 ML		Farmácia do Componente Especializado e Hospitalar
OXICODONA 10 MG	ORXYCOTIN	COMPRIMIDO	ADMINISTRAÇÃO NÃO RECOMENDADA	RISCO DE ALTERAÇÃO FARMACODINÊMICA QUE PODE LEVAR A DEPRESSÃO RESPIRATORIA	Farmácia do Componente Especializado e Hospitalar
OXICODONA 20 MG	ORXYCOTIN	COMPRIMIDO	ADMINISTRAÇÃO NÃO RECOMENDADA	RISCO DE ALTERAÇÃO FARMACODINÊMICA QUE PODE LEVAR A DEPRESSÃO RESPIRATORIA	Farmácia do Componente Especializado e Hospitalar
PARACETAMOL + CODEINA	TYLEN	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	4+	20 ML		Uso hospitalar
QUETIAPINA 100 MG	SENOQUEL	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	NÃO	3+	20 ML		Farmácia do Componente Especializado
SILDENAFIL	VIAGRA	COMPRIMIDO	TRITURAR, DILUIR E ADMINISTRAR IMEDIATAMENTE	SIM	SIM	3+	20 ML		Farmácia do Componente Especializado