## **COLPOSCOPIA - HRG:**

| Paciente:  |                        | Data:                                   |                  |
|--|------------------------|---|------------------|
| Idade:anos DUM:/_/_Filhos:ACO:   | Menopausa:             | Médico:                                 |                  |
| EXAME COLPOSCÓPICO   |                        |   |                  |
| Colposcopia: [ ] adequada [ ] inadequada por : [ ] inflamação [ ]      | atrofia [ ] sangram    | ento [ ] jec não visível                |                  |
| Colo uterino: [ ] ausente [ ] normotrófico [ ] hipotrófico [ ] atrófic | co [ ] não visibilizad | do                                      |                  |
| Muco cervical: [ ] cristalino [ ] opaco [ ] hemático [ ] purulento     | [] ausente             |   |                  |
| Orifício do colo: [ ] puntiforme [ ] ovalado [ ] fenda [ ] irregul     | ar [] circular         |   |                  |
| Junção escamocolunar (JEC): / [ ] endocervical r                       | não visibilizada       |   |                  |
| Achados Colposcópicos Normais: [ ] cistos de Naboth [ ] orifícios      | s glandulares [] re    | epitelização metaplásica                | à                |
| [ ] ilhotas de epitélio glandular                                      |                        |   |                  |
| Achados Colposcópicos Anormais:  |                        |   |                  |
| [ ] epitélio aceto branco [ ] fino [ ] denso                           |                        |   | · ·              |
| [] pontilhado [] fino [] grosseiro                                     |                        | _ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                  |
| [] mosaico [] fino [] grosseiro  | 1                      | _                                       |                  |
| [ ] leucoplasia[ ] erosão  | ·                      | _                                       |                  |
| [ ] orifícios glandulares espessados                                   |                        | _                                       |                  |
| [ ] vascularização atípica   |                        |   | <b>\</b>         |
| Zona de transformação: [ ] Tipo I [ ] Tipo II [ ] Tipo III             | Å ,                    |   |                  |
| Colpite: [ ] difusa [ ] focal [ ] mista [ ] atrófica                   |                        |   | /                |
| Vascularização: [ ] típica [ ] exuberante                              |                        | 0                                       | ÷                |
| Vagina:  |                        |   |                  |
| ·  |                        |   | AA.              |
| Vulva:   | -                      |   |                  |
| ·  |                        |   | ya <sup>y'</sup> |
| Achados vários:  |                        |   |                  |
| Teste de SCHILLER: [ ] Negativo [ ] Positivo Captação de lo            |                        |   |                  |
| Coleta de CO: [ ] sim [ ] não Biópsias: [ ] sim                        | -                      | hs. [ ] não                             |                  |
| Conclusão: Colposcopia sem alterações [ ] Colposcopia c                | om alterações [ ]      |   |                  |