

## **EXAME DE ESPIROMETRIA**

Chegar 10(dez)minutos antes do exame. Evita 04 horas antes do exame as medicações: Berotec, Aerolin, Duovent, Brincanil, Combivent, Aerodenil, Aerojet, Teoden.

Evitar 12 horas antes do exame as medicações: Atrovent, Bamifix, Teolong, Foradil, Oxis.

Outras medicações devem ser usadas normalmente.

Faça uma alimentação leve uma(01) hora antes do exame.

Não tomar: café, café com leite e chá horas antes do exame. **Não fique de jejum.**

Não ingerir bebidas alcoólicas nas ultimas 04(quatro) horas antes do exame. Não fumar 02(duas) horas antes e nem usar batom.

## **ORIENTAÇÕES PARA COLONOSCOPIA**

Tomar 02 comprimidos de bisacordil 05mg- 16h.

Após 05 horas que tomou o bisacordil, tomar 01 frasco de manitol (misturado em água pura + 250ml de água), tomar em até 01(um) hora.

250ml de manitol+250ml de água pura = 500ml

### **Endoscopia**

08(oito) horas de jejum.

## **PARA IGES/HBDF**

Para realizar Estudo Eletrofisiológico e Consulta em Arritmia no Iges/HBDF é necessário levar ECG anteriores e recente.