

FLUXO DE ATENDIMENTO CASO SUSPEITO DE MPOX HRG PACIENTE INTERNADO

Definição de caso: Indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas e/ou erupção cutânea aguda sugestiva de mpox, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo e/ou proctite (por exemplo, dor anorretal, sangramento), e/ou edema peniano, podendo estar associada a outros sinais e sintomas.

PACIENTE INTERNADO NO HRG COM SUSPEITA DE MPOX


Enfermeiro Assistencial

- fornece máscara cirúrgica ao paciente;
- aciona **CHEFIA DE EQUIPE** para atendimento médico o mais rapidamente possível;
- encaminha o paciente para leito de isolamento de setor;

Equipe Médica

- avalia o paciente em leito de isolamento
- define conduta clínica para suspeita de MPox;
- Solicita exames à critério médico, considerando diagnóstico diferencial

Equipe Médica realiza o pedido do PCR para Mpox no Trakcare



Enfermeiro Assistencial

- Coleta SWAB (3 amostras conforme vídeo demonstrativo***) e envia ao laboratório;
- Manter o paciente isolado, enquanto aguarda alta médica pelo diagnóstico que levou a internação;
- O isolamento só deverá ser encerrado após o desaparecimento completo das lesões;

LABORATÓRIO

Coletar amostra de soro. Considerar diagnóstico diferencial***** (sangue: 10ml- frasco bioquímica)

Receber e acondicionar as amostras de swab e soro.

Registrar amostras no GAL

Providenciar encaminhamento das amostras ao **LACEN**

AGUARDAR O RESULTADO

NHEP

NHEP

Notificar as autoridades de saúde competente em 24 horas via telefone e E-SUS NOTIFICA

Identifica os contatos e registra em formulário específico, envia formulário para email institucional do NVEPI com cópia para notificad@saude.df.gov.br

Monitora evolução do caso e encerra o caso epidemiologicamente.

NCIH

Orientação sobre as medidas de isolamento e precaução.

Monitoramento e controle de infecção e uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPI).

Orientação sobre o descarte de resíduos e higienização do local

acesse o vídeo de instrução de coleta de swab para MPOX no QR code abaixo



* **SINAIS DE GRAVIDADE:** Lesões extensas em mucosas e lesões que evoluíram para úlceras dolorosas; lesões com infecção secundária e complicações como celulite e infecções sistêmicas; dificuldade respiratória; convulsões; rigidez de nuca; confusão mental, dentre outros sinais neurológicos; lesões oculares; desidratação severa; disfunção renal; comprometimento hepático; hemorragia e estado geral debilitado (MS com constantes atualizações).

** **ISOLAMENTO:** O isolamento só deverá ser encerrado após o desaparecimento completo das lesões.

*** **VÍDEO COLETA DE AMOSTRA:** QR CODE.

**** **NOTIFICAÇÃO:** Não é necessário encaminhar notificação impressa, mas é obrigatório notificar no site do e-SUS Sinan (<https://esussinan.saude.gov.br/login>). Dúvidas 7304

***** **DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:** HERPES SIMPLES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA; CONCRÓIDE; INFECÇÃO MONOCÓCCICA; REAÇÃO ALÉRGICA; VARICELA; HERPES ZOSTER; INFECÇÃO BACTERIANA DE PELE; LINFOGRANULOMA VENÉREO, MOLUSCO CONTAGIOSO (POXVÍRUS); GRANULOMA INGUINAL.

***** **Nos fins de semana e feriados:** a comunicação deverá ser feita ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) pelos números 99145-6114, 99221-9439 ou ramal 4437.

