Fluxo de Dispensação e Administração do Fármaco Palivizumabe para pacientes Internados no HRG conforme Nota Técnica N.º 5/2024 - SES/SAIS/ARAS

CRITÉRIO 1 - MS

CRITÉRIO 2 - MS

CRITÉRIO 3 - MS

CRITÉRIO 4 - SES/DF

Criança **<2 anos** (1ano, 11 meses e 29 dias), portador de displasia broncopulmonar (doença crônica da prematuridade.

Criança <2 com cardiopatia congênita ou adquirida com quadro clínico de insuficiência cardíaca, hipoxemia e/ou hipertensão pulmonar significativos.

Criança < 1 ano (até 11 meses e 29 dias) que nasceram com idade gestacional até 28 semanas.

Criança **< 6 meses**, que nasceu prematuro, com idade gestacional de 29 semanas a 31 semanas e 6 dias.

PODERÁ SER REALIZADA A PARTIR DE 7º DIA DE VIDA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CLÍNICAS APRESENTADAS NO PERÍODO DE INTERNAÇÃO.

15 MG/KG

Médico Assistencial da unidade de internação deverá:

- Preencher Formulário de Solicitação;
- Preencher Termo de Consentimento;
- Prescrição Trakcare: 1 a 5 doses do medicamento de fevereiro a julho, com intervalo de 30 dias entre as doses.

O enfermeiro da Unidade Assistencial de internação:

- Encaminhar o formulário e o termo de consentimento à Farmácia Hospitalar.
- Administração do fármaco conforme nota técnica vigente. A dose a ser administrada será na posologia de 15mg/kg intramuscular, de preferência na face anterolateral da coxa.

A farmácia hospitalar do HRG:

 Fará a autorização e fornecimento do insumo em conformidade com a nota técnica vigente.

- 1.Após a primeira dose, as doses subsequentes devem ser administradas com intervalo de trinta dias (até cinco doses, no máximo).
- 2. É de responsabilidade da UNIDADE DE INTERNAÇÃO fornecer cópia de toda a documentação (Formulário de Solicitação e Termo de Consentimento) para aplicação de doses subsequentes.
 - 3. Contra indicações não deve ser utilizado em pacientes com histórico em reação grave anterior ao palivizumbe ou qualquer um dos excipientes ou a qualquer outro anticorpo monoclonal.