Termo de Esclarecimento e Responsabilidade Tiotrópio, Olodaterol, Umeclidínio, Vilanterol, Formoterol, Salbutamol, Salmeterol e Glicopirronio, Beclometasona, Budesonida

Eu,	declaro ter sido informado (a) claramente sobre benefícios,			
riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de beclometasona , budesonida , fenoterol , formoterol , salbutamol , salmeterol e brometo de tiotropio , indicados para o tratamento da DPOC .				
Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas foram resolvidas pelo médico Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer as seguinte melhoras: - controle dos sintomas; - melhora da qualidade de vida; - normalização ou estabilização da função pulmonar. Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos duso destes medicamentos: - os riscos na gravidez e na amamentação ainda não são bem conhecidos; portanto, caso engravide, devo avisa mediatamente o médico;				
- efeitos adversos da beclometasona e budesonida: problemas na fala (reversíveis com a suspensão do tratamento), infecções na boca (candidíase), boca seca, alteração do paladar, irritação na garganta, tosse, infecções urinárias, inchaço, cansaço, alergias de pele, palpitação, taquicardia, dor abdominal, vertigem, tontura, ganho de peso; efeitos adversos mais raros: náuseas, vômitos, coceira, problemas na visão, agitação, depressão, insônia, faringite, sinusite, alteração do ciclo menstrual, diarreia ou constipação, febre, dores de cabeça, infecções virais, redução da velocidade do crescimento em crianças, aumento dos níveis de glicose no sangue, reações de hipersensibilidade, sangramento anal e osteoporose (em caso de tratamento longo);				
- efeitos adversos do tiotrópio, olodaterol, umeclidínio, vilanterol, fenoterol, formoterol, salbutamol, salmeterol e glicopirronio: ansiedade, agitação, insônia, náuseas, vômitos, dores abdominais, prisão de ventre, tonturas, dores de cabeça, diminuição dos níveis de potássio no sangue, tremores, palpitações, tosse, respiração curta, alergias de pele, alteração do paladar, secura da boca, dor muscular, reações alérgicas de pele, problemas no coração, aumento ou diminuição intensa da pressão arterial, inchaço dos pés e mãos, cansaço, infecções do trato respiratório, falta de ar, insônia, depressão, dor de dente, alteração do ciclo menstrual e problemas de visão; - o risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem e com o uso concomitante de outros medicamentos. Estou ciente de que este(s) medicamento(s) somente pode(m) ser utilizado(s) por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei a ser				
atendido(a), inclusive em caso de desistir de usar o medicamento. Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que assegurado o anonimato.				
O meu tratamento constará de um ou mais dos seguintes medicamentos: Dumeclidínio Dvilanterol xDtiotrópio xDolodatero				lodaterol
Local:	Data:			
Nome do paciente:				
Cartão Nacional de Saúde:	,		9	
Nome do responsável legal:				
Documento de identificação do responsável legal:				
Assinatura do paciente ou do responsável legal				
Médico Responsável:	i je njektoru –	. sug - manthalistic or or or or	CRM:	UF: DF
Assinatura e carimbo do médico Data:				
Suu.				

Observação: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento de medicamento do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada na farmácia, e a outra, entregue ao usuário ou a seu responsável legal.