

Faculté de Médecine de Monastir

Préparation à l'Examen Classant National 2025

Questions d'évaluation

Sujet 21 : Diarrhées chroniques (Objectif 1)

Sujet 74 : Ulcère gastrique et duodénal (Objectif 1)

Sujet 68 : Troubles acido-basiques (Objectifs 1-2-3-4)

Syrine GALLAS (M.D, Ph.D)

Professeur Hospitalo-Universitaire

Laboratoire de Physiologie (Faculté de Médecine de Monastir)

Service de Physiologie et des Explorations Fonctionnelles (CHU Sahloul)

SUJET 21 : QUESTIONS D'EVALUATION

- 1. L'absorption intestinale du fructose :**
 - A. est couplée avec les ions Na^+
 - B. est identique à celle du glucose
 - C. est totale
 - D. fait intervenir le transporteur GLUT2 du côté basal
 - E. se fait par diffusion facilitée

- 2. L'absorption intestinale des protéines :**
 - A. est couplée avec celle du potassium
 - B. est totale
 - C. met en jeu des transporteurs dépendants du Na^+
 - D. met en jeu des transporteurs dépendants du H^+
 - E. peut se faire par endocytose-exocytose

- 3. La formation de micelles est nécessaire pour l'absorption intestinale:**
 - A. de la vitamine A
 - B. de la vitamine C
 - C. du fer
 - D. du calcium
 - E. du cholestérol

- 4. L'absorption intestinale de l'eau :**
 - A. dépend de l'absorption des nutriments
 - B. emprunte les voies trans et paracellulaires
 - C. est de l'ordre de 900 ml/24heures
 - D. est maximale au niveau du duodénum
 - E. est totale

- 5. L'absorption intestinale se fait totalement pour :**
 - A. la cellulose
 - B. le cholestérol
 - C. le fructose
 - D. le glucose
 - E. les acides aminés

- 6. L'iléon est le lieu d'absorption spécifique pour:**
 - A. le fer
 - B. le calcium
 - C. les sels biliaires
 - D. la vitamine C
 - E. la vitamine B12

SUJET 74 : QUESTIONS D'EVALUATION

- 1. La sécrétion acide par les cellules pariétales :**
 - A. est initiée par l'ouverture d'un canal chloré
 - B. est un transport passif
 - C. fait intervenir une pompe H^+/Na^+ATP^{ase}
 - D. passe par trois phases de régulation
 - E. s'arrête après repli des canalicules sécrétoires

- 2. La sécrétion acide gastrique augmente sous l'effet de :**
 - A. l'acétylcholine
 - B. l'histamine
 - C. la cholécystokinine
 - D. la sécrétine
 - E. la somatostatine

- 3. La sécrétion de gastrine par la cellule G est stimulée par:**
 - A. l'arrivée d'aliments riches en protéines
 - B. l'histamine
 - C. la distension de la paroi gastrique
 - D. la stimulation vagale
 - E. un pH gastrique < 2

- 4. La sécrétion de gastrine par la cellule G est inhibée par :**
 - A. l'acétylcholine
 - B. l'histamine
 - C. le peptide vasoactif intestinal
 - D. la sécrétine
 - E. la somatostatine

- 5. La sécrétion acide gastrique est inhibée par :**
 - A. l'acidité elle-même
 - B. l'histamine
 - C. la gastrine
 - D. la sécrétine
 - E. la somatostatine

SUJET 68 : QUESTIONS D'EVALUATION

1. Les ions hydrogène de l'organisme:

- A. sont éliminés sous forme d'acides volatils par les poumons
- B. sont éliminés sous forme d'acides fixes par les reins
- C. sont principalement produits par le métabolisme cellulaire oxydatif
- D. diminuent en cas de régime hyper-protidique
- E. augmentent en cas de régime végétarien

2. Le système tampon bicarbonate-acide carbonique :

- A. a une masse constante
- B. est efficace en cas d'alcalose
- C. est peu efficace en cas d'acidose
- D. est soumis à un double contrôle viscéral
- E. a une activité importante au niveau intracellulaire

3. Les chémorécepteurs centraux :

- A. ont un délai d'action de quelques heures
- B. sont insensibles au CO_2
- C. sont sensibles à la PO_2
- D. sont stimulés par les ions H^+
- E. stimulent les muscles ventilatoires

4. Les chémorécepteurs périphériques :

- A. ont une action lente
- B. sont insensibles aux CO_2
- C. sont sensibles à la PO_2
- D. sont stimulés par les ions H^+
- E. inhibent les muscles ventilatoires

5. Le rein intervient dans l'équilibre acido-basique :

- A. au bout de quelques secondes
- B. en éliminant une urine de pH variable
- C. en sécrétant les acides fixes
- D. en sécrétant les acides volatils
- E. en sécrétant les bases

6. La réabsorption tubulaire des bicarbonates :

- A. est maximale dans le néphron distal
- B. concerne 50 % des bicarbonates filtrés
- C. s'accompagne d'une réabsorption de Na^+ et d'une sécrétion d'ions H^+ dans le néphron proximal
- D. s'accompagne d'une réabsorption de K^+ et d'une sécrétion d'ions H^+ dans les cellules intercalaires A
- E. diminue en cas d'acidose

7. La réabsorption tubulaire des bicarbonates peut augmenter sous l'effet d'une:

- A. hypovolémie
- B. hypokaliémie
- C. hypochlorémie
- D. hypocapnie
- E. hypocalcémie

8. Le tampon phosphate inorganique:

- A. a une masse variable
- B. est un tampon ouvert
- C. joue un rôle essentiel dans les compartiments extracellulaires
- D. joue un rôle essentiel dans les urines
- E. permet de régénérer des ions bicarbonates au niveau urinaire

9. Le tampon ammonique :

- A. est produit à partir de la glutamine
- B. est d'autant plus actif que le pH plasmatique est bas
- C. est responsable du 1/3 de l'excrétion urinaire acide
- D. excrète les ions H^+ sous forme d'acidité titrable
- E. permet de régénérer des ions bicarbonates au niveau urinaire

10. L'excrétion tubulaire de l'ammonium est favorisée par :

- A. l'acidose
- B. l'alcalose
- C. la déplétion en potassium
- D. l'aldostérone
- E. le traitement par des corticoïdes