

Infections urinaires


C45

ECN 2025

Pr. Amel CHAABANE

dr.amelchaabane@gmail.com

Auto-évaluation C45



I

Parmi les antibiotiques suivants, le(s)quel(s) peut(vent) être(s) administré(s) par voie orale ?

- ☐ Aminosides
- ☐ Céphalosporines de troisième génération
- ☐ Quinolones
- ☐ Cotrimoxazole
- ☐ Imipénème

Parmi les antibiotiques suivants, le(s)quel(s) est(sont) actif(s) sur *Pseudomonas aeruginosa* ?

- ☐ Aminopénicillines
- ☐ Carbénicilline
- ☐ Pipéracilline
- ☐ Acide clavulanique
- ☐ Céfotazidime

Parmi les antibiotiques suivants, le(s)quel(s) agi(ssen)t sur la paroi bactérienne ?

- ☐ Bêta-lactamines
- ☐ Fosfomycine
- ☐ Gentamycine
- ☐ Lévofloxacine
- ☐ Nitrofuranes

Une cystite chez la femme enceinte peut être traitée par :

- ☐ Ofloxacine
- ☐ Amoxicilline-acide clavulanique
- ☐ Gentamycine
- ☐ sulfaméthoxazole- triméthoprim
- ☐ Fosfomycine-trométamol

Parmi les propositions suivantes la(les) quelle(s) ne s'applique(nt) pas à la néphrotoxicité induite par les aminosides :

- ☐ Elle est de type immuno-allergique
- ☐ Elle n'est pas réversible
- ☐ Elle est favorisée par l'administration du furosémide
- ☐ Elle s'accompagne d'une hématurie macroscopique
- ☐ Elle s'exerce sur l'anse de Henlé

Parmi les antibiotiques suivants le(s)quel(s) est(sont) une(des) bêta-lactamine(s) :

- ☐ Céfotaxime
- ☐ Pipéracilline
- ☐ Lincomycine
- ☐ Tobramycine
- ☐ Tazobactam

L'association amoxicilline-acide clavulanique

- ☐ a une bonne diffusion rénale
- ☐ est administrée par voie intra veineuse
- ☐ est éliminée par la bile
- ☐ peut être à l'origine de tendinopathies
- ☐ n'est pas active sur les staphylocoques

Parmi les propositions suivantes lesquelles s'appliquent aux aminosides :

- ☐ sont des antibiotiques bactéricides concentrations dépendants
- ☐ l'atteinte cochléaire est plus précoce que l'atteinte vestibulaire
- ☐ peuvent être administrés en monoprise quotidienne
- ☐ la concentration plasmatique est corrélée à la toxicité
- ☐ ils inhibent la synthèse protéique en se fixant sur l'unité 50S du ribosome bactérien

Les fluoroquinolones :

- ☐ sont bactériostatiques
- ☐ ont un effet post-antibiotique prolongé
- ☐ sont indiqués dans les prostatites
- ☐ peuvent être utilisés chez l'enfant
- ☐ ont une diffusion tissulaire limitée

Parmi les antibiotiques suivants, lesquels sont indiqués chez un homme de 40 ans présentant une prostatite aiguë avec un ECBU révélant un E.Coli multi-sensible ?

- ☐ Ampicilline
- ☐ Cotrimoxazole
- ☐ Amikacine
- ☐ Colimycine
- ☐ Ciprofloxacine

Chez une femme de 23 ans enceinte de 7 mois sans antécédents et qui présente un tableau de pyélonéphrite aiguë avec une fièvre à 38°C bien tolérée, vous prescrivez de première intention :

- ☐ Une fluoroquinolone
- ☐ Une céphalosporines de troisième génération
- ☐ L'association sulfaméthoxazole-triméthoprim
- ☐ Un macrolide
- ☐ Un aminoside

Parmi les propositions suivantes concernant la cystite à *Escherichia coli*, lesquelles sont justes ?

- ☐ Elle survient plus fréquemment chez la femme que chez l'homme
- ☐ Le diabète constitue un facteur favorisant
- ☐ Elle se rencontre en pathologie communautaire
- ☐ La norfloxacine est parfois utilisée pour son traitement
- ☐ L'antibiothérapie est toujours administrée par voie parentérale

Quel antibiotique parmi les suivants n'est pas une céphalosporine de troisième génération :

- ☐ Céfixime
- ☐ Ceftriaxone
- ☐ Cefazoline
- ☐ Cefotaxime
- ☐ Cefpodoxime

Concernant les fluoroquinolones, quelles sont les réponses justes ?

- ☐ Certaines sont des inducteurs enzymatiques
- ☐ Ce sont des antibiotiques bactéricides à effet concentration dépendant.
- ☐ Les résistances aux fluoroquinolones sont uniquement d'origine chromosomique.
- ☐ Leur liaison aux protéines plasmatiques est faible.
- ☐ Les sels de fer diminuent l'absorption digestive des fluoroquinolones par chélation

Laquelle des affirmations suivantes ne s'applique pas au cotrimoxazole?

- ☐ Il est utilisé pour le traitement des infections urinaires à bactérie sensible
- ☐ Il est constitué de l'association de deux agents antimicrobiens agissant en synergie
- ☐ Il agit par perturbation de la synthèse des bases puriques et pyrimidiques de la bactérie
- ☐ Toutes les entérobactéries y sont naturellement résistantes
- ☐ Il est administrable par voie orale