

FACULTE DE MEDECINE IBN EL JAZZAR DE SOUSSE



Questions de cours de résidanat

ARRET CARDIO-CIRCULATOIRE

Physiopathologie, Diagnostic, Traitement

Dr Ines GHANNOUCHI

inès.ghannouchi@hotmail.com

**Laboratoire Physiologie
et Explorations Fonctionnelles**

Année universitaire

2025-2026

QCM 1:

La vitesse de conduction électrique est la plus rapide au niveau :

- A. Nœud sinusal
- B. Les oreillettes
- C. Le faisceau de Hiss
- D. Les fibres de Purkinje
- E. Le nœud auriculo-ventriculaire

QCM 2:

Le potentiel de membrane de repos de la cellule musculaire cardiaque est maintenu grâce :

- A. La pompe Na^+/K^+ ATPase
- B. La grande perméabilité membranaire au Na^+
- C. La grande perméabilité membranaire aux anions
- D. La diffusion passive du Na^+ contre son gradient de concentration
- E. La grande perméabilité membranaire au K^+

QCM 3 :

La dépolarisation ventriculaire se manifeste sur l'ECG par :

- A. L'onde P
- B. Le complexe QRS
- C. L'intervalle QT
- D. L'intervalle PR
- E. Le segment ST

QCM 4 :

Le potentiel de repos d'une cellule musculaire cardiaque banale :

- A. Est de l'ordre de -90 mV
- B. Dépend de la perméabilité membranaire aux ions Na^+ et K^+
- C. Est instable
- D. Est maintenue grâce à la pompe Na^+/K^+ ATPase
- E. Est égale à celui du tissu nodal

QCM 5 :

Les cellules du tissu nodal :

- A. Sont excitables
- B. Sont douées d'un automatisme
- C. Sont innervées uniquement par le système parasympathique
- D. Sont conducteurs
- E. Ont un potentiel de repos stable

QCM 6 :

Le nœud sinusal :

- A. A une pente de dépolarisation spontanée la plus rapide
- B. A un rythme de dépolarisation spontané à 70/min
- C. A un PA avec un plateau
- D. Est situé au niveau de l'oreillette gauche
- E. A une régulation nerveuse

QCM 7 :

La phase 0 du potentiel d'action cardiaque des cellules cardiaques banales est due à

- A. L'ouverture de canaux ioniques rapides à Na^+
- B. La sortie massive de Na^+
- C. La fermeture des canaux potassiques
- D. L'ouverture des canaux calciques lents
- E. L'ouverture des canaux Na^+ funny

QCM 8 :

La phase 4 du potentiel d'action des cellules sinusales :

- A. Est une dépolarisation spontanée
- B. Est due à l'activation des canaux calciques transitoires
- C. Sa pente augmente par la stimulation parasympathique
- D. Est due à l'inactivation des canaux I_f
- E. Est due à une entrée massive de K^+

QCM 9 :

Le PA d'une cellule sinusale diffère de celui des cellules myocardiques banales :

- A. Une phase 2 plus longue
- B. Une pente de dépolarisation (phase 0) plus raide
- C. Une phase 4 instable
- D. Une durée totale plus longue
- E. Des phases 1 et 2 confondues

QCM 10:

Le PA d'une cellule myocardique banale est caractérisé par :

- A. Une ouverture des canaux sodiques lents au cours de la phase 2
- B. Une ouverture des canaux potassiques au cours de la phase 3
- C. Un plateau de dépolarisation dû à l'entrée de Ca^{2+} et la sortie de K^{+}
- D. Une fermeture de canaux calciques lents au cours de la phase 2
- E. Une phase 1 et une phase 2 confondues