

Préparation au Concours de Résidanat 2025

QCM à choix multiples portant sur le **Sujet N° 36**

Hydatidose hépatique et pulmonaire : Objectifs 1, 2, 3, 8, et 13

**Pr. Fathallah Akila
Dr. Chouaieb Hamed**

QCM 1 :

L'échinococcose hydatique humaine en Tunisie sévit selon un mode :

- A- Sporadique
- B- Hyperendémique
- C-Holoendémique
- D-Hypoendémique
- E-Epidémique

QCM 2 :

En Tunisie, l'incidence de l'hydatidose humaine est particulièrement élevée dans les Gouvernorats suivants :

- A- Tataouine
- B- Siliana
- C- Kairouan
- D- Le Kef
- E -Sfax

QCM 3 :

Les facteurs d'hyper-endémicité du KH en Tunisie sont :

- A- La fréquence élevée d'abattage clandestin (non contrôlé)
- B- La fréquence élevée d'élevage traditionnel
- C- Les difficultés de ramassage des carcasses des ruminants décédés
- D- Le climat tempéré en Tunisie
- E- La densité élevée du réservoir bovin

QCM 4 :

L'échinococcose kystique (EK) pose un problème de santé publique du fait de son endémicité très élevée dans les pays suivants :

- A- Turquie
- B- Inde
- C- Arabie Saoudite
- D- Le Soudan
- E -Espagne

QCM 5 :

L'échinococcose kystique du poumon :

- A- Représente la localisation la plus fréquente chez l'Homme
- B- Touche souvent les sujets âgés
- C- Est plus fréquente chez les hommes que les femmes
- D- Peut être associée à une localisation extra-pulmonaire
- E- Est toujours associée à une localisation hépatique

QCM 6:

***Echinococcus granulosus* :**

- A- Est un Nématode
- B- Présente 3 formes parasitaires évolutives au cours de son cycle
- C- Le ver adulte vit dans l'intestin grêle de l'Homme
- D- Le premier anneau de l'adulte est ovigère
- E- L'adulte est de quelques mètres de long

QCM 7 :

Quelles sont les réponses correctes concernant les œufs d'*Echinococcus granulosus*, ils:

- A- Comportent une coque externe rigide
- B- Comportent une coque interne appelée embryophore

- C- Comportent un embryon hexacanthé
- D- Sont résistants dans le milieu extérieur
- E- Ont une longévité courte dans le milieu extérieur

QCM 8:

Les 3 formes évolutives d'*Echinococcus granulosus* sont :

- A- L'Embryon hexacanthé
- B- Le ver adulte
- C- Le scolex
- D- Les oeufs
- E- La forme larvaire ou hydatide

QCM 9 :

Dans le cycle parasitaire d'*Echinococcus granulosus* :

- A- L'Homme abrite le ver adulte contenant de nombreux scolex
- B- L'Homme est un hôte définitif accidentel
- C- L'Homme est habituellement une impasse épidémiologique
- D- L'Homme prend la place des animaux herbivores
- E- L'hydatidose animale est exclusivement ovine

QCM 10 :

L'Homme contracte l'EK par:

- A- Contact direct avec un chien ténifère
- B- Ingestion de foie de mouton parasité
- C- ingestion de crudités souillées d'embryophores
- D- ingestion d'eau contaminée d'embryophores
- E- Ingestion de foie de bœuf parasité

QCM 11 :

Au niveau des poumons, la greffe parasitaire :

- A- Est souvent primitive
- B- Peut être secondaire par rupture d'un kyste dans les bronches
- C- N'est jamais hémotogène
- D- Peut être à l'origine d'une autre localisation.
- E- Est souvent associée à une localisation cardiaque droite.

QCM 12 :

Dans le cycle parasitaire d'*Echinococcus granulosus* :

- A- Le chien héberge habituellement un seul ver adulte
- B- Le chien est un semeur d'œufs
- C- Le chien est une source de contamination directe de l'Homme
- D- Le chien peut être contaminé par les embryophores souillant le sol
- E- Le chien élimine spontanément des Ténias entiers

QCM 13 :

En Tunisie, des études d'épidémiologie moléculaire faites sur des kystes hydatiques de l'homme et de l'animal ont permis de montrer la présence des souches d'*Echinococcus granulosus* suivantes :

- A- Souche ovine commune
- B- Souche bovine
- C- Souche équine
- D- Souche porcine
- E- Souche caméline

QCM 14 :

Les constituants de la larve hydatique sont :

- A- L'adventive
- B- La cuticule ou membrane lamellaire

- C- La membrane germinative ou proligère
- D- Le liquide hydatique
- E- Le sable hydatique

QCM 15:

La membrane proligère:

- A- Est la couche la plus externe
- B- Donne naissance à tous les constituants du kyste
- C- Joue un rôle essentiel dans la croissance du kyste
- D- Est anhiste
- E- Laisse passer vers l'organisme les produits du métabolisme du parasite

QCM 16 :

Le liquide hydatique est:

- A- Riche en protoscolex
- B- Fortement antigénique
- C- Est responsable des réactions anaphylactiques dues à la rupture du KH
- D- Septique
- E- Eau de roche

QCM 17 :

Dans le cadre de l'échinococcose kystique humaine, la sérologie hydatique :

- A-Permet de confirmer le diagnostic en cas de positivité
- B-Permet d'éliminer le diagnostic en cas de négativité
- C-Est négative dans les formes asymptomatiques
- D-Permet de dépister une récurrence postopératoire
- E-Se négative rapidement au postopératoire immédiat

QCM 18 :

Le diagnostic biologique de l' échinococcose kystique du foie se fait par :

- A- un examen parasitologique des selles
- B- la sérologie
- C - un frottis sanguin
- D - un examen parasitologique des urines.
- E - la ponction du kyste

QCM 19 :

Les indications de la sérologie hydatique sont :

- A- Le bilan étiologique d'une collection liquidienne au niveau du foie
- B- L'évaluation de la gravité d'une échinococcose kystique
- C- Le suivi postopératoire d'une échinococcose kystique
- D- L'identification du type d'une échinococcose kystique
- E- Les enquêtes épidémiologiques

QCM 20 :

La prophylaxie collective (générale) contre l'échinococcose kystique est basée sur :

- A-Traitement du cheptel ovin atteint
- B-Vaccination des chiens
- C-Abattage des chiens errants
- D-Traitement des chiens à propriétaires
- E-Amélioration de l'assainissement en zones rurales