

FACULTE DE MEDECINE IBN EL JAZZAR SOUSSE



PREPARATION DU CONCOURS DE RESIDANAT

La maladie ulcéreuse gastro-duodénale

Les Diarrhées chroniques

Pr Monia ZAOUALI AJINA

Aout 2025

Sujet n°74 : LA MALADIE ULCEREUSE GASTRODUODENALE**1/ Concernant la cellule pariétale gastrique :**

- A. Elle sécrète l'acide chlorhydrique via une pompe H^+/K^+ -ATPase
- B. Elle est stimulée par l'histamine, la gastrine et l'acétylcholine
- C. Elle est localisée principalement au niveau de l'antre gastrique
- D. Elle sécrète également le facteur intrinsèque
- E. Sécrète le pepsinogène

2/ Les cellules pariétales de l'estomac possèdent des récepteurs à :

- A. la somatostatine
- B. la noradrénaline
- C. l'histamine
- D. la Gastrin Releasing Peptide
- E. l'acétylcholine

3/ La sécrétion acide de l'estomac :

- A. met en jeu l'anhydrase carbonique
- B. est initiée par l'ouverture d'un canal chloré et d'un canal potassique
- C. est assurée par les cellules principales
- D. est arrêtée par le repli des canalicules sécrétoires des canaux ioniques
- E. nécessite l'activation de la pompe H^+/Na^+ ATPase

4/ La sécrétion gastrique de H^+ par les cellules pariétales :

- A. Est activée par l'acétylcholine sur des récepteurs muscariniques
- B. Est stimulée par l'atropine
- C. Est inhibée par l'histamine
- D. Est inhibée par une forte acidité dans la lumière gastrique
- E. Est stimulée par les prostaglandines

5/ La gastrine est libérée :

- A. Par les cellules G de l'estomac
- B. En période post-prandiale
- C. En réponse à la distension de l'estomac
- D. En réponse à l'acidité gastrique
- E. En réponse à l'histamine

6/ La gastrine stimule :

- A. La sécrétion pancréatique exocrine
- B. La sécrétion d'histamine
- C. La sécrétion acide des cellules pariétales de l'estomac
- D. La croissance de la muqueuse gastrique
- E. La contraction de la vésicule biliaire

7/ L'histamine :

- A. Potentialise les effets de la gastrine sur la sécrétion gastrique
- B. Stimule la sécrétion de H^+ par la muqueuse gastrique
- C. Stimule la sécrétion de gastrine par les cellules G de l'antre gastrique
- D. est sécrétée en réponse à une stimulation sympathique
- E. Est sécrétée par les cellules ECL de la muqueuse gastrique

8/ La libération de gastrine :

- A. Peut être secondaire à une stimulation vagale
- B. Peut être secondaire à une stimulation sympathique
- C. Est bloquée par l'atropine
- D. Est stimulée par l'action du GRP sur les cellules G de l'estomac
- E. Est stimulée par action de l'acétylcholine sur les cellules G de l'estomac

9/ Au niveau de la cellule G de l'estomac, on trouve des récepteurs à :

- A. la somatostatine
- B. la noradrénaline
- C. l'histamine
- D. la Gastrin Releasing Peptide
- E. l'acétylcholine

10/ Concernant les inhibiteurs de la sécrétion acide gastrique :

- A. Les inhibiteurs de la pompe à protons bloquent la H^+/K^+ ATPase
- B. Les anti- H_2 bloquent l'action de la gastrine
- C. L'oméprazole est un inhibiteur irréversible de la pompe à protons
- D. L'atropine inhibe la stimulation cholinergique de la cellule pariétale
- E. L'atropine inhibe la stimulation de la cellule pariétale par la gastrine

11/ À propos des phases de la sécrétion acide gastrique :

- A. La phase céphalique est déclenchée avant l'arrivée du bol alimentaire dans l'estomac
- B. La phase gastrique est médiée par la distension gastrique et la gastrine
- C. La phase intestinale inhibe généralement la sécrétion acide
- D. La phase céphalique est celle qui produit le plus d'acide
- E. La phase intestinale est médiée par le vague

12/ À propos du rôle de l'acide chlorhydrique dans l'estomac :

- A. Il permet la dénaturation des protéines
- B. Il active le pepsinogène en pepsine
- C. Il favorise l'absorption de la vitamine B12 indépendamment du facteur intrinsèque
- D. Il exerce un effet bactéricide
- E. Il est tamponné en grande partie par les bicarbonates gastriques

SUJET : LES DIARRHEES CHRONIQUES**Objectif 2 : Expliquer les mécanismes de l'absorption intestinale :****1/ La surface d'absorption de l'intestin grêle dépend de :**

- A. la longueur totale de l'intestin
- B. de l'intégrité des villosités
- C. des cellules à mucus
- D. des entérocytes
- E. des bactéries présentes dans l'intestin grêle

2/ A propos de l'absorption des électrolytes au niveau des cellules intestinales :

- A. le sodium pénètre dans la cellule intestinale par les canaux sodiques, un co-transport sodium-glucose- ou un co-transport sodium- acide aminé
- B. le passage de sodium dans la cellule intestinale est inhibé par l'aldostérone
- C. le passage de sodium dans la cellule intestinale peut être couplé à celui du chlore
- D. la pompe $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPase}$ de la membrane baso-latérale joue un rôle important dans l'absorption de l'eau et des sels minéraux
- E. la sécrétion de chlore par la cellule intestinale est inhibée par la toxine cholérique

3/ L'absorption intestinale du glucose :

- A. A lieu dans le jujénum
- B. Est totale
- C. Nécessite des symports glucose sodium de la membrane apicale des cellules épithéliales
- D. Fait intervenir des Glut 2 de la membrane apicale des cellules intestinales
- E. Nécessite des symports glucose sodium de la membrane basale des cellules épithéliales

4/ L'absorption intestinale des acides aminés :

- A. A lieu dans l'estomac
- B. A lieu dans l'intestin grêle
- C. Dépend d'un symport acide aminé sodium analogue au transporteur de glucose
- D. Peut se faire par diffusion passive sans transporteur à travers les cellules intestinales
- E. Se fait sous forme de micelles

5/ L'absorption intestinale des lipides :

- A. nécessite au préalable la formation de micelles
- B. a lieu dans l'intestin grêle

- C. dépend d'un transporteur dépendant du sodium
- D. est totale si l'apport de lipides est inférieur à 300g/j
- E. se poursuit par une digestion cytoplasmique

6/ A propos de la digestion et l'absorption des protides :

- A. la digestion des protides débute au niveau de la bouche
- B. certains di et tripeptides sont hydrolysés par des peptidases intracellulaires
- C. les acides aminés sont transportés dans les entérocytes par un système dépendant du sodium
- D. l'absorption des acides aminés est rapide au niveau du duodénum et du jéjunum
- E. 25% des protéines présentes dans l'intestin grêle échappent à la digestion et à l'absorption

7/ A propos de la digestion et de l'absorption des glucides :

- A. la digestion des polysaccharides en monosaccharides se produit au niveau de la bordure en brosse par les disaccharidases
- B. l'absorption du glucose est Na^+ dépendante
- C. la digestion des glucides est très lente
- D. l'absorption du fructose est Na^+ dépendante
- E. elle siège surtout au niveau de l'iléon terminal

8/ Une malabsorption de protides peut s'observer en cas :

- A. insuffisance de sécrétion pancréatique exocrine
- B. déficit en sels biliaires
- C. résection jujénale importante
- D. atrophie villositaire
- E. dénutrition

9/ Une malabsorption des lipides :

- A. peut s'observer en cas de résection iléale
- B. peut s'observer en cas de gastrectomie
- C. peut s'observer en cas d'obstruction des voies biliaires
- D. peut être objectivée par la détermination du débit fécal de graisse
- E. est toujours accompagnée d'une malabsorption des protides et des glucides

10/ Le chylomicron :

- A. est une lipoprotéine synthétisée dans le foie
- B. est une lipoprotéine synthétisée dans l'entérocyte
- C. est une forme d'absorption des lipides au niveau apical
- D. est drainé par la circulation porte
- E. est responsable de l'aspect lactescent du sérum en postprandial